



E L E M E N T A
P H Y S I O L O G I A E
C O R P O R I S H U M A N I.

A U C T O R E

ALBERTO v. HALLER,

P R E S I D E S O C I E T A T I S R E G . S C I E N T . G Ö T T I N G .
S O D A L I A C A D D . R E G . S C I E N T . P A R I S . R E G . C H I R . G A L L .
I M P E R . B E R O L I N . S U E C I C . B O N O N I E N S . B A V A R .
S O C I E T . S C I E N T . B R I T A N N . U P S A L . B O T . F L O R . H E L V E T .
I N S E N A T U S U P R E M O B E R N E N S I D U C E N T U M V I R O .

T O M U S S E C U N D U S .

S A N C U I S . E J U S M O T U S . H U M O R U M S E P A R A T I O .



L A U S A N N A .

Sumptibus SIGISMUNDI D'ARNAY

M D C C L X



F R I D E R I C O V.
DANORUM, NORVEGORUM,
GOTHORUM, VANDALORUM
R E G I
P I O, F E L I C I, S A P I E N T I

*Inscriptum sacro Tu o^m nomini librum
ea cum indulgentia acceptum fuisse,
qua conatibus hominum literatorum pro-*

*pitius soles adfulgere, ex Regia TUA libe-
ralitate edoctus, aucta cum alacritate ad opus
perficiendum accessi, quod TIBI REGUM
SAPIENTISSIMO, non videretur displicuisse.
In omnibus imperii artibus TE potestate su-
prema ita uti, universa Europa testatur, ut
TUUS septentrio, medias inter convulsi Orbis
calamitates, serena pace fruatur, unaque &
commercia, & opicia, & agri cultus, &
felicis vite praesidia apud gentes TIBI sub-
jectas quotidiana capiant incrementa. Sed
etiam ea minime dignabilis summi fastigii
est prærogativa, quod ipsi hominum animi,
& Divina TUA munificentia, tanquam a be-
neficio*

nefico sole, novos ad fructus ferendos concavescant. Ita DEI, Regum exempli, ad similitudinem TE conformasti, ut ingenia alas, excitesque, quæ IPSE dedit.

R O C H E Bernensium d. 22. Oct. 1759.



P R A E F A T I O.

Serius si hoc volumen prodit , partim rerum meanum conversus status in culpa est , partim bibliopolarum festilio , inque novam societatem cœcuntini jone necessariae moræ , partim experientia , quæ deullo incubato numerosa interim edidi .

Levis hæc culpa est , majorem vereor ne commiserim in parte operis , quæ pene tota in hypothesi versetur , aque anatomæ luce remotior , ex mera speculatione sit repetenda . Dicenda fuerunt , quæ ipse non viderim , chemica imprimis experimenta , dicenda , quæ nemo mortalium vidit , & in elementis corporis animalis N A T U R A E occulta potestas regit , exemplo secretionum .

Priora corrigere neque vitæ genus sivit , neque certe vehementer concupivi . Ab egregiis viris summa cum cura faclæ analyses , in maximis explorandi sanguinis voluminibus , haud facile a me quidem emendari potuerunt .

Quæ nemo vidit , exque mentis speculantis meditatione repeatuntur , studui ut quam facilissimo sermone proponerem , neque spem facerem

facerem majoris certitudinis , quam quidem prefitorus esset.
Lætus autem ad respirationem exponendam redeo , que & ab anato-
me declaretur , & a vivis animalium incisionibus , & a notissimis
experimentis , que aeris indolem declarant. Ad eum ergo laborem
me transiero , ad quem D E U S ipse mihi otium concepit , qui in
quiete patrie silentem recessum me duxit , ubi præter mea studia
neque officia mihi fere superercent , neque voluptas ulla.

Repetitiones , exosum mihi vitium & lectori fastidiosum , non po-
tui undique evitare. Nimirum frequenter de eadem , duobus locis pluri-
busque agitur , ut utroque necesse sit experimenta producere ,
& fe tueri ratiocinio : neque enim ab omni tirone sperare licet ,
ad priorem locum eum reversurum , quo caue momenta trade-
bantur.

Voluminis brevitatem deprecor. Nutritionis & incrementi his-
toriam , huic tomo destinatam , vidi certe relictus cum embryonis e-
vocatione , & incrementis conjungi. Quare libri integri argu-
mento ad finem totius operis rejecto , hujus quidem Tomi pa-
ginis aliquid decepsit. Sed ferenda ea jactura erit , dum reliqua fir-
ma , dum facilita ea sint.

His dum finem impono , video III. ALBINI Adnotationum L. IV.
qui acrem censuram mihi imprimis summo viro opponere visum
est . discipulumque sui amansissimum , a quo tot locis cum merito qui-
dem , sed tamquam grato , sed voluntario , sed vividissimo suæ ve-
nerationis testimonio , laudatus esset , opprimere , quantum quidem
in tanta auctoritate potest . non est deditiugatus. Nunquam equi-
dem id obtinebit , quin memor si u scholarum , quas ante 32 an-
nos apud eum frequentavi , quin juventutis meæ Praeceptorem
aeternum suspiciam , quin honores ejus pergam ornare. Id unice
ne Ipsi quideam displicerit , si lineas , que adeo vehementer ipsi
displicerunt , hic interpretatus fuerim.

WACHENDORPIUS fuit , olim vir morum suavissimorum , qui
propriis ad me datis literis conquestus est , de silentio , quo com-
munis noster Praeceptor membrane pupillaris WACHENDORFI-

ANAM

A N A M descriptionem præterierat. Non veritus est mecum queri, suumque apud me dolorem deponere, quent noverat, ejusdem membranæ, proprios per labores detectæ, inventione ipsi facilime cessisse, quam primum priora Viri optimi jura psvideram.

Nunc de fabrica non vasculosa corporis agitur, deque valvula coli. Illam quidem refutaverat **ALBINUS**, refutaveram ego, **ALBINI** excitato Ill. nomine. Sed erat certe multa pars mea, quam poterat **P R E C E P T O R** in discipulo laudasse, si perinde, ut ego soleo, discipulorum laude letaretur. Dissolvi in aqua membranas corporis humani aut plurimas, aut omnes, & vidi in cellulofas, solidas squamas secedere. Non ex intertextis vasis ergo, sed flocculis filisque fieri, quodcumque esset membranosi, experimentis confirmari.

Dudum iis, & ab anno 1747. in primis lineis, periculis usus fueram, dudum noster **S C H O B T I N G E R U S** suis in thesibus anno 1748. eadem proposuerat. Eaque experimenta, ut nunc quidem recordor, non erant neque aut a **K A A U W I O**, aut ab Ill. **A L B I N O** facta.

Potuerat Ill. **A L B I N U S**, cum opinione: contrariam refelleret, horum laborum meminisse, neque ego, si Providentia vices nostras commutasset, hanc opportunitatem innocentissimæ cupedinis benefaciendi mihi passus essem eripi. Id adnotavi, non meo nomine, sed tamquam scriptor diarii. Alter enim in diario, aliter nostro nomine scribitur, cum illo quidem loco publicam, & ab omni proprio alienovo amore puram personam, sustineamus, haec tenus aliquanto liberiores, ut de nobis ipsis loqui & possimus, & aliquando debeamus..

De valvula coli ignoscat vir summus, si repeto, & hanc pli-
cam intestini, similesque vesicularum seminalium, & biliarie, &
arteriarum flexiones a cellulosa tela fieri : eamdeinque esse, que
continua adtractione caecum fetus intestinum, in hominis adulti
fabricam convertit. Etiam si musculose fibræ de laxe intestino in-
angustius transeunt, non tamen valvulae, non obliqui situs intestinii
cæci & ilei causa sunt : neque possent omnino ab intestino ad in-
testinum

tectinum transfire , nisi cellulosa tela utrumque sibi intectinum eum in contractum situm adduceret. Erat autem præterea in opusculo nostro comparatio recentis coli valvulaeque cum sicca , & imutata per varios gradus rerum facie , & alia , quæ potuerat vel nominasse vir Ill. ne industriam discipuli sibi displicere silentio testatur. Neque dubito mecum sensurum , si & animum meum , laudium ipius plenum pvideret , & operas nostras ea cum benignitate legeret , quæ bona suorum probat , excusat deteriora.

Legem in Belgio latam neque officere potuisse Germani hominis in edendis *BOERHAAVII* scholis libertati : neque post annum 1750 contra me produci debuisse , cum anno 1742. unicus heres *BOERHAAVII* , non sine significacione sue amicitiae , meam editionem adoptaverit : neque oportuisse cum notariis turpissime maculosorum libellorum *BOERHAAVII* , a Bibliopolis editorum , de quibus vir beatus conquestus erat , meas , utcunque non perfectas , prælectiones eodem loco haberi , æquius ipse sentiet *ALBINUS* , quando depositis iris rem ipsam , non personam hominis exponet , si quidem ea , maximo certe meo cum dolore , ipsi odiosa est.

Cæterum in his ipsis *adnotationibus* errorem in citatione disputationis Wesselingeianæ ex vocis nervosæ minus solito usu , & ejus libelli absentia , natum ab Ill. viro recte notatum reperio , gratiasque ipsi egro , quoties doctiorem me dimittet , opportunitatemque præbebit , ut in magno opere , ejus beneficio , magis cominus ad verum accedere possim.

*Rupe ex Aquileiensi Bernensium ditione , Novembris die 13.
 anni 1759.*

ERRATA ET ADDENDA TOM. IL

Pag. 10. L. ult. dele *in*

p. 17. not. o. L. 2. post *gelatinam* adde *flas.*

p. 31. seqq. Numeri REAUMURIANI ad FAHRENHEITIANOS reducti sunt, ex hypothesi Cl. SAUVAGES de la Croix, qui calorem ebullientis aquae in ea scia, ad n. 87. ponit *Mémoir, sur les vers à soie*, p. 28. Sed ea omnia incerta satis esse, neque diverso tempore fabricata REAUMURIANA thermometra eu leu ad Fahrenheitiana ratione habere, nunc ex Cl. Michelii du CRIST accuasatoribus experimentis didici.

p. 33. n. 12. *imprimat* lege *imprimit*.

p. 35. n. 6. *calore* legi *caloris* gradus.

p. 35. nota i ad q. mutentur, ut i sit k, k sit l & sic deinceps.

p. 38. L. 4. super ultimam post (q*) adde *exhalaverint.*

p. 83. Sed Cl. GABER urinam tidiuanam, & in febre jam hora 39. p. 85. cum acidis effervuisse vidit, tum sanguinem 24 hora a morte p. 77. &c.

p. 84. *volatilium* lege *volatilum.*

Hic Cl. PRINGLE sententiam Cl. GABER optime cum nostra, & cum re ipsa conciliat. Nempe omnia humores noltri, dum vivimus, incipiunt alcalefere, & post mortem alcalefunt etiam magis cumque acidis liquoribus fervent, unaque factent. Cum vero ipso suo fatore volatiles partes amittant, ipsi se putredo deltruit, atque post breve tempus, quo cum acore, etiam vegetabilis, effervuerunt, humores animales eam potefactem amittunt, porroque alcalinam naturam deponunt. Non ideo penitus idem est fætere, & alcalinum reddi, sed frequenter utrumque conjungitur *Msc. Taurin.* p. 77. ad 85.

p. 147. L. 18. post *quod*, adde *id quidem*

p. 161. L. 6. post (f*) dele.

p. 209. L. 2. ante ultima pro *vita* lege *arteria.*

p. 211. Dele has lineas mali sensus siueque contrarii *Liberalis calendarus* est ad vocem *prædicta.*

p. 261. L. 26. pro *rario* lege *rarioræ.*

p. 267. L. 3. post *granissima* adde *febre.*

p. 294. L. 7. pro (d) lege (n).

p. 299. post *homine* adde *cordis.*

p. 314. Cum hec impressa essent, legi Cl. CICINA contra segmentiam nostram experimenta in *Msc. Taurin.* p. 68. 71. Ea certe vix finunt aliqua noltrorum firma esse. Et primum minime a sola comprehensione quacunque stratorum inferiorum eorum nigrorem fieri, luculente demonstravit vir Cl. Deinde aeris certe aliquam viam esse in augendo rubore sanguinis, visetur inde adparere, quod lamina suprema remota proxima, que minus rubebat, nunc purpureum nitorem inducat, & sic porro ex ordine quecumque lamina sanguinis ruborem induat, ut aerem adtigit. Ea tamen, non de obscuro rubore vera sunt, qui etiam in vacuo spatio supererit, sed de flore illo coccineo sani sanguinis.

Nigrum ethiopum sanguinem esse, nunc demum credimus III. MECKELLO *Mémoir, de l'Acad. de Berlin* 1757.

p. 311. L. 2. supra ultimam Maii lege Mainn.

p. 331. L. 11. pro *accusatet* lege *accusat.*

ELEMENTORUM PHYSIOLOGIÆ

LIBER QUINTUS.

S A N G U I S.

S E C T I O I.

AD SANGUINIS HISTORIAM IN UNIVERSUM CONSIDERATI.

§. I. *Quantum sanguinis in vasis hunani corporis continetur.*

N arteriis , venisque ; quas diximus , & per cordis cavae ; universumque corpus animale , vitalis humor circumlit , quem in homine , & bestiis , ubicunque rubet , *sanguinem* veteres dixerunt , *cruorem* enim peculiariter eam sanguinis portionem dicemus , quæ ruborem sibi proprium sola possidet . Infectorum luccos , qui sepe alterius coloris sunt , sanguinem vocare non solent . In eo nunc humore multa sunt , quæ physiologum contemplari oportet : primum & simplicissimum videtur , ut quantitatem , ut aiunt , five unciarum numerum definiamus , quas universus sanguis pendet . Eam enim vitalis humoris copiam & ad definiendum circuitum tempus , & ad terminandam sanguinis portionem , quam sibi singula viscera sumunt , & ad alia necesse est cognoscere . In morborum demum curatione videtur , temerarium esse medicum , qui sanguinis non paucas libras detrahat , neque tamen mensuram teneat necessarii humoris , absque quo vita superesse non possit , & cuius si majorem aliquam portionem removeris , cordis vires labefact , & animal , etiam multo retento sanguine , tamen pereat (a) .

Sed ea quidem questio non est facillima . Promtum equidem videtur , animali vivo arteriam incidere , donec amissio sanguinis intereat : aut sanguinis pondus cum totius corporis pondere conserre , deinde corpus animalis cum humano comparare , & pro ratione ponderum utriusque , sanguinis in hominis vasis circulum cheuntes pondus aestimare . Hanc viam ingressus Cl.

Haller Physiolog. Tom. II.

A

olim

(a) L. IV. p. 490.

olim medicus ALLEN MOULINS (*b*) in ove 118. librarum sanguinis libras quinque reperit, cum parte quarta, ut totius animalis pars fere 23^{ra} sanguis esset. In eodem animale quatuor libras sanguinis HARVEIUS repererat (*c*), uncias vero 68 Cl. olim vir, Edmundus KING (*d*). In agno triginta libras pendente, cum semisse, sanguinis sesquilibra fuit, quæ est pars animalis fere vigesima (*e*). In anate librarum duarum, unciarum quatuordecim, cum quinquaginta granis, sanguinis fuit uncia, cum drachmis quatuor, & granis 53, quæ portio est totius animalis pene trigesima (*f*). In cuniculo, cuius pondus erat unciarum decem, drachmarum septem, granorum quinquaginta, sanguinis fuerunt drachmæ duæ, grana 57 cum diuidio, quæ denuo pars totius animalis est trigesima (*g*). Ex his rationibus deduxit Vit Cl. posse sanguinem haberi pro parte totius corporis animalis vigesima, atque adeo hominis adulti sanguinem ad octo libras aestimari posse. Neque ab eo calculo recessit Cl. olim archiater, Martinus LISTER (*h*).

S. II. Quid in eo calculo desiderari possit.

Multa tamen sunt, quæ non sinunt hunc calculum recipere. Nam experimenta primum dissentient. Ita ex cane 48 librarum, apertis arteriis, sanguinis libras quinque, partem adeo pene decimam, eduxit Carolus DRELINCOURT (*i*), quatuor vero libras Bartholomæus de Mook (*k*), quæ est pars fere duodecima. Ex bove, incisis vasis, 33 libras (*l*) effluxerunt, exque alio 46 libras (*m*) cum semisse, cum bovis pondus esset 500 l. atque adeo sanguinis portio fuit pene undecima. Ex equo libras 28, exque alio 44 collectis, Cl. noster Collega Stephanus HALLES (*n*).

Deinde aliæ causæ sunt, cur MOULINI experimentum veram sanguinis

(*b*) Phil. Transfud. num. 191.

(*c*) Exerc. circul. sang. p. 48.

(*d*) Phil. Transfud. n. 25.

(*e*) MOULINS l. c.

(*f*) Ibid.

(*g*) Ibid.

(*h*) Phil. Transfud. n. 270.

(*i*) Canticid. I.

(*k*) Inflauerat. Medic. p. 50.

(*l*) SLEGEL de motu sang. p. 104.

(*m*) HALES philos. exper. p. 95.

(*n*) IDEM hominiflat. p. 8. add. THOMASON differt. med. p. 42.

nis copiam non definit. Nempe dudum *Jacobus PRIMIROSE* (o), inde *KEILIUS* (p) & nuper *Stephanus HALES* (q) ostenderunt, ex animale vivo, cui arteria aperitur, & sanguis ad mortem usque effluit, non omnem sanguinem exire, qui toto vasorum systemate continebatur. Plurimus enim sanguis in arteriis minimis, venisque (r), etiam majoribus superest, quando ex jactura sanguinis animal perit, neque enim tum demum exspirat, quando universus de corpore sanguis exhaustus est. Equi equidem, in experimentis *Cl. HALESI* perierunt, quando sanguinis columna ex incisa arteria ad duos pedes cum uncii quinque (s), & ad uncias demum decem supra duos pedes (t) subsiluit, manifesto arguento, minime contemnendam sanguinis copiam in arteriis ipsis inque venis superfuisse. Venæ sectio nimia parum sanguinis emitit, etiam quando plurimum detrahimus, & tamen subito occidisse visa est (u).

§. III. Ut rectius ineatur.

Aliam ergo viam alii Clari (x) viri ingressi sunt. Collegerunt ex historia medica exempla hominum, qui maximam sanguinis de naribus, aut aliam corporis sui partem amiserunt. Nunc si lenta haemorrhagia fuerit, multo ea major est, quasi in subitis illis sanguinis jacturis, quæ de violato majore vase erumpunt. Nam in lento malo humores tentiores (y), qui subtiliora vascula permeant, in evacuata vasa rubra per vim derivationis (z) succedunt, massamque sanguinis augent. Quare unice iis utemur exemplis, in quibus intra breve tempus ea sanguinis copia decepsit, quam ad aestimandam universi humoris vitalis copiam adhibemus. Tuto vero poni potest, aliquanto plus, etiam in his exemplis, sanguinis in corpore hominis fusse, quam quidem amisit, cum debilitata vis cordis, quæ mortem praecedit, non possit de minimis vasculis adtractum ad parietes vasorum sanguinem expelle-

A 2

re.

(o) *De circ. sang.* p. 4.

(p) *De quantit. sang. a princip.*

(q) *Hemostat.* p. 7. 14. 16. *TEICHMAYER antthrop.* *SENAC* in *HEISTERUM* ed. nov. p. 106. Sanguinis ne dimidia quidem parte emissa animal perit, *PRIMIROSE* in *HARV.* p. 41.

(r) *Ibid.* Vene plene & aliquid in aorta & corde. Venæ cavæ sanguine plene, cum arteriosus sanguis effluxisset *DRELINCOURT* *Canticid.* 1.

(s) *Hemostat.* p. 16.

(t) p. 11.

(u) *Zacetus LUSITANUS prax. admirab.* L. III. obs. 143.

(x) *KEILIUS* l. c.

(y) *QUESNAI de la saignie* ed. nov. p. 391.

(z) *Descripta in second Mem. sur le mouv. du sang* p. 336. &c.

re. Deinde, cum hi homines pene omnes cum sanitate reconciliati fuerint, necesse est non minimam portionem vitalis humoris in vasis superfluere, qui ad restituendam & alendam vitam, cordisque necessarium stimulum sufficerit.

Ex naribus amissæ libræ novem sanguinis: inde animi deliquum, eventu felici (a). Decem librarum de naribus jaætura, absque malo eventu (b), & undecim (c). Duodecim sanguinis libræ, unica nocte vomitu rejectæ (d). Floridi sanguinis libræ 14 intra 24 horas egestæ (e). Hæmorrhagia narum libratum 15 (f). Vomitus octo pintarum sanguinis, sive librarum sedecim in splenetico (g). Octodecim libræ de naribus amissæ (h), & libræ 22 (i). Totidem libræ de pulmone rejectæ (k). Qui 20 libras nigritum dejectionum, neque semel emisit, tamen is fatus evasit (l). Diana Eftensis 22 sanguinis libras ex naribus amisit, neque periret (m). Ex venis taninis sanguinis 24 libræ fluxerunt (n). Intra 24 horas 29 libræ coacti sanguinis vomitu excretæ (o). Triginta librarum hæmorrhagia per nares (p). Sanguinis enormis vis vomitu reddita, ad 15. 27. 30. 24. 18. & in eodem paroxysmo libras, ut summa amissi sanguinis esset librarum 202, neque tamen eo minus æger convalesceret (q).

Postquam hæc testimonia produximus, licet aliqua exempla adjecisse; in quibus non subita adeo jaætura, sed adeo tamen immensa fuit, ut omnino suppeditari nequisset, nisi magna sanguinis vis in vasis humanis contineretur, et si facilis dederim, & remissos in vacua vasa succos non rubros, & de cibis, quodcumque in sanguinem verti potuit, hanc molem auxisse. In Angola, P. CARLI quotidie tres quatuorve sanguinis libras per nares amitterebat

(a) *Horn. de HEERS* obser. oppido rur. p. 66.

(b) *ROSETTEI* suo. *Systen.* p. 18.

(c) *LANCIS.* de mort. subit. L. II. c. ult.

(d) *Oraï de la METTRIE* Comment. in Boerb. Tom. II. p. 413.

(e) *SPINDLER* obf. 44.

(f) *SACCHI* medicin. theor. præl. p. 48.

(g) *BARTHOLIN* Centr. l. hist. 87.

(h) *DE HEYDL* discuss. p. II. *RHOD* Centur. L obf. 50. *BRASSAVOLA* apud

KEILUM p. II.

(i) *Anat. LUSITAN.* ad histor. 130. Centur. II.

(k) *LINDEN* de circul. sang. II. 16.

(l) *CARDAN* in aphorism. hipp. p. 253.

(m) *IDEM* ibid. p. 347. cx *BRASSAVOLA*.

(n) *BUCHNER* miscell. ann. 1730. p. 1062.

(o) *SOLENANDER* Consil. Med. Sccl. V. p. 483.

(p) *BARONIUS* de pleuroperitonemotia p. 293.

(q) *Irenaeus VEHM* cassis agri sang. vomentia.

SECT. I. IN UNIVERSUM.

mittebat, cum parcissime viveret, & intra biennium nonagies septies veniam sibi secari passus est (*r*). Hominis, qui frequentissime venam sibi fecabat, & sanguinis singula vice triginta & quadraginta uncias emittebat, meminit *Henricus de HEERS* (*s*). Quæ 1020^{es} in 19 annis venam fecuit, ob morbum hystericum, ea ex erumpente per uterum sanguine demum sana evasit (*t*). Virginis de Pisana gente celebris historia est, quæ omni mense uncias sanguinis 125 amisit, neque paucis annis; & intra 14 mensies partim alternis diebus, & partim quotidie, venam sibi secare passa est (*u*). Alia libratum sanguinis mille intra annum amissorum historia existat (*x*); alia haemorrhoidum, per quas totis continuis 62 diebus, quotidie librae sanguinis quinque perierunt (*y*): alia juvenis, qui intra decem dies sanguinis libras 75 perdidit (*z*).

Verum, utcunque has immensas sanguinis jactutas interpreteris, certum est ex prioribus, sanguinis libras non paucas per vascula nostra circumfluere. Nimis parcus est *Theophilus LOBB* (*a*), qui sanguinem decimam sextam totius corporis humani partem æquare persuadet, etiam parcior *Richardus LOWER* (*b*), qui decimam quintam. Ex eo enim calculo vix decem in adulto homine sanguinis libra continerentur. Propius utique ad verum aut *Franciscus QUESNAY* accessit (*c*), qui 27 libras sanguinis admisit, aut *Fridericus HOFMANN* (*d*), qui viginti & octo, quæ ratio est ad mediocrem hominis molem, ut 1 ad 5. Nam octoginta libras (*e*), centum (*f*) & ultra de humoribus & fluida parte corporis universa admittere possis, nimias tamen futuras, si de vero sanguine sumerentur.

Neque dissimulandum est, obiter hæc & vague definiri. Infinita enim procul dubio in ratione sanguinis ad reliquam corporis molem varietas est, & in similibus unice hominibus ea lex admitti potest (*g*), quæ sanguinis

(*r*) *Histoire génér. des voyages* L. XII.

(*s*) *Olf.* 27.

(*t*) *Journ. de medec.* 1757. Mai.

(*u*) *Eius historiam dedit P. Ant. MICHELOTTUS:*

(*x*) *THURNEISER* *zom Utrum* L. VI. p. 51.

(*y*) *Lettere al D. CURZIO* p. 34-37.

(*z*) *Act. Erud.* *Lipz.* anno 1698.

(*a*) *Of fevers* p. 278.

(*b*) *De corde* C. III. p. 170.

(*c*) *De la saignée nov.* edit p. 45. 47. Humorum molem facit 120 lb

(*d*) Apud *SCHULZE* in *prejudicat. opinion. de vena sicc.*

(*e*) *De sanguine HAMBERGER physiolog.* p. 3.

(*f*) *KEIL* p. 39.

(*g*) *SAUVAGE* p. 14. in notis ad *HALXSIUM*.

copiam in diversis mortalibus in triplicata staturarum ratione facit. Nam cæterum, quo plus in corpore adipis est, eo minor procul dubio sanguinis est portio, quæ ad rationem novi auctarii ponderis minime crescat. Sed etiam juniori (*h*) homini, aut animali, plus sanguinis est, per experientia, quam seni vetulove. Hinc recens nato homini cutis universa, & ipsa cornea oculi tunica rubet, quæ omnia sensim diminuta sanguinis portione, per tetatem exalbescunt (*i*). Plus etiam sero animali sanguinis est, quam domestico, & in universum, sanguinis pondus eamdem rationem ad reliquum corpus obtinet, quam cor observat (*k*). Minoribus adeo animalibus plus sanguinis inesse videtur, quam quidem grandibus, non absque suspicione, ob eam causam calidiora esse. Deinde inter pisces, quicunque calent, ii plurimo cruento abundant, phocarum exemplo [*l*], in quibus incredibilem vim sanguinis esse legimus: forte quod in maxima receptacula venosa congestus facile per vulnera effluat. Contra in piscibus frigidi sanguinis, & serpentibus parcissimus sanguis est. Ex multis anguillis ægre aliquot uncias collegit Cl. *Vincentius Menghinus* [*m*]. In crocodilo sanguis minorem ad totum animal rationem habet [*n*]. In vipera, quæ drachmas pendebat triginta cum semisse, non supra 80 grana sanguinis fuerunt, quæ portio est totius animalis vigesima [*o*] septima, ut adeo quintuplo, & ultra parcior his animalibus, quam homini sanguis insit.

Cæterum hujus sanguinis copiam, si in arterias & venas distribuere volueris, & arteriarum diametrum ad 3 æstimaveris, venarum ad duo [*p*], cum parem utriusque systematis longitudinem ponere possimus, reperies, in arteriis quidem quatuor partes, in venis novem contineri.

S. IV. Neque enim arteriosus sanguis a venoso differt.
Qui differre scripserint

Idem in arteriis inque venis sanguis est, neque enim sanguinis evictus circuitus

(*b*) *LISTER de humorib.* p. 6. ex *Mozzini* experimentis. *Rosen anat. beschrifft*
pag. 128.

(*i*) *Rosen ibid.*

(*k*) *L. IV.* p. 411.

(*l*) *MARTENS Spitzbergische Reise* p. 77.

(*m*) Ex centum anguillis unciam *Conon. Bononi.* L. c. p. 251.

(*n*) *HASSELQUIST* *rejst til Palestina* p. 295.

(*o*) *Mémoir. de l'Acad. Roy. des Scienc.* 1732. p. 26.

(*p*) *L. II.* p. 133.

tus discrimen admittrit, cum nihil in arterias veniat, nisi quod ex venis cor acceptit. Insedit tamen medicorum animis contraria & perantiqua opinio, quæ ex hypothesi primum nata, etiam nunc hypotheseos necessitate se tueretur. Nempe diversi generis humorem in arteriis, & in venis veteres posuerunt, non ii quidem adeo contra sua principia, qui diversam utriusque sanguinis originem receperissent. Primum adeo ERASISTRATUS, sincerum in arteriis spiritum, contineri, in venis vero sanguinem, cum sua secta docuit [q]. Ita apud CICERONEM legimus [r], spiritum ex pulmone in cor recipi, & per arterias distribui, sanguinem per venas. Ita RUFUS, cordis ventriculum dextrum sanguineum, sinistrum pneumaticum vocat, cum ab accepto spiritu moveatur [s]. Sed GALENUS etiam, cum ERA SISTRATI placita studiose everteret [t], tamen arteriosum sanguinem a venoso distinxit, illumque ex venoso quidem per septi cordis poros penetrante natum, cæterum spiritu, sive aere a pulmone recepto ditari, flavumque, & floridum esse, & vitam partium corporis animati unice sustinere docuit, cum interim venosus crux, his dotibus desitus, easdem partes nutrit. Denique ARETÆUS [u] perinde fere, uti nuperi scriptores, sanguinem ex arteria flavum, tenuemque fluere scripsit, a vena crassum, ut tamen adderet, arteriosum difficulter spissescere, venosum facile.

Cum HARVEIUS sanguinis in orbem iter detexisset, vix poterat hæc recepta utriusque sanguinis diversitas firma manere. Non enim unice idem in arteriis sanguis est, qui in venis fuit, sed præterea rapidissimus sanguinis circuitus facit, ut idem nunc ex arteria sanguis fluat, qui ante non plenum horæ minutum venosus, per arteriam pulmonalem advenit. Quare HARVEIUS [x], primique circuitus sanguinei statores, arteriosum sanguinem aut ægre a venoso differre, aut nihil quidquam, communis fere consensu docuerunt [y], neque in colore discrimen admiserunt, neque in densitate, neque in elementis, in que sanguis resolutus discedit. Neque remotus,

(q) Apud GALENUM de HIPP & PLATONIS decretis L. VI. c. 7. & in libello superius scripto, *an sanguis natura in arteriis continetur.*

(r) De natura deorum L. II. p. m. 603.

(s) De appetat. part. L. II. p. 59. edit. CLINCH.

(t) An sanguis natura in arter. contin.

(u) De causis & signis Auctor. L. II. c. 2.

(x) Exercit. II. p. 221.

(y) Job. WALBUS de motu chylī & sanguinis apud BARTHOLINUM Edit. L. p. 386. Edit. IV. p. 762. BARTHOLEMUS ipse Edit. IV. anat. renov. p. 380. PLEM PIVS in fundam. medic. p. 117. SEVERINUS pboea Anat. p. 41, deinde LISTER Exerc. Anat. II. p. 256.

remotus ab ea sententia J. *Dominicus SANDRIS* in homine & similibus animalibus leviter a venoso sanguine arteriosum differre scripsit, in phocena vero, castore, etinaco, que pro frigidis animalibus habebantur, nullum utriusque discrimen esse [z]. Contra, qui circuitum sanguinis recusabat admittere, *Homobonus PISONI* antiquam illam differentiam restituit, sanguinisque venosi alium colorem repetit [a].

Verum, cum paulo post HARVEIUM plerique physiologi nitrum aerum in sanguinem recipieren, quod ruborem, aliasque dotes sanguini conciliaret; rediit antiqua opinio, que aliquid in arterioso sanguine posuit, quo super venosum excelleret. Deinde cum nuperis in pulmone sanguinem densari docerent, inque minus volumen comprimi, etiam ex ea praedjudicata sententia, vestigia novæ hujus densitatis in arterioso sanguine conspici, Cl. ejus sectæ auctores scriperunt. Ergo sanguinem arteriosum floridum, pulchre rubrum, venosum obscuri coloris esse communis fere a LOWERO Scholarum doctrina fuit [b]. Id discrimen ab aere nasci, qui sanguinem in pulmone mutet [c] fere consentiunt, licet in modo, quo aer eam mutationem efficeret, varie sentiant. Quare addunt, etiam absque pulmone, aerem flatu cum sanguine venoso commixtum, novum ei ruborem suppeditare (d): & contra, suppressa respiratione, aut aspera arteria lino intercepta, carotidis sanguinem æque obscurum de vulnere prodire, ac quidem venæ cavæ crux (e). Addit *Johannes MAYOW*, qui inter principes nitri aerei auctores est, arteriosum sanguinem in spatio inani validissime ebullire, venosum lentius (f).

Nuperiores enim scriptores aliqui, suis aliunde meritis illustres sanguinem

(a) *De sanguine* p. III.

(a) *Ult. antiquit.* p. 40.

(b) LOWER de corde p. 179. WILLIS *pharmac. rationis*. P. II. p. 17. Ed. Angl. IV. SWAMERDAM de respir. p. III. LEAL *LEALIS hebdom. febril.* p. III. DUVERNEY. *Mémoires de l'Acad. avant 1659.* T. I. p. 197. *Mémoir. de l'Acad.* 1701. p. 200. SMARE phisiol. transact. n. 204. LANCIS. L. C. p. 21. VERHEYEN. L. II. p. 178. HELVETIUS *Mémoir. de l'Acad. des Sciences* 1718. p. 297. *Eclaircissements* p. 17. P. A. MICHAELLOTTUS in *Epist. ad Fontenellum* p. XXIII. XXV. &c. SCHWENCKE *hamatolog.* p. 83. KAANUW *de perspir.* n. 463. SCHREIBER in *ELEM.* p. 342. 343. &c. HAMMERSCHMIDT *de sanguinis arter.* *Ex venosū discrim.* p. 21. KLANKE *de ven.* p. 29. qui diversitatem exigiam reperit.

(c) SCHREIBER I. c. &c. de vene pulmonalis sanguine.

(d) LOWER L. C. HELVETIUS *mémoir.* ann. 1718. p. 232. *éclairciss.* p. 2. BRÉTIER *physique des corps animés* p. 65.

(e) LOWER I. C. belg. 1722. HELVETIUS *éclairciss.* p. 3.

(f) *De nitro aereo* p. 132.

nem arteriosum calidiorem fecerunt, ut caloris ratio, ad venosi sanguinis calorem esset, ut 97 ad 94, uti 100 ad 95, uti 99 ad 97 (g).

Verum in aliis sanguinis dotibus omnino Cl. viri in diversum abierunt. Hæc quidem opinio, quam novissime dixi; cum ea consentit, quæ sanguinem arteriosum venoso rariorem facit, minusque ponderosum, quo quidem olim ARETÆI locus inclinat (h), deinde M. A. SEVERINUS, (i), Georgius ENT (k), Archibaldus PITCAIRN (l), J. M. LANCISIUS (m), Petrus Antonius MICHELOTTUS (n). Addit IDEM duorum experimentorum fidem, in quibus venosum sanguinem pondere reperit superasse. Non dum auditore noster J. Andreas HAMMERSCHMIDT, experimentis etiam institutis, sanguinem arteriosum leviorum reperit, ut ejus ad venosum ratio esset uti 1404 ad 1414 (o). Idem venosum, celerius exaruisse vidit, quod nempe plus solidarum partium continere videretur.

Alii contra, qui sanguinem in pulmone cogi docuerunt, ab ipsa sua theoria coacti, sanguinem arteriosum densiorem fecerunt, & ipse princeps J. Claudius Adrianus HELVETIUS (o*), & alii nuperiores (p), & prius sanguinem arteriosum facilius concrescere LEAL scripsérat (q), uti minus seri continere HELVETIUS nuperior anchor est (r). Accuratus Franciscus BOISSIER rationem densitatis in arterioso sanguine ad venosi crux densitatem ingentem constituit, nempe 20. 000. 000 ad 14. 000. 000 sive 20. 14 (s), & Georgius Ehrhardus HAMBERGER,
 eamdem

(g) SCHWENKE p. 31.

(h) p. 7.

(i) Duplum sero inesse, si cum venoso comparaveris apud SCHELHAMMERUM de lymph. & de aq. pericard. conf. BARTHOLIN. hist. 29. Cent. III.

(k) paulo sero inesse, cum in corde aliqua portio olei consumta sit, in apoplegia pro circ. ed. Londini. polter. p. 31.

(l) Leviores aliquanto particulas facit, que colore sunt floridiori de causa diversa molis qua sunt sanguis per pulmonem animalis nisi & non nati n. 23.

(m) l.c.

(n) l. c. p. 22. 42.

(o) Nempe in eodem volumine sanguinis arteriosi reperit drachmas 23. grana 14. venosi vero drachmas 23. grana 34. p. 19.

(o*) Memoires l. c. p. 234. Eclaircif. p. 44.

(p) J. Fr. de la SOUDIERE & BERNARD in thes. in hac verba. Ego non utilique corporis sanguis idem Paris. 1743. I. N. H. von der verdickung des blutes. KNOLLE in lib. ejusdem tituli. HAMBERGERUS. Fr. BOISSIER. FIZES de heue p. 112.

(q) Hebd. febr. p. 99.

(r) Memoires p. 235.

(s) De inflammata. p. 244.

eamdem rationem numeris expressit, qui se paulum diverso modo habent, ut densitas in arteriis ad venosam densitatem alias se habeat uti 482 ad 465^f, alias uti 417 ad 407, alias uti 525 ad 515 (*t*). Addit HELVETIUS, a densitate ruborem floridum esse, hinc etiam venosum sanguinem pulchre rubere, quando emissus durescit (*u*) Duriorem esse etiam MICHELOTTUS (*x*) & rubicundiorem.

S. V. *Quid in ea opinione desiderari possit.*

Continuo se vehemens suspicio offert, parum omnino in his experimentis firmi esse, quæ adeo e directo secum pugnant. Deinde si calidior arteriosus sanguis est, aut si certe venoso non frigidior est, uti vix quisquam frigidorem facere sustinuit, qui possit densior esse, siquidem a calore raritas separari nequit?

Ego quidem nonnunquam in arterioso sanguine aliud a venoso coloratum in vivis animalibus vidi [*y*], ut ille haud paulo latius ruberet. Sed frequenter omnino, & in divetsis emissi de eadem ejusdem hominis vena sanguinis patellis, & demum in eadem vena (*z*) ejusdem animalis parem omnino diversitatem vidi, ut floridissimus sanguis flavo crux contrarius occurret, & in rana quidem, in qua non magnam a pulmone sanguinis mutationem spes, quem haud maximus aortæ ramus adeat. Sed etiam aliena testimonia exstant, ab idoneis profecta testibus. Sanguis primus sepe densissimus, alter solutissimus, tertius compactus de incisa vena prodit (*a*). Etiam vulgo innotuit, sepe sanguinem qui posterior mittitur, floridiori colore esse, ut arteriosum vocent. Vedit Johannes Freind sanguinem ex vena secta emissum, floridum crassumque fuisse serum suum plusculis horis non dimisso, ex eodem vero homine breve post intervallum, emissum sanguinem aqueum seroque plenissimum prodisse (*b*). Ex brachio humano sanguis spissus fluxit, cum ex pede floridus saliret (*c*). In pleuritico homine, sanguis primæ patellæ floridus, in alterius crustam

(*t*) *Physiolog.* p. 3.

(*u*) *In celaircif.*

(*x*) *Epist. ad Fontenell.* p. XXII. XXIII. Nunc denum invenio cl. STEVENSONIO venorum sanguinem calidiorum visum *Eff. of a Societ. at Edimbr.* T. V. F. II. p. 815.

(*y*) *Second Memoire sur le mouvement du sang.* Exp. 22.

(*z*) *Ibid.* exp. 13. 18. & in pullo incubato *Obl.* 43. 45. 66. 273.

(*a*) *De H A E N rot. med.* p. 104.

(*b*) *Locus excidit.*

(*c*) *BUCHNER & EBERRHARD* *diff. de sanguific.* p. 50.

crustam habuit [d]. Pedum sanguis saepe rubicundus, magis inflamatus, sanguis vero de brachio obscurior, feroque missus uberiore prodit [e]. Feminæ dantur, quarum primus [f] de vena missus sanguis ruber, alter mucosus est. Et quæ alia infinita hic adducere facile fuerit.

Sed etiam in pullis, quos ovum continet, neque aer tangere potest, aut diducere pulmones, sanguinem arteriosum non raro floridiorum mihi visus sum percipere [g], alias similem [h], denique obscuriore [i]. In suis vasis utique semper floridior videtur, quod crassiora sunt, & multorum ordinum globulorum sanguinis satura purpura per tenuem venæ membranam sincera pelluceat, cum eum ruborem albus arteriæ paries temperet, rolique reddat similiorem, & in tenuiori arteria pauciores ordines globulorum congerantur. Hinc idem in æqualis diametri arteriis venisque color fuit [k]. Ita sene sanguis venosus, dum deliquescit, & adeo acervi globulorum minuuntur, una floridior redditur [k*].

Denique saepe comparavi arteriæ pulmonalis cavæque venæ sanguinem, cum arterioso sanguine venæ de pulmone reducis [l], nunquam in multis experimentis, aliquam in colore utriusque sanguinis diversitatem vidi, neque HARVEIUS vidit [m], neque GUILIELMUS CHESELDEN [n], neque CL. KNIGHTH [o], neque CL. noster auditor EVERTSEN [p], neque ipse contrariae opinonis auctor HAMBERGERUS [q].

Sed etiam alias arteriosi sanguinis prærogativas gnari in experiendo viri invenire nequierunt. Ita in pondere nullum discriben JURINUS reperit [r]; nullum in calore, aut CL. vir Georgius MARTINE [s], in libro quem de eo ipso calore scripsit. Denique cum varios suc-

B 2

cos

(d) PISONI de circulat. Sang. p. 359.

(e) Roncallius PAROLINUS Europ. Medic. p. 267.

(f) ZWINGERI diss. de venæccl. pedis fallaci.

(g) Mem. sur la form. du poulet Exp. 241. 246. 281.

(h) Exp. 235. conf. 241.

(i) Exp. 78. 224.

(k) Obl. 241.

(k*) MUSSCHENBROEK diss. de aëre &c., p. 10.

(l) Second mem. sur le mouvement du Sang exp. 20. 21. 22. 35.

(m) Exerc. de circul. Sang. p. 171.

(n) Anat. of human body p. 194. edit. 1726.

(o) Of the cause of heat p. 120.

(p) In experimentis in submersis captis Gotting. 1753.

(q) De respirat. p. 71.

(r) Dissert. phys. math. VIII. p. 104.

(s) De calore animal. simil. p. 177. Aliquantulum frigidorem esse sanguinem venosum, gradum tamen definiri non posse, quo differant.

cos cum arterioso pariter & venoso sanguine misceret DRELINCOURT^{TIUS} (u), & Archibaldus PITCAIRN (x), similia fere in omnibus periculis, & in arterioso sanguine & in venoso phænomena reperturunt.

Si quando elegantior arteriosi sanguinis rubedo fuit, eam HARVEIUS [y] angusto vulneri tribuit, ut obscurior idem manaret, quoties per patulum vulnus elabebatur. Idem experimentum etiam HELVETIUS recepit [z]. Contra Franciscus QUESNAI [a] arteriarum sanguinem saturate purpureum vocat, & nigriorem suisse cordis sinistri sanguinem contrariæ sectæ princeps, ipse vidit HELVETIUS [b], adeo hæc omnia incerta sunt, & varie eveniunt in variis corporibus.

S. VI. An in sanguine diversarum arteriarum discriminem sit.

Varii quidem physiologici scriptores, & princeps omnino BOERHAAVIUS (c), sanguinem arteriæ carotidis memorabili aliqua mobilioris indolis uberiorumque spirituum prærogativa pollere docuerunt. Neque defuerunt, qui experimenta producerent, que pro ea hypothesi testimonium dicerent. Ita Franciscus BOISSIER [d] in sex unciiis sanguinem carotidis arteriæ septendecim granis leviores fecit, quam, aliarum arteriarum sanguis est. Ita noster olim discipulus Daniel Johannes TAUPE [e] in carotidis sanguine aliquanto plus aquæ reperit, ut feri in carotide ratio, esset ad serum in arteria femorali, uti 132 ad 169, haec tenus contrarius J. Baptiste BIANCHO (f), ipsique aliis suorum librorum locis BOERHAAVIO [g], qui sanguinem renalis arteriæ sero abundare scripserunt. Verum ea experimenta, alioquin non satis repetita, alibi evidenti corollario comparabimus, quod a sanguinis in circulum itinere sumitur. Nullum enim viscus, membrum nullum sibi proprium sanguinem

(u) Apud MANGER in biblioth. Anat. p. 951.

(x) Element. med. mathemat. p. 35. sqq.

(y) Exerc. II. p. 223, tum DIONIS cœters d'Anat. p. 469.

(z) Memoir. I. c. p. 235. 236.

(a) Ocor. anim. T. III. p. 57.

(b) Memoir. I. c. p. 232.

(c) Prædiction. T. II. n. 232. p. 559.

(d) Memoir. de l'Acad. de Montpellier 1743. p. 42. 43.

(e) In diff. de sanguinis ad cerebrum studentis inde Gotting. 1753. p. 29.

(f) Histor. hepatic. p. 68.

(g) Praedit. T. III. n. 359.

nem accipit, sed ex communi penu de corde emissa, & ipsa quidquid habet, mutuatur, & in eandem penum omnium partium corporis animalis remissus sanguis confunditur.

Num venosus sanguis hepatis [h], lienis, omentive peculiares aliquas dotes possideat, hic nondum definio, neque possidere repugnat. Sed de ea peculiari indole alias videbimus: interim, quæ dicemus, ea omnia de omni corporis animati sanguine dicta volumus.

§. VII. Rubor sanguinis.

Sequitur, ut de fanguinis colore dicamus. Verus sanguis, hominis & animalium plerorumque, etiam non respirantium, ruber est, colore in fano homine eleganter certe florido, & coccum aut æquante, aut superante. Neque tamen aut in omni ætate eo colore nitet, aut in omni temperamento, aut in ejusdem hominis venis totus sincero rubore splendet. Et primo fetui humano sanguis minus pulchre rubet, & obscurior atque fuscus magis, quam in adulto ejus color est. Deinde si etiam proprius ad primordia vitae animalis retrosperceris, rubiginosus [i] exque flavo mistus, denique totus flavus [k] reperitur, & ante eum colorem, omnino pellucet [l]. Idem ex vitello flavo nascitur, cujus vasa rubent, quo tempore nihil in fetu non album est [m]. Flavus etiam iis temporibus manet, quibus in ovo bene incubato rubet, quoties cordis vires diminutæ languent [n]. In eamdem flavedinem, ex qua per vitæ vim in ruborem perfectus est, reddit idem per morbos; ex vehementissimis putredinosis febribus [o], ex

B 3

serpentum

[b] Omnia fluidissimum & mobilissimum esse venæ ad portas sanguinem FASELIUS in diff. de eo sanguine p. 29. consentiente etiam III. MEKELIUS experimento. Mem. de l'Acad. de Berlin T. XII. & HEUERMANNO Physiolog. T. III. p. 736.

[i] LANCISIUS L. c. p. 81. Mémoir. sur le poulet T. II. p. 36. obf. 66. 67. 69.

[k] MALPIGH. de form. fetu p. 6. LANCISIUS L. c. p. 81. SENAC T. L. p. 414. 415. Mem. sur le poulet T. II. p. 36. 180. obf. 35. 47. 51. 53. 62. 74. 78. 80. 93. 95. 134.

[l] Mémoir. T. II. p. 35. BIRCH T. III. p. 234.

[m] M AITTEEJEAN p. 53. 62. 63. BUFFON T. II. p. 353. BEGUELIN bibl. impart. 1750. HAMBURG. MAGAZ. T. XIX. p. 144. Mem. de l'Acad. de Berlin 1749. BIRCH T. III. p. 234. Adnotant cl. viri ruborem in sanguine nasci, & in figura venosa apparere, quo tempore fetus ipse albus est. Inde voces D. de la C A's, cor posterius generari, quando vasa sanguinea iam apparuerint. Idem de l'Homme physique p. 100. 101. Nempe cor non reperiari creditur, quando non rubet.

[n] Second Mem. p. 36.

(o) Edim. Eff. nov. T. II. ut. 29.

serpentum pessimis moribus [p], ex variis non satis certis causis [q], ex ictero, ex chlorotica debilitate [r], & in animalibus frigidi sanguinis pauci [s] languentis bestiolæ globuli in venis sub mortem flavent. Sed etiam in cellulofas telas effusus sanguis, quoties resolvitur, ex pene nigro rubore in flavedinem transit [t], ut omnino a sanguine flavedo non aliena sit, et si fani, adultique hominis, aut animalis sanguis, etiam in aqua dilutus, nullum flavoris vestigium ostendit [u].

Ultra flavedinem in decolorem denique colorem nonnunquam in cachecticis & phlegmaticæ temperiei hominibus reddit. Crystallinum sanguinem cordis SANTES ZARINI (x), mere pituitosum RHODIUS descripsit (y), tenuem & decolorem in homine pene fame enecto KIRKLAND (z). De scorbutica post plurimam jacturam albus exit (a).

Sed etiam albus nonnunquam adparet, aut vitiose totus, aut sanus; sed chylo nondum subacto, neque mutato mixtus. Et crustam quidem pleuriticam hic omittimus, nam etiam in aliis diurnis morbis, aut in minus firma valetudine, quando ad malum habitum corpus inclinatur, pars magna sanguinis in album & subcareruleum coagulum abit (b), atque haec albedo a chylo, quem excitabimus, omnino differt. Albus erat sanguis & valde coagulatus, quem III. SENACUS dixit (c).

Nempe in vivis animalibus chylum albo suo colore conspicuum, saepe per vasa sanguinea oberrare, de vulnere fluere, aut in cor ipsum apertum de auricula effundi vidi (d). Ita quatuor, aut quinque a capto cibo horis lac in carotide vivi canis LOWERUS reperit (e), & similia sunt THOMÆ SCHWENKE

(p) Ut apud HASSELQUIST refa til palestina p. 596. viperæ caudisone FEVILLEÆ, viperæ Europæ CARDAN in apberijm. Hipp. p. 313. FRANK. ANNEX. T. II. p. 244.

(q) Sanguis in calculo flavis KLAUNIG profocom. p. 85.

[r] Mise de plant. naphercin. p. 42. BOERHAAVEE prædict. T. II. p. 295. 296.

[s] Second mem. sur le mœve. de sang Exp. 16. 19. 223.

[t] SCHWENKE p. 120.

[u] GAUBIUS inst. patholog. p. 159. 160.

(x) P. II. hist. 7.

(y) Obs. 72. Cent. 3.

(z) Of gangrenes p. 78.

(a) MATANI de anæmysin. p. 33.

(b) FLOVERE paternatural state of blurn. p. 51.

(c) T. II. p. 331. 446.

(d) Second mœve. sur les part. irrit. & sensib. Exp. 543. tr. des poules T. II. p. 105.

(e) L. C. p. 237. 239.

SCHWENKE, clarissimi medici (*f*), & Joannis BOHNII (*g*), & J. Godofredi de BERGER (*h*) experimenta. In anate porro, animale lacteis alioquin vasis destituto, chylum in sanguine WALKERUS (*i*) vidit, inque anse re aliisque avibus Olaus BORRICHIIUS (*k*).

Nihil ergo est, quare vehementer admireremur, si quando de vena in homine incisa chylus fluxerit, quem aliquot a cibo capto horis nondum mutatum sanguis in omni homine circumfert. Exempla numerosissima extant, excitabo pauca. Lac bubulo simile sanguini innatabat, in TUPPI historia (*l*). Tres partes sanguinis lacteae fuerunt in Thomae GUIDOTI (*m*) exemplo, inque alio, in quo sanguinis pars per venas subducta est, pars alia de naribus stillavit, tertia lactis pars fuit (*n*). Boni saporis id lac esse, & caseum inde adiuto acido factum REGNERUS habet DE GRAAF (*p*): inque nutrice (*q*) verum lac fuit, quod perinde cogeretur. In puerperis, & a suppressis lochiis (*r*), inque febre lactea (*s*), frequentes etiam sunt historix; sunt etiam auctores, qui frequentius ab equitatione lac de vena incisa fuere scripserunt (*t*). Sed etiam de femoris ulcere, & ex cucurbitula lac fluxit (*t**). In exemplis colligendis (*u*) uberior fui, quod sint, qui nengent

(*f*) *Hematolog.* p. 13.

(*g*) Serum chylolum vocat, *circul.* p. 161.

(*h*) In ventriculo dextra, *de natur.* *humana.* p. 160.

(*i*) *Epiſt. de chyllo apud BARTHOLINUM* p. 461. *conf. Ad. Hafn. Ann. I. obſ. XI*

(*k*) *Cbemic. agypt. sapient.* p. 262.

(*l*) *Obſ. 58. L. I.*

(*m*) *Prolegom.* p. 44.

(*n*) *Eph. nat. cur. Dec. II. ann. IV. obſ. 165,*

(*o*) *Ibid. ann. IX. X. obſ. 65. 66.*

(*p*) *Oper. omne.* p. 46.

(*q*) *VERDUC usq. des part.* p. 188.

(*r*) *Galer. de Minoro.* T. V. p. 143. *ZARINI de veneficis.* p. 19. *bif. 25.*

(*s*) *BARTHOLIN. de latr. theorac.* p. 39. *bif. 17. Cent. I. & bepar. defundit.* p. 51.

(*t*) *Memoir. de l'Acad. des Scien.* 1752. p. 129. Verum lac & coagulabile.

(*t**) *Eph. nat. Cur. Dec. I. ann. IX. X. obſ. 65. 66.*

(*u*) Habent alia CARDANUS [qui pro veneno habuit] *Contradic. Med.* L. II. tradit. 5. p. 173. b. *Morelli* *DONATUS bif. med. mir. p. 50.* *WILLIS de febribus.* p. 108. G. ENT apologet. pro circ. sang. p. 210. *LOWER* p. 238. J. N. PECHLIN obſ. 15. L. IL *RHODIUS* obſ. 36. *Cent. I. obſ. 32. Cent. II. SCHNEIDER de catarrb.* T. III. p. 10. J. BIERLING adverſar. p. 176. *WEDEL physiol.* p. 137. qui addit. in obesis non rurum esse *Mauritius.* *HOFMANN. de maxilla.* confit. *Bernardus ALBINUS de pravis. sang.* p. 51. *AMMAM parvus.* p. 40. 41. *VIRIDET de prima. cost.* IL n. 18. *H. FRID. TEICHMEYER embryopolog.* p. 62. de polyp. n. 22. *Philos. Transf.* n. 6. 8. 443. *Eph. nat. cur. Dec. I. ann. III. obſ. 123. ann. VI. VII. obſ. 214.* *La FAYE princ. de chir.* p. 532. 534. *F. FRANK. Anatomik.* T. III sub fin.

gent (x), verum chylum, verumve lac esse, quod album cum sanguine circumvit; aut de vena incisa elabitur. Sed id omne, quod in sanguine lacteum circumvit, id paucis a cibo sumto horis evanescit, & tota porro sanguinis massa sincere rubet.

Uti viciose sanguinis expallescit, ita vicissim per morbos in atrorem degenerat, tunc in primis, quando restagnat, aut in varicibus (y) aut in utero, aut alio loco (z). Haec proculdubio prima causa fuit, cur de atra bile veteres cogitarent. Etiam cetacei pisibus, qui tamen respirant, sanguis ater est, phoca (a), balenæ (b).

A sanguinis rubore etiam carnes rubent (c), & eloto sanguine ad nativum colorem redeunt (d). In pediculo manifesto percipitur, ut sanguis totum corpus perfluat, ipsaque antennas rubro colore tingat (e). Ut albiflava sit vitulina, pridie sanguinem animali detrahunt, pene universum, altera die demum occidunt (f). Ita enim penitus sanguis exhauditur.

S. VIII. *Sanguis sponte coit.*

Etiam hoc toti sanguinis massæ commune est, ut in fano homine continuo, uti ex vena emissus est (g), aut de poro narium stillavit, in crassioris minusque coherentis tremulam gelatinæ speciem coeat, quæ compressa digiti vestigium recipit, & serum sudat, atque vicissim se dimissa restituit, scrobemque delet. Perinde coit, aut in æstivo aeris calore, qui ad 90 usque FAHRENHEITII gradus adscendit (h), aut hiberno tem-

p ore

(x) Anat. p. 252. 293.

(x") Lac duodecima hora in sanguinem abit LOWER p. 239. ed. Bat.

(y) NORFORD of cancerous tumours p. 69. 70.

(z) In ipso corde atram bilem in tophi nigri speciem concretam reperit FIRRELIUS patolog. L. V. c. 12.

(a) SCHELHAMMER apud VALENTINUM Amphib. Zoot. p. 89.

(b) Phil. Transact. n. 334.

(c) De GRAAFT De sijn Sipon. p. 533. BARTHOL. metb. Anat.

(d) BIRCH hisl. of the royal Society. T. III. p. 240.

(e) LEEUWENHOECK Phil. Transf. n. 136.

(f) KALM Amer. reisj. T. II. p. 8.

(g) HOFMAN Inflit. p. 239. JESSEN a JESSEN de sanguine p. 16. &c. In ipsis tubulis transfusoriis sanguis grumescebat, haecque ex præcipuis causis infelicium eventuum fuit. Conf. L. III. p. 236.

(h) SCHWENKE L. c. p. 90. Jos. Anton. PUJATIS de morbo Naromiano p. 110. In perpetuo calore tamen digestio sine 96. graduum servatus fluidus manit BIRCH L. c. T. III. p. 238.

pore, in hoc tamen, si nonnullis experimentis fides etiam magis (*i*). A frigore certe septem gradibus citius quam aqua (*k*) congelatur, & citius adeo, quam lac (*l*) ut initium congelationis in ambitu fiat (*l**), inque centro fluidus sanguis superficit. Polypi ex frigore vivis in hominibus nascuntur (*m*). In homine frigore extincto sanguis in omnibus arteriis venisque in polyposas teretes concretiones abierat, ut etiam in dura meninge vasa sanguine turgerent (*n*). Ceterum quadrupedam quidem, & calidi sanguinis, & frigidi, & avium, & piscium sanguis cogitur, majorum tamen animalium & robustiorum sanguis vehementius aliquanto coagulatur (*o*), de rana (*p*) tamen, perinde ut de homine, emissus in laminas rubras concrescit. Iuvenibus etiam continuo, & totus, sanguis coit (*q*), eti funt, qui id crassitamentum tenerius esse aiunt (*r*). Num in testudine (*s*), & lamantino (*t*) neque in frigore densetur, neque in calore, id non dixerim, testis tamen ejus eventus exstat. Soli insectorum vitali humori proprium est, nullo frigore densari (*u*). In cochleis (*u**) & passim in insectis, alioquin gelatinam refert.

Etsi nunc ex sanzi hominis incisa vena missus sanguis utique densatur, densior tamen est in iis, qui corpus valide exercent (*x*), ut in agricolis, aliisque mortalibus, qui suo labore vitam sustentant. Vehementius etiam coit

(*i*) *QUESTNAZ de la saigne* ed. nov. p. 399.

(*k*) *Car. Ang. a BERGEN Nor. Epb. Nat. Cur.* vol. I. app. p. 43. Gradu 25. cogitur *MAXTINE effay* p. 351.

(*l*) Quod primo gradu congelascit. In Ruffico frigore sanguis cogitur *BISCH* l.c. Tom. II. p. 445.

(*l**) *SCHWENKE* p. 97.

(*m*) *BOEHMER de praeacavend. polyp. gener.*

(*n*) *QUELMALZ de frigor. effect.*

(*o*) Ut in equo HUXHAM fore throat p. 53. Ejus sanguis, quando friget, continuo in gelatinum *BISCH* l.c. T. IV. p. 292. Phocaë viscidissimus est & valde adhaerit *HARTMANN anas* phoc. p. 25.

(*p*) *Second Mémoir. sur le monstre. des sang* Exp. 37. 38. 39.

[*q*] *ANDRY Alim. du carme* p. 413.

[*r*] *LISTER humor.* p. 245.

[*s*] *OEMELIN hist. des avonturiers* T. I. p. 86. 87.

[*t*] IDEM ibid. p. 99. Coctus tamen coit, & in phoca, animale Lamantini adhinc, etiam in frigore *HARTMANN* l.c.

[*u*] *Mem. de l'Acad. Roy. des Sciences* 1734. p. 182. Eucæ hiemale frigus anni 1709. vitales superarunt.

[*u**] *LISTER de cochl.* p. 29.

[*x*] *Brown LANGRISH modern. practice* p. 25. gradum tamen caloris 92 Fahrenheiti thermometri per aliquem errorum ponit, cum oportuisset gradum ponit 94.

coit in hominibus arthriticis (*y*), apoplecticis (*z*), rheumaticis; podagrericis (*a*) inque febribus, quibus inflammatio subest [*a**]. Sed etiam in exanthematicis febribus, cum inflammatione tamen conjunctis [*b*], sanguis densior reperitur; & in ardentibus febribus absque fero visus est [*c*], & grumosus adhæsit [*d*], ejusdemque generis in universa acutarum febrium classe (*e*), certe sub morbi principiū mittitur. Nam in febre miliarī, minime benigna, inque alia gravissima, de erysipelaceo genere, proprium sanguinem meum vehementer coactum vidi. Sed etiam in variolis certi testes [*f*] extant, in aliis febribus malignis alii (*g*); & in ipsa Siamensi febre [*h*], in que peste [*i*], ut præ tenacitate sanguis vix de vena prodiret, & in vaccarum contagiosa lue [*k*]. In febribus tamen putridi generis cum adolescente febre sanguis utique resolvitur, inque tenue liquamen abit, quod alias fusius repetemus.

Verum etiam intra vasa corporis humani [*l*], & animalium, calidiorum [*m*] maxime & grandiorum, frequens est, coactum sanguinem reperire. In homine ab asthmatica anxietate (*n*) oppresso universæ & arteriæ & venæ nigerrimo, coacto, sanguine plenæ fuerunt (*n**). In fœsta

[*y*] ARCISSSWXY de remedio Kniffeli p. 96. 97.

[*z*] in apoplectici sanguine serum non fecedebat SCHWENKE p. 177.

[*a*] COSTE sur la goutte p. 21. ut tamen aquæ copiam conjunctam habeat.

[*a**] in morbo acuto sanguis sine fero FANTON obs. 7.

[*b*] in variolis BOERHAAVE prax. med. T. L. p. 265. G. v. SWIKETEN Comm. T. II. p. 458. ut ne gutta quidem diffueret, quæ de naribus illabat. AUGENIUS de oīnafed. L. IX. c. 24. BAGLIV. oper. p. 627. BARKER obſ. on the prefēt ſeoir p. 10. PUJATI de morbo Naron. p. 86.

(*c*) AUGENIUS I. c.

(*d*) PANAROLUS Pentecost. II. c. 29.

(*e*) BARTHOLETTUS de respirat. diff. p. 232.

(*f*) Browne LANGRISE direct. on the smallpox p. 5.

(*g*) BAGLIV. I. c. pro re frequente BARKER L. C. BENNINGER ad. belvet. T. II. p. 88. QUESNAI de febr. T. II. p. 43. FRANK alleluia p. 329. In angina maligna HUXHAM I. c. p. 37 38.

(*h*) TITSINGH geneskunst voor de heilmeesters p. 113. 114. Nouv. Voyage de Chine p. 311. in nov. collect. Ad. Edim. T. II. art. 29.

(*i*) BEISTRAND tr. de la peste.

(*k*) Europ. medicin. p. 245. Fränkische außerck. T. II. p. 105.

(*l*) RIO LAN Encir. anim. patol. p. 42. Notat de motu cord. p. 57.

(*m*) Canibus imprimis viscidiſimus sanguis est: etiam Cl. viro Andrea PASTA ſcīte.

(*n*) WILLES de morb. Convulſio. p. 130. de morbo hypochondr. p. 15.

(*n**) Conf. WALThER de atra bile.

nesta [o] syncope sanguis in arteriis venisque adeo coactus fuit, ut solida ejus massa extraheretur: quod quidem phænomenon & alias [p], & in vasis potissimum uteri vidi. Nimis frequens equorum morbus la gourme a sanguine in magnis vasis, venis cordeque coacto nascitur [p*]. Inde nata est Cl. viri opinio (q), qui totam sanguinis massam non pro humore aliquo vasa perfluenta habuit, sed pro vero textu fibroso, musculo, solidio. In vena cava, & aorta arteria, sanguinem quasi fibrosum alias reperi [r], & cum minutali in iliaca vena comparavit Cl. chirurgus PALLUCCI [s].

§. IX. *In vasis etiam vivi hominis sanguis coit.*

Minime rarum est; de vena incisa; polyposa coagula extracta fuisse [t], aut venam, cum searetur, obstruxisse [u]. Ita ex incisa vena sanguis ad funis modum vasculum percussit (x), inque album solidum quasi arcum (x*), & in massam pene tendineam, fibris implicatis contextam abiit [y]. In apoplectico sanguis, cum vena incidetur, concretus erat [z]. In homine, cui femur amputatum fuerat, crux de tanto vulnere nullus manavit, cum arteria grumis sanguinels plena esset [a]. Hi iudicem procul dubio vermes [b] sunt, quos aliqui scriptores de vena eductos descripsierunt.

C 2

Sed

(o) P. SALIUS apud J. H. de HEUCHER oper. omni. p. 381.

(p) Habent etiam similes observations Job. FERNELIUS de sede facult. Et c. L. VL c. 7. Felix PLATNER Prax. P. L. C. 14. qui cum corallii comparavit. P. PAVIUS obs. 21. M. ABE. SEVERINUS de recondit. abscessi. p. 277. Thom. BARTHOLINUS bff. 94. Cent. III. in homine melancholico. Multa exempla collegit P. J. SACHS Oceae. microcosm. p. 126.

(p*) VIRIDET du bon chyle p. 421.

(q) D. CAPILUPI apud VALENTINERIUM Oper. T. III. p. 321.

(r) Opuscul. patholog. obs. 19. 10.

(s) Lithotom. perfectionis. p. 68.

(t) LITTRÉ Mémoire de l'Acad. des scienc. 1704. p. 14.

(u) Journal des savans 1697. D. 29.

(x) SENAC T. II. p. 132. 446. LECAAN p. 37.

(x*) PESCHLIN T. II. obs. 13.

(y) MANGET bibliothec. p. 958.

(z) HIGHMORE disquis. Anat. p. 158.

(a) TSCHAPP de amput. mem. cruent. & simile exemplum habet PETIT Mem. de Acad. des scienc. 1712. p. 394.

(b) COLETTE Journ. Encyclopédique 1757. febr. VANDERMONDE Journ. Period. 1751. avril.

Sed etiam inter duo vincula immotus sanguis coit [c], inquē umbilicalibus vasis notissimum experimentum est. Demum in vivis animalibus, quibus tegumenta corporis pelluent, sanguis manifesto sublato motu & in globulorum agmina (d), & in rubri olei speciem coalefcit (e) quod ad unguinis instar stagnat; sub qua euidem specie veri globuli, nondum mutata figura latent, quos videoas ab incisa vena, fluento sanguinis restituto, renasci (f), sphæricamque figuram recuperare. In ejusdem tribus bestiolis sanguinis in vasis liberis (g), aut inter mesenterii laminas (h), coagulum oculis subjicitur, & grumi demum formatio, qui in arteria venæve incise vulnere residet (i), & rimam obturat, ut hæmorrhagia sponte cesset: eum autem grumum adunati globuli constituunt, quos multa lympha in nubium speciem concreta circumstat (k). Is idem in homine grimus arteriam violatam denique claudit, & a claris chirurgis (l) passim memoratur. Sed etiam renalem venam læsami grimus sanguinis niger, & solidus circumset, cuius in media fede papilla carnea, coactus nempe crux vulnus obturat (m). Cordis demum vulnus sanguinis coagulum obsedisse visum est, ut vita ad septimum diem supereret (n). In ipsa arteria pulmonali, in syncope, atque febri frigore sanguinem in polyposa coagula flocculosque cogi, Gerardus v. SWIETEN auctor est [o], inque febri frigore coagula nasci persuadetur, quæ per totam vitam

(c) In experimento DRELINCOURTII apud DRAPER de plenit. Leid. 1581. Post mentem in ligata arteria sanguis intus polyposus reperitur LANGIS de corde & arteriis. p. 124 ed. 1728.

(d) LEEUWENHOEK exp. &c cont. p. 178. 179. &c.

(e) Exp. 18. 20. 151. 155. Conf. MALPIGHII postb. p. 34.

(f) Exp. 151. 155.

(g) Exp. 60. 93. conf. 177. 228.

[h] Exp. 233.

[i] Exp. 93. 160. 167. 170. 175. 177. 178. 179. 182. 183.

[k] Exp. 88. 153. 154. 155. 157. 163. 167. 170. 171. 175. 176. 180. 182. 183. 187.

189. 212.

[l] Alex. MONROO Essays of a Society at Edimburg. T. II. p. 273. Andreas PASTA de motu sangu. &c polyp. p. 75. PETIT Mem. de l'Acad. 1732. p. 394. 1735. p. 443. 447. ut nullus ex amputata tibia sanguis flueret. MORAND Mem. de l'Acad. des scienc. 1736. Ex adhibito agarico conicus grimus natus arteriam obturavit Phisof. Transact. 1755. n. 10. & a lycoperdo La Fossat. in obij. fier les nudit. des chevaux p. 73.

[m] Mem. de Chir. T. II. p. 217.

[n] Dioryctius SANCASSANZ obij. 44.

[o] Comm. in BOERHAAVE apbar. T. I. p. 684. T. II. p. 175. Ea tamen coagula per subortam palpitationem solvi credit.

vitam supersint (*o**). Ex sola recensione horridi objecti deliquum ani-
mi & mors, sanguine in vasis magnis de corde excurrentibus concre-
to [*o***]. A subito timore polypi (*o****). Ex frigore subiti in ho-
mine fano polypi nati (*o*****).

§. X. *Eadem coagula polyporum nomine veniunt.*

Uti in reliquis vasibus, ita in cordis aut thalamis, aut auriculis adeo fre-
quenter ejusmodi sanguinea coagula reperiuntur, ut absque iis fere nullum (*p*) cadaver reperiatur: frequentiores tamen aliquanto in ve-
na cava & dextra auricula, & in ventriculo dextro reperio. Hic procul
dubio vermis in corde fuit, SEVERINO dictus (*q*), & RHODIO [*r*],
& ZACUTO (*s*), & RIOLANO (*t*), & aliis (*u*) forte auctoribus.
Haec eadem vipera est, hominum sermonibus celebrior, quam olim ad
sanguinis coagula sagacior retulit VALISNERIUS (*x*). Sed etiam in
elephantō (*y*), leona (*z*), leone (*a*), pygmæo (*b*), equo (*c*), aliis
que animalibus (*c**) ejusmodi sanguinei grumi visi sunt. Sinus cerebri
frequentissime eodem crux vitio obsidentur, ut in numerosissimis exem-

C 3

plus

[*o**] T. II. p. 175.[*o***] SENAC T. II. p. 464.[*o****] MALLEPIGHIIUS de polyp. p. 128.[*o*****] BOEHMNER de polyp. gener. præcav. p. 21.

[*p*] Pro perpetuo habet GALenus de hippocr. &c. Plat. decret. L. I. Deinde inter
superos recte viderunt JUANUS OFRATI. l. c. p. 325, & EDMUNDUS TYSON anat. of the
pigmy & BORENS in Breslau. Sammlung 1723. Januar. & THOMAS SCHWENKE p.
107. & ILL. SENAC T. II. p. 464, & alii Cl. viri, vix adultum cadaver reperiisi, cui in
corde coagulatus sanguis non reperiatur.

[*q*] Vipera pyth. p. 281. 252.[*r*] Centur. III. obf. 61. 62.[*s*] Prax. admirab. L. I. obf. 139. 140. L. III. obf. 99.

[*t*] Etchirid. patol. p. 142. Serpentis figura caro in utroque cordis ventriculo
WILLIS de morb. consuelt. p. 150.

[*u*] Eph. Nat. Cur. Dec. I. ann. I. obf. 50. & forte PLANQUES bibiotb. T. III. p.
551. 552.

[*x*] Oper. omni. L. I. p. 125. 126.[*y*] B. ATR. phisof. transact. n. 326.[*z*] Eph. Nat. Cur. Dec. L. ann. 2. obf. 5.[*a*] BARTHOL. bift. 100. Cent. IV.[*b*] TYSON in ejus animalis anatomie.[*c*] In lue equorum frequens malum LANCISIUS.

[*c**] In cane etiam frequentes Phil. Transf. n. 335. De usculo costi mondii PAR-
SINAL.



plis vidi, & alii (*d*) clari viri viderunt, & triste in celeberrimo (*e*) anatomico exemplum exstat. Ubique nempe in vasis animalibus sanguis cogitur, quam primum ejus per sua vasa motus fractus est (*f*). Hi sunt polypi in corde magnisque vasibus reperti, quos nullum ante mortem symptomata praecessit (*g*). Hinc in aneurysmatibus non unice sanguis aut colligitur (*h*), aut densatur (*i*), sed præterea accurate definitos densitatis gradus induit, vt eo molliores quasi laminæ sint, quo axi arteriæ, motusque sedi propiores, eo duriores vero, magisque membranarum similes, quo remotiores a sede motus, & parieti arteriæ viciniores sunt (*k*). Sed etiam in varice polypi reperti sunt (*l*). Hinc sanguis de vena lente fluens magis coagulatur (*m*), & cum contrarii oppositarum caudarum effectus sint, idem in phiala concussum, ne in frigore quidem coagulatur (*n*).

S. XI. *Polypi veri.*

Non ideo cum FONTANO (*o*), & KERRRINGIO (*p*), & RUYSCHO (*q*), & TYSONE (*r*), & haec tenus cum SCHWENKIO (*s*) omnino

[*a*] BLAS. L. VI. obf. 2 *Journ. des Savans* 1697. n. 29-30. HANRICI *de abscessu* *mesenterii*. HARMES *de causa mort. maniaci*, quæ inter nostras recula exstat. *Pbil. Transf.* n. 157. 224. Apud VANDERMONDE *Journ. period.* T. II. n. 4.

[*e*] Cl. olim HUNAULD *Commerc. Litt. Noric.* 1743. p. 284.

[*f*] SENAC T. II. p. 466. *Pasta del fusto di sangue* p. 172. seqq.

[*g*] BOHN *experient. fisiat.* n. 64. 65.

[*b*] In nostris experimentis secund. menovr. sur le mouv. du sang. *Exp.* 97. &c.

[*i*] LANCIS *de aneurysm.* prop. LXI. ed. nov. p. 251. Arteriam in magno aneurysmate fornix polypo obduci monet, & similia habent. BOGDAN obf. 8. RUYSCHE obf. 2. BIANCHI apud MANGET *Theatr.* p. 193. SAVIARD obf. 61. BOERHAAVE *Prax. med.* T. I. p. 394. G. v. SWISTEN *Comm.* T. I. p. 150. *Hist. de l'Acad. des scienc.* 1707. p. 21. 171X. p. 31. obf. noſtr. *pathol.* n. 4. 19. *Obf. of a Society at Lond.* vol. I. p. 26.

[*k*] RIVA in *Eph. Nat. Ctr. Dec.* I. ann. I. obf. 18. LANCIS. I. c. p. 231. *Mem. de l'Acad. Roy.* 1712. p. 79. seqq. 1724. f. 2. 1736. T. 10. f. 6. STENZEL *fractomat. aort.* p. 10. NORTWYCK *pathol. ad NIELII prefagia.* *Obf. of a Society at Lond.* vol. I. p. 346. *Obf. noſtr. pathol.* 4. 19.

[*j*] SANDRIS *de sanguine* p. 218. PAW obf. 21. in vena cava.

[*m*] QUENSENAI *de la jaigree* ed. nov. p. 399.

[*n*] SENAC T. II. p. 134. 135. *Verdusc de l'usage des partis.* T. I. p. 354.

[*o*] Coagula pituitaria cordis negavit polypos recte vocari, aut aliquas cordis mortales adfectiones sequi ad VESALIUM p. 23.

[*p*] SPICIG. *obſerv. Anat.* 77.

[*q*] Apud BOERHAAVIUM *Prax. Med.* T. I. Ab eo viro forte hanc animadversionem, ut alia multa, KERRRINGIUS habuit.

[*r*] Polypis sanguinis serum a morte coactum esse l. c.

[*s*] Pieroique polypos sub mortem; & a morte generari l. c. p. 107.

no ex morborum numero polypos velim relegatos. Sæpe enim vidi, & alii idonei testes ante me viderunt, nimis dura (*t*), & alba (*u*), neque adeo subito nata solida coagula, in auricula potissimum dextra valvulis venofis tendineis (*x*) funiculis & ramis suis intertexta cordisque laceratis (*y*), & demum ita innata (*z*), ut lacerando separare necesse esset, aut demum minimis inter reticulatas cordis interni fibras quasi radiculis suis infixa (*a*).

Sed etiam natura lis polypis, quam grumo sanguinis subito effus, diversa est. Teneri primo, grumum (*b*) utique crux pro centro habent, quem alba lympha in carnis tremulæ speciem coacta circumdat (*c*), omnipotenti uti ruber grumus in vulneribus vasorum, alba & lymphatica nebula ambitur (*d*). Ejusmodi polypum ipse vidi. Sensim idem incrementa sumit, novisque lymphæ quasi lambris (*e*) accendentibus augetur, & fibris quasi distinguitur (*f*). In vetusto malo magna tenacitas (*g*) accedit, expressa fluidiori parte (*h*), eo vero, quod reliquum est

(*t*) Tendineum vidit PECHLIN de corde: de nigred. atbiop. p. 16. obf. 1. Cent. M. Pene cartilagineum BLASIUS obf. 1. Part. VI. BARRERE anat. p. 100. seqq. Osteum, in aneurysmate III. SENAC p. 362 Lapii similem SHELL de cordis polypo.

(*u*) Albos esse monet PEYERUS method. anat. p. 81. seqq. Hæc causa est, quare vetustiores scriptores cum adipe comparaverint ut JASOLINUS colleg. anat. p. 19. HIPPOFOLYTUS BOSCUS, qui cum candela contulit facult. anat. p. 38. SMETIUS miscell. L. X. p. 323. C. BAUHIN p. 218. C. HOFFMANN de pinguedine n. 23. BONVIUS obf. 8. III. RIOLANUS inclin. anat. path. p. 226. qui frequenter se reperiit monet, BARTHOLOMÉUS in apoplectico Epist. ad WORMIUM p. 651.

(*x*) BARTHOLOMÉUS biflor. 17. Cent. III. SCHACHER in progr. ann. 1721. editio. SENAC T. II. p. 462. de HAEN rat. med. alt. p. 122.

(*y*) GOHL von Hertgenwitzsen BLAIR de elej hanti polypo L. C.

(*z*) BARTHOLOMÉUS Controvers. anat. p. 481. BLASIUS obf. 1. Part. VI. CALDESI delle tartarughe T. IX. f. 2. CHIFLET obf. 16. VALISNERIUS oper. Tom. III. p. 310. inter observations variis Pbil. Transact. n. 464-481. BOLTERNS biblioab. Hamberg. p. 150. de HAEN L. C. Rareum tamen esse monet FANTONUS diff. anat. p. 303. Ad arteriarum valvulas adhaerentem MITTELMAYER de polyp.

(*a*) L. IV. p. 381.

(*b*) RUMLER obf. 81. J. V. HORNE in ep. de aneurysm. BERGERE de polyp. MAUCHART de præsul crepitante p. 11. BARRERE L. C.

(*c*) RUMLER L. C. &c. Mucum vocat BOEHMERUS de præcav. polyp. gener.

(*d*) p. 20. In grumis arterias incisas claudentibus lymphatica pellicula pariter reperitur Pbil. Transact. 1745. n. 10. la FOSSE L. C. & conf. PETIT Mem. de l'Acad. 1732. p. 293.

(*e*) MALPIGH. de polyp. p. 124. J. V. HORNE L. C. FANTON ad obf. 31. MORAGN. advers. II. p. 81. BEHRENS in Bresl. sahl. 1722. April. SCHACKER in progr. quo contra KERRINGIUM polypos vindicata.

(*f*) SCHACKER L. C.

(*g*) not. 2. BARRERE L. C.

(*h*) PASTA ad RONCALLEUM Europ. Medic. p. 262.

est, a cordis vehementer labore compacto. In aqua servida, inque vini acerimō spiritu polypi in dura coagula abeunt. Membranas vero veras (*i*) polypos involvere, aut in iis membranis vasa reperiri (*k*), id utique nimium est, neque flammam concipere crediderim (*l*). Sedes polyporum verorum in utraque cordis cava est, in dextra tamen magis (*m*): et si neque a sinistro thalamo absunt (*n*). Frequenter omnino in magnas arterias (*o*) venasque (*o**) quasi propagines educunt, neque exemplum debet, ejusmodi coagulum a corde ad pedis usque arterias continuatum suisse (*p*).

Neque ex fabrica unice adgnoscimus, aliud a grumo sanguineo concrementi genus polypos esse. Nam ea quidem pars sanguinei receptaculi, quæ polypum continet, utique super naturæ (*q*) legem dilatatur, cum præter polypum etiam sanguini spatium esse necesse sit. Cordis in polyposis amplissimi numerosissima exempla existant (*r*).

Deinde

* (*i*) S. COLLINS in *Tiniebei CLARK* & viri Cl. cadavere p. 771.

(*k*) DIEMERBROECK oper. omni. p. 278. 279.

(*l*) UT DAM. SINOPENS in parteg. p. 32.

(*m*) ALBINUS de polyp. p. 10. MALPIGHIIUS L. C. SCHWENKE p. 107. BOENBINGER L. C. n. 12. Phil. Transact. n. 222. FANTON ad obf. 19. Addit a difficulti trans pulmones itinero hanc frequentiam nasci.

(*n*) Exempla non rara sunt, apud VESALIUM loco quem citabo, BOSCHUM L. C. BARTHOLINIUM L. C. super in Epist. ad WORM. Is polypus vene pulmonalis aditum clauferat. Idem & addit sepe te ame pituitam videlicet defens. vasor. lymph. p. 86. Porro similia exempla existant in Phil. Transact. n. 188. 281. 464; apud MALPIGHIIUM p. 119. FRANCISCUM BAYLE de apoplex. p. 52. 53. BEASIUM L. I. obf. 19. PECUNIUM L. C. CALDESII L. C. Tab. 9. f. 2. PECHLIN L II. obf. 1. BERGERUM de polyp. p. 28. Job. VIRIDET du bon chyle p. 686. 687. FR. de SAUVAGES de inflammat. p. 140. MITTELMAYER de polyp. SCHAARSCHMID, BARRERE p. 100. BOSCHUM p. 6. 7. QUERITISCH sedet. Francof. T. IV. vol. VI. Duriora esse hac similitate caver coagula addit ALBINUS L. C.

(*o*) WORM ep. p. 653. GOTZ de polyp. concr. & BARTROLET TUS resp. diff. p. 329. BARRERE obf. nov. p. 102. seqq. p. 104. seqq. Ulnaris in arteria magna BECKERI polyp. Polypus pedis longitudine ex ventriculo suctio in arteria extensus MITTELMAYER de polyp.

(*o**) In venam cavam ad hepar usque in subclaviam & jugularem SALZMANN de sanguine in pericard. effus. In jugulares venas ad sinus usque laterales, & ad media femora HIST. de l'Acad. 1705. n. 8. In venis maximis & corde dextro in jugulares usque & abdominis venas Phil. Transact. n. 157.

(*p*) SAUVAGES L. C.

(*q*) Hoc veri polypi indicium olim MALPIGHIIUS proposuit posthum. p. 45. & numer. III. SENAC T. II. p. 455.

(*r*) MARCHETT Anat. p. 73. VIRIDET du bon chyle p. 29. 30. Phil. Transact. n. 157. BERGER L. C. FANTON Anat. corp. brum. p. 287. obf. 19. 22. MITTELMAYER

DS AX 22

Deinde symptomata polypum in cadavere inventum præcesserunt, quæ manifesto confirmant (*s*), in vivente jam homine impedimentum in cordis caveis adfuisse, quod non nuper demum, interque moriendum, natum sit. Ergo polypus in iis hominibus reperitur, quibus pulsus inordinatus (*t*) fuit, & cor palpitavit (*u*), cum se imperfecte depletet, neque unquam eo liberaret stimulo (*x*), qui a polypo, crasso corpore, internam caveam obsidente natus, non poterat non cor perpetuo sollicitare. Præterea & asphyxia (*y*) a polypo nascitur, quando sanguis ab arteriarum majorum ostiis avertitur: eademque causa syncopes cardiacæ (*z*); apoplexiæ (*a*) mortisque subitæ est (*b*). In iis etiam hominibus, quos polypus oblidet, respiratio difficilis supervenit (*c*), ex animæ conatu, quæ ad expediendum sanguinis ex dextro thalamo in sinistrum iter omnes suas dilatando pulmoni idoneas vires impendit: dolorem eadem in sede perpetuum alii observarunt (*c**), aque cordis polypo orientem gangrenam

MAYER L C. p. 12. BECKER obf. 37. LANGIS L C. p. 39. SENAC T. II. p. 417. BOERHAAVE Prax. T. I. Aortæ ostium dilatatum VALISNER oper. T. III. p. 370.

(*s*) GOETZL C. p. 23. contra KERKRINGIUM, ALBINUS de polyp. p. 6.

(*t*) MALLEPIGH. posth. p. 45. de polyp. p. 128. GOETZL C. VIRIDET L C. p. 263. 686. 687. Pulsus inde intermittens MALLEPIGH. p. 128. ALBINUS de polyp. p. 6. BOERNER, BARRERE p. 100 & 104. GOETZL C.

(*u*) SMETIUS L C. Phil. Transf. n. 481. p. 100. TOZZI theor. p. 203. DE HAEN I. C. p. 122. PISSINIUS p. 124. Coitas fregit palpitatio in historia, quam habet WALDSCHMIDT de fractur. absque evag. extern. Maxima ut eminus exaudiretur FANTON obf. 22. Pulsus inqualis MALLEPIGH. p. 128.

(*x*) L. IV. p. 490.

(*y*) RIOLEN. in C. BAUHIN. p. 704. anthropol. p. 393. WELSCH epifagm. obf. 34. PISSINIUS de cord. polyp. p. 125.

(*z*) WEPFER de apoplex. p. 184. FANTON Ep. 8. ad MANGET, LANGIS. p. 39. ed. prior. BERGER I. C. BOERNER I. C.

(*a*) TULP. obf. 27. L. I. Phil. Transf. n. 224. VIRIDET L C. p. 263. LANGIS. obf. 4. post tradi. de mort. subit.

(*b*) Catarrhus suffocatus SCHACHER L C. subita mors RIOLEN. enchytr. p. 239. FANTON obf. 8. VIRIDET L C. & p. 263. BERRERE Triga cas. memor. DIONIS de la mort. subite p. 62. 63. SALZMAN L C. HEUCHELA oper. p. 366. BERGER I. C. p. 28. Epib. Nat. Cas. vol. 7. obf. 112. Vena cava lude rupta & mors subita BURNET tber. pract. L. III. S. 68.

(*c*) RIOLEN I. C. PISSINIUS p. 126. VIRIDET p. 686. 687. MARCHETT. p. 73. ALBINUS Phil. Transf. n. 464. SENAC T. II. p. 467. BARRERE p. 100. 102. 109. BARTHOLETTUS p. 319. Asthma cum polypo AD. Bud. art. 39. DE HAEN I. C. In quo asthmaticis polypi in corde fuerunt GRAMMIUS apud HOFFMANN. NUM de genit. mort. subit.

(*c**) ROSEN beschrif. p. 25. in C. Fleming.

nam (*c***). Sed & hydropem (*d*) a polypo nasci, non absurdum est (*e*), quod venoso humori redditum angustiorem reddat, & difficiliorum.

Causa polypi videtur in aliqua sanguinis in vivo animale quiete (*f*) esse, quæcunque ejus quietis causa fuerit. Poteat ergo polypus ab impedimento aliquo pulmonis nasci, unde non raro in medicis historiis cum difficulti respiratione, asthmate (*g*), peripneumonia (*h*) & phthisi (*h**) polypus conjungitur. Possunt a micerore (*i*) aliisca causis, vitæ vires frangi, ut quidem in chronicis morbis polypus frequens est (*k*). Poteat terror (*l*) subito cordis actionem intercepisse, ut sanguinis per cordis caueas motus derepente destrueretur. A quiete enim sanguinem cogi, & vinculum (*m*), & aneurysma (*n*), & nostra (*o*) nuper excitata experimenta confirmant. Possunt acida, aut spirituosa venena lento & multo usu

(*c***) *VESAL Exan.* p. 154.

(*d*) *BARTHOLETTUS* L. C. *VIRIDET*: *CHIFFLET* obf. 16. *BARTHOLIN*, *controversi*, p. 481. pro re frequenti *BAGLIV*. p. 617. *SCHAARSCHMIDT* *relat*. T. IV. p. 411. *Comm. Lit. Nor.* 1736. *bebd.* 45. Pallor inde & œdema *BARRERE* p. 100. 101. 104. Cachecticus leo fuit in quo polypum *BARTHOLINUS* invenit *bif*. 100. *Cent.* IV. In hydrocardia corde 20. uncis lentez pituitæ *BLAS* L. I. obf. 19. In hydrops pectoris caro alba ventriculis adnata *CHIFFLET* obf. 16.

(*e*) L. II. p. 154.

(*f*) *PASTA de mot. sang.* p. 64. *del flusso di sangue* p. 172.

(*g*) p. 16. *Conf. BARTHOLETTUM* *respir.* diff. p. 250.

(*h*) Non absonum est & a polypo respirationem difficultem nasci, & a respiratione difficulti, aliunde nata, polypum. Nam & cordi male se deplenti anhelitu subvenimus, & a pulmone impedito sanguis in corde fistulari. Ergo in epidemia nautica post difficultes respirations, acutamque febrem, in plerisque defunctorum cadaveribus monstroso & laminati in corde polypi fuerunt *Phil. Transf.* n. 464. Post pleuritidem frequentes polypos albos valvulis intertextos repert *SENAC* T. II. p. 467. Frequenter polypum ab ea causa nasci *IDREM* monuit p. 466. & nuper extinctus venerandus olim *FANTONUS* ad obf. 19. Huc etiam pertinent exempla *COWPERI* *Phil. Transf.* n. 270. *Dom. de MARCCHETTI* L. C. p. 73. *CALDEST* p. 91. *WEISSII* in *program.* V. p. 12. *GOTZIUS* L. C.

(*h**) *WORM*. ep. 653. &c. *BARTHOLIN* *Controversi*, p. 481. *BECK* de *palpit. cord.* p. 38. ulnam longum *WILLIS* *morb. convuls.* p. 130. pro frequente malo.

(*i*) *VIRIDET du bon cbyle* p. 19.

(*k*) *Philof. Transf.* n. 222. in *venia Cava*.

(*l*) *MALPIGHII* p. 148. *BOEHMER* L. C. p. 21. 36. 37.

(*m*) p. 20.

(*n*) p. 21.

(*o*) p. 20.

usu in sanguinem viam sibi fecisse (*p*), & cruentem perinde coguisse, ut in animalibus solent, quorum venis injiciuntur (*q*).

Cæterum primam polypi descriptionem apud BENIVENIUM repetio (*r*), & alteram, apud VESALIUM, qui glandulosam carnem in sinistro ventriculo diu haerere scripsit, eosque homines mori, absque dolore, cum gangrenosis artibus (*s*). Perantiquus etiam auctor scholiorum M. S. quæ, adjecta Ludovici VASSAEI historie, in bibliotheca mea exstant, sanguinem in hominibus propinato opio enectis, & apoplecticis in corde fere in pituitam congelari scriperat. Nomen polyporum amstelodamenses medici pituitæ in sinistro ventriculo apoplecticorum concretæ primi impo-suerunt (*t*): & eodem fere tempore BARTHOLINUS (*u*) cum WORMIO carunculas ex utroque cordis ventriculo exemit, quas polypos dixit imitari. Veros polypos dari contra KERKINGIUM PECHLINUS defendit (*u**), & MALEPIGHIIUS (*u***), & SNELLIUS (*u****), & VATERUS (*u*****), & G. Aug. LANGGUTH (*u******), & SCHACHERUS (*u******).

SECTO II.

Elementa sanguinis.

§. I. Calor.

Qui homogeneus videtur sanguis, quando primum de nare stillat, aut de incisa vena fluit, is quidem in diversas & alieni ingenii partes aut sola quiete abit, aut adiecta ignis, fallumve vi. Eas partes sanguinis pri-mas

D 2

(*p*) *Hist. de l'Acad. des scienc. obs.* 5. Ab abuso certe spiritus frumenti frequenter in pulmonibus circulum deduco, quem in Saxonia inferiori *Dunnen* vocant.

(q) L. III. p. 227. 228.

(r) *Abdit. morb. caus.* c. 35.(s) *In Examini obsero. Fallop.* p. 154.

(t) TULPIO teile obf. 27. L. L.

(u) *Anat. renop.* p. 393.

(u*) L. II. obf. 1.

(u**) *De polypis.*(u***) *De polypo cordis.*

(u****) L. c.

(u*****) L. c.

(u******) Progr. cit.

mas contemplari æquum est, in quas sponte sua & absque artis imperio discedit. Aerem brevissime tangemus, quem putredo, aliaque artificia demonstrant, id enim aeris elementum a respiratione aque pulmonis efficacia (*x*) divellere fas non est, quo quidem loco inquirere oportebit, num aer, qualis nos undique ambit, in sanguine contineatur: an potius aliæ ejus aeris dotes sint, qui inter elementa cruxis est.

Ignem calor demonstrat. Omnium enim animalium sanguis, dum vivunt, aliquot gradibus, per thermometrum definiendis, supra aquam aut aerem calet (*y*), in quo ea animalia vivunt. Eorum nempe piscium vitalis humorem, a quorum fabrica pulmo abest, & sanguinem animalium quadrupedum oviparorum, quibus pulmo est, sed exiguus, & unicus cordis ventriculus, penitus quidem frigere, nempe eo calore unice frui, qui in atmosphera est, aut in aqua, recepta fuit opinio. De vipera (*z*), testudine (*a*), etiam robusta, & cujus cor valide micaret (*b*), testimonia extant, ut etiam aere (*c*), & aqua (*d*) frigidorem sanguinem habere, sint, qui scripserint: alii tamen haud paulo rectius reliquerint (*e*), ea temperie esse, quæ aquæ est. Facile vero peregrinatoribus, a naturæ studio plerumque alienis, ejusmodi errores obrepunt. Nempe, qui thermometri auxilio destituti solo ex sensu suo calorem metiuntur, iis omnia frida videntur, quæ suo fanguine minus calent, aut elementis suis organa nostri sensus minus celeriter emovent, quam proprius sanguis (*f*). Hinc fit, ut profundiores cellæ fontesque, qui de intimis montis scaturiunt, hieme calere, aestate vero frigere videantur: temperiem enim non mutant, quæ sere 53 (*g*) FAHRENHEITIANORUM graduum,

etiam

[x] T. III. L VIII.

(*y*) Georgius MARTINE in libello *de animalibus familiis*, & iuprimis in *Essays medical and philosophical* p. 327. seqq.

(*z*) BURRICRIUS ad BARTHOLINUM Epist. 92. Cens. IV.

(*a*) Ejus sanguinem frigere RONDELET de piscib. p. 448. 575. FABER ad HERNANDEZ p. 448. PLUMIER in *Journal de Tresoux* 1705. M. Febr. JACOBUS de Ratis p. 106. HUGUES natural history of Barbados p. 399. &c.

(*b*) Pbil. Transf. n. 27.

(*c*) Ibid.

(*d*) RICHER *Memoir. de l'Acad. avant 1699. Voyage de Guianne* p. 315. DU HAMEL hist. acad. Reg. scient. p. 157. Deterius Leonardus a CAPOA, qui etiam delphiini, phocæ & cetorum corda acre frigidiora fecit delle moffette p. 44.

(*e*) HALLEY apud BIRCH *hist. of the R. Soc.* T. IV. p. 257. BAZIN obij. sur les flanter p. 201.

(*f*) BOYLE of cold. p. 3. &c. WOLF von den wirkungen der matter. D. 74.

(*g*) MARTINE *Essays* p. 223.

etiam in profundo mari est (*h*). Sed hi gradus æstivo aeris calore minores sunt, hiberno majores. Inde etiam intelligitur, cur peregrinatores, qui ex algidis montibus in valles descendunt, regionem (*i*), de dimidio colle quasi suspensam, calidam prædicent, quam iidem frigere queruntur, quoties de calidissima maritima planicie ad eadem oppida adscenderunt. Perinde *Kenelmus Digby*, cum balneorum turcicorum diverso gradu carentia hypocausta perambularet, aque fervidissimis in frigidum aerem rediret, frigida sibi visus fuisse narrat, quæ calidissima sibi visa fuerant, quando primum libero ex aere balnea adiverat (*i**).

Multo minus verum est aut marinorum avium (*k*) sanguinem frigere, aut erinaceorum (*l*), quibus animalibus pulmo nostri similis datus est. Si unquam ab experimento hæ traditiones originem duxerunt, hic me forte, frigore, & somno sopitum animal incisum fuisse (*m*) necesse est, uti certe muris montani sanguis suis in hibernaculis friget. Aestate vero erinaceorum, quos dissecui, sanguis calidus fuit, & paria illustrium virorum testimonia extant (*n*).

In ipsis ergo piscibus, qui branchias agitant, sanguis unico (*o*), & unico, cum dimidio (*p*), & septem (*q*) demum FAHRENHEITIANI thermometrum gradibus magis calet, quam aqua, in qua vivunt: quinque vero gradibus sanguis ranæ & marinæ testudinis (*r*). Sed etiam vipera post mortem magis friget, quam quidem dum vixit frigebat (*s*). Insecta demum, quæ singula nobis frigere videntur, collecta, solo obscuro motu, & agminis densitate, tantum calorē generant, ut humani sanguinis ca-

D 3

lori

(*b*) ELLIS in *Jurnal. Oceanum*, 1754. M. April.

(*i*) Tarigaguam ULLOA in *itinere americano* p. 285.

(*i**) du HAMEL de corp. anim. L. L.

(*k*) Calere omnino ostendit. de ave *macroura*, quam expediebat sanguine frigido esse, ut pro pisce haberi, & in quadragefimali jejuno inter cibos recipi posset, ANDRY N. des ultim. de carmine p. 413.

(*l*) SCHRAEDER decad. III. obs. 3. cum cor saliret. BLAS. anat. p. 64. TYSON apud BIRCH T. IV. p. 258. & de Siamensi erinaceo TACHARD *Voyage de Siam*. T.M. p. 251.

(*m*) LISTERI jam conjectura fuit de *humor*. p. 104.

(*n*) LISTERI C. *Tancredus ROBINSON in Episi. postb. ad RAIUM, LANZ* & *ISSEL* C. p. 38.

(*o*) MARTINE off. p. 331. 332.

(*p*) KRAFT physic. theor. p. 243.

(*q*) IDEM ibid.

(*r*) MARTINE p. 332.

(*s*) WOODWARD *Supplm.* p. 88.

lori æqualis, aut major sit (*t*), & ægre denique manibus toleretur (*u*). Sed etiam absque eo acervorum fotu, erucæ duobus super aerem gradibus calent (*x*).

A vibus, quadrupedibus viviparis, & ipsis etiam piscibus cetaceis (*y*) & pulmo est, & duo in corde ventriculi, & arteria pulmonalis aortæ fere æqualis. De horum animalium sanguine in universum nemo dubitat, quin caleat, & jam olim SANCTORIUS pronunciavit, qui primus (*z*) thermometri ad medicinam faciendam utilitatem sensit, etiam sub æquatore (*a*) ant in æstivis ardoribus (*b*), tamè sanguinem eo aere calidorem esse, quem respiramus, eademque CAESARIS MAGATI (*c*) fuit observatio, & BOYLEI (*d*), & BOERHAAVII (*e*). Ali quanto vero accuratius hæc definire oportet, cum in primis hic a summis viris dissideamus.

§. II. An constanter major atmosphæræ calore.

Nempe aeris atmosphærici æstivi calor a 64 (*f*) gradibus Fahrenheitianis ad 126 adscendit, ut omnino in calidis regionibus, non unice constantior

(*t*) Graduum nempe 97. MARAELDI Mem. de l'Acad. Roy. des scienc. 1712. p. 323. Conf. MARTINE anim. simili. p. 210. ESSAY p. 331. REAUMUR Mem. pour servir à l'hist. des insectes T. V. p. 671. 672. Hinc in frigore percunt BAZIN.

(*u*) NEUMANN Clém. ex edit. ZIMMERMANNI p. 937. REAUMUR Mem. pour servir à l'hist. des insectes T. V. p. 671.

(*x*) MARTINE p. 330. 331. BOERHAAVE Elem. Chem. T. I. p. 415.

(*y*) Delphino Marliouini calidissimum sanguis est, ut fumet ANDREY tr. des alimens du carente p. 479. Addit. TACHARD voy. T. I. p. 32. J. de Trevoux 1740. p. 2230. RICHER voy. de Geyzanne.

(*z*) In Comm. ad primum seu. Avicen. Inde ad ægros thermometri usum transluit SWAMMERDAM de respir. p. 211. & ad animalia, deinde G. COCKBURNE of Feadiseafer, & ill. BOERHAAVIUS.

(*a*) p. 318.

(*b*) p. 145.

(*c*) De rara medicat. ouln. p. 15. ed. Venet. 1616.

(*d*) Hist. sang. p. 22.

(*e*) Elem. Chem. p. 192.

(*f*) Ante omnia gradus REAUMURIANOS cum FAHRENHEITIANIS comparare oportet. Calor ergo sanguinis humani est fere 96 grad. FAHR. calor idem 33 grad. REAUMURI. Frigus congelationis est huic quidem olim celebri artici FAHRENHEITIO, 32. gr. denique calor aquæ ebullientis est apud REAUMURIUM 87, a. ud FAHRENHEITIUM 214. Sunt ergo frigus iotcr glaciale, & aquæ bullientis atcolim gradus REAUMURIANI 87, FAHRENHEITIANE 182. ut isti quidem priorum pene subduplici sint.

stantior (*g*) calor sit, sed præterea major. Ergo, ut multas observationes in brevem tabulam colligamus, calor equidem æstivus medius Edimburgi est 57 (*h*), Londini 64 (*i*) & 70 (*k*), in Helvetia planiori fere 80. Sed in calidioribus regionibus, Patavii est 89 & 91 (*m*), in insula Curaçau 80 ad 86 (*n*). Jamaicæ mediocris calor est 85 (*o*), Maderæ a 60 ad 80 (*p*), Javæ ad 88 (*q*), Alepi 91½ (*r*), in insula fl. Senegal 88 quando frigidissimus aer est (*s*), in capite bonaæ spei ad 90 & ultra [*t*]. Sed longe acrius saepe cælum calet; calor enim æstivus in Europa & Berolini quidem adscendit aliquando ad 86 [*u*], Gedani ad 89. 90 [*x*], Gottingæ ad 95 [*y*], Londini ad 90 [*z*] 96 & 100 gradus [*a*], Petropoli ad 96 [*b*], Parisis ad 100 [*c*], Astracani ad 98 & 103 [*d*], Tolosæ ad 106 & paulo ultra [*d**]. Viennæ ad 107 (*d***).
Verum

(*g*) Ita vulgo scribi solet, ut Parisis non minor quam sub tropico calor sit, in *Mémoir de l'Acad des scienc.* 1737. Neque Massilia quam in antillis insulis minorem æstum esse. D. L A V A L. Sed etiam Petropoli calorem quarta parte majorem fecit, quam in zona torrida Cl. K R A P T de prærogat. reg. septent. Ita Javæ cœlum in umbra non supra 88 grad. calere, sed ideo agre tollari scribit Cl. vir. C. A N G. a B E R C S N, quod is calor noctu parum, & vix 6 gradibus minuatur *Hamb. Magaz.* T. V. p. 264. *Epb. Nat. Cur. nov.* vol. I. app. p. 38. Carthaginæ nova Americæ æstum mediocrem sed perpetuum esse *ULLOA viage* p. 58. & Panamæ æqualem æstivo gallize æstui, sed perinde constantem esse *IDEM* p. 164. Sed etiam aliud & verum distinctione subest.

(*h*) P I T C A R N apud M A R T I N E.

(*i*) N E W T O N ibid.

(*k*) M A R T I N E *Essays* p. 312.

(*l*) P O L E N. apud M A R T I N E. *anim. famili.* p. 144.

(*m*) T I T S I N G genees konft voor de betrouweli. p. 382.

(*n*) Gentlem. Magazine 1754 Jan.

(*o*) Phil. Transf. vol. 48. p. 618.

(*p*) Car. Aug. a B E R G E N l. c.

(*q*) Is æstivus medius calor est, apud R U S S E L. *Natural hist. of Aleppo.*

(*r*) A D A N S O N *Voyage au Senegal.*

(*s*) Mem. de l'Acad. 1751. p. 447.

(*u*) Mys. Berolin. T. V. p. 131.

(*x*) H A N O W *seltenheiten* p. 477. 517. Etiam Tubingæ 89 grad. fuit K R A P T no*comment.* T. I. p. 144.

(*y*) D U N T Z E in diff. saepe laudanda p. 11. in umbra.

(*z*) M A T T Y *Journ. Brit.* 1750. M. Aug.

(*a*) Gentlemans Magazine l. c. Julio Mense 1752.

(*b*) M A T T Y l. c.

(*c*) M A R T I N E l. c. In umbra gradus fecit ad 89. K R A P T exp. meteor. in sol: ad 103. Idem, & in trop. *Comment.* T. I. p. 144.

(*d*) L E R C U in *Mem. de l'Acad. des scienc. de Berl.* 1746. M A T T Y l. c. G M E L L E R for. sibiv. pref. p. LXXXI.

(*d**) *Mémoires présentés* T. II. p. 411.

(*d***) De H A B B l. c. p. 160, 161. In unius.

Verum neque isti ardores summi sunt. In umbra enim tantus Patavii calor fuit, qualem diximus, in sole multo acrior. Solis enim aestus calorem, qui in umbra est, valde superat, non 12 solis gradibus (*d†*), aut 20 (*d***), sed 30 (*d****), & 36 (*d*****), & demum in calidis regionibus enormiter major est (*d******). Ita, in ipsa iterum Europa, Monspeli ova in sole cocta fuerunt, & ruptum thermometrum, idemque calor flevit, qui sebum dissolvit (*e*), & demum calorem aquae ebullientis superavit (*f*).

Deinde aliis in regionibus major adhuc, quam in Europa, celi aestus certis experimentis innotuit. In Carolina in umbra calor est ad 98 usque & 99 (*g*), & Pondicherii calor fuit $32\frac{1}{2}$ grad. R. qui incubantis gallinæ calore major est (*h*), tum Apameæ ad 35 REAUMURIANOS (*i*), qui aestus FAHRENHEITIANOS 106 major est. In capite bonaë spei calor ad eosdem 35 adscendit (*k*). Alepi quatuor mensibus aestivis calor a 92 ad 101 usque FAHR. gradus (*l*) fere pervenit. In Senega flum. aestus ad gr. FAHRENHEITIANOS 105 (*m*) & ad $38\frac{1}{2}$ (*n*), 40, & 45 (*o*) REAUMURIANOS gradus flevit. In Carolina celi ardor aliquando ad 126 adscendit (*p*), totisque 28 gradibus calorem sanguinis humani superavit (*q*). Hic

(*d†*) HALTI veget. flat. c. 1.

(*d***) Petropoli, uenep. 101, cum in umbra esset 83. KRAEW obs. meteor.

(*d****) MATT 1750. Aug. p. 448.

(*d*****) De HAEW p. 160. 161.

(*d******) Duplo calidior. Cum enim in umbra ad 31 liquor adscenderet, in sole adscendit ad 50. Le Bon Mem. de la Soc. de Montpel. 1746. Duplo etiam calidior in Francia de SAUVAGE observatione. Nam ad 60 gradus liquor venit, cum in umbra non superaret 30 effts de l'air p. 31. Triplo autumno superaret le Bon L. c.

(*e*) In sole quidem Hisp. de l'Acad. Roy. des scienc. 1705, p. 39.

(*f*) Ita le Bon L. c. non accurate. Nam ad 80 gradus REAUMURIAW. liquor adscendebat, sed verus ebullitionis gradus est 87. Sed eo pervenisse legimus in Memoir. de l'Acad. des scienc. 1706, p. 13.

(*g*) LINNSG. Phil. Transf. n. 487.

(*h*) Mem. de l'Acad. des scienc. 1737. p. 439. M. Febr.

(*i*) Ibid. 1736.

[*k*] 1751. p. 447.

(*l*) Junio fuit 96. grad. Julio 101. Augusto 97. RUSSELL in mat. hist. of Aleppo.

(*m*) MATT L. c.

(*n*) Mem. de l'Acad. 1738. p. 402. Gradum 38. ponit CL de BUFFON hist. de la mat. T. III. p. 517. 518.

(*o*) ADANSON relat. p. 81. Ipso in fluvio nocturnus calor erat 32 graduum, qui fere sanguinis est. In fabulo calor erat $60\frac{1}{2}$ quo ova indurescerent, & pix colligentes p. 26. 27. 81. 130. 131. Ova enim in calore 153 FAHR. coquuntur TRALLEZ Caribbean p. 52.

(*p*) Phil. Transf. n. 496.

(*q*) Ibid. n. 487.

Hic summus caloris gradus est, qui certo observatus sit, & 38.^{num} gradum REAUMURII, quo supra calorem congelationis aerent calere posse vir III. existimavit, quando æstus maximus est, multis numeris superat, uti multum infra gradus 38 (r) sub congelationis punto Sibiræ frigus thermometri liquorem deprimit

Mofambicensem aut Suaquensem calorem nimium credas, in quo sigillata liquefiant (s) plumbeaque glandes, & calcei torreantur, & cutis dederat (t). Neque tamen penitus fabulosas vel has historias dixerim, quoties eas cum venti Samiel, aut Harmattan, violentia comparavero, qui in desertis circa Euphratem fluv. & alibi, & subito mortales occidit (u), & pecora, quæ deprehendit, faciente & agros amburit (x), ut rubra tumeat, quali ab ebulliente aqua percussa, & aquæ calorem eundem imprimat, qui sanguinis est (y).

Demum peculiaris ille calor, quem in balneis experimur, plerosque in orbe terrarum æstus aut æquat, aut superat. Aquæ equidem minerales ad 134 (y*), 140 (z), 152 (a) & 157 (b) grad. FAHR. usque calent, non tamen ideo eo sumnum calorem elevaverim, quem homo tolerat. Fert autem certa per exempla 97. 98. (c), 99 (d), 100 [e],

110

(r) *Mem. de l' Acad. des scienc.* 1736. p. 485.

(s) BOYLE *nat. hist. of the air* p. 165. KAEMPFER p. 321.

(t) LU DOLPH. *hist. ethiop.* I. c.

(u) Quatuor millia hominum occidit TREVENOT T. II. L. 2. c. 10. 116. vide KAEMPFER p. 671. BALERI *utin.* p. 33. Est Alcmena AVICENNAE L. L. T. II. dodr. 2. c. 8.

(x) CHARDIN T. IX. p. 223. 224. 225 qui in Caramania ipse expertus est. TREVENOT *voyag.* T. III. L. L. c. 10. 11. 12. CHARDIN T. IV. p. 22. DAMPIER *of winds* p. 50. In arenosis Barbariz BOYLE *hist. of the air* p. 150. in AEGYPTO MALLET T. II. p. 346. ed. belg. Habet etiam PERROT p. 256. & KAEMPFER.

(y) TREVENOTUS nisi fallor T. II. c. 34. 80. nec enim nunc ad manus est.

(y*) Aponenses calent 52¹/₂ gradu. Si Reaumuriani sunt, erunt gradus Fahrenheit. 134. VANDELLI *diff.* p. 7.

(z) Aquæ urbis DAX apud CL. SECONDATIUM, Ill. patris egregium filium, quas credit calidissimas esse. Aquæ Porceti gradu 144. calent LUCAS *of main Waters* T. III. p. 196.

(a) LUCAS ibid. de aquis etiam Porcetanis.

(b) Aquæ Balarucenses ad 42¹/₂ & 47 gradum REAUMURII extuant *Memoir. de l' Acad. des sciences* 1752. p. 536.

(c) J. PLANCUS vir eruditiss. in *tberm. Pisanar. descriptio* p. 40.

(d) Libere in eo calore respiratur SENAC T. II. p. 150.

(e) MARTINEZ *anim. simil.* p. 144.

110 [f] & 116 gradus [g], licet Cl. le MONNIER calorem 40 grad.
REAUMUR ANORUM sive 116 fere gr. FAHR. tolerare non potuerit [h].
Sunt tamen segni, qui etiam 42 $\frac{1}{2}$ & demum 47 gradum Reaum. per 7
vel 8 minuta ferant [i], qui est 130 grad. FAHR. diutius toleraturi,
si consuetudo [k] accederit. Demum in illo testu Caroliniano^o ut aliqui
mortales perierunt [k*], ita alii & plerique vitales edurarunt [l], calor
vero Senegallensis etiam a laborantibus aethiopibus toleratur. Ita canes in
vaporariis inclusi, gradu demum 113 [m], 115 [n], 122 [o],
& 146 [p] perierunt, & tolerarunt gradus 106 [q], 108 [r], 109 [s],
120 [t], 126 [u], & demum 146 (x). Longe majorem ardoris excessum
animalia frigida ferunt, si cum innato calore sui sanguinis comparaveris.
Nam in aquis calorem humani sanguinis aequantibus cyprini vivunt (y);
qui tamen calor totis, ad minimum, 92 (z) gradibus calorem sanguini-

ni

(f) In aquis Bathonianis; per horas tolerari GRASS *of Bath* p. 27. Gradum 39
REAUM. plerisque convenire Mem. 1752. p. 637. Sed est Fahrenheiti 113.

(g) In Russorum vaporariis 108 & 116. grad. calentibus per integrum horam durant
GMEIN flor. Sibiric. præf. p. LXXXI. Pene ardente calorem ferit WESER terram
England. T. I. p. 22.

(h) Memoir. de l'Acad. 1747. Multos non ultra grad. 36 tolerare Mem. 1752. p. 637.
aut 107. grad. FAHR. PLANCUS l.c.

(i) Memoir. 1752. p. 636.

(k) In balneo vaporis prima die vix 6 minutis durant & pene diffundunt, iude ad
15 minutis edurant SPRINGSFIELD *it. Caribid.* p. 261.

(k*) Etiam in Europa aetibus nonnunquam homines & animalia subito perierunt
MASSA *de febr. pestil.* p. 146. DERRHAM phys. theol. p. x7. dis 8 Jul. 1707. Gammoni
& homines perirent, & canes KÄMPEFER p. 721.

(l) Phil. Transf. n. 487.

(m) DUNSTON exp. 1.

(n) Exp. 2, 5 & 119. gradus.

(o) Exp. 3.

(p) Exp. 4.

(q) Exp. 6. per quatuor horas cum dimidia.

(r) Exp. 6.

(s) Exp. 6. Venesectione revocatus est, qui cum calorem toleraverat p. 21;

(t) Exp. 3.

(u) Post fessuorum demum in eo ardore perit canis Experimenti 5.

(x) Demum post 57 min. perit canis Experimenti 4. in calore 146. gr.

(y) LUCAS l.c. p. 205, 206. In calore 72 vivunt MUSCHENBROCK *instit.*
phys. p. 122. inque repidis oris thermarum ebullientium VALISNERI oper. T. III.
p. 471, 472. T. V. p. 112. Ad 27, 29, 38. vivunt cantharides & buccina VANDER-
L. I. p. 52. repet autem aqua 27mo. In thermis pifces & ranas vivunt CONKLING *cald.*
tumati. p. 42, 43. inque thermis Islandic calentibus ANDERSON p. 17.

(z) Qui sit unus aut ad summum 7 graduum p. 29.

ni eorum piscium familiarem superat, ut excessus inde idem sit, qui foret, si homo in calore 188 graduum viveret. Sed etiam in aquis hoc ipso gradu calidioribus, quarum aestus ad gradus FAHR. fere 111 ascendit, et si pisces pereunt (*z**), ranæ tamen vivunt (*a*), quarum sanguis 106 gradibus minus calet: quæ iterum æque memorabilis calor est tolerantia, quam hominis est, qui in 200 calore Fahrenheitiano vivit.

§. III: Non perpetuo superat.

Per hæc adeo experimenta constat, hominem in calore 120 graduum FAHR. & aliquanto etiam majore vivere. Sed is calor multum superat sanguinis humani calorem.

Nam in thermometro sub alas hominis dato argentum vivum ad 32 REAUMURII (*b*), & 94 (*c*), 95. 96 (*d*), 98 (*e*), 99 (*f*) FAHR. gradus ascendit, ut alius homo alio fervidiorum temperiem nactus est, & diutius mensura adhibetur (*f**). Sanguinis ipsius, aut viscerum abdominis vivi animalis aliquanto major (*g*) calor est, ut uno duobusve gradibus FAHR. superet.

Inter animalia multa sunt, quæ aliquanto magis calent, ut ex quadrupedibus carnivoris, canes [*h*] felesque, quorum calor est fere

E 2

103

(*z**) Pereunt 96. MUSCHENBROCK. In calidissimis aquis ranæ pereunt, TARGONI: viagg. T. II. p. 419. De Porcetanis LUCAS of waters T. III.

(*a*) COCCHI bagni di Pisa p. 59.

(*b*) In thermis Apouenib[us] plantæ vivunt MAPPUS de potu calido p. 27. Mem. de l'Acad. 1734. p. 562. 563. 1738. p. 492.

(*c*) BOERRHAAVE Elem. Chem. T. I. p. 415.

(*d*) SCHWEINKE p. 44. RUTTY synops of miner waters p. 594. FAHRENHEIT apud MARTINE. A de HAEN L. c. p. 153.

(*e*) MARTINE anim. simil. p. 142. de suo calore Essays p. 335. In Minorca inf. 98. & femel 100: RUTTY L. C.

(*f*) MATY Journ. Brit. Phys. p. 447. Nimiris frigidum sanguinem fecerunt BOERRHAAVIUS, qui calorem humanum ad 92 gr. & in infantibus ad 94. extimavit: tum Stephanus HALES, qui pene ad 93 gr. FAHR. calculo facto subtiliter veget. flat. c. l. p. 59: & CL SAUVAGES, qui 30 REAUMURIANOS gr. admisit effets de l'air, & magis adhuc PITCAIRNIUS apud MARTINE, qui 90. FAHREN. Nimiris calidus potius sit, si dimidium calorem aquæ ebullientis ipsi tribueris Phil. Transj. n. 271.

(*f**) A de HAEN L. c. p. 157. Ad sex denum gradus liquor per moram ascendit.

(*g*) MARTINE anim. simil. p. 174. Essays p. 336. 337. 338. WHYTE physiol. eff. p. 16. non adeo 12 gradibus, ut Theophilus LOBB de febrib. n. 259. Urinam quantu[m] gradibus calidiorum facit HALES L. C.

(*h*) MARTINE anim. simil. L. c. essays p. 336.

Ex his ergo omnibus comparatis conficitur, sanguinem quidem ex recepta opinione plerumque atmosphera calidorem (z) esse, in qua vivitur: sed etiam in eo aere vivi posse, qui supra summum sanguinis calorem sedecim gradibus calefacit & ultra. Nam in aestu illo Caroliniano undecim (z*) & 28 gradibus calore 98 graduum sanguini proprio ac magis astuavit, & thermometrum in aere umbroso descendit, cum in os hominis transferretur (a). Haec operose erui (b), quorum alibi utilitas adparebit.

§. IV. Halitus.

Solo tactu ignis, halitus etiam oculo percipitur. Nempe sanguis ex fani huminis incisa vena emissus, aut sanguis vivi animalis aeri utcunque expositus, fumum evidentem exhalat, quem etiam aestivo tempore ascendere videoas, hiberno tamen magis. Eum vaporem nescio annos primus HELMONTIUS (c) viderit, qui nuperis medicis nunc vulgo innotuit (d). Est in eo subsalsus sapor, odorque parum foetidus (e), urinosis ingenii, actior uterque in morbis (f) & in animalibus carnivoris (g), herbivoris mitior. Sed etiam de humano sanguine nonnunquam oolidus vapor exhalat, & huic ipsi cause imputatum est (h), quod a tractatis vulneribus morbi exitiosi chirurgos invaserint.

E 3

Idem

(z) Ut p. 31. compar. cum 35. In locis insolatis sequalem fere facit ILL. SENAC T. II. p. 247. cum contra CL. SAUVAGES sanguinis calorem bieme faciat 28 grad. RRAUMURIS quando aer octavo gradu friget, zelante 30 quando aer circa 25 & 27 gradum teper effets de Fair.

(z*) Pbil. Transf. n. 496. nempe in sole. In ipsa umbra calor cum sit 98 graduum sanguinis humani calorem superat LININGS ibid. n. 487.

(a) Pbil. Trauf. n. 487.

(b) Quod vulgo cum BOERHAAVIO credatur, hominem in eo aere vivere non posse, qui sanguinis calorem habeat. Cbem. T. I. p. 192. 193. SAUVAGES effets de Fair p. 35.

(c) Asar. vital. p. 577. edit. ELZEVIR. oper. omni.

(d) Conf. M. MALPIGHIIUS de polyp. p. 430. Thomas CORNELIUS prognostica. VII. Pbil. VEEHEYEN L. II. p. 34. (spiritum vocat rotiferum) J. Maria LANCESIUS p. 18. 19. ed. nuper. Pet. Ant. MICHELOTTO de separat. fluid. p. 55. Thomas SCHWENKE L. C. p. 90.

(e) Rob. BOYLE de conservat. corp. in vacuo M. MALPIGHIIUS L. C. LANCESIUS L. C. MICHELOTTO L. C. SCHWENKE L. C.

(f) Simon PAULI in digest. de febre maligna.

(g) Is est vapor foetidus, qui de canis corde exhalabat KYPER de bus. pericard. n. 36.

(b) VAUGUENON oper. de Chir. p. 142.

humores esse, qui misti, dum animal vivebat, unum sanguinem constituebant.

Cruorem amamus eam partem vocare, quae rubra, quae ponderosior est, quae globulis constat, quae sola ferrum continet, & partem inflammabilem. In colore nihil est, quod dubium sit. Omnis enim aqua, quae de cruento fecedit, perpetuo flavescit, neque quidquam preter cruentum in animale rubet. De pondere possit ambigi, siquidem eximius olim & de universa naturali philosophia, & de sanguine auctor, cruentum in sero natore, tantoque leviorem esse scripsit, ut ratio sit utriusque, quae 1041 & 1154 fere quae 10 & 11 [r], neque mirum est, illi viri auctoritatem alios scriptores in suas partes traxisse, cum ejusmodi experimenta instrumentum otiumque poscant, quo omnino multi eruditivi viri, verique cupidi destituuntur [s].

Olim ergo grumum sanguinis rubrum sibi permistum fundum petere monuit *Hieronymus BARBATUS* [t], idque experimentum alii [u] confirmarunt. Inde fit, ut grumi pars superior exalbefcat [x]. Sed etiam globulos rubros sero graviores esse senserat *Antonius v. LEEUWENHOECK* [y]. Inde accuratius *Jacobus JURIN* [z] pondus, quod vocatur specificum, sanguinis ad serum ea ratione aestimavit, quae est 1054 ab 1030, cruentis vero folius ad serum, uti 1126 ad 1030 [a]. *Georgius MARTINE* globulosam massam foliam ad serum facit uti 1093 ad 1022, sanguinem vero, uti 1045 ad eundem numerum [b]. *Petrus v. MUSSCHENBROECK* rationes ponderum sanguinis, cruentis, & scri confituit 1050 ad summum, tum 1044 & 1027 [c]. Cl. olim medicus, *SWIFTII* amicus & *POPII*, *Johannes ARBUTHNOT* rationem, involutam quidem, dedit sanguinis ad serum uti 1020 ad 1000 (d). Deinde

(r) *Robertus Boyle* append. ad *bifl. Sang.* p. 28. 57.

(t) Serum una sexta parte quam sanguis gravius est *SCHREIBER* Element. med. maiorem, p. 235.

(u) *De sanguine & sero* p. 154

(v) *PASTA I c. 74. Europ. medic.* p. 264. *SCHWEINS* p. 102. *JURIN* L c. p. 99. 100.

(x) *PETIT* *bifl. de l'Acad. des sciences.* 1733. p. 31.

(y) *Pbil. Transact.* n. 105. deinde *Antonius de HYDE obf.* 86.

(z) *Pbil. Transact.* n. 351. d'f VIII. p. 103.

(a) *Ibid.* p. 110. Experimentum dat 1034. Sed ob varias rationes eum numerum corrigit ad 1125.

(b) *I. c.* p. 104.

(c) *Instit. physi.* p. 354.

(d) *I. prox. cit.*

Deinde *Thomas SCHWENKE* sanguinis pondus ad pondus seri reperit;^e uti 1173 ad 1142 (*e*), cruoris vero seorsim sumti, ad idem serum comparati, uti 1204 ad 1142 (*f*). *J. Baptista MAZINUS* rationem sanguinis ad serum admittit, quæ est 1886 ad 1803 (*g*). *G. Erhardus HAMBERGER* multa experimenta fecit, quæ eamdem proportionem ponderis confirmant, seri nempe ad sanguinem venosum pondus in homine facit, ut 400 ad 409, in cane uti 500 ad 515. serum vero sanguinis arteriosi suum ad sanguinem, uti 500 ad 525, neque in cane aliam rationem constituit (*h*). Inde vir *Cl. Johannes SILBERLING* in eodem volumine sanguinis reperit partes 216, seri 209 (*i*). *ADOLPHUS* vero *FRIEDERICUS HOFMANNUS* (*k*) sanguinis totius pondus te habere expertus est uti 2072, cruoris ut 2206, seri ut 1938, ut gramus tota octava parte seri pondus superaret. Ex his omnibus, paulum utique diversis, conficitur tamen, cruorem sero gravirem esse, hinc etiam sanguinis ex sero & cruore misti pondus seri gravitatem, minori utique discriminare, superare. Vera enim ratio ponderum specificorum rubrae albaeque partis sanguinis vel ideo erui vix potest, quod cruorem sincerum habere non detur (*l*).

Juvat etiam comparatum cum aqua sanguinis pondus addere, quale præcipui in experimentis viri constituerunt, et si non ignoro, ipsam aquam, perinde uti sanguis, pondere alio esse, alioque, ut alia & alia purior fuerit. Ergo *JURINUS* sanguinis totius pondus, ad pondus aquæ reperit, uti 1051. 1053 & 1055 ad 1000, ut medius fere inter differentias experimenta numerus foret 1053. Cruoris solius pondus ad eamdem aquam facit esse, uti 1126 ad 1000 (*m*). Porro vir *III Thomas SCHWENKE*, per experimenta magna cum cura instituta, totum sanguinem ad aquam facit uti 1173 ad 1110, cruorem uti 1204 ad 1110.ⁿ

(*e*) L. c. p. 123.

(*f*) L. c. couf. p. 62.

(*g*) *Mechan. morbor.* T. I. p. 34.

(*h*) *Physiolog.* p. 4. In vacca eamdem rationem seri, ad sanguinem, facit uti 519. ad 527, in equo uti 508. 528. in sue uti 503. 513. satis similes omnes.

(*i*) p. 15. Variae autem rationes reperit, ut sanguis ad serum modo esset uti 10 ad 8, modo uti 11 ad 10, modo uti 12 ad 10, p. 14. *diss. de humor. corp. human. gravitas. specific. Argent.* 1749.

(*k*) *Nos. hypothes. de rebus physic.* p. 6,

(*l*) *GAUBIUS patbol.* p. 163,

(*m*) L. c. p. 104. 108.

1110, sive uti 12 ad 11 proxime (n). Cl. vir Petrus v. MUSSCHEN-BROECK sanguinis ad aquam rationem facit 1040 & 1056 ad 1000, seri 1027 ad 1000, cruoris absque sero 1084 ad 1000 (o). Georgius MARTINE sanguinem ad aquam facit uti 1056 aut 1057 ad 1000, serum ut 1032 (p). MAZINUS sanguinis ad aquam rationem habet 1886 ad 1749 (q): HAMBERGERUS (r) 409 ad 385: Fridericus HOFMANNUS, celebrior ille Halensis medicus 615 ad 585 (s). Cl. SILBERLING sanguinem, in diversis experimentis, aqua graviorem repetit $\frac{10}{288 \text{ mis}}$ deinde $\frac{11 \cdot 12 \& 14}{288 \text{ mis}}$, serum vero $\frac{8 \cdot 10 \& 11}{288 \text{ mis}}$ (t), & alibi, sanguinem ad aquam facit uti 281 ad 261 (u), serum uti 272 ad 261. Adolphi Friderici HOFMANN rationes sunt (x), sanguinis totius ad aquam uti 2072 ad 1875, grumi rubri uti 2206 ad 1875, seri folius uti 1938, ad 1875: ut massa sanguinis decima nona parte sui ponderis aquae pondus superet, serum nonnisi trigesima prima (y). Ex MARTINI experimentis uncia anglici ponderis æquivalet 1, 6526 poll. sanguinis calentis, uncia vero sanguinis occupat 1. 813 pollicis (z). Ad aquam falsam Johannes ARBUTHNOT sanguinem & serum comparavit, reperit sanguinem ad eam aquam se habere uti 26 ad 15, serum uti 300 ad 353 (a). Ad aerem rationem recepit CL. HALLES, quæ est 841, 1. (a*).

§. VI. Sponte cogitur in scissile quasi hepar.

Mirum omnino videri possit meditato; cruorem; qui pene totus aqua sit (b), cogi posse, & fluidissimum aquæ elementum inter sanguineas

(n) p. 123.

(o) l.c.

(p) l.c. 94 & 106.

(q) l.c.

(r) l.c. p. 3.

(s) *Med. System.* T. I. p. 93.

(t) l.c. p. 14.

(u) p. 15.

(x) l.c. p. 5. 6.

(y) p. 17.

(z) l.c. p. 100.

(a) *Essay concerning the nature of aliments* p. 121. 122.

(a*) *Hemaflat.* p. 98.

(b) Ostenditur in analysi, quanta in sanguine aquæ sit portio.

neas moleculas quasi coerceri, & una firmum stare (*c*). Et tamen hanc coagulabilem sanguinis naturam facilima experimenta ostendunt. Diximus, ut in vivo animalis vasis in unguinis speciem coeat, quam primum perpetuo motu circumagi cessat (*c**). Emissus idem, si exigua massa fuerit, in laminas ruberrimas, lertas, tremulasque, ad gelatinæ modum Perizœque hibernæ cogitur. Major massa aut in figuratum intra vasa sua grumum (*d*), aut in latam figurabilem scissilemque placentam in patera coit, quæ continuo secedente sero in insulam solidescit, quam plurima aqua circumfluit. Dum ea aqua avolat (*e*), evanescit una insula, donec crusta rubra, subnigra, sicca, friabilis superfit, quæ patellæ ambitum obducit (*f*). Eam crustam celerius ex ruforum sanguine nasci Cl. auctor exstat (*g*).

Coit autem in placentam in aere utcunque calente, certe in Europa. In frigore etiam absque sero (*h*) ante reliqua sanguinis elementa congelatur (*i*), in frigore nempe, quod 9. 10 gradibus Reaumurianis determinatur (*k*).

Solent medici galli (*l*) nuperiores monere, duriora coagula esse, quæ ex sero nascuntur, & serum vi densabili cruentum superare, cum in frigida coeat, dum sanguinis pars rubra fluiditatem conservat (*m*).

Verum certum est, etiam ex rubro cruento, dura nasci coagula, & quidni nascantur, cum in ea sanguinis parte, & terræ, & ferri, plurima sit portio. Et primum ne membranas RUY SCHIANAS sero tribuas, certum est una cum sero integrum sanguinem quassasse RUY SCHIUM [*o*], inque membranam vertisse, quau solebat medicis, qui
se

(*c*) SCHWENKE p. 147.

(*c**) p. 20.

(*d*) p. ib.

(*e*) p. 38.

(*f*) De HAXN RAT. MED. p. 84. 85. ELLER Mem. de l'Acad. des scienc. de Berlin T. VII.

(*g*) Intra 24 horas BURGGRAB de aere & ag. Francof. p. 15.

(*h*) BIRCH L. C. T. II. p. 445.

(*i*) DIEROLD de aere.

(*k*) IDEM ibid. p. 23.

(*l*) PETIT Mem. de l'Acad. des scienc. 1732. p. 393. SENAC T. II. p. 92.

(*m*) PETIT L. C.

(*n*) Thes. VII. n. 39. Thes. L. off. L. n. 3. Thes. manu. n. 158. Cur. removat. n. 15.

se inviserent, ænigmatis loco ostendere. Totum etiam sanguinem de vena calentem, in lagenam receptum (*p*), quassando brevi in membranam mutavit Vir III. Antonius de HAEN (*q*): recentem autem esse oportet, nam conservatus eamdem membranam non reddit, neque ex fero ea membrana fit (*r*), & ablata ea membrana tamen serum concrescibile superest (*s*). Sanguis arteriosus post amputatos artus in cellulosa telam effusus, in nbras indurescit (*t*). Denique rubra illa fila, fibræque solidæ placentæ sanguineæ, quæ ex sanguine in uterum effuso nascitur (*u*), satis ostendunt, etiam ex rubro cruro firma coagula parati. In sanguinea crux, quæ siccata in solidam naturam abiit, fibrosus & cellulosus habitus adparuit (*x*). Demum etiam in vivo animale grumi sanguinis enati duriores fuerunt (*y*).

Uti sponte grimus ruber ex fluido sanguine nascitur, ita firmius coit idem, si præterea calor major acceferit, sive is circa 140 (*z*) gradum FAHRE. aut aliquanto major (*a*) fuerit, sive demum omnino ebullientis aquæ fervorem adtigerit: ita enim densus, & tamen intus rubens (*b*) grimus nascetur. Etiam testudinis fluidissimus sanguis coctus cogitur (*c*). Neque ob fluidarum particularum jacturam nova haec soliditas nascitur, nihil enim grumi ponderi decedit, dum coagulatur (*d*): & oportet utique adtractilem sanguinis vim hic adgnoscere, cuius efficaciam sublatu motus progressivus nunc liberam fibi reliquit.

Uti calor igneus, ita febrilis æstus sanguinis naturam compactilem auget. In valida febre vis cohaesione sanguinis ab 8, 9 & 12 gradibus

F 2

qui

n. 15. Thes. VI. n. 15. conf. BOERNER de præcas. polyp. p. 13. 14. LÖTSCHER Anthropolog. exper. p. 35. MALLEPIGRUM de polypo p. 116. sed imprimitus Cl. de HAEN.

(*p*) H A E N p. 88.

(*q*) IDEM p. 91. 92.

(*r*) IDEM p. 87.

(*s*) IDEM p. 94.

(*t*) MONROE Essays of a Society at Edim. T. II. p. 173.

(*u*) SMELLIUS cœsi in midwifry. p. 96.

(*x*) FRANK. ANMERK. T. I. p. 446. 447.

(*y*) Mem. de l'Acad. de Chir. T. II. p. 21.

(*z*) SCHWENCKE p. 106.

(*a*) p. 116. Ad ignem coire vidit WILLISIUS de cerebro p. 134.

(*b*) SCHWENCKE p. 106.

(*c*) OXXMELIN bijl. des avontur. T. I. p. 86. 87.

(*d*) SCHWENCKE p. 136. 137.

qui in fano homine sunt, crescit ad 32, (e), 48, 56; & funesto equidem eventu ad 64. In homine fano, in placentam crux ante 24 horas emissi, dimissum octo drachmarum pondus grumum frangit, in febre vero etiam 70 drachmæ requiruntur, ut placenta cedat (f).

§. VII. *Idem sibi permisso dissolvitur.*

Grumus coacti sanguinis paulatim in libero aere, & in modico calore (g) aut 50 graduum, aut minori, putreficit, & levior fit sensim, ut in aqua nunc natet, mergique renuat [h], qui recens emissus continuo subsidebat. Ita in aquam flavam (i) & volatilem factamque (k) naturam degenerat, quoad, præter eam rubram crustam, quam dixi, nihil superfit: celerius tamen in juvene, in sene tardius cruentum grumum evanescere auctor est Cl. a BERGEN (l). Non sine risu videoas celebrem olim medicum, sanguinem post elapsas 24 horas in aquam resolutum, pro re rara & aquæ spadaneæ simili habuisse (n). Sed etiam in vivo homine maxima effusi in cellulofam telam crux coagula dissolvuntur (o) & evanescunt, ut ruber grumus in fuscum, tunc in viride, deinde in flavum liquamen redeat, maneatque a dissipato cruce similis sere rufus pulvis (p), qualis a sanguine post exhalationem superest. Mirum exemplum juvenis recordor me vidisse, cui a præcipiti ex alto lapsu sanguinem quasi alterum caput vertici accesserat. Is enormis, facile unius libræ grumus, secundum cellulosa muscularum, & ossium spatia in palpebrarum duplex intervallum, faciemque descendit, ut ea æthiopis similius esset: neque multis diebus interpositis, per eos, quos exposui, colorum medios gradus tota ea massa dissoluta evanuit. Idem calor incubantis gallinæ sanguinem per meuses fluidum retinet, neque cogi permittit (q).

Sed

(e) Browne LANGRISH modern. practice p. 68, 119. &c.

(f) Samuel MILES, ad versionem primarum linear. physiolog. T. II. p. 357.

(g) SCHWENKE p. 128. add. PRINGLE exper. p. 416.

(h) SCHWENKE p. 113.

(i) HARVEI de gener. p. 160.

(k) NORFORD of cancerous tumours p. 107.

(l) l. c.

(m) SCHWENKE p. 50.

(n) HEERS spadacene obs. 23. p. m. 207.

(o) HEUGHER p. 349.

(p) Sub unctionibus de dissipato sanguine superfusisse SCHWENKE p. 99.

(q) BIRCH l. c. T. III. p. 238.

Sed in vivi etiam hominis vasis sanguis ita mutatur, ut amissa natura coagulabili pallidum in liquamen abeat, quod porro nulla arte, nullo alcoholе corrigi cogique queat, neque membranas illas dare aptum sit. In cachecticis, chloroticis, (r) aliisque debilibus (s) scorbuticis (t), & hemoptoicis (u) ægris res vulgo nota est, eoque refero eorum hominum hystorias, quos aiunt solo jure carnium vixisse (x), quod per arterias & venas sanguinis locum teneret Memorabile vero est in primis id resolutionis genus, quod in morbis acutis, plerumque, tamen aliam etiam post febrem supervenit, nam in intermittentis febris principio sanguis latus est, in fine floridior (y). Sanguis in petechiis sub initia morbi rutilus, inde niger & dissolutus, in faniem putridam abit (z). In febre flava insularum antillarum sanguis sub principia floridus, absque fero, omnino ut ex venis profluit [a], cogitur, post triduum vero flavum colorem induit, naturamque deponit coagulabilem (b). Idem in angina maligna locum habuit (c), ut sanguis, qui in morbi principiis densus fuisset, post tres quatuorve venæ sectiones merus nunc exiret ichor. Ita porro in variolis (d), petechiis (e), morbis malignis variis (f), peste (g), vaccarum lue (h) sanguis dissolutus educitur. In febribus malignissimis regionum calidiorum sanguis in principio fanus, postea resolutus pro-

F 3

dit

(r) FREIND *Emmenol.* p. 118. Edit. Oxon.

(s) WEPFER *de apoplex* p. 355.

(t) HUXHAM *of fevers* c. 5.

(u) Ex hemoptoici sanguine membrana RUYSCIANA parari nequit de HAEN p. 95.

(x) Apud LOWERUM c. II. p. 71. ed. belg. HANNES in *diff. qua fetum per se nutritri offendit.*

(y) TABOR p. 274.

(z) HUXHAM *of fevers* T. II. p. 83. *of sore throat.* p. 39.

(a) p. 18.

(b) WARREN *of the yellow fever.* p. 11. LININGS *Ess. medic. and philos.* T. II. ast. 29. HUGHES *nat. hist. of Barbado.* p. 18. N. BOYAG. *de Guinde* p. 311.

(c) HUXHAM *of sore throat.* p. 37.

(d) HUXHAM *of fevers* p. 52. SCHWENKE p. 129. LISTER *de variol.* p. 98.

(e) IDEM *ibid.* p. 58. 59. 62. BIANCHINI *lettere* p. 135.

(f) In Parisiensi morbo, celeriter ad mortem tendente, sanguis tenuis fuit, ut pulilli crux *Memorium. de l'Acad. des scienc.* 1749. p. 119. In angina maligna similia habet HUXHAM *of sore throat.* p. 52. in febre nosodochiali iam proœcta PRINGLE *de morbo castrensi.* p. 296. Sanguis in malignis anmitit mucosum elementorum vinculum du BONDEU *du peuli* p. 303.

(g) In peste sanguis floridus & ruber OHFF. *sur la peste* p. 343.

(h) HANNAKUS in libello de ea lue proprio p. 19.

dit (*b**). In Bredana febre sanguis lividus, & fætidus, non concrevit (*i*). In omnibus vero his morbis sanguinem non coire malum est (*k*), & non imperite hispani (*l*) in maligna febre sanguinem mortem portendere autumant, si fluidus de vena prodierit. Inde etiam funestissimæ illæ hæmorrhagie fluidi sanguinis, qui in malignis febribus (*m*) faniosus de auribus, oculis, naribus, ore, utero intestinisque, & de cute vesicantibus emplastis erosa, aut cum sudore (*n*) erumpit; & in peste (*o*) de naribus, utero, & de incisa vena, aut scarificata cute fluens vix coerceri potest (*p*); idemque in simili putredine, quam serpentium morsus (*q*) sanguini imprimet, ex auribus, naribus oculisque manat, tum in morte subita ex vapore sentinæ putrido (*r*). Etiam hæc hæmorrhagie sere funestæ eveniunt (*s*), & raro evadunt, quibus in [*t*] variolis sanguis per urinas exiit, doctissimis anglis testibus. A putredine enim hæc dissolutio est, quæ vires cordis potentissime destruit, ut tenuitas ea sanguinis cum pulsu minimo [*t**] fere conjugatur, neque malum auxilia sere admittit, siquidem corrupto sanguini sua nativa densitas reddi nequit (*u*). Sed etiam alii in corpore humano humores coagulabilem naturam per morbos amittunt (*x*).

§. VIII.

(*b**) RUSSEL *natur. hist. of Aleppo* p. 209.

(*i*) VANDER MERE apud G. V. SWIETZEN p. 123.

(*k*) In variolis LISTER l. c. Pro signo malignæ febribus habet BIANCHINI.

(*l*) ZACUT. LUSIT. PRAX. admir. L. III. obf. 59.

(*m*) In Europæis malignis & petechialibus febribus HUXHAM *of sore throat* p. 60. 61. *of fevers* p. 44. In febre flava LININGS l. c. WARREN l. c. N. voyag. de SIAM p. 211.

(*n*) HUXHAM *of fevers* p. 44.

(*o*) MURALT *cbr. Schriften* p. 587.

(*p*) TIMONIUS in gener. chronol. *hist. of strafons* p. 154.

(*q*) PISO *hist. nat. Ind.* p. 276. de mortu serpentis Ibiracoa.

(*r*) Continuo sanguis de ore, naribus & auribus exiit cum magna putredine RUTTY *synop.* p. 148.

(*s*) In peste v. MURALT l. c. LARADIE *de la peste à Toulouse* p. 1610. RADZINSKI p. 367. In febre flava LININGS l. c. in morbo sere eodem, quem sordorem sanguineum vocat HELVETIUS *partes de sang* p. 87. 88.

[*t*] LISTER l. c. SYDENHAM.

[*t**] MEM. DE L'ACADE. DES SCIENS. 1749. p. 119. HUXHAM *of sore throat* p. 39. 60. 61. LININGS l. c.

(*u*) De sanguine SCHWENKE p. 129. de ichthyocolla putrida LISTER *aq. med. Angl.* T. II. p. 90.

(*x*) In scorbuto, ut vocat, vaccarum lac non cogitur PLANQUE *hist.* T. III. p. 22.

§. VIII. *Cruoris & seri in sanguine portio.*

Quæ nuper exposita sunt, non permittunt certam seri ad grumum rationent esse (y): cum enim tot ex causis seri copia aut crescat, aut diminatur, cum crux perpetuo aliquam seri copiam exfudet, quæ sibi decedit, adeoque seri portio crescit, donec de crux vix superfit quidquam, non oportet certam utriusve elementi ad alterum rationem sperare. Nihil ergo ab exspectatione nostra alieni est, quando clarissimi scriptores alias & alias de utriusque in sanguine partis rubræ, quam diximus, & flavæ rationes admiserunt. Oportet autem eos audire, quorum major est auctoritas. Qui minimam seri portionem fecit HAMBERGERUS, estimavit ad tertiam sanguinis partem, inque homine rationem ejus ad crux fecit 109. 212. ut tamen ea ratio paulatim creceret, & denique serum ad crux esset, uti 145 ad 176 (z). Tertiam, & paulo ultra, neque tamen penitus dimidiam, recepit Browne LANGRISH (a). Rubri sanguinis partes 62. albi 38 reperit Raymondus VIEUSSENS (b). Aequalem utriusque portionem facit Robertus BOYLE (c) & Carolus DRELINCOURT. (d), & Ad. Frid. HOFMANN (e). Quinque cruxi duodecimas. sero septem adsignat Johannès TABOR (f). Quinque seri, tres cruxi, partes estimat HOMBERGIUS (g), duas tertias seri, cruxi unam Thomas SCHWENKE (h). Tres quartas partes seri, unam cruxi admittit Franciscus QUESNAI (i), nosterque amicus SCHREIBERUS (k) & olim FRIZIMELICA (l), inque alio experimento Carolus DRELINCOURT (m). Sed etiam alibi Robertus BOYLE

(y) Conf. GAUBIX patholog. p. 153.

(z) Physiolog. p. 6.

(a) Medical prædict. p. 74.

(b) Des liqueurs p. 25.

(c) Apparatus. p. 54. append. p. 24. Plus utique repererat [crux]ori, sed negat inde concludi posse, serum a cruxi copia superari.

(d) Canicid. X. exigua nempe diversitas fuit: CHYTRIX English malady p. 120.

(e) I. c. p. 17.

(f) p. 62. ad experimentum nou optimum.

(g) Mem. de l'Acad. Roy des sciences. 1712.

(h) p. 92.

(i) De la saignie p. 14. & diuidia minorem in nov. edit. p. 51.

(k) Almoecht. p. 54.

(l) Apud WALSCHE midomimemata. II. n. 98. Pro sanguine arterioso, sed intra sex horas.

(m) Canicid. I.

generis uberrimo sanguine replentur (*e*), & globulorum tanta in eorum vas a copia fertur, ut sero vix locus supersit.

Poro in juniori animale plus est seri, si cum globulis comparaveris (*f*). In sex pueris seri rationem ad cruentum reperit *Bryan ROBINSON* (*g*), quae est 9187 ad 10000. Quo majorem etatem adtingit animal, eo magis globulorum rubrorum ad serum portio crescit. In media etate globulos facit *IDEM* vir Cl. 10000, serum non supra 7143 (*h*). In senio & ista portione major cruentis est copia, ut cruentus quidem semper sit ut 10000, serum nunc ut 6908 (*i*). Ita fit, ut in etate ineunte, & adulta, & vergente seri ad 10000 partes cruentis partes sint 9187. 7143. & 6908. Scenibus copiosissimus cruentus *Thomas SCHWENKE* (*k*). Idem crassamentum sanguinis in adultis densius est (*k**).

Denique in morbis, quo quisque fuerit acutior, eo minor in sanguine seri portio superest (*l*). Periculum a celeri morbo abesse persuadetur *Georgius CHEYNE* (*m*) quamdiu seri dimidia, aut quarta demum in sanguine portio est. In febre intermittente serum sanguinis non supra tertiam quartamve totius sanguinis partem efficit (*n*), quartamque (*o*) in acuta febre, & quintam (*p*) & sextam denique (*q*).

Alterius generis *Guilielmi HARVEI* (*r*) experimentum est, qui sanguinem de animale continuo a pastu emissum sanosum reperit sero plenum, post jejunium vero, aut urinam uberior redditam, aut multum sudorem, eundem sanguinem in grumum densatum invenit. Id ita intellico

(*e*) Passim ut *Exp.* 17. & p. 23. 24.

(*f*) *SCHWENKE* p. 92. *WILZSIS de cerebro & nervo.* p. 134. ed. 8.

(*g*) *Essays* p. 425.

(*b*) p. 426.

(*i*) p. 425.

(*k*) p. 92.

(*k**) *ROBINSON Essays on anim. anat.* T. II. p. 425.

(*l*) *English malady* p. 120. *BROWNE LANGRISH* l.c. p. 74. *SCHWENKE* p. 56. 57. 93.

QUESTNAI des fevres cont. T. II. n. 43.

(*m*) *Diseases of body and mind.* c. 4. p. 111.

(*n*) *Browne LANGRISH modern. practice* p. 232. Cruentus magis viscidus in quotidianis quam in tertianis, in illis tenacior, quam in quartanis. *IDEM* ibid.

(*o*) Drachmas 16. gr. 22. ex drachmis 22. gr. 16. *Browne LANGRISH*.

(*p*) *IDEM* octo drachmas grana 16. ex drachmis 49. p. 68. seqq.

(*q*) *IDEM* drachmas 16. grana 15. ex drachmis 97. grana 16. p. 69.

(*r*) *De generatione animi.* p. 161.

ligo, ut sanguinem eo tempore inspicias, quo chylus in lympham abiit, duodecima (s) fere post cibum sumtum hora.

§. IX. Partes five Elementa cruxis. Globuli

Ad subtiliores sensim particulas indagandas descendimus, quæ in cruxre animalium reperiuntur. Initium faciemus in iis elementis, quæ sponte sua, absque ignis tortura, in vitali humore adpareant, quamprimum industria aliqua, & vitrorum convexorum potestas, diametros auctura accrescit: inde ad eas mutationes transfiguri, quas saluum vis, admixtique alii succi excitant, aut ignis violentia.

Quoties lente vitrea, non valde quidem objectorum diametros augent, in frigidis animalibus sanguinem sua per vasa meantem contemplamur, toties utique rubras in universum & rotundas particulas videmus, quæ per liquorem, neque microscopii auxilio conspicuum, feruntur: Non absque ratione frigida animalia nominavi, nam calidorum quidem animalium, propriumque in primis sanguinem, de vulnusculo in capillarem tubulum raptum, tepidaque dilutum speculatus est, figurisque suis expressit ANTONIUS VAN LEEUWENHOECK (t), postque eum virum aliis, ejusdem fere ætatis medici (u) viderunt. Nunquam autem mihi, etiam solari uso microscope, aut eductum, inque capillare vitrum resumtum cruxrem, aut per vasa calidi animalis motum, ita pervidere datum est, ut globulos in eo perciperem (x). In tubulis quidem crassities ipsa vitri umbram faciat, perpetuo magis nocitaram, ut acriori vitro uteretur (y). In vivi animalculi, muris in exemplo, mesenterio, perinde expanso, ut in ranis solemus, globulos nunquam distinxii, cum a primo aeris contactu totus in suis vasis sanguis staret, rubrunque in filum consisteret, tota ut vasa tamquam coralliorum rami, uniformi rubore replerentur. Non felicior fuit REMI nostri (z) industria, neque fere video quemquam recentiorum scriptorum, qui globulos rubros depinxerunt, de calidis animalibus exemplar sibi sumisse. Non ideo tamen quemquam refutavero,

qui

(s) LOWER p. 239. ed. belg.

(t) *Philoſ. Transact.* n. 102. 106. BIRCHI l. c. T. III. p. 372.

(u) BRUNNER *de pancreate* p. 128. 129. Antonius de HAYDE obj. 86.

(x) *Second mémoire sur le mouvement du sang exp. 2.* p. 18^o.

(y) Ibid. p. 183. exp. 10.

(z) Dill. *Spec. cit.* p. 39.

qui felicior ea viderit, quæ meos veri cupidos oculos fugerunt. Inventionis cæterum laudem ad *Marcellum Malpighium* refero, ut tamen ipse vir illi non penitus pviderit, quæ ipsi natura obtulerat, atque adipis glebulas se vidisse persuasus fuerit, quando verissimos sanguinis globulos viderat. *Sanguincum nempe vas in omento hystricis citat, in quo globuli pinguedinis propria figura terminati rubescentes, & coralliorum rubrorum vulgo coronam æmulantes visi sunt*, Hæc jam anno 1665 scripsit (a). Serius, & aliquot eisdem annis serius, civis etiam Delphensis, *Antonius van Leeuwenhoeck* globulos in sanguine rubros vidi, die 15 augusti anni 1673 (b). Cum tamen IDEM hoc in argumento diligentissime versatus sit, novisque in sanguine particulas multas per animalium genera persecutus laboriose descripsit, suam certe lauream, neque indecoram meretur.

S. X. *Omnino vera, siue generis sanguinis sunt elementa.*

Commune noviter repertarum rerum, neque injustum fatum est, ut serius aliquanto fidem impetrent. Praestiterit enim aliquantum in dubitationis partes declinasse, quam novas, neque satis firmas undique opiniones, absque judicio aut examine recipere. Ergo alii quidem globulos rubros erronea ab observatione natos esse scriperunt, neque dari in nostro sanguine moleculas, quibus rotunditas perpetua sit; *huc Nicolaus Hartsoeker* (c) pertinet, alioquin in *Leeuwenhoeckium* iniquior, & difficilis nova credere *Elias Camerarius* (d). Sed etiam nuper Vir elegantissime doctus *J. Zacharias Platner* (e). sphæricas has moleculas rejicit, & sanguinem non globulosum, & ramosum potius sibi adparere scripsit *Archibaldus Adams* (f). Verum etiam ita nollem globulos rubros intelligi, ut pleraque fluida componi, aut vulgo scribitur, aut ab insigni experimentorum auctore *Petro v.*

G 2

Muschen-

[a] De omento & adiposis duellibus, Editionem Londinensem cito p. 42.

[b] Ipse diem indicat *Philos. Transact.* n. 102.

[c] *Extrait critique* p. 5. A liquoribus heterogenesis immixtis explicat.

[d] *Specim. medicin. celest.* Diff. IV. p. 48. Bulas ex viscore aliquo & aere compositas dicit.

[e] *De suppuratione, coib. n. 4.*

[f] *Philos. Transact.* n. 325.

MUSCHENBROECK (*g*), aut ab Ill. GAUBIO (*h*) intellectum est. Ex theoria enim unice & absque sensuum fide, globosa elementa liquoribus tribuuntur, ut elementorum facillima discessio explicetur: sic neque oleum, aut hydratgyrus, aut fumus carbonum, eo modo, quo sanguinis moleculæ, globulis constat. Nam in argento quidem vivo molecularum figura incerta est: adtractione vero in globulos majores, acer-
voque particularum figurantur. In oleo cum aqua subacto (*i*) inque emulsionem abeunte ejusdem generis globuli nascuntur, adipis ab aqua circumscriptæ massulæ, quibus neque magnitudo constans est, neque color ruber, neque ferri elementum. In sanguineis globulis omnia alia sunt. Solidi, perpetui, circumscripti, certa magnitudine & figura, certa ferri portione prægnantes, in fluido invisibili moventur, & adtractione inutua adeo non figurantur in globulos, ut eam figuram amittant.

Neque adeo in sanguine, perinde ut in aliis liquoribus animalium, communi lege factos globulos reperio, ut etiam in bile (*k*), sudori (*l*), saliva (*m*), lacruma (*n*), urina (*o*), etiam putrida (*p*), liquore prostatico (*q*), pancreatico succo (*r*), amnii humore (*s*), semine demum (*t*) similes globuli sint, aut in nervis (*u*), medullave spinali (*x*) aliisque rebus (*y*) reperiantur, quæ olim LEEUWENHOEKII, nuper vero

[*g*] *Essays de physique* p. 367.

[*h*] *Patholog.* p. 161.

[*i*] Eo lactis globulos refero, LEEUWENHOEKIO dictos, pellucidos, variae magnitudinis *Pbil. Transf.* n. 192. BIRCH T. III. p. 380. J. B. SENAC T. II. p. 657. POERHAAVE *Prax. Med.* T. I. p. 221. & Petrus Eructio ASCRIO de natur. fermentis n. 59. &c. tum chylosos illos & illi Ill. viro dictos, & ASCRIO obf. 51. 52. Globulos adipis etiam Delphensis habet observationum auctor *Pbil. Transf.* n. 106. compressos, exiguoque; & in pure Ill. SENAC p. 659. Cum acetato subactum oleum globulis comparat CHEREYNE *philos.* princip.

[*k*] ASCHE obf. 60. 61. Minimos addit esse.

[*l*] LEEUWENHOEK l. modo cit.

[*m*] Ibidem perpaucos. ASCHE p. 62-68.

[*n*] Ibid. pariter paucos.

[*o*] LEEUWENHOEK *Anat. & contemplat.* p. 40. *Exper. & contimpl.* ep. 46. ASCHE obf. 69.

[*p*] ASCHE obf. 76.

[*q*] IDEM obf. 49.

[*r*] IDEM obf. 50.

[*s*] IDEM obf. 53. etiam in putrido semine.

[*t*] p. 102. &c.

[*u*] LEEUWENHOEK *Philos. Transf.* n. 108.

[*x*] Ibidem n. 116.

[*y*] n. 17.

vero Cl. J. Petri Aschii (*y**) voces sunt, a bullis forte aereis, aliisque peregrinis particulis natæ. In nullo enim alio liquore ejusmodi globulos, copiosos, certos, constantes haec tenus vidi, quos in ranis, bufonibus, piscibus (*z*) variis, in lacertis, squillis, cancris, araneis, libellis (*a*), cochleis (*b*), aut LEEUWENHOEKIUS, aut alii idonei testes viderunt.

S. XI. *Figura globulorum.*

Nomen sphærulas indicat, & vulgo pro sphærulis habentur, sphærulasque in calidis animalibus depinxit Antonius v. LEEUWENHOEK (*c*). Ipse tamen belgicus inventor in frigidis (*d*) animalibus, inque avibus (*e*), haec tenus ab ea figura recessit, ut glebularum sanguinis tres inæquales diametros ficeret, quarum gratia *particulas planovalles* vocarentur: sectiones nempe elliptici corporis figuris suis exprimit (*f*), que crassitatem pene nullam, longitudinem latitudine aliquanto maiorem haberent. Nuper etiam clarissimi viri, in anglia (*g*) & gallia (*h*), figuram harum molecularium lenticularem faciunt, que & ipsa denominatio inæquales diametros, & crassitatem longitudine minorem exprimit.

Ego quidem solis in frigidis bestiolis has particulæ contemplatus sum, eas vero semper rotundas reperi, ut nunquam latitudine minorem longitudinem viderim (*i*): crassitatem vero, quatenus microscopiis de crassitate judicatur, semper insignem repererim (*k*), cum intensior in medio co-

G 3

lor

[*y**] Materiem per se coherentem sponte in globulos formatam esse p. 203.

[*x*] Second. *mémoire* c. 1. tot.

[*a*] LEEUWENHOEK *exper.* & *contemplat.* p. 280.

[*b*] LISTER *de cubil.* p. 95.

[*c*] Innumeris locis, qui continuo excitabuntur.

[*d*] Epist. prior. quas sub nomine *anatomia & contemplatione* latine verfas edidit, n. 38. p. 54. & iii altera *enumeratione* p. 51. in *expér.* & *contemplat.* Epist. 60. p. 78. in *continuat. aevanor. natur.* p. 218. Consentit WYERUS GUILIELMUS MUYS de *flor. musc. fabrie.* p. 300. MISTICHELLI *de apocœa.* p. 42.

[*e*] LEEUWENHOEK iisdem fere locis, ut Ep. 60. p. 78. MUYS l. c.

[*f*] v. c. epist. 39. p. 54.

[*g*] Henrici MICHELIS Phil. *Transf.* n. 460.

[*h*] ILL. SERAC in *essays de physique* T. II. p. 350. ed. 1753. & *traité du cœur* T. II. p. 545.

[*i*] Second. *mémoire* Exp. 2. 3. 5. 19.

[*k*] Ibid. Exp. 2. 11. 17. 19.

lor sit, oræ vero sensim expallescant. Deinde cum globulos vario in situ, per minimas in primis venulas moveri cernerem, nunquam aciem globulorum vidi, ut quidem me vidisse oportuerat, si omnino planam latitudinem haberent, tenuemque aciem. Sed etiam solare microscopium, quo enormiter rerum visibilium imagines augentur, sphærulas, pisces non minores, ostendit (*l*): Quare mihi quidem nondum causæ est satis, quo minus pro veris sphærulis habeam, aut certe ejusmodi rotundis moleculis, quarum crassities reliquis duabus diametris nullo discriminè cedat, quod oculis percipiatur. Sed etiani in LEEUWENHOECKII verbis videor mihi contradictionem percipere. In cancris nemipe, & squillis (*m*) & araneis (*n*), frigide utique classis animalculis, globulos constanter vocat, qui ex minoribus globulis conponantur (*o*): modum etiam iconē exprimit, quo coalescunt (*p*). Verum ejusmodi compactio solidam, non planam utique moleculam efficit. Pallentes forte (*q*), hinc ad centrum parum saturatus tintæ piscium moleculas vidit, quas ob eam ipsam causam non crederet crassitiem habere. Angulosos globulos (*r*), aut caudatos (*s*) partim observationis vitio tribuerim, partim globulorum deformationi. Nam & ipse effusos in oblongam & vermiculi similiē speciem degenerasse vidi (*t*).

§. XII. Magnitudo.

Magnitudinem his moleculis constantem tribuit *Antonius v. Leeuwenhoek*, neque ego diversitatis memini, quam observaverim, paucis equidem animalium generibus usus, iisque frigidis omnibus. Verum idem clarus belga eamdem omnino globulorum rubrorum in omnium, etiam corporis sui niole diversissimorum animalium sanguine reperit, ut bovis in cruce non grandiores, quam in rana essent, & eadem in culicolo,

[*l*] Ibid. Exp. 1.

[*m*] Exferim. Et contemp. p. 159.

[*n*] Contin. arcan. natur. p. 314.

[*o*] Exper. Et contemp. p. 452.

[*p*] Exper. Et contemp. p. 2. Continuat. arcana. natur. epist. 228. f. 5. 4.

[*q*] Exp. noistr. 4.

[*r*] Frankische anmerkungen T. I. p. 22.

[*s*] MINERES l. c.

[*t*] Second. memoirie cap. 17.

niculo, ovo, homine, bove, earum sphærularum magnitudo esset, neque quidquam in cete differret, minimove pisiculo (*u*). Ita Cl. MUVSIVS in sanguine galli indici, gallinacei, passeris, aselli, porcelli, hominis, bovis, ovis, talpæ murisve æque grandes globulos (*x*) vidit. In homine & simia æquales esse Franciscus BOISSIER (*y*). Sunt tamen etiam, qui dissentiant. Nam in pisibus, quam in calidis animalibus majores facit Johannes TABOR (*z*), & in lacerta humanis majores, etiam duplo COPPERUS (*a*), quem hactenus fecerat est Henricus BAKER (*b*) ut certe majores faceret. Denique vir clarissimus Vincentius MENGHINUS (*c*) non eamdem in variis animalibus globulorum sanguineorum magnitudinem esse, gravis testis adfirmat. Mihi ad hæc experimenta accurata non suppetunt, neque videntur, si absque dubio rem definire oporteret, quæ hactenus, absque micrometro capta sunt, penitus sufficere.

Non magis in ratione consentitur, quam globuli rubri, etiam cuiuscomque animalis, diameter ad pollicem habeat. Mille millions ejusmodi globulorum non majores esse arenula, phrasis est LEEUWENHOEKII (*d*), qui alibi globulum uni $\frac{1}{1000}$ arenæ æqualem fecit (*e*), ejusmodi autem arenulam diametrum habere scribit $\frac{1}{4}$ pollicis æqualem, vir olim eximius WICRUS Guilielmus MUYS (*f*). Propius ad eamdem diametrum definiendam accessit Jacobus JURIN (*g*), qui diametrum bis millesime pollicis parte æqualem tribuit, deinde (*h*) paulo accuratius $\frac{1}{540}$ pollicis, quæ mensura ipsi LEEUWENHOEKIO placuit. Proxima ill. viri J. Theodori ELLERI (*i*) mensura est, qui cum $\frac{1}{540}$ pollicis comparavit. Minorem fecit Stephanus HALES (*k*), neque majorem diametrum dedit,

[*u*] Continuat. arcuor. matr. p. 220. Phil. Transf. n. 293.

[*x*] p. 298. 299. 300. Habet tamen etiam ovata corpuscula alia aliorum dupla p. 300.

[*y*] Memoir. sur la maladie des bœufs p. 17.

[*z*] Exerc. p. 58.

[*a*] Philos. Transact. n. 280.

[*b*] The microscope made easy p. 125. Decies majores in ricino aquatico Hoglands p. 32.

[*c*] Comm. Botan. T. II. P. II. p. 258.

[*d*] Esper. &c contempl. p. 161. Tanto minores unica facit BOERHAAV & de ci-ribus medic. p. 35.

[*e*] Phil. Transf. n. 106.

[*f*] l. c. p. 333.

[*g*] De aq. fluent. mot. inter diff. p. 46.

[*h*] Phil. Transact. n. 377. art. 7. ex eadem mensura filii argentei.

[*i*] Memoir. de l'Acad. des scienc. de Berlin. T. VII.

[*k*] p. 16. ex JURINI, ut lego, priori experimento in Phil. Transf. n. 255. refa-
to, qui liber ad manus non est.

dedit, quam $\frac{7}{12}$ pollicis. Ad $\frac{7}{12}$ digiti geometrici diametrum olim aestimabat J. Fridericus SCHREIBER (*l*), ad $\frac{7}{12}$ Johannes Tabor (*m*), quæ mensura neque J. Baptiste SENAC (*n*) displicuit, neque Thomæ MORGAN (*o*), neque amplissimo GESNERO (*p*) nostro. Denique vir olim in exponendo celeberrimus Johannes Theophilus DESAGULIERS tantillam rubro globulo diametrum fecit, ut esset $\frac{7}{12}$ pars (*q*) unciae.

Ego quidem cum minimorum corpusculorum mensuris non satis habeo consuetudinis, ut inter magnorum virorum opiniones judex sedere sustineam. Comparavi tamen, ad microscopium solare globulum sanguineum cum plurima de ala papilionis sumta. In alio experimento lens augebat corporum diametrum, ut 250^{a} se ipsa major videretur, & tamen globuli diameter non videbatur vigesimam partem pollicis excedere. Id experimentum, quod minime velim supra merita laudare, diametrum globuli faceret ebulimodi, ut ad pollicem in eadem ratione se habeat, quæ est 5000 ad 1.

§. XIII. Color.

Etsi hæc sphærulae in universum rubræ sunt, obque eas solas sanguis reliquus rubet, non tamen constanter idem iis color est. In animale sano, valido, beneque saturo, etiam singulæ fature purpuræ sunt (*r*). In aliis animalibus, malignius pastis, & debilibus, pallent (*s*) iidem, inque luteum colorem degenerant. Neque hæc in colore globulorum varietas inde pendet, quod palleant solitarii, congesti, vero aucto colore rubescant (*t*). Etsi

[*l*] Elementa phys. math. p. 309.

[*m*] p. 59. experimento non valde subtili usus.

[*n*] Traité des cœurs T. II. p. 655.

[*o*] Philos. principi. p. 187. Addit, sibi ea mensura minores videbuntur.

[*p*] De natur. studior. 1.

[*q*] Course of experimental philosophy T. I. p. 29. ad calculos equidem LEEUWENHOEK BOEGRIANOIS.

[*r*] Second. memoirie &c. exp. 5. 8. 11.

[*s*] Second. memoirie exp. 4. 11. 16. & p. 188.

[*t*] Inde ruborem perdere, & acervatos rubore, singulos neutriquam A. V. LESTER WENBROCK Phil. Transf. n. 166. Anat. Et contempl. p. 44. Experim. Et contempl. p. 209. Fisiol. physiolog. T. IV. p. 335. LANCISSI q. 21. VERDUC tr. de l'enfance des part. T. I. p. 209. W. CHIL. MUYLS I. c. p. 300. F. QUÉSNAT Oeconom. animal. T. III. p. 35. DOM. MISTICHELLI de ophaxia p. 42. &c.

Etsi enim color a congectione corpusculorum utique intenditur (*u*), certum tamen est, etiam solitariis (*x*) globulis, in fano animale, innatam purpuram infidere, neque eos, seorsim inspectos & sigillatim aut pellucere, aut rubrum colorem deponere, uti quidem paissim scribitur; etsi id quidem verum est, ubi in vase capillari pauci sunt, nudum oculum in eo vasculo colorem rubrum non percipere. Oblique illapla lux argentei quid his globulis adspergit (*y*), quale & alia in corpuscula fluida jubar projicitur, neque iis corporibus proprium inhaeret. Contra in venis etiam majoribus (*z*), numerosi in debili animali & congesti globuli flavum colorem conservant. In eadem etiam vena, non satis nota ex causa, hunc globulorum torrentem flavum, alterum saturate purpureum suisse, alias monui (*a*).

§. XIV. Copia.

Variam horum globulorum rubrorum in pellucente humore copiam esse posse, satis intelligitur. Inanes, aut quas oculus certe inanes reperit, arteriae venæque, utique invisibilem liquorem continent, in quo aut pauca rubrorum globulorum linea (*b*), aut omnino ne eæ quidem linea (*c*) continentur; nempe his in exemplis ratio globulorum ad lumen sui vasis, adque diaphanum elementum, in quo moventur, exigua est. Id phænomenon in captivis anguillis LEEUWENHOEKIUS visiderat (*d*). Contra, quo quodvis animal robustius fuerit, eo major vis globulorum est, ut in ranis bene pastis, bufonibusque vix spatium videas, quod rubro globulo non repletatur. Consentiant ea Cl. Britannorum theoræ, qui plethora naturam non in universi sanguinis, sed in rubrorum globulorum abundantia (*e*) posuerunt.

Pauciores

(*u*) SENAC T. II. p. 652. M ALPIGH. *pallium*. p. 113. LANCIS. I. c. p. 21.

(*x*) Exp. 3. 5. 8. 11. 12. 119. Subrubertos esse frœnak. amwerk I.c.

(*y*) Exp. 14. 15. Etiam hoc phænomenon vidit III. ARCHIATRORUM Comes I. c.

(*z*) Pren. mem. p. 17.

(*a*) Exp. 13.

(*b*) Exp. 81. 85.

(*c*) Exp. 71. 73. 74. 75. 78. 81. 84. 86. 171. 181. 218. 219. 215. 226. 233. &c.

(*d*) Contin. arcana. natur. p. 358.

(*e*) Georgius MARTINE *Essays of a Society at Elimb.* T. II. p. 83. Bryan RIBISON of food and discharge p. 65.

Pauciores equidem in frigidis animalibus, quam in calidis globulos esse, si cum sero comparares, jam LEEUWENHOEK IUS auctor fuit, eamque ipsam rationem dedit Thomas SCHWENKE (f), cur frigida animalium unico corde præditorum sanguis flavescat. Paucos etiam in cochleis cruris globulos esse, seri plurimum, LISTERUS (g) reliquit, & accuratior Vincençius MENGHINUS (h), pauciores in anguilla quam in rana, in rana rariores quam in homine globulos reperit, raros etiam in piscibus, avibusque. Verum hæc ego omnia ad languentium animalium ninius frequentes incisiones refero, nimis certus, in robusto bufone, ranaque bene pasta, & rubicundissimum sanguinem esse, nullo gradu, quam in homine pallidiorem, & in arteriis & venis microscopio oppositis tantum globulorum numerum moveri, ut pluribus non sit locus.

§. XV. *Mollities. Elater. Figura mutabilis.*

Dificile est experimentis de his globulorum rubrorum dotibus definire, adeoque & in definiendo magnam scribentis modeliam esse oportet, & dubitantis facilem excusationem. Cum tota placenta sanguinea cum elatere mollis sit, cumque pinguedinem in globulis nostris suo loco limus demonstratur, non repugnem, globulos de plastica gelatinæ natura esse (*i*), ut tamen aliquanto figurae suæ tenaciores esse videantur, quos nunquam, tot in experimentis, aut ad pulsos ad parietes vasorum suorum comprimi figuramque mutare, aut resumere laxatos viderim, aut demum in angustiis vasorum minimorum mutatis diametris in ellipticam figuram transfigisse, cuius longior axis longitudinem sui vasis sequeretur, angustior diametrum canalis fui metiretur. Minime ignoro, quam multi, quamque clari in experiendo viri & mutare figuram viderint, & resumere sibi commissos, ipsum nempe principem *Antonium v. LEEUWEN-*

(f) p. 119. Idem cruoris, in terrestribus rationem tanto majorem facit, ut aquatilium
cruorem ~~ges~~ superet p. 79.

(g) *De cocktails* p. 45.

(b) l. c. p. 258.

(i) Elatícos voca *Franciscus Quereshai* acenom. anim. T. III. p. 41. & G. MARTINEZ Edim., effigi l. c. & alii, & credit Cl. SCHWENKE, posse adunatos, innatoque elatere resilientes, serum interiectum excludere p. 110. Compáctiles & figurables. vocat *Gaußius* clarissimus l. c. p. 162.

HOECK (*k*), deinde *Guilielmum Cowper* (*l*), & inter eos, qui cum vitris convexis consueverunt, *Fridericum Wilhelnum Horch* (*m*), *Henricum Baker* (*n*), & *H. Miles* (*o*), ut alias graves (*p*) auctores, & *Gerardum v. Swieten* (*q*) omittam, qui in lacertæ pulmone (*r*) rem optime adparere addidit. Cupidum certe pulchri phænomeni, non voluntas, neque in iterando experimento pertinacia deftuit, sed natura utique noluit, quem avidus accepisse, eventum industræ meæ dare. In numerofissimis animalculis minoribus globulos folitarios per minimas venulas ferri vidi (*s*), perque frequentes earum venarum anfractus iter sibi aperire. Vidi, quantum ad excitandam eam opinionem satis est, sed id utique non vidi, quod sufficiat ad convincendum hominem unice veri studiosum, nicatio enim aliqua adfuit (*t*), alteriusque subinde facieculæ lucide modo, & modo obscuræ, in globulo alternæ apparitio. Ipsam figuræ mutationem nunquam certo vidi (*u*), neque probabilis ea mihi visa est consideranti, quanta velocitate (*x*) per minima vascula hi globuli ferantur, quos æquum erat lente reptare, si suo circulo maximo incuneati vasculi parietes dilatarent, lumenque sibi cum propriæ figuræ mutatione pararent. Sed neque oleum illud striatumque æmulum coaguli genus (*y*) huc trahi debet, quod sape utique vidi: globuli enim, qui eam faciem induerunt, figuram suam non mutarunt, cum paulo post, incisa vena, novoque reddito fanguini motu, priorem in sphærularum natum redeant (*z*). Vidi etiam, sed rarius in polygonum quasi rete abiisse (*a*).

H 2

§, XVI.

(*k*) *Exper. &c contemplat.* p. 61.

(*l*) *Pbil. Transf.* n. 280, append. ad *BIDL.* T. III. f. 4.

(*m*) *Miscell. Berolin.* T. VI. p. 115.

(*n*) *Microscope made easy* p. 136.

(*o*) *Pbil. Transf.* n. 450.

(*p*) *James KEEL of muscular motion* p. 161. *J. B. SENAC T.* II. p. 657. *J. Frid. Schröder almagli* p. 232. *Francisc. Boissier de SAUVAGES Mem. de Berlin.* 1755. p. 44. *DOUGLAS on heat* p. 136.

(*q*) *Comment.* T. I. p. 195.

(*r*) *I. c. Au ex COWPERO, qui idem animal citat?*

(*s*) *Mémoire, sur le mouvement du sang.* Exp. 64. 112. 120. 121. 124. 125. 125. 127. 128. 132. 138. 143. 144.

(*t*) *Exp. 14. 15.*

(*u*) *Exp. 8. 14. & p. 20. Negat etiam Cl. KRUGERUS, & experimentum LEBENWENHOEKII rejectum refrigerat. sang. in pubn.* p. 16.

(*v*) *Exp. 119. 121. 124. 125. 126. 127. 128. 132. 135. 139. 143. 144.*

(*y*) *Exp. 18. 20.*

(*z*) *Exp. 18.*

(*a*) *Exp. 5. BONANNUS microgr. p. 92. ic. 116. SENAC tr. du GRAN T. II. p. 658.*

§. XVI. *An aere elasticō reflectantur.*

Communis hæc opinio fuit, ut globuli sanguinei pro bullis haberentur, ex aere elasticō factis, quæm crux lamina includeret. Eo tota secta Iatromathematica inclinavit, ab ipso retro Præceptorre nostro Johanne BERNOULLIO (*b*), & Jacobo KEILIO (*c*), neque defuerunt etiam inter alios (*d*) physiologæ scriptores, qui eamdem opinionem reciperent, & nuper Cl. STEVENSON (*e*) tumorem venarum in pedibus in calidam demersis ad sanguinis rarefactionem maluit referre, quam ad vasorum laxationem. Ita etiam J. F. SCHREIBER (*f*), non ejusdem cæterum sententiae, tamen in arteriis pulmonis globulos elasticam naturam induere docuit.

Multis vero modis hujus hypotheseos infirmitas evincitur. Nam ipse oculus, hos globulos absque præjudicata opinione speculatus, non bullas videt, intus pellucido, aut invisibili quoconque fluido plenas, sed crassas massulas, in media convexitate opacissimas, quas oporteret, ex hypothesi, in centro pellucidissimas esse, quod plurimus ibi aer, & coloratæ laminæ longius a se invicem remote essent. Facile autem bullas pellucidas in iisdem ranis distinximus (*g*). Sed neque quisquam vidi aut collisos inresistentes arteriolas globulos, aut in alios globulos impulsos, comprimi, inque minus spatium redire, & exstat Antonii v. LEEUWENHOECK confessio, nunquam ejusmodi quidquam se vidisse (*h*).

Deinde, cum aer utique in frigore densetur, & laxetur in calore, dum observatum est, rubrum crux omnino ne in summo quidem frigore in minus spatium redigi, ex Samuelis AURIVILLII (*i*), clarissimi nunc Upaliensium professoris, testimonio, & ipiusdem Ill. viri Francisci BOISSIER (*k*) consensu. Sed etiam G. E. HAN-

BERGER.

(*b*) In l. de musculorum motu edit. MICHELOTTIANÆ n. 5. p. 6.

(*c*) De secret. animi, & de metu muscul. p. 100. Deinde JEREMIAS WAINWRIGHT of air p. 65. Georgius CHEYNE Physiol. prim. p. 304. Thomas KNIGHTH of heat p. 41. Georgius Ewaldus HAMBERGER physiol. p. 16. 17.

(*d*) Job. Boni circul. anat. physiol. p. 179.

(*e*) Essays of a Society at Edimburg. T. V. P. II. p. 866. seqq..

(*f*) Exp. 3. 9. 17. 198. 214.

(*g*) Almagest. p. 344.

(*h*) Contin. arcu. natur. p. 117.

(*i*) In diss. de vapor. pulmonalium &c. cavitatibus cordis in aqua amplissimæ n. 26..

(*k*) Frigus glaciale sanguinem in minus spatium non comprimit des effets de l'air. p. 48. elem. physiol. p. 138.

S E R G E R fassus est, ne a columna quidem 36 digitorum argenti vivi cruxrem in angustius spatium comprimi (*l*). Porro cum ex professo in hanc item inquireret Clariss. olim *Jacobus JUXIN* (*m*), facile vidi sanguinem aerem aliqua memorabili portione continere non posse, ne ea quidem, qua in aqua continetur, cum tuber globulus, totusque crux, aquæ pondus internum superet, longe levior futurus, si aerem lamina unice colorata obvolutum contineret.

Iterum, cum aer aut in majori calore se expandat, aut in vacuo spatio, neutro modo globuli aut in summo calore se habeant, aut in inani loco. Etsi enim Cl. vir, de secta Iatromathematica, sanguinem in calore ebullientis aquæ quadragesima (*n*) parte prioris voluminis, deinde in nuperioribus scriptis tantum ducentesima (*o*) rarefieri scripsit, inque febribus sexcentesima (*p*), nostris. tamen in experimentis (*q*), cum calor multo major adhiberetur, nullum omnino voluminis incrementum in globulis adparuit. Ita neque in spatium ab aere evacuatum (*r*) dimissi globuli grandescunt. Ut omnino hanc hypothesin dimittere liceat.

§. XVII. *Num in alios globulos minores rubri globuli diffiliant.*

Quibus argumentis adfirmetur:

Majoris etiam momenti hanc questionem esse persuaderor, cum divisione globulorum, tamquam altera columnæ, systema humorum tenuiorum nitatur. Eo accuratius adeo audire oportet, quæ pro hac divisione stabilienda adferuntur. Ergo *Antonius v. LEEUWENHOECK* in proprio stercore (*s*) globulos ex sex aliis compositos, aliosque vidit, trigesimæ sextæ parti sphærulae sanguineæ æquales: inque boum & equorum excrementis

H 3.

excre-

(*l*) *De uno pulsu* p. 4. *physiol.* p. 18.

(*m*) In *Philos. Transact.* n. 361.

(*n*) *De inflammatis* p. 41. de toto vero sanguine sermo est, iā quem variis modis aer se admiscere potuit.

(*o*) *Des effets de l'air* p. 32.

(*p*) *Ibid.*

(*q*) *Second, memoir &c. Exp. 6.* p. 7.

(*r*) *JURIN L C. &c in diff. VIII. p. 100. MORGAN physiol. princip. of medicine p. 24.* *WILLIAMS of the yellow fever.* p. 15.

(*s*) *Anat. &c contemplat. Epist. 34. ad R. HOOKE dat.* p. 38.

mentis (*t*) alias globulos sextæ, alias trigesimæ parti rubri globuli aquales. Porro in equi urina (*u*) globosæ moleculas percepit, quæ ex sex sphærulis componebantur, sanguineæ æqualibus: eademque in alias sex minores sphærulas resolvebantur. In urina humana (*x*) multas particulas vidit, sextæ parti rubri globuli aquales. In ipsis cerevisiæ (*y*) facibus iterum globulos, ex sex aliis conflatos, inque vini fæce (*z*) minus certæ formæ rotundas particulas vitris suis adtigit, quæ duabus, tribus, sex & ultra minoribus sphærulis constarent. In vino, sulfuris fumo medicato, & sphærulas ex sex globulis compositas, & earum in sex minores moleculas dissolutionem distinxit.

His, & similibus aliis experimentis confirmatus, anno 1680 (*a*) in eam sententiam inductus est, chyli globulos fingi in sphærulas sextæ parti sanguinei globuli aquales, ejusmodi vero sex sphærulas in unum globulum sanguineum conponi, cum in primis in chylo & lacte (*b*) globulos videret, sextæ parti sanguineæ moleculae aquales. Multa inde vidit, quæ eam opinionem fulcire videbantur. In squillarum (*c*) & in cancro-rum sanguine (*d*) globulos percepit, ex sex pellucidis sphærulis compositos, inque salmonis (*e*) sanguine ex sex ovalibus planisque particulis. In aqua porro globulos sextæ parti sphærulae sanguineæ aquales vidit, aut certe se vidisse credidit, in uiam sphærulam sanguineæ simillimam sola agitatione compingi (*f*), eamque majoris globuli formationem ico-nibus expressit (*g*). Vicissim globulos majores iterum dissolvi, inque sex rotundas moleculas singulos discedere conspexit, ex quibus primum coaluisse videbantur: eam resolutionem & in vino sulfure vitiato (*h*), & in cerevisia (*i*) vidit. In sanguine demum (*k*) moleculam rubram quam-

(*t*) p. 39.

(*u*) p. 40.

(*x*) Exper. & contemplat. Epiſt. 56. p. 13.

(*y*) Id. ibid. p. 2.

(*z*) p. 6. 7.

(*a*) l. c. p. 3.

(*b*) Ibid. p. 12.

(*c*) l. c. p. 189.

(*d*) l. c. p. 451.

(*e*) Continuat. arcanae, natur. Epiſt. 128. p. 218. 223. l. 4.

(*f*) Experim. & contemplat. p. 10. 11.

(*g*) loc. modo citat. exper. & contempl. p. 2. contin. arcanae, natur. Epiſt. 128. l. 5. 6.

(*h*) Experim. & contempl. p. 8.

(*i*) Ibid.

(*k*) Ibid.

quamlibet sex in sphærulas diffilire expertus est, quæ molliores essent illis in vini & cerevisiæ sacibus globulis, & aliquanto difficultius inveni- rentur.

Eodem modo addito sale volatili oleoso plerisque globulos in sex minores resolvi (*l*) addit, ut non aliud quam minor ejusmodi globulus superesset. Ita factum est, ut minime dubitaverit, de fero perinde, ut de cruento, pronunciare, & ipsum hunc tenuorem humorem ex globu- lis conponi (*m*).

Sed neque in hac subtilitate Cl. viri industria substituit. Viderat suo (*n*) in stercore, inque bubulo (*o*), particulas trigesimæ sextæ parti rubri globuli æquales, quales cruentum humanum constituant: in chylo vero particulas multo iis minores, quas cum sexta parte rubri globuli comparaverat. Inde, ejusdem anni 1680 novembre M. confecit (*p*), globulum rubrum sanguinis humani conponi ex sex minoribus sphærulis: has singulas sex minoribus pilis conponi, & etiam has minimas sphærulas forte ex minoribus iterum globulis constare, ut omnino unicus ruber hu- mani sanguinis globulus ex 36 (*q*), & forte 216 minoribus globulis compingatur, inque eos iterum diffolvi possit. Denique sale volatili (*r*) adjecto globulos ita adtenuari vidit, ut in particulas trigesimæ sextæ parti sue molis abirent, adeoque sanguinem globulum ex triginta sex aliis sphærulis post nupera experimenta confidentius pronunciavit (*s*).

§. XVIII. *Aliorum experimenta, & hypothesis Boerhaaviana.*

Non frequentes utique aliorum scriptorum propriæ de minoribus globulis observationes occurunt. Luteos tamen orbiculos in vasis nū- noribus prior jam **MALPIGHIIUS** (*t*) vidit. Deinde **Johannes TAN- BOR** (*u*) globulum rubrum ex minoribus particulis conponi, lente vi- trea

(*l*) Ibid. p. 35. 36. 87. *Pbil. Transact.* n. 145.

(*m*) *Pbilof. Transact.* n. 117.

(*n*) *Anal. &c contemplat.* p. 38.

(*o*) *Exper. &c contemplat.* p. 12.

(*p*) l. c.

(*q*) *Addit continuat. arcan. natura.* p. 212.

(*r*) *Experim. &c contemplat.* p. 88.

(*s*) *Contin. arcanor. natura* p. 222.

(*t*) *Pojstum.* p. 113.

(*u*) *Exercit.* p. 59. 60. Moleculas in sanguine vidit, quæ ad globulum rubrum se habeant, uti z. ad 34. §. p. 60.

treas adhibita expertus testatur. Minores pellucidos globulos se vidisse auctor est *Carolus Augustus de BERGEN* (x), de eorum numero non perinde certus. Globulos in sanguine albos dixit *Johannes Bonhomme* (y), decolores *Henricus BAKER* (z), qui in minorem ramulum de trunco arteriolæ redierunt. Flavorum meminit *Franciscus Boissier* (a), & compositionem minorum globulorum in unam massam congestorum, credit suis se oculis percepisse, illustris testis *Stephanus HALBS* (b). Seri globulos modico tempore adhibito in plures massulas fecedere auctor est *Thomas SCHWENKE* (c). Addi potest, rubrum cruentum manifeste crassam naturam suam, pulchramque purpuram deponere, inque flavum serum degenerare: eam vero mutationem physiologi ita interpretantur, ut discessionem in minores massulas demonstrat (d). In minores massulas abire, non tamen certo numero, neque in serum tamen, gravis auctor est *Hieronymus David GAUBIUS* (e), neque ipse ab ea opinione alienus fui (f).

His, & aliis forte, quas secundum ingenium magno viro suppeditabat, argumentis, celebrem hypothesis superstruxit *Hermannus BOERHAAVE* (g), "esse nempe in sanguine globulos rubros, molecularum, quæ in humanis humoribus reperiantur, maximos: eos globulos ex sex serosis sphærulis compactis nasci, inque ejusdem iterum generis sphærulas resolvi. Porro globulum serosum, flavum, sive secundi generis, componi ex lymphaticis pellucidis sphærulis, inque easdem iterum minimi (h); in rubro itaque globulo & sex serosos, & triginta sex lymphaticos globulos coalitos contineri. Verum neque his limitibus divisionem globulorum terminari: licet oculorum acies ultra nihil separata, ret-

(x) l. e.

(y) *Cypheo'sonie* p. 309.

(z) l. c. p. 136.

(a) *Pulsus theor.* p. 24.

(b) *Hæmat.* p. 96.

(c) l. III.

(d) *SCHWENKE* p. 112. *Wyer. Gm' Muyt. L. C.* p. 106.

(e) l. c. p. 162.

(f) *Comment. ad prædict. BOERN.* T. II. p. 322.

(g) *Instit. rei Medic.* n. 216. & in *prædict. & de viribus medic.* p. 82.

(h) Lympham ex dilatentibus rubris globulis nasci receperunt præter *BOERHAAVE* *prædict.* T. II. p. 325. etiam *ANTONIUS DEIDIER physiolog.* p. 34. F. *QUESSANT* de la *salignté nov.* edit. p. 418. *LORRY* *des alim.* p. 156. seqq. & alii.

, ret (*i*). Nam longo procul dubio ordine globulum etiam lymphaticum ex minoribus, & invisibilis multarum serierum sphærulis constitutum, omnium vero ultimum & tenuissimum globulum esse, qui fluidum spirituum nomine notius. Sua vero singulis globulorum serieribus & propria vasa esse, arteriosi generis, venosique: serofas nempe, & lymphaticas arterias venasque, & perspirantia demum vascula, & spiritalia (*k*).

Hanc hypothesin, late per pathologiam etiam regnaturam, plurimi recentiorum medicorum & mathematicorum admiserunt (*l*), ipseque PETRUS ANTONIUS MICHELOTTI (*m*), belgicaeque in primis scholæ doctores Thomas SCHWENKE (*n*), Johannes de GORTER, Gerardus v. SWIETEN, alii.

§. XIX. Qui contra scripserint.

Ut fere fit, quam plurimo cum plausu plerique receperunt hypothesin, eam pauci primo, sensim plures, infirmare suscepserunt. Primus, ni fallor, Johannes TABOR, alioquin de STAHLII secta homo, negavit, visum sibi globulum serofum, qui in minores sphærulas discederet (*o*). Inde J. Maria LANCISI, cum globulos sanguineos curiose contemplatus esset, nunquam ex minoribus moleculis componi vidit (*p*). Porro eruditissimus olim collega noster J. Godofridus BRENDEL (*q*), proprio libello ostendit, fieri non posse, ut una & diametri ratio, & ponderis aucti, globulorum majorum vera sit.

Sed

(*i*) l. c.

(*k*) Ibid. n. 246. prædict. acad. T. II. p. 123. 124.

(*l*) Georgius MARTINE I. C. p. 58. Cistiboni WENTRINGHAM senior de podagra p. 28. Cl. Adriani HELVETIUS economia animalis. ubique, & in bijl. de l'Acad. des Scien. 1724. Martinus NOGUEZ anat. du corps humain p. 505. Servatius ANGULIMUS VILLERS physiolog. p. 161. J. Franciscus le FEVRÆ operari p. 47. Josephus LIEUTAUD physiolog. p. 84. 85. Franciscus QUESNEL (lymphaticum nempe globulum sex in minores dividit) economia anim. T. III. p. 41. 78. &c. J. Fridericus SCHREIBER Element. med. Phys. math. L. II. c. 2. Almagest. p. 169. Ernestus Jeremias NEVELD de secretione p. 52. Thomas KINNEIR of nerves p. 6. 7. Franciscus de SAUVAGES physiolog. p. 125.

(*m*) LeBUWENROCKIE nempe experimenta probat de separat. humor. p. 284.

(*n*) l. c. p. 109.

(*o*) l. c. p. 60.

(*p*) l. c. p. 22.

(*q*) Programma Gottingæ ann. 1742. edito.

Sed in primis *J. Baptista SENAC*, qua pollet ingenii acie, copiosus contra BOERHAAVIANAM globulorum sanguineorum divisionem dixit, negavitque serum, aut lympham, globulis constare (*r*), eosque, qui pro flavis globulis aliquoties ab *Antonio v. LEEUWENHOECK* habiti sunt, omnino rubros quidam globulos, sed solitarios (*s*) fuisse, suoque imposuisse pallore, perspicax suspicatus est. Porro acervos fuisse globulorum, quos bonus senex ex globulis conponi putavit (*t*); neque quemquam vidisse duos globulos uniri, ut in unum confluant (*u*); neque ejusmodi coalitionem probabilem videri; neque vicissim certa fide innotuisse globulum rubrum in minores sphærulas dissexisse (*x*); neque deum ex rubris globulis dissipatis lympham nasci, cum globulis destrutis ipsa super sit (*y*), IDEM ILL. AUCTOR notavit.

§. XX. *Quid in globulorum divisione firmum videatur.*

Auctoritas hinc amati preceptoris, inde contraria argumenta & experimenta, fecerunt, ut propriis, neque paucis, periculis in naturam globulorum sanguineorum inquirerem (*z*). Ea experimenta, ut numerola fuerunt, in eo demum consenserunt, praeter globulos rubros, unius classis & magnitudinis, nullam in sanguine indigenam sphærulam reperiri: qui vero globuli passim & mihi (*a*), & aliis, flavi visi essent, eos ipsos globulis rubris minime minores, de eodem genere esse, & unice pallere, aut quod solitarii adparerent, aut, quod magis probabile videtur, quod in languente bestiola experimentum factum esset (*b*).

Porro icones LEEUWENHOECKIANAE confirmant, globulorum omnino acervos fuisse, quos in salmono pro sphærula ex minoribus sphærulis composita habuit vir CL. Ita enim toties in meis periculis sanguinis coagula cum LEEUWENHOECKII figura (*c*) coasentiant, ut nihil magis.

(*r*) *Traité du cœur* T. II. p. 97. 660.

(*s*) Ibid. p. 662.

(*t*) p. 619.

(*u*) p. 658.

(*x*) p. 665.

(*y*) p. 96.

(*z*) *Mémoire sur le mouvement du sang* c. 1.

(*a*) Ibid. exp. 3. 4. 11. 13. 16. 17.

(*b*) p. 57.

(*c*) Epist. 128. f. 4. Confer ejus agmina globulorum in *exp. & contempl.* p. 173. 179. 186. 205. 208. in *Continuas. arcas. natur. epist.* 189. p. 117.

gis. Deinde neque unquam aut diffilientem in minores globulos rubrum illum vidi, aut vicissim minores sphæras in majorem unicam coalesce-re. Videntur autem rubri globuli nimis suæ figuræ, sive voluminis tenaces esse, neque ejusmodi aut regularem divisionem, aut coalitionem ad-mittere: in coagulo enim, & sanguineo grumo (*d*), & unguine (*e*) demum quasi oleoso; in quod si globuli per quietem degenerant, figura-m, quam amississe videntur, conservant, facileque recuperant immutatam. In ipsis demum illi. ELLERI experimentis adparuit, salem marinum, nitrum, salem Epsomensem, alumem, variis modis globulorum unionem mutare, ut sanguis aut cogatur, aut solvatur, & tamen figuram globosam in eo coagulo, aut in solutione superesse (*f*); demum ipsum salis, & nitri, & vitrioli spiritum, qui vehementer sanguinem coagulant, globulos tamen neque destruere, neque mole minuere (*g*). Serum denique, per quod ipsum rubri globuli moventur, totum ita pellucet, ut ne quidem oculis percipi possit, & rubri globuli per inane ferri, videantur, etiam Iosepho Antonio Piatte teste (*h*), gravissimo equidem viro.

Deinde globuli rubri in lympham deliquescere non videntur, qui & inflam-mabile elementum plurimum contineant (*i*), & ferrum (*l*), quo lymphia (*m*) pene tota caret, & cuius ejusmodi firmitas est, quam leni calore destrui posse non debeat sperari. Sed idem calor, qui cruem in lympham resolvit, etiam lympham adtenuat, & eam indolem destruit, quæ a potentiori acore, & a vini spiritu cogitur, ut non probabile sit, coagulabilem na-turam in lympha superesse posse, si in eam cruem contabuisset. Quare, quoties ruber sanguinis grimus, in flavum liquamen diffundit, vel omni-no globulorum moles diminuitur, ut porro & armato oculo propria subtilitas eos subripiat (*n*); aut simplicius, grimus ruber serum qui-

I 2

dem

(*d*) *Exp. 160, 161.* p. 303, &c.

(*e*) p. 20.

(*f*) *I. c. p. 13, 15.*

(*g*) *Ibid. p. 16.*

(*h*) *De morbo Naroniam.* p. 104.

(*i*) *Sect. istius n. 38.*

(*l*) *Sect. istius n. 43.*

(*m*) *Sect. III. n. 8.*

(*n*) Theoria est illi. SENACI, T. II. p. 666. etiam experimento nixa. Etiam sale corticis peruviani admisso ita extenuantur, ut porro oculis percipi non possint.

dem exsudat, quod inter rubros globulos continebatur, neque tamen ad eorum naturam pertinebat. Quando vero diutius adfervatus sanguis & globulosam fabricam amittit & colorem, & in aquam resolvitur, tunc utique adiposa globulorum natura per putredinem, lenisque caloris operam, in aquulam pallentem eliquatur, uti omnis adeps putredine contabescit. Nullo autem experimento constat, ejusmodi in ichore globulos esse, aut eam naturam superesse, quæ cum corporis humani integritate consistere queat.

Nunc, si ista conferas cum iis, quæ dudum contra vasorum decrescentes series monuimus (o), & ea vasorum quasi per gradus pergens diminutio, & perinde respondens globulorum in minores sphærulas dissolutio, pariter infirmo fundamento niti videbuntur. Non id nego, & teneriora vasa dari, & his aptos tenuiores humores: id volo, de iis humoribus pronunciari non posse, aut globulis constare, aut eos globulos perpetua scala ex rubris globulis natos esse, inve rubros globulos iterum compingi posse. Coagula cæterum globulorum ex quiete nata, ipse vidi (p), & modum, quo vascula minima ex pallore [q] invisibili oculis conspicua rubraque reddi possunt, dum sanguinis copiosioribus undis perfluentur. Inverso experimento intelligitur, ut possint rubra etiam vasa evanescere, quando parciori sanguine adluuntur. Nam & rubor diminuto globulorum numero decrescit, & albor membranarum cum eorum crassitie augetur (r).

S. XXI. *Num in sanguine viventis animalis fibræ sint.*

Antiqua res est fibra sanguinis, nam & auctor libri *de carnibus* (s) habet, qui inter HIPPOCRATICOS adseratur, & in primis ARISTOTELES, qui fibras calidorum animalium sanguini inesse, non perinde timidorum (t) animalium cruori, & earum fibrarum gratia sanguinem concrescere scribit: hinc sanguinem damæ cervique, meticulosarum bestiarum, minus

(o) L. II. p. 117. 118. 119.

(p) Conf. p. 20.

(q) In experimentis numerosis 71. 91. 92. 95. 183. &c. *Deon. l. Mensir. Et. l.*

(r) Exp. 70. 77. 92.

(s) n. 9.

(t) *Histor. anim.* L. III. c. 6. *De partibus anim.* L. II. c. 4.

minus firmiter cogi, omnino vero non coire eum sanguinem, de quo fibras exemeris (*u*): quæ eadem **GALENI** (*x*) est sententia: quam haec tenus correxit **Johannes FERNELIUS** (*y*), ut damarum etiam & cervorum in sanguine fibras reperiri adderet. In scholis medicis, cum aliis **GALENI** placitis, receptæ fibrae diu absque contraria voce regnare, & inter recentiores etiam scriptores & elasticas (*z*) esse, & contractioni arteriarum reniti, & esse contractionis capaces & relaxationis (*a*) alii scripserunt, alii cum muscularum fibris compararunt (*b*), aliis ipsas fibras ex animali, & ex vegetabili etiam cibo, in corpus humanum rapi, & fibrarum nostri corporis intervallis adponi, ut omnino eadem fibra nunc hominis sit, quæ modo fuit ovinæ (*c*), probabile visum est, & gravi atque superrimo scriptori tertium cum cruce & fero sanguinis elementum fibra est (*d*). Neque desuit, qui fibras diminutas in globulos abire scripserit (*d**).

Duplici potissimum experimento naturam fibrosam sanguinis confirmare tentarunt, quibus ea sententia placuit. Placenta nempe sanguinis ex suis vasis effusi, sponteque sua coacti, solidarum quasi partium reticulum refert, in quarum areolis serum sedet. Eas solidas particulas pro fibris habent. Ita **MALPIGHII** (*e*), & clari viri discipulus (*f*), & ipse **MALPIGHII** adversarius **J. Hieronymus SBARALEA** (*f**) pari fere modo rete sanguineum descripsit. Porro valde nuper vir **Cl. Vincentius Menghinus** (*g*) fibras sanguinis linteo impositi, elutis aqua adfusa globulis separavit: & illi. vir **Hieronymus David GAUBIUS** de sanguine frigescente, & stagnante, multa frigida abluto, filamenta ferre membranosa obtinuit (*h*).

I 3

de

(*x*) *Histor. animal.* L. III. c. 8. & 19. *Part. anim.* I. c.

(*x*) *De elementis* L. II.

(*y*) *De sanguine natur.* L. VI. c. 7. In cervi cruce etiam fibras reperit A. L. PATRICKIUS apud **CAGNATUM obser.** var. p. 56.

(*z*) *HECQUET de la tristis.* T. I. p. 60. &c.

(*a*) *Quæstions sur la boisson EJUS.*

(*b*) *WILLIS de cerebro* p. 140.

(*c*) *Archibaldus PICTARNE* de modo, quo cibi in ventriculo conter. quæ quidem epistola Cl. BORRI nomen præ se fert.

(*d*) *H. D. GAUBIUS patolog.* p. 160.

(*d**) *FIZES de biene* p. 123.

(*e*) *I.c.* p. 125. 126. *de polyp.*

(*f*) *J. Maria LANCETIUS* I. c. p. 21. ed. nov.

(*f**) *Mentis & oculi vigil.* p. 105. 106.

(*g*) *Comment. Bowon.* T. II. P. II. p. 254.

(*h*) p. 158. Habet etiam fibras infelix **SKEBBARE** T. II. p. 20. ex quibus corium sanguinis credit coalescere.

Et omnino sanguis, qui in frigidam de nare destillat, continuo in oleosam striatamque crustam expanditur, quæ aque innat. Ab ea vero macula continuo lineæ per aquam descendunt fundumque petunt, quæ in calida in nebulas abeunt, cum alcohole vero vini in pelliculas (*i*). Si majori copia, ut ex vena pedis incisa, sanguis frigida exceptus fuerit, etiam evidentius pellucidæ fibræ in aqua nascuntur, quæ se amplexæ & coherentes ad vasos fundum descendunt (*k*).

Iterum, ex sanguine in aqua agitato fibrosa lanugo nascitur, quæ fundum aquæ petit, ill. nostro olim fecero auctore. In suillo sanguine quaesito fibre orientur (*l*), quæ membranas constituunt. Sanguis suillus, per horam percussus, involutus erat substantia ex fibris membranam referentibus facta, carnis omelino simili, in qua, plurima aqua macerata, fibre albæ adparuerunt (*m*). Et sanguis animalium crustaceorum exsiccatus in musculosam & fibrosam carnem abit (*n*).

Huc etiam polypi revocari possunt, fibrosi utique, quasi cellulosa tela misti, quæ fibras connectit, sive in corde reperiantur (*o*), sive ex sanguine de vena missio in fervida nati fuerint (*p*).

Denique non defuerunt testes, qui in sanguine, pariter ut globulos, ita fibras se vidisse referant, *Philippus nempe VERHEYEN* (*q*) & *Johannes BONHOMME* (*r*).

§. XXII. *Quid contra eas fibras adferatur.*

Primus, quantum quidem memini, *J. Alphonfus BORELLUS* (*s*) fibras sanguinis hactenus impugnavit, ut inter ejus humoris elementa nollet recipere. Phænomena utique, quibus fibre solebant stabiliri, non ignoramus.

(*i*) *Antonius de HEYDE* obs. 87. *SENAC* T. II. p. 103.

(*k*) *FERNELIUS* L. c. L. VI. c. 7. *BARTOLI* *dil. ghiaccio* p. 184. *MALPIGHIA* *postibm.* p. 45. *SYLVA de la saignee* T. II. p. 357. *SCHWENKE* p. 104. *BRUYNSTEIN* *de inflammatis.*

(*l*) *TRICHEMAYER* *de polyp.* n. 12. *Anthropolog.* p. 65.

(*m*) *BOEHNER* *de præcavend. polyp. gener.* p. 14.

(*n*) *LISTER* *de bromorib.* c. 22.

(*o*) *TRICHEMAYER* *de polyp.* n. 10.

(*p*) *SCHULZ* *in physcal. beliffig.* T. III. p. 1065, 1066, 1067.

(*q*) *L* II. p. 32.

(*r*) *Cephalotomie* p. 309.

(*s*) *De mat. animi* L. II. Prop. 132. p. 265, 266.

ignoravit vir Cl. in viventis tamen hominis sanguine fibras negavit repetiri, quæ nimis magnæ sint, neque minimis vasculis corporis humani recipi possint. Neque desueunt, qui Claro viro venirent in subsidiū (t), neque BOERHAAVIUS fibras sanguinis admisit.

Qui vero paulum longitudinem fibrarum sanguinarum meditatus fuerit, & gravitatem, & molitatem, continuo perjuadebitur, nullo modo fieri posse, ut vis a corde veniens hujusmodi longum flexileque filum per minimorum vasculorum angustias & anfractus promoveat, quod æquum sit ad primam quemque vasculi flexionem inpingere, & repulsum in se ipsum convolvi.

Sed in vivo animalis sanguine nihil unquam fibrae (u) simile adpareret, aut in meis experimentis, aut in alienis, aut in emissō crōore, quamcunque convexorum vitrorum vim adhibueris. In sero utique sanguinis capillari vitrea fistula recepti ramenta MALPIGHIIUS (x) reperit, quæ in solidum corpus coire vidit. Sed ea non debent pro fibra sanguinea excitari, quæ a sero diversa sit.

Denique utiliter monuit III. SCHWENKIUS (y) omnino fibras, quæ in frigida colliguntur, in vivo animale adesse non posse, cum in calore, qualis est vivi animalis, dissolvantur & evanescant. Ipse demum III. fibrarum defensor GAUBIUS fibras in vitali sanguinis statu nondum reperi fatetur (z). In calidam, si sanguinem de vena emittas, nullæ fibrae generantur (a).

Quæ vero experimenta pro fibris producuntur, eorum aliqua ad membranam sanguinis pertinent, quæ præcipue ex sero coacto fit (b): aliqua ad mucaginem, quæ in sanguine plurima est, & in aqua frigente colligitur (c): aliqua ad gummosas particulas, quæ cum sanguine circumveunt, fluidas hactenus, dum vita & calor superevit, ad coeundum verospitas, quando frigus accessit & quies.

§. XXII.

(t) Johanna BORN *circul. Anat.* p. 169. Hieronymus SEBAGEL I. c. p. 109. Gmelius COOPER ad BEDL. T. 23. l. 16.

(u) SCHWENKE p. 103.

(x) *Posthum.* p. 45. Habet etiam III. SENAC particulas in lympha ramosas T. II. p. 57. 650.

(y) p. 102. 103.

(z) p. 158.

(a) BARTOLI I. c. SCHWENKE p. 103.

(b) Conf. FLOYER *prænatural. state of humours,* p. 9. SENAC T. II. p. 108.

(c) Sect. III. n. 5.

§. XXIII. *Sal sanguinis, num oculis percipiatur.*

Transimus paulatim ad ea sanguinis elementa, quæ demum per alia corpora admitta innotescunt, neque in fani vivique animalis sanguine sponte sua se offerunt, sales nempe, oleum, terram, ferrum, aerem. Et salem quidem sanguini inesse sapor (*d*) prodit. Sanguis nempe de naribus sanissimi hominis stillans, propriæque oblatus linguae, vehementer salitus videtur, ut obiter aquam salam exprimat, cui centesima, & major etiam pars salis communis ineft. Salem ergo continet & uberiorem, quam quidem saliva, aut mucus, cum quorum humorum sale lingua consuevit. Non ideo a marino sale eit, quam in cibis receperimus. Animalia enim fera, quæ nullum sale culinarem admittunt, pariter salsum habent sanguinem (*e*). Quis autem is sal sit, nondum inde definitur. Oculum equidem armavit LEEUWENHOECKIUS, ut definiaret, crediditque se variis in humoribus animalium sales vidisse, neque unius generis. Ergo marino quidem similem, rubrumque salem vidi in lente crystallina (*f*), inque sanguine (*g*) de quo aqua aliqua exhalaverat, tum in cancri vitali humore (*h*), & squilla (*i*), & aranci (*k*). Similia fere in sanguine experimenta LANCIUS addidit (*l*), & Wierus Guilielmus MULLUS (*m*). Alias porro particulas salinas sanguinis spiculorumque similliores Dominicus GUILIELMINUS (*n*) describit, & Philippus VERHEYEN (*o*); quales equidem particulas in sudore etiam LEEUWENHOECKIUS videbat (*p*), in viperarum vero veneno depinxit eruditissimus olim medicus.

Richardus

(*d*) MAGISTER Chym. prat. p. 452. QUESNAT Ecor. anim. ed. vet. p. 150. Jus carnis abfque adjecto sale conjuendo saluum fit SCHNEIDER de catarrb. p. 233.

(*e*) FALCO, PEYER obj. 48.

(*f*) Auct. Et contempl. p. 8.

(*g*) Philof. Transact. n. 117.

[*h*] Exper. Et contempl. p. 452.

[*i*] Epist. physiolog. p. 11.

[*k*] Contin. arcuat. natur. p. 330.

[*l*] Diff. IV.

[*m*] De sanguine musc. p. 100. Philof. Transact. n. 339.

[*n*] De sanguinis natur. Et confit. n. 52. In liccato equidem fero particulas vitro adhaerentes speculatus est.

[*o*] L. II. p. 33.

[*p*] Exper. Et contempl. p. 390.

Richardus MEAD (*q*), inque aselli majoris humore crystallino (*r*) idem iterum delphenium civis.

Nos, ut fatcamur quod verum est, harum rerum nihil simile vidimus unquam, & eas, quæ in siccato sanguine strice vitro adhæserunt (*s*), non differre credimus ab iis nondum certæ naturæ salibus, quales plurimos *BAKERUS* depinxit. In vivi animalis sanguine angulosi quidquam aut linearum simile circumfluere, ea mole, quæ oculis armatis se offerat, atque adeo vasorum minimorum diametro æqualis sit, id quidem non videtur cum eo expedito circuitu conciliari, qui ad vitæ integratatem adeo necessarius est.

§. XXIV. Ut mutetur a salibus mediis admistis.

Variis modis ad naturam hujus salis, aliorumque elementorum sanguinis indagandam acceditur, admistis salibus, per observatos morbos, per putredinem, denique ignis tortura exhibita. Saliū autem, & spirituum, aliorumque humorum admistorum phænomena prima repetemus, postquam aliqua monuerimus. Experimenta Cl. virorum si quæ excitabimus, alia cum toto sanguine capta sunt, alia cum cruro a fero separato, neque semper facile sicut distinguere, quæ ad sanguinem grumum, adve totam massam pertinent. Quoad tamen ejus fieri potest, scopus noster est de rubra parte sanguinis dicere, sive pura fuerit, sive admistum serum phænomena grumo propria non valde vitiaverit. Deinde cavere oportet, ne omnia, quæ sanguini accident, unice admistis salibus tribuantur: ita sibi relictus sponte sua stat, nullo equidem sale admisto, ut non continuo sali alicui imputari debeat, si sanguis post aliquam moram in placentam coiverit (*s**). Ex hac ipsa forte cautela poterit fieri, ut eæ lites componantur, quæ de vi nitri aut cogente sanguinem, aut solvente agitatæ fuerunt. *STAHLIUS* (*t*) enim a nitro, tamquam frigus inferente pharmaco, sanguinem addensari docuit, non improbabili

[*q*] *Op̄ poisons* p. 15. ed. IV. T. I. f. 10. In apis veneno *IDEM*.

[*r*] *Epistol. physiol.* p. 10. 12.

[*s*] Ut in *GUILZIUS* experimento.

[*s**] Monet ut ab effectu aquæ nobis caveamus, *SNELLEN* *theor.* p. 266. 267.

[*t*] *Op̄sc. phys. med.* tum Cl. Viri P. *VALCARENHI* *medicin. ration.* p. 79. & *Auctoritas der legonis de Cynnie* p. 4. Sanguinem inde in gelatinam cogi. *Thomas SCHWANKE* p. 145. & *ELLER* I.c.p. 13. ut tanue globuli separati, & ordinati sint *ELLER*. Omnes humores humani a nitro admisto densantur *IMBRE* & *T. quest. med.* XII. p. 42.

probabili ratiocinio usus: alii contra, & princeps *Fridericus HOFMANN* (*u*) & nuper *Franciscus BOISSIER* (*x*) a nitro sanguinem potius solvi maluerunt, ut ab aliis mediis salibus solvitur.

Ergo primo ea communis salium mediorum, & lixiviosorum natura est, ut fluidum plerumque sanguinem, reddant (*y*), aut liquidum conservent, colorem vero rubrum aut firment (*z*), aut omnino augeant (*a*). A nitro sanguis neque solvitur, neque cogitur, in meis quidem experimentis (*b*). Admixto enim nitro laminæ eisdem crucis floridissime rubentes nascentur, verum ex, etiam absque nitri ope, pariter ex eodem sanguine coeunt. Color autem vividissime coccineus (*c*) utique nitro debetur, quo sale non aliud latiore purpura sanguinem ditat. Et tamen, is ipse sal, ad novem omnino grana in duabus uncii aquæ dissolutus, in præstantissimorum virorum experimentis canem subito occidit (*d*), quem ejus periculi exitum quidem mallem casui tribuere, cum unice midum a nitro in sanguinem injecto alias, magnæ auctoratis scriptor (*e*), citatum viderit. Cæterum, si de lite illa omnino definire oporteret, credetrem nitrum sanguinem potius resolvere, siquidem leviorum reddit (*f*), neque mea experimenta penitus repugnant (*g*).

Alii sales medii utcunque similia faciunt. Sal narinus cum sanguine commixtus floridum (*h*) colorem facit, cæterum coagulationem neque valde.

(*u*) *De acido fæcide p. 44.* tum alii præstantes viri *MALPIGHIIUS de polyp.* p. 132. *Ant. de HEYDE obit. 87.* *VERHEYEN* L. II. p. 31. *Tb. SCHWENKE* in exp. p. 189. *BOECLER & VOLMAR* in disp. ad definiendam item proposita, *an nitrum sanguinem coagulet.* *RUTTY Symp.* p. 52.

(*x*) Inter omnes sales sanguinem fluidum alium reddere, *sur l'effet des medicaments*, p. 39.

(*y*) *BOERHAAVE Elem. Chemie* T. II. p. 378. 379. *MALPIGHII* p. 132. Addit, imprimiti si moti fuerint, *Tbomas SCHWENKE* p. 190.

(*z*) Ne brevi, ut alias solet, in obscurum spadicemque colorem elongat.

(*a*) *BOERHAAVE* l. c. *EICHEL* in disp. qua *Experim. circa sanguin. contin.* n., 34. p. 21. n. 44. p. 25.

(*b*) *Second Mémoire exp. 29. 34.*

(*c*) *CLAYTON* miscell. cur. T. III. p. 347. *PETIT* seconde lettre p. 34. *SCHWENKE* l. c. *HALES* bannifas. p. 154. *ELLER* memoir. de l'Acad. des scienc. de Berlin T. VII. p. 13. *SAUVAGES* *sur l'effet des medicaments* p. 37; *Exp. mor.* 16. 17. 28. 29. 34. *RUTTY* l. c.

(*d*) *CLAYTON* l. c. *PETIT* l. c.

(*e*) *MALPIGHIIUS* l. c. p. 132.

(*f*) *SILBEREING* l. c. p. 16.

(*g*) *Exp. 27. 28.*

(*h*) *VERHEYEN* T. II. p. 29. *ELLER* l. c. p. 131.

valde promovet, neque impedit (*i*), nisi motus accesserit, qui etiam solus coagulationem impedivisset (*k*). In venas vivi animalis impulsus sicut fecit, ultra non nocuit (*l*).

Tartarus solubilis ruborem auget (*m*), ut nitrum, in venas tamen impulsus enecuisse visus est (*n*). Cæterum non oportet dissimulasse, subitam hanc liquidorum, in primis frigentium injectionem, etiam quando natura humoris innocentissima est, animalia occidere. Ita legimus ab aqua injecta (*o*), & a lacte (*p*), & ab oleo (*q*) in venas dato animalia subito periisse.

Sal Epsomensis sanguinem perinde floridiorem reddit, fluidumque, globulorumque distinctionem conservat (*r*). Sal mirabilis cogit utique sanguinem (*s*). Sed is ipse sal etiam aquam, ut notum est, coagulat.

Nitrum calcarium variorum fontium, mirabilis salis ad fine, sanguinem sese cogit (*s**), & lac, tum sal polychrestus (*s***) & prunellæ.

§. XXV. Ut ab acidis.

Sales acidi leniores, sanguinem alias cogunt, alias aut non cogunt, aut omnino diluunt (*t*). Tartarus regeneratus sanguinem fluidum reddit, servatque, & floridum (*t**). Cremor tamen tartari, qui terram propriam conjunctam habet, sanguinem separavit, ut pars inferior cogeretur, & globuli in planitiem conprimerentur (*u*). Vinum sanguinem diluit, ne-

K 2 que

(*i*) SBARAGLII l. c. p. 121. 122. Stat in gelatinæ rubræ speciem SCHWENKE p. 106. 146. 189. ELLER l. c. addit globulos separatos & ordinatos manere. Fluiditatem confervat RUTTY l. c. tab. AA. & adtenuat p. 143.

(*k*) SCHWENKE p. 106.

(*l*) Pbil. Transf. n. 335.

(*m*) PETIT Epif. II. p. 34.

(*n*) Ibid. p. 37.

(*o*) SANDRIS de statu sanguinis p. 100. Gelida erat.

(*p*) LOWER de corde c. 2. conf. L. III. p. 228.

(*q*) Oleo injecto alter canis subito periit, alter post soporem Pbil. Transf. n. 335.

(*r*) ELLER l. c. p. 15. RUTTY p. 76. de vulgari sale factitio. Addit minus tenacem reddere.

(*s*) IDEM ibid.

(*s**) RUTTY p. 60. 90. 116. 130. Aqua tamen sulfureo nitroso minus tenacem reddidit p. 545.

(*s***) RUTTY p. 78. tenaciorem sanguinem facit & furniorem SCHWENKE p. 190.

(*t*) RUTTY p. 210.

(*t**) BOERHAAVE Chem. Elec. S. II. p. 379.

(*u*) ELLER p. 14.

que coire finit, et si a vino generoso venis injecto in pulmone coagulatum, sanguinem reperit *Carolus GIANELLA* (x): semper enim oportet memores esse, quam facile a morte sanguis his in vasis absque alia causa admista cogatur.

Acetum sanguinis fluiditatem non mutat (y), nec auget (z), ceterum peculiarem, ingratissimum luridumque colorem in sanguine admistum producit (a): ut omnino non alias liquor in amoenius cruentum tingat, quam quidem is beneficus acer. Neque *J. Baptiste du HAMEL* (b) aut *FREINDII* experimento (c) contra ea, quae ipse vidi, fidem trahere possum, qui ab aceto destillato sanguinem cogi yiderunt. Satis autem notum est, acetum destillatum simplici & naturali potius debilis esse. In venas vivi animalis datum alias non nocuit (d), alias animal post eam infusionem extinctum fuit (e), sive id aceti culpa factum est, sive casus vim suam exseruit.

Sal acetosae, quem intelligo essentialiem, & acidum fuisse, sanguinem in lividum concrementum mutasse visus est, ut tamen globulorum ordo incorruptus maneret (f).

Sales acidi fossiles sanguinem magis mutant, potissimum tamen, si accrem igne expuleris, ut sinerum ad cruentum misceas. Alumen solutum sanguinem aut non cogit adsusum (g), aut cogit, ut tamen rubedo conservetur (h), magis vero cogit, si pulverem aluminis majori copia adduderis (i). Venis inmissum idem occidit (k).

Solutio.

(x) *Saggi di medicin. ital.* p. 47.

(y) *Second-mémoire* Exp. 27. *QUESNAY* econ. T. II. p. 66. *DRELINCOURT* apud *MANGET* *Biblioth.* T. I. p. 951. *VERHEYEN* L. II. p. 31. *BOERHAAVE* L. c. p. 378. *SCHWENKE* p. 190. Non diluit nisi tritus accedit *KRUGER* *diates.* p. 224. .

(z) *EICHEL* p. 34. *SAUVAGES* *ad. des medicament.* p. 37.

(a) *Ibid.* exp. 27. 28. 34. *DRELINCOURT* apud *MANGET* *bibl. anat.* T. II. p. 951. *EICHEL* p. 31. *VERHEYEN* L. c. p. 29. *SAUVAGES* L. c. Luteum inde fieri (ab aceti spiritu) *BOYLE* *append. ad hist. sang.* p. 101. Recte, si terreum aut lutosum colorem intelligit.

(b) *Hist. Acad.* p. 75. .

(c) p. 177.

(d) *PETIT* L. c. p. 37. cum ad duas uncias infudisset, *COURTEN* *Phil. Transf.* n. 335.

(e) *PINELLI* *de podagra* p. 230. *SPROEGEL* p. 79. A copia aceti occisum animal *FREIND* p. 182.

(f) *ELLER* p. 15.

(g) *QUESNAY* T. I. p. 103. *SCHWENKE* p. 148. 149.

(h) *ELLER* p. 13. conf. *SCHWENKE* p. 190. *Ant. de HEYDE* obs 87. *RUTTY* T. AA. *BAGLIVIUS* & cogere, & obicuro lividoque colore tingere auctor est. p. 464.

(i) *EICHEL* p. 30. *SCHWENKE* L. c.

(k) *Philos. Transf.* n. 210.

Solutio vitrioli potentius operatur, & in sanguinem cinereum coagulam flocculentum excitat (*l*), ut globuli in filamenta mutantur. Vitriolum album, quod metallicum aliquid admistum habere videtur, sanguinem admistum coagulat, & injectum in vivi animalis venas cogit (*m*). Sal martis, qui & ipse vitrioli genus est aliquanto magis artificiosum, sanguinem solutus addensat (*n*), ejusque tinctura nigrum ipsi colorem imperit (*o*). In venas iomissa anima martis bestiani letho dedit (*p*). Vitriolum cæruleum, cupreum & potentius, sanguinem & plerosque humores cogit: (*p**), etiam aquas eo vitriolo fetas (*p***).

Vehementius iterum sanguinem mutant acidi liquores, quos multus ignis de salibus exegit. Diluti equidem mitius hactenus fæviunt. Spiritus vitrioli debilior, & aluminis liquor, sanguinem nondum cogunt (*q*), & potius diluere videntur (*r*), & in venam injectus spiritus salis dilutus, & aqua regia debilis, animal non occidit (*s*). Sed etiam vitriolicus liquor longo usu sanguinem valde inflammatorum arthritici hominis potius diluisse visus est (*t*). Meraciores iidem spiritus utique totum cum sero sanguinem cogunt (*u*), nigrumque reddunt. Inprimis autem spiritus salis sanguinem coagulat (*x*), coloremque ad atrum tendentem inducit (*y*), globulos tamen non destruit (*z*). Eiusmodi massa cruxis nigro carboni similis incorrupta manet (*a*). Sed etiam dulcis, ut vocant (*b*), salis spiri-

K 3 tus

(1) ELLER L C. SCHWENKE p. 195. Mireris de viridi negare, ut solvere aiat C.RUTTY p. 262, 263. cum tamquam aquas vitriolicas serum & salivam a dicat cogere p.268.
(m) COURTE L C. & subito occidit. De hungarico vitriolo DEDIEZ de la poste in collect. p. 334.

(**) W R I G T H *de ferro* p. 31.

(e) SILBERLING p. 18.

(p) De Hayde obs. 50.

(P*) RUTTY T. AA. & p. 261, 16j.

(p. 291.) IDEM p. 291.

(q) MALFIGHT I. C. p. 131. PITCAIRN'S ELEMENTS, MED. MATH. p. 36. QUENKATI I. C. p. 26.

(r) COLONIUS de thermis p. 20.

(1) Argissewsky de curatione podagra p. 96, 97.

(1) PETIT l.c. p. 37. SPROEGEL exp. 56.

(u) *Ant. de Heyden* obs. 87. EICHENL. n. 39. *de Haan* T. c. p. 112. &c. BIRCH
bill. of the R. Soc. T. I. p. 509.

(x) BOERHAAVE, PITCAIRN L. C. FREIND p. 177; SCHWENKE.

(y) Plerique priorum.

(2) ELLER I. C. p. 16.

(a) De Haan p. 112.

(b) FRIEND, SCHW

（二）在本办法施行前，已经完成登记的公司，其登记事项与本办法的规定不一致的，由公司依照本办法的规定申请变更登记；未申请变更登记的，由公司登记机关责令改正，拒不改正的，吊销其营业执照。

tus sanguinem addensat, minus tamen valide. In venas injectus spiritus satis necat, & in iis animalibus, quæ enecuit, sanguis per totam venarum seriem ad cor usque in grumos coactus repetitur (*c*). Etiam aqua regia injecta occidit (*d*).

Nitri spiritus sanguinis colorem per ipsas etiam vasorum vivi animalis venas in lutulentum terreumque (*e*) colorem mutat, unguinisque modo lentum cogit stare. Nudo sanguini adfusus cogit (*f*). Etiam dulcis sanguinem addensat (*g*). Meracus in venam vivi animalis injectus necat (*h*), iterumque ab ejus acoris violentia sanguis in venis brachii cavaque vena, & dextra aure, & ejus lateris ventriculo, & in pulmone in grumos fixus repertus est (*i*). Cum sicco sanguine etiam magis fervet, quam vitrioli oleum (*k*).

Spiritus vitrioli debilior sanguinem nigricantem reddit (*l*), & coagulat (*m*), ut sere limum referat, & ab ipso oleo vitrioli diluto coagulum terreum & molle nascitur (*n*). Debilis sulfuris spiritus injectus aliquando non occidit (*o*), alias (*p*), forte non satis dilutus, & ipse, & sulfuris per campanam (*q*) paratum oleum animal enecuit.

Violentior acidus liquor, qui de vitriolo stillat, & spiritus vocatur, sanguinem coagulat, subnigrumque facit, & durum (*r*): in venas misfus,

(*e*) SPROEGBE exp. 57. 58.

(*d*) BORRICH. de Sang. p. 85. De spiritibus acidis in universum v. AALSEM in disp. de humorib. Leid. 1671. edita.

(*r*) Second Memoire Exp. 24. 25. Nigrum vocat PETIT p. 34. Fœdum SCHWENKE p. 194. Pallidum ELLER L.C. Limicolum DRELINCOURT L.C. Terreum BIRCK l. c.

(*f*) Cogit utique apud III. viros SCHWENKE L.C. PITCAIRNE p. 36. BOERHAAVE, BAGLIV. FREIND, BOYLE appar. p. 58.

(*g*) FREIND p. 176.

(*b*) PURMANN Lorberkraut L. III. p. 274.

(*i*) FRACASSATUS L.C.

(*k*) GREW parts of animals p. 250.

(*l*) VERHEYEN L. II. p. 32. ELLER p. 16.

(*m*) BOERHAAVE, BAGLIV. I.C. BORRICH. L.C. MANGET Bibliot. Anat. T. II. p. 169. ELLER L.C. Inequaliter addit cogere FRACASSATUS de cerebro p. 414.

(*n*) J. MAUR. HOFMAN disquisit. Anat. patol. p. 178.

(*o*) BORRICH. L.C. COLEBATCH append. concerning acid. and alkali, qui canem edacem addit reddidisse. Oleum sulfuris vocat, qui innocuum repescunt, CRISCIUS de sevrib. p. 45. COCKBURNE of sepienissimi p. 115.

(*p*) FRACASSATUS Phisof. Transf. n. 27. de cerebro p. 411. 418.

(*q*) ETTMULLER chirurg. insuffor.

(*r*) ELLER L.C. p. 16.

fus, excludit, & cruorem in polypos vertit (s). Oleum vitrioli, qui idem spiritus est meracior, sanguinem atro colore tingit (t), & cogit (u). In vivi animalis venas impulsum pariter mortem infert, & sanguinem in grumos addensat (x). Sed præterea cum eodem cruento effervescit, & calorem fervendo excitat (y). Non inde protinus alcalina in sanguine indoles demonstratur. Nam etiam aqua (z), & ipsa demum glacies (a), cum oleo vitrioli sincero incalescit.

§. XXVI. Ut a salibus per lixivium factis.

Antiqua opinio est, sales hujus generis, quos vulgo alcalinos dicunt, sanguinem fluidum (b) reddere, & conservare, ne crassamentum nasci possit (c); deinde ruborem (d) augere, & ab acidis mutato sanguini suum colorem reddere, & limpiditatem (e). Hinc coagulo ab acidis salibus facto hoc quasi antidoton jubent opponere (f).

Fixis in universum salibus, fluidam naturam cum sanguine communicari (g) graves autores sunt, tum de sale aut oleo tartari (h) sigillatum, & de calcis aqua (i). Rubrum ab hac classe colorem intendi, perinde legimus

(s) FREIND L. c. du HAMEL p. 88. BAGLIV. p. 463.

(t) EICHSEL p. 29. Æruginosum vocat PITCARNE.

(u) EICHSEL p. 34. PITCARNE p. 34. FREIND, BAGLIV. MALLEIGHI.

(x) ZOLICOFFR de dolore p. 11.

(y) PITCARNE p. 34. EICHSEL I. c. BAGLIV. Cum sicco tamen sanguine pariter fervet, & cum cervi cornu. G R E W parts of animals p. 249. 250.

(z) BOYLE de origine formar. p. 34. S'GRAVEZANDE Elem. phis. Newton. n. 2449. CHARAS mem. de l'Acad. des scienc. 1692.

(a) BOYLE I. c. p. 84.

(b) DREILINGOURT apud MANGET I. c. p. 951. 952. HUXHAM of fore straw. p. 53. ELLER I. c. p. 14. PETIT, BAGLIV. Ant. de HEYDE obs. 87.

(c) HUXHAM I. c.

(d) ELLER I. c. BAGLIV. I. c. PETIT Epist. II. p. 34. SCHWENKE p. 190. EICHSEL p. 22. (de fixis salibus) FREIND p. 161. DREILINGOURTIUS equidem subnigrum colorem impertire fatetur I. c.

(e) EICHSEL p. 24. 28. RUTTY de aquis Alcalinis tab. CC.

(f) DREILINGOURT p. 951.

(g) DODART projet pour servir à l'histoie des plantes p. 236. FREIND p. 167. de absinthii sale & genitrix. BOERHAAVE I. c. DREILINGOURT. ELLER p. 13. RUTTY p. 406. tab. CC. & AA.

(h) PETIT p. 26. VIRESSES de remos. Et proxim. p. 124. BAGLIV. p. 463. BORRICH. p. 85. FRACASSATUS p. 418. BROEN de despic. belli veterum p. 225.

(i) COLONIUS I. c. WHYTTE on limewater Ed. II. p. 102. nempe cruentam iugis tenacem fieri, si in aquam calcis dimiseris, quam si calida pura fueris usus.

legimus (k). Sic de salibus volatilibus (l), alcalinae classis similia proposita sunt, nempe liquefieri sanguinem (m), & ejus rubeum colorem conservari (n), & augeri (o). Exempla producta sunt in spiritu salis ammoniaci (p), sanguinis (q), cornucervi (r). Hinc iterum deductum est, in peste, & morbis malignis sanguinem ab alcalina vi aliquari (s), acidaque antidotorum loco esse, quæ alcalium crimina reperant, sanguinique suam coagulabilem indolem reddant

Verum equidem mihi nondum certum est, aut ruborem, aut fluiditatem sanguinis ab ejusmodi lixiviosis salibus augeri.

De fluiditate primum, deque salibus fixis. *Franciscus QUESNAY* ejusmodi sales coagulum sanguinis durius reddere reperit (t). Oleum tartari sanguinem, si una digesseris, in syrupum vertit (u), albumque in cruento coagulum excitat (x). Sanguis cum sale tamarisci, artemisiae, rosmarini, thymi, & meliloti in forte coagulum abiit (y). Hinc idem tartari oleum in venas impulsu, canem occidit (z), ut sanguis omnino coactus & viscidus arterias infarciret (a).

Deinde

(k) FREIND L.C. PITCARNE L.C. BROEN L.C. PRAGASSATUS L.C. ELLER L.C. A thincula antimonii ELLER p. 77. A cineribus ruticis potab RUTTY p. 406. a murali alcalecente nitro p. 407 a sale urinæ p. 111. equidem minus lixiviofo; ab aqua alcalinis tab. CC. a nitro tab. AA.

(l) BOYLE Phil. Transf. n. 145, 204. ELLER p. 14. Fixo sale etiam fluiditatem reddere sanguinem.

(m) PECHLIN de purganti. p. 100. du HAMEL p. 88. EICHEL n. 46. BOERHAAVE L.C.

(n) BOERHAAVE

(o) MAJOR Chirurg. infus. p. 123. Phil. Transf. n. 204. MANGET bibl. T. II. p. 169.

(p) Dihere sanguinem BOYLE apparat. p. 58. SCHWENKE p. 191. BAGELY. p. 45. floridum reddere FREIND p. 150. de HEYDE, BIRCH T. I. p. 509. tum de urinæ spiritu simili.

(q) Eo ad grunnum sanguinis adfuso ruborem nasci floridum BOYLE apparat. ad bift. sang. p. 42. 43. append. p. 116. 118. FLOYER of the preternatural state of humours p. 118.

(r) Ruborem augere sanguinis FLOYER. L.C. EICH-L.C.

(s) DRELIN COURT L.C. p. 551. HUXHAM, BOERHAAVE &c.

(t) Oeconom. anima. Edit. L. p. xxviii pref.

(u) PETIT Epist. II. p. 35.

(x) BOYLE apparat. ad bift. sang. p. 59.

(y) PITCARNE p. 40. 41.

(z) COLEBATEC append. concern. acids mid alcal. n. 215. post aliquot dies, con tinuo vero in experimeto CL. COURTEN Philos. Transf. n. 335. & SPROEGELLI L. p. 83. Eadem viderunt ETMULLER chir. infusor. de HEYDE epif. 90.

(a) SPROEGEL L.C.

Deinde colorem in sanguine non rubrum produxisse, sed subnigrum (*b*), obscurum (*c*), atrocinereum (*d*), nigrum denique (*e*) auctores existant.

Porro de volatilibus salibus, ex urino genere, (& nonnunquam a fixis), grumum nigriorem fieri, ceterum communi sententiae addictus factetur Cl. EICHEL (*f*), deque sale ammoniaco, equidem nondum omnino alcalino, auctor est Cl. SCHWENKE (*g*), a quo ad cruentum admisto gelatinam sature rubram nasci, etiam ELLERUS vidit (*h*). Deinde in nuperis experimentis suis spiritum salis ammoniaci sanguinem in eamdem massam tenacem, inque carbonem abituram cogi testis est Clarissimus vir Antonius de HAEN (*i*). In venam injectus idem, quem modo diximus, salis ammoniaci spiritus, animal enecat (*k*), nisi parva dosis adhibeatur (*l*), & solet ab ea administratione sanguis per venam cavanum undique coactus reperiri (*m*). Ita & cantharides injectae, pariter & lixiviosae, & volatiles, sanguinem nigro colore tinixerunt, & coagularunt (*n*): earumdem tinctura, et si non coegit, nigerrimum tamen reddidit (*o*).

Has contrarias opiniones, ut conciliarem, sanguini fano, & recenter de vena emisso, inque diversa vascula recepto, oleum tartari per deliquium natum adfudi, spiritumque cornu cervi. Iste quidem sanguinem nigriorem reddidit, coagula etiam nubeculosa & membranosa, non multis horis duratura, excitavit. Grumo coacto adfusus idem nihil mutavit.

Oleum vero tartari utique & sanguini, & grumo rubicundum, elegantem colorem conciliavit, non tamen supra 24 horas superfuturum. Coagula

(*b*) DREZINCOURT.

(*c*) BAGLIV. p. 463.

(*d*) PITCARNE p. 40.

(*e*) HELVETIUS *éclaircissements* p. 18.

(*f*) n. 35. 46.

(*g*) p. 189.

(*h*) p. 14.

(*i*) p. 112.

(*k*) PETIT l. c. DREZINCOURT l. c. p. 951. BAUTZMANN in *diss. de peste* Leid. 1673, de eodem DREZINCOURTEI experimento locutus; COURTES philos. transact. n. 335. ZOLLICOFER L. C. VAN ALSEM etiam ab unico scrupulo injecto.

(*l*) PETIT l. c. Eo referto non funestum eventum in experimento HARDERI *Apiae*, obi. 25.

(*m*) ZOLLICOFER L. C.

(*n*) VERRATTI *Comment. Bonon.* T. II. Part. II. p. 208.

(*o*) BAGLIVI l. c. p. 464. *Experim. de vesc.* II.

gula idem in recente sanguine striata, radiata, laminata, & pene membranosa excitavit, quæ ultra biduum superfuerunt, neque sponte natos grumos, impedivit, solvitve, neque grumum sponte sua factum.

S. XXVII. *Quid inflammabiles spiritus.*

Liquores, qui flammam admotam concipiunt, si sinceri fuerint valde que meraci, sanguinem euidem cogunt (*p*), in fibrofi cujusdam parenchymatis aut infantilis hepatis speciem (*q*), idque coagulum durabile persistit (*r*). Eiusmodi coagula a liquore vini stillatio facta vidi (*s*), & a terebinthine oleo (*t*), vivorum in hominum vulnera calide instillato. In gelatinam albam ab eorum liquorum vi sanguinem cogi non vidi (*u*). Diluti iidem sanguinem non cogunt (*x*). In venas injectuni vini alcohol enecat (*y*), late coacto in placetas sanguine (*z*): dilutum idem inebriat, & apoplexiā movet, neque occidit (*a*).

Sed etiam oleum juniperi sincerius aque aqua liberum sanguinem cogit (*b*), pariterque spirituose, quas vocant, essentiae (*c*), & tinctura (*d*), quæ liquorem vini continent. Sales volatiles oleosi pelliculam, crutice pleuritice similem excitant (*e*), aqua vero cinnamomi leve, & gelatum concrementi genus (*f*). Laudanum liquidum Sydenhami sanguinem potius liquidum retinet (*g*), globulos tamen quasi glutine adunit.

Spiritus

(*p*) BOYLE apparat. p. 29. append. p. 13. BOERHAAVE L. C. p. 379. FREIND p. 16c. PITCAIRNE p. 36. SCHWENKE p. 192. Second memoir au Exp. 27. 28. 34.

(*q*) Second memoir exp. 27. 28. FABRICIUS ab AQUAPENDENTE etiam odo rem & saporem hepatis in sanguine nasci, reliquit de formaz. ovi p. 55.

(*r*) SCHWENKE p. 192.

(*s*) De eo intelligenda fere loca n. 14.

(*t*) YOUNG cur. triumphal. terebinth. p. 42.

(*u*) EICHEL p. 32.

(*x*) Solvere potius MALLPICHIUS p. 132. de HEYDE L. C.

(*y*) Aut. de HEYDE off. 90. PETIT p. 23. COURTEN Phil. Transf. n. 335. FREIND p. 168. SPROEGEL exp. 50.

(*z*) SPROEGEL L. C. second. memoir exp. 31. 36. & exp. fere n. 23.

(*a*) COURTEN L. C. BAGLIV.

(*b*) SCHWENKE p. 195.

(*c*) ELLER p. 17.

(*d*) SCHWENKE p. 194.

(*e*) LEIGH differt. p. 79.

(*f*) BAGLIVI p. 464.

(*g*) ELLER L. C. Alter Cl. STANCARUS in Comment. Acad. Petrop.-T. I qui potius cogi scriperat.

Spiritus vini, dum sanguinem addensat, pondus specificum, quod vocant, auget (*h*).

Arsenicum, dubium corporis genus, sanguinem cogit rubrumque reddit (*i*). Cæterum infinita alia cum variis succis instituta experimenta, apud Cl. viros legere oportet, quos excitavi (*k*). Obiter autem ex iis, quæ repetiti, discas, quam parum ad medicamentorum virtutes dignoscendas utilitatís ab his experimentis possis arguere. Arsenicum enim, sumnum venenum, sanguinem fere ut beneficū illud nitrum mutat. Accutum inter omnia pharmaca tristissimum colorem sanguini inducit, non ideo minus innocuum. Acidi liquores & lixiviosi pariter cogunt.

S. XXVIII. Per hæc experimenta sanguinis natura nondum innotescit.

Ex his experimentis nondum ostenditur, sincerum aliquem salem in sanguine habitare. Acidam indolem neque aliquis cum lixivioso sale fervor demonstrat, neque odor, neque sapor, neque aliud signum liberi acoris. Sed neque lixiviosa indoles perfecta huic humoris inest. Cum nullo acido liquore fervet, solo oleo vitrioli excepto; sapore non est alcalino; neque colores excitat, quos id salium genus producere solet; neque præcipitat, quæ ab acido liquore diffoluta fuerunt. Id equidem per experimenta ostenditur, quæ nunc proponemus, esse in sanguine eam naturam, quæ adjuta ab aeris calore, aut a motu muscularum aucto, aut demum adjecto aliquo sale fixo in putredinem abeat. Is corporum status nondum quidem ad alcalici classem ea transfert. Neque enim certo experimento humores in corpore humano vivente lixiviosi sunt. Etiam in ardente febre lotium (*l*), ut acre sit, nondum tamen cum aceto effervescit, & unicum experimentum, neque forte satis fidum (*m*) extat sanguinis podagrī hominis, qui syrumpum violarum viridi colore tinxerit.

L 2

Hactenus

[*b*] SILBERLING p. 16.

[*i*] ELLER p. 15.

[*k*] R. BOYLE, *Car. DREELINCOURT, Archibaldus PITCARNE, Georgius BAGLIVI, Job. FREIND, Thomam SCHWENKE, Job. Theodorum ELLER.* Veniam fere vel ob ea peto, quæ hic iterato retuli, maxime quæ ab infusione venenorum sumta plurima ad L. III. iam relata sunt. Verum hic nihilominus idoneo loco leguntur.

[*l*] BOSKHAAVE *Prax. Med.* T. I. p. 190. B. LANGRISH *modern. practice* p. 58.

[*m*] COLBATCH *of the gout* p. 256. 431. deque fetu doctrine of acids assertet. p. 450.

Hactenus tamen ad alcalinam naturam sanguis accedit, ut omnino, levi exhalatione, quo ad sapam redigitur, qualem *extraclum* vocant (*n*), ad lixiviosam utique indolem disponatur; ut aqua, qua grumus sanguinis digestus eluitur, signo praestet lixiviose indolis (*o*); ut siccus sanguis cum acidis liquoribus effervescat (*p*), crustaeque, quae de siccatis sanguineis placentis supersunt, alcalini quid habeant (*q*); ut putrida urina cum spiritu nitri seruat (*r*). Putredo vero adeo prope ad naturam lixiviosam accedit, ut acidissimi quique fructus, aut mero acefcente frumento pascit animalium corpora, quando computruerunt, nullum nunc ab admoto igne aut essentialis acidive (*s*) salis, aut ammoniacalis, aut fixi (*t*) demum vestigium repräsentent, exque iis, pridem adeo acidis corporibus, saceri nunc sales alcalini soli adscendant. Adeo vero volatilē sallūm generationem putredo adjuvat, ut, qui post aquam sales adscendebant acidi, ii nunc alcalini, & volatiles ante aquam adscendant (*u*). Sed etiam in animalium carnibus putredo non impedit, quin solita urinosa elementa suppeditent (*x*), & olea potissimum ita adtenuantur, ut calore nunc levi cum sale volatili in summas phialas sustollantur (*y*). Hæc ideo paucō curiosius moneo, quia nuper Cl. PRINGLE (*z*) multis experimentis ivit evictum, non idem esse putridum corpus, & alcalinum.

§. XXIX. *Sanguis putreficit, a motu muscularum, a febre.*

Corpocis vehementior exercitatio sola, urinam fætidam, acrem, urentem reddit, sudorem ingratum nidorem olentum, sanguinem acrem, febrisque omnium ardentissimas, & subitas mortes. Ea mala ex unico die pedestris itineris succellisse visa sunt (*a*). Qui imperia ducis ad exercitum defec-

[*n*] VERHEYEN L. II. p. 38.

[*o*] De HARN L. c. p. 84.

[*p*] GREW L. c.

[*q*] HAHN L. c.

[*r*] PALUCCI *litthotomie perfectionnée* p. 58. SCHAPER *de maff. sangu. corp.* p. 31.

[*s*] BOERHAAVE *ELEM. Chym.* T. II. p. 289. scqq. Natura animalis acorem deluit MALOUIN *Chymie pratique* T. II. p. 441.

[*t*] BOERHAAVE L. c. p. 190. 328. MACQUER L. c. p. 425.

[*u*] NEUMAN *Chym.* T. III. p. 14. BOERHAAVE L. c. p. 316.

[*v*] NAVIER *sur l'amoll. des os* p. 7.

[*w*] IDEM ibid.

[*x*] OBB. *on the diseases of the army* p. 410. &c.

[*y*] BUCHNER *de motu voluntar.* excidente n. 322.

dēserebat (*b*), ex ardore in officio nimio, ipso die pugnæ pérīlit. Cursorem publicum, qui magni momenti nuntium adulterat, summa cum velocitate, intra biduum memini ex pessima febre periisse. Ex itinere sub diu nimio febris ardens, & hydrophobia vera successit (*c*), qua in observatione memoria dignum videtur, humores acres in humano corpore natos, eamdem venenatam efficaciam exserere, quam quidem virus canis rabidi. Similia a convolutionibus gravioribus fiunt, quæ & ipse ad motum musculorum vitiōse auctum pertinet (*d*).

In animalibus cursu nimio ad mortem usque exercitis, eadem, vel horum etiam majora fiunt. Cervus vehementissime a venatoribus agitatus cum fatido sanguine vulnus stillaret (*e*), pérīlit. Animalis ad cursum violentum coacti carnes cito putrescant (*f*), ut argentum tingant, & cochleari discerpi possint (*g*).

Quæ motus muscularum, eadem febris facit, quæcunque ejus origo fuerit: dum sanguinis motum vehementius augrat. Putrescant in febre humores (*h*), & in variolis (*i*), & in petechiali genere (*k*), flavaque illa insularum antillarum peste (*l*), sanguis fætidos per os & nares erumpit. In variolis confluentibus penetrabilem factorem fæpe expertus, nullis aceti in planas patinas expositi contrariis vaporibus satis emendare potui. Ipsum inde lac ebutyratum, & citri succus putreficit (*m*). Fætent ante mortem, qui febre paludosa putrida laborant (*n*). Factorem combustarum solearum similem, adeoque alcalinum, in malignis, sudoremque enormiter olientem SEGERUS observavit (*o*). Funestus cadaveris odor in hominibus

L 3

[*b*] Ven. & Doctiss. Vir. CAM. FALCONET des fevres p. 19.

[*c*] Ger. v. SWIETEN Commentar. T. III. p. 537. & in diario, quod edidit CL VANDERMONDE 1757. mens Jul.

[*d*] WILLIS de convuls. p. 173.

[*e*] BAYNARD Pyrolyphia or of cold baths p. 328.

[*f*] LISTER de humorib. p. 54. BOERHAAVE Præfess. Acad. T. III. p. 51. T. SCHWENKE p. 52. 54.

[*g*] WILLIS pharmac. rational. T. II. p. 91.

[*h*] HOPFMAN de gener. sal. morboſor. HUXHAM on fore throat, qui veros sales alcalinos produci credit. PRINGLE p. 429. Addit idem, quamprimum perspiratio cessat.

[*i*] HUXHAM of fevers p. 52. 53.

[*k*] IDEM ibid. p. 62.

[*l*] LININGS Essays and observations of a Soc. at Edim. T. II. art. 19.

[*m*] SCHWENKE p. 55.

[*n*] PRINGLE p. 211.

[*o*] Plenit. morbo militari critice solut. Fætidus in peste sudor FALLOP. de bubon. phil. p. 9. & in febre carcerum PRINGLE on jail fever p. 29.

minibus peste laborantibus (*p*) percipitur, quilem ab ægro ipso perceptum memini in bibliopola propriæ mortis certa præfigia dedisse: is autem in peste odor inficit, lateque malum propagat (*q*). Mira virulentia humorum in hominibus est, qui peste pereunt, & sanguis ipse fætet (*r*), & vapor destillati de pestilente bubone puris quasi fulminis iætu male curiosum medicum prostravit (*s*). Adeps animalium, de bubula clæse, lue interemtorum, olentissimus est (*t*). Corpora hominum peste extinxitorum (*u*), aut paludosa febre (*x*), continuo putrescant.

Sed & aliae cause, haec tenus febribus adfines, similes in sanguine & humoribus corruptiones producunt. Ipse vietus mere carneus (*y*), febrem facit, ut sanguis putrefaciat. Idem in fame fit (*z*), cuius effectus subitasque humorum putredines, alias exponemus. Abusus faliū volatilium, quos juvenis majori copia adfuerat esitare, hæmorrhagias de intestinis, naribus, gingivis, pruritum intolerabilem, febrem hecticam (*a*) mortemque intulit, novo arguento, quam cognata febri alcalina natura sit. Putredo aliunde nata similem & funestam in sanguine putredinem generavit (*a**).

Calor nimius aeris, non quidem adeo subitam (*b*) putredinem interfert, ut animal vivum tabescat, sive tamen efficit, ut celerime [*c*] carnes corrumpantur. Idem venti illi ardentes orientis efficiunt [*d*], neque multo blandius aer operatur, quem nimia, inque loco clauso stipatae, turbæ suis halitibus corruerunt. Perniciosissimæ inde & putridissimæ

[*p*] MURALT Chirurg. Schriften p. 578.

[*q*] IDEM ibid. p. 584.

[*r*] ZARENUS de miff. sanguini.

[*r*] ALPRUNNER in Zodiæ. Med. Gall. T. II. p. 104. & apud VATERUM de pestil. p. 30.

[*t*] DE HAEN verband. van de rouwveeziekte p. 8.

[*u*] Art de faire les raports p. 336.

[*x*] PRINGLE p. 221.

[*y*] HUXHAM of the malignant sore throat p. 62.

[*z*] IDEM ibid. p. 62. 63.

[*a*] IDEM ibid. p. 68.

[*a**] Vapor nempe de aqua sentinz putridus RUTTY p. 148.

[*b*] Nam sanguis nou fætidas fuit in calore 109. & 110. graduum Fahrenh. DUNKE exp. 4. 6.

[*c*] IDEM exp. 1. 2. ut etiam aer altero die per cellulosa intervalla effunderetur.

[*d*] Continuo putrescant, quos ventus Samuel percussit, ut membra tracta manum sequantur CHARDIN soy. en Perse T. IV. p. 22. TRAVANOT seqg. T. III. L. L. c. 10. T. II. L. I. c. 12.

tridissimæ febres nascuntur [e]. Mercurii vis per vasa corporis humani sanguinem resolutum ita agitat, ut fetidissima inde animæ corruptio nascatur [f], & urinæ, & sudoris, & sanguis ipse fæteat [g], unaque febris oriatur non exigua [h], &, ex peritorum certe virorum fide, hac quidem ex causa vera alcalina degeneratio in humoribus locum habeat, salivaque syrumpum violatum colore tingat viridi [i], & cum acidis ferreat. Sed etiam animalium venenatorum morbus subitam putredinem, & humorum eliquationem, excitant [k], & carnes, perinde ut ab igneo illo vento, ab eo veneno flaccescunt.

Sed etiam ali, chronici magis ingenii morbi, ingentem humorum acrimoniam conjunctam habent. Scorbutus lentius equidem, sed magis quam ipsæ febres, sanguinem fundit, ut de gingivis, de intestinis [l], de cute, cum intolerabili fætore diffundat. Adeo enim acris lympha scorbutica est, ut in ventrem effusa chirurgorum digitos excoriet [m], & linteum corrodat [n], & tanta in ejusmodi malis in sanguinem etiam viventium ægrotorum tabis vis transfiit, ut hirudines eum cruentem respuant [o], & maculae a sanguine in linteo natæ nimis profunde sedeant, neque possint elui [p]. Ab eodem morbo major urinosis salis portio de sanguine destillat [p*]. Halitu phthisicorum mulcæ interemæ fuerunt, ut etiam cognomen memoria regis Abdelmelik, ex Muhamidarum gente, ab ea animæ virulentia hæserit. Rachiticæ puellæ fætidissima anima aviculam occidunt [q].

Similis utique etiam in reliquis humoribus corruptio nascitur. Urina retenta, calidique corporis tempore fota, adeo acris redditur, ut catheteris argentum fusco colore vitiet, & fætore suo in chirurgo leviorum peripneumoniam

[e] PRINGLE of the joyful sever. Ab aere nofocomiorum BELLOSTE Chir. de l'hop. p. 67. Ab aere ventilatori qui carcere repurgabat PRINGLE Pbil. Trans. n. 48.

[f] GRAINGER de ptyalismo p. 21. 22. &c.

[g] IDEM.

[h] Pulsum 120.130. IDEM.

[i] BARON in notis ad LEMERRE cours de chimie p. 290.

[k] A serpente caudifono FEUILLE Journal, a sepe HASSELQUIST p. 596.

[l] LIND of Scutney p. 167. BOERNHAVE Introd. in praxim clinicam p. 5.

[m] Memoir de l'Acad. des Scienc. 1659. p. 376.

[n] CRAANEN, MENO MATTHIAS obit. xl. J. B. FANTON obit. 36.

[o] LISTER de scorbuto Mem. de l'Acad. I.C. p. 173. PANAROLUS Pentecost. IV. obit. 7. la METTRIE obit. de medec. prat. p. 50. HUXHAM c. 5. &c.

[p] SMALTS apud CRAANEN de homine p. 311.

[p*] COLBATCH Essay concerning acid. and alcal.

[q] J. Petr. BUCHNER in diss. de rachitide, quam in collectione mea practica reculam dedi.

moniam excitaverit (*r*), cumque acidis liquoribus efferuerit [*s*]. Etiam in urina scorbuticorum verum sincerumque alcali fuisse legitur [*t*], et si negabat se vidisse, quinto funesta iſchuriz die BOERHAAVIUS [*u*]. Ita in aqua hydropicorum, facta paracentesi educta, vestigia lixiviosæ indolis apparuerunt [*x*], ut ab ejus percepto fatore morbus convulsivus maligni ingenii sequeretur [*y*], inque hydatidum simili fero, quod oculis receptum dolorem excitavit [*z*]. Adeo magna etiam innocui alias de naribus muci acrimonia fuit, ut labia continuo excoriatet [*a*], tum lacrumæ, in epiphora [*a**]. Acrimonia aquæ forti haec tenus comparabilis in glandulis siphilitici cadaveris gustu percepta est [*a***]. Lac in febre alcalescit [*a****].

His omnibus, quos excitavi, humoribus, violentius venenum est ichoris, qui de cancerosa mamma sudat. Ab ejus gustatione temeraria terrimus fætor chirurgo indivisus comes adhæsit, ad mortem usque, quæ ex hoc ipso contagio fecuta est [*b*]. Odor solus cancri mammam uxoris erodentis perinde ad mortem usque constans, Franciscum BELLINGER, non incelebrem scriptorem, interemit (*c*). Sed ea sanies de alcalino ingenio est, viridique colore syrum violatum tingit [*d*], ut non probabile sit, cum cancrorum, quos vocant, oculis efferuisse [*e*].

§. XXX. Putredinis progressus.

Nemo putredinem accuratius descripsit, celebri illo olim, & una paradoxologo viro, Joachimo BECCHER [*f*], qui die quinto factorem

[*r*] *Gerr. v. SWIETEN Comment. T. I. p. 132.*

[*s*] SCHAPER *de mafsa ſing. corporis calidit. p. 31.*

[*t*] BOREICH. *bermes. agypt. sapient. p. 351.*

[*u*] *ELEM. Chm. T. II. p. 306.*

[*x*] PINELLI *de podagra p. 187. PITCAIRNE de opera quam praeflant acida &c alcalina p. 157.*

[*y*] *Philof. Transact. n. 454.*

[*z*] HEUERMANN *physiolog. T. I. p. 202. conf. BIRCHI. c. T. IV. p. 377.*

[*a*] MEIBOM. *de sucerib. n. 33.*

[*a**] COL. DE VILLARS *cours de Chirurg. T. II. p. 233.*

[*a***] MASSON *de carie ossium.*

[*a****] RAULIN *obſ. de Aleſte. p. 182.*

[*b*] HARRIS *dift. med. Chir. p. 168.*

[*c*] Ibid. p. 169. A cadaveris fætore similem funestum acutum morbum, cum perpetua fætidissimi odoris praesentia natum habet KISKATATEK *de analys. inoculat. variol. p. 12.*

[*d*] *Memoir. de Chirurg. T. I.*

[*e*] SCHAAERSCHMID *relation T. II. p. 320.*

[*f*] *Physic. ſubterrane. p. 148.*

rem vehementer increscere, die duodecimo stercorum fieri, die trigesimo situm sive mucorem efflorescere, inde cutem & carnes in foramina collabi, vermesque irrepere animosus obseruator refert. Ad usus nostros interim aliqua adspersorius. Putredo omnia vincula partium animalium rumpit, humores alioquin coagulabiles, cruentem, lympham, ovi albumen, amnii liquoramen, in acre & nullo porro veneno coagulabile tabum resolvit, adipem colliquat, carnes (*g*) membranasque & fibras emollit primo, inde in mucum diluit. Omnes humores animales a putredine in detestabile venenum abeunt, ut in ovo *BELLINUS* (*h*), expertus est, & de boum morbo extinctorum tabo refert *Griffith HUGHES* (*i*).

Princeps vero phænomenon putredinis, neque hactenus adultæ (*k*) est, expedire aerem. In humanis & animalium carnibus, sætubusque integris sæpe vidi (*l*), sub aqua mansisse, donec integræ erant, cum subnato factore vero undique de tota cute aerem effloruisse, quibus quasi vesicis sublevatae carnes ad summam aquæ superficiem ascenderent. Sæpe mihi æstivo tempore in corde aer cum spuma intritus visus est (*m*). In vivo homine, sed putrefactibus humoribus infecto, in prælimno scorbuto (*n*), in gangræna, similis omnino aer generatur, qui late sub cute regnat, & emphysema refert. Exi aerem & sanguis generat, & serum (*o*), & adeps (*p*), & ipsæ demum solidissimæ corporis animalis (*q*) partes. Sanguinem Cl. *FAVELET* (*r*) minus obseruavit, qui de incisa vena in vitrum exceptus, octava jam hora turgere incepit, diffluere, vaporem acrem spargere, & urinosum, idemque vitrum denique displosus fregit (*s*).

Ex

[*e*] NAVIER *sur Panoiff.* des or p. 34. seqq.[*f*] PRINGLE p. 421.[*i*] *Natural history of barbados* p. 63.[*k*] PRINGLE p. 426.[*l*] *Mémoir. sur la respirat.* Exp. 132.[*m*] PRINGLE p. 427.[*n*] FRANCKE anmerk. T. III. p. 417. Copiosissimum, ex uno sanguinis pollice ad pollices 33. *Hales vegetable statiks* c. vi. exp. 49.[*o*] *Apparat. ad bījī. sang.* p. 70.[*p*] *Patet et multum* IDEM ibid.[*q*] *Hales* ibid. conf. cum *hemastat.* p. 178.[*r*] *De ferment. ventric.* p. III.[*s*] BOYLE p. 88. KRUGER *physiolog.* n. 53. Die septimo sanguis putreficit RUTTERLY *lymph.* p. 304.

Ex osse putrescente fætidissimam spumam cum sonitu erupisse, aliis testis extat (*t*).

Plerumque tamen, aeris atmosphæri liber commeatus ad putredinem requiritur, & in clauso vulnere sanguis in polypum abit, neque in universum putrescit, si motum abstuleris (*u*). In ipso etiam utero fetus extinctus integer, & valde utique putrescibilis placenta, absque putredine per menses annosque circumgeruntur (*x*), dum clausus uterus aerem non admiserit. Multum vero putredo adjuvatur, si sanguini, aut bili, aut cuiuscunque humoris, putredini destinato, salem lixiviosum fixum, aut certe terram acido oppositam addideris. Cancrorum oculi sanguinis (*y*) & sal fixus (*z*) carnis putredinem promovent. Idem bili admitti & fætidorem putredinem faciunt, & velociorem (*a*), eundemque effectum ipsa terra præstat (*b*). Sal tartari, aut clavellatus cinis, sanguini nuper de vena missio admistus, odorem urinosum cogit adscendere (*c*), & cum sudore idem præstat (*d*). Hoc quidem arguento ostenditur, magnam sali sanguinis cum ammoniaco sale adfinitatem intercedere, nam & iste sal adjecto sale fixo urinosum odorem exhalat. Sed in vivente etiam homine lixivi sales, qui Stephaniano medicamento efficaciam præstant, longo usu sanguinem alcalinum, acrem, scorbuticum, heclicumque (*e*) reddiderunt, ut etiam vesicas de cute elevaverit (*f*). Hinc a saponis usu & lotione linteriorum proxima pestis erumpit (*g*), & in vivo linteriorum Constantinopoli primum amat fevire (*h*). Volatiles alcalini sales putredinem potius morantur (*i*) & impediunt: Sic sales vegetabiles.

[*t*] *Micb. Bernh. VALENTIN* diff. *Epiſt. II.* p. 151.

[*u*] *Conf. DRELINCOURT* apud *MANGEV* *Institutiones anatom.* T. II. p. 256. *Albam CYPRIAN* epif. ad *MILLINGTON* p. 55. 56.

[*x*] *QUEENAI* acon. anim. T. II. p. 122.

[*y*] *PRINGLE* append. p. 194. 414.

[*z*] *PINELL* L. c. p. 160. Mireris ergo legi, putredinem a sale tartari adjecto inhibet *KUTTY* L. C.

[*a*] *GILBERT* de putredine in corp. anim. p. 18.

[*b*] IDEM & CL. PRINGLE.

[*c*] *HUMMER* de arthritide.

[*d*] *Commerc. Lit. Norv.* 1739. hebdo 4. *MODEL* tom. physichen salae..

[*e*] *HUXHAM* of fevers p. 48. 49.

[*f*] *PARSONS* of the bladder p. 125.

[*g*] *DIEMERBERG*: & familia habet de *HEYDAN* *Synops.* dif. p. 149.

[*h*] *Gemmelli CARRERI* topon. T. I. p. 321.

[*i*] *PRINGLE*, *RUTTY* L. C., *GILBERT* p. 13. 24. Siccam idem sal albamque carmen reddit.

getabiles (*i**) & magis adhuc acidi (*k*), de fossilibus parati liquores, & princeps inflammabilium alcohol putredinem avertunt. Sed etiam me-dii sales (*l*), culinaris ille, & nitrum, copiosius adjecti incipientem omnino putredinem frangunt, nondum natam occupant, aqua mineralis Newhol-tensis penitus impedivit (*l**). Plena putredo, abacto per fætidum halitum volatili elemento fatuam relinquit & tenerimam terram (*l***).

S. XXXI. *Animalia quibus humores lixiviosæ indoli propiores sunt.*

Alia animalia humores universos acres, & eorum nonnulla pene manif esto lixiviosos habent, infecta maxime, deinde serpentum genus, de-nique carnivora ferociores bestiae. Lac salamandras intolerabiliter acre est (*m*). Lacerta Gecko, si nudam hominis cutem perambulaverit, via suæ veltigia, ruborem, calorem, pustulasque relinquit (*n*).

Bufonis flammei de posterioribus cruribus emissus viscor catarthum in iis excitavit, qui vivum animal dissecuerunt, inque oculis dolorem (*o*). Liquor de apis vesicula linguam acrimonia sua vehementer percussit (*p*), inque vulnusculum dimisus, eundem, quem ita, dolorem producit (*q*). Tigridis urina odore est cantharidum (*r*). Omnibus fere erucis vis adu-rens ineft, quæ vesicas excitet (*r**).

Sed in aliis exemplis natura lixiviosa manifestior est. Millepedum ge-nus urinoso salis ammoniaci odore *LISTERUS* designavit (*s*). Jus can-

M 2 crorum

[*k*] Succus limonum putredinem sanguinis ad diem 43. distulit RUTTY l. c. Lac adiectum etiam putridum sanguinem acore suo subigit PRINGE p. 406. Etiam urinam aliquamdiu, & diutius quam alcalini sales a putredine servant HAEW p. 79.

[*l*] GILBERT p. 14. Ad diem 8. nitrum ad duodecimum fal marinus RUTTY.

[*l**] RUTTY l. c.

[*l***] Salis lixiviosi copiam minorem putredo praefat, quam ignis NEUMANN Tomi. III. p. 10.

[*m*] ARNAULD de NORLEVILLE *bijstorie natur. des animaux* T. II. P. 2. p. 204.

[*n*] HASSELQUIST *resa til palestina* p. 308.

[*o*] J. Aug. ROESSEL de ROSENHOFF in eximia *bijstorie ranasian indigenarum* p. 100.

[*p*] SCCRADERE de armatur, anim. brutor.

[*q*] REAUMUR *memoir pour servir à l'bijstorie des insectes* T. VII. p. 352. PAULINUS traité des ruches de bois.

[*r*] Hist. de l'Acad. Roy. des scienc. 1747. p. 78.

[*r**] FIOO bijst. natur. Ind. L. V. p. 281.

[*s*] De humorib. p. 92. edit. belg. Cum nitro tamen cum potius salens comparat J. F. HENKEL de cataracta p. 22.

erorum non cogitur, & violaceum st̄pe syrupum viridi colore viciat (*t*). Bombycum celerrima & fætidissima est putredo (*u*), & sericum plurimum inter omnes animantium partes, aut humiores, salem volatilem gignit (*x*). Sed etiam viperæ copia salis volatilis excellunt, & in ranis denique secundum vertebras albus pollen sedet (*y*), qua nervi prodeunt, qui cum acidis salibus effervescit. Cantharidum etiam in pulverem redactarum totam naturam cum aceto fervere legeram, sed expertus falsum reperi; cum spiritu nitri utique fervent [*z*]. De vípera equidem locus extat *Richardi M B A D* [*a*], celeberrimi medici, quo dicitur, succum heliotropii ab eo veneno admisto rubro colore tinctum esse. Verum aliquis in eo experimento ab impuro vase aliove casu error obrepississe videtur, cum & chemica analysis repugnet, & vípera de carnivororum animalium genere sit. Cantharides succo plantarum vivunt, earumque acrimoniam pariter ad acidam classem vir insignis [*b*] reduxit, vesparumque [*c*]. Sed experimentum effervescentis acidi liquoris nimis simplex est, eorumque animalium liquor acerrimus, & empyreumaticus, non ideo tamen acidus est, et si sale volatili hoc quidem animal minus abundat [*d*].

S. XXXII. *An nullus in animalibus acor superfisit.*

His ab experimentis, exque iis, quæ ignis de humoribus animalium elicit elementis, factum est, ut omnino solos in animalibus urinosos sales dominari, neque acidi quidquam reperiri, contra priorum medicorum opinionem passim scriptum sit [*e*]. Addiderunt aliqui, ne eos quidem homines acidum in sanguine elementum habere, qui solis acidis, pane, limonum succo & olivarum oleo in Liguriæ montanis vicitant [*f*].

Non

[*t*] *Comment. Acad. Bonon.* T. II. P. I. p. 56. seqq.

[*u*] *BOERHAAVE prax. med.* T. I. p. 175.

[*x*] *NEUMANN Chem.* T. III. p. 768.

[*y*] *Apud JACOBUM de ravis* p. 47.

[*z*] *GREW* l.c. p. 249.

[*a*] *De venen.* p. 8. y. addit. *PLANQUE* *biblioth. de medic.* T. III. p. 204.

[*b*] *CARTHEUSER* *mater. med.* p. 423. *Addit. HOMBERGIUM* l.c. p. 272.

[*c*] *NEUMANN* l.c. p. 55. Sed obitci omnino.

[*d*] *HILL* *mater. med.* p. 823.

[*e*] *Friderico SLARE* ejusd. *BIRCH* loco saepius cit. T. IV. p. 429. *HOFMANN* de *sali*, *morboſor.* general. p. 15. *JONES* de *febribus interniſtient.* p. 42. *COLEBATCH* *dolirii of acids* further affert p. 448. *PINELLI* de *podagra* p. 77. seqq. *H. BOERHAAVE* & *ELEM.* *Chem.* T. II. p. 310.

[*f*] *PINELLI* l.c. p. 73.

Non tamen finit experimentorum fides hæc pro veris recipi, aut acorem penitus de natura animali eliminari. Infecta quidem bene multa plurimum de natura acida conservant, quæ de vegetabili utique cibo aluntur. Sapor acidus penetrans, vis chartam ceruleam & cichorium tingens, & acor denique coagulaturus, reperitur in liquore, quem de vesica propæ oesophagum posita eruca saligna cauda bisurca projicit (g). Formicatum saliva, aut succus certe, quem cum morbu effundunt, ex veteri experimendo (h) cichorei ceruleos flores rubro colore vitiat. Eadem destillata copiosissimum acidum liquorē suppeditant, ad undecim omnino ex sesquilibra uncias (i). Sed eum quidem acorem ad male superatam natūram acidam vegetabilem refero; nam formicarum quidem nymphæ, quæ nondum plantarum succos gustarunt, acidum non præstant (k), formicæ exclusæ utique & copiosum, & manifestum (l) solæ inter animalia (l*) chemico sub igne fundunt. Acetosus est, neque ad mineralē acorem pertinet (m). Eo etiam retulerim, si firma sunt, quæ de apum, & vesparrum, & cantharidum acida indole passim legimus (n). Sed in cantharidibus accuratiōr Chemia lixiviosa omnia, præter terram mortuam, & fervore cum acidis confirmat (n*).

In humoribus etiam nonnullis, juniorum potissimum animalium, manifestus acor reperitur, in adipē etiam evidenter. Jus & gelu de carne vituli, sibi relicta acent (o). A butyro rancido æs eroditur (p) & virescit, ut ab acidis liquoribus folet. Lac cum putrido animalium sanguine mistum, tamen acidum liquorē generat, neque acor a putredine vincitur (q). In pure acida indoles refidet (r),

M 3

fed

[e] In egregii collegi nostri Caroli BONNET memoir. des Savans Etrangers T. II.

[b] TRAGUS auctor experimenti est: deinde RAI phisof. transact. n. 68. HOMBERG T. III. p. 45. HAHN de salibus med. 1712. p. 272. NEUMANN oper. chemicor. Ed. nov. Swenska metenk. acad. bandligrar 1741. p. 39.

[i] NEUMANN I. c. p. 45. 55. 57. 58. Habe eum spiritum HIEBRON Tintamen II. p. 44. & GLEDITSCH Mem. ds l'Acad. de Berlin 1749. & RAIUS I. c.

[k] NEUMANN ibid. p. 55.

[l] IDEM ibid. p. 54.

[l*] IDEM ibid.

[m] GLEDITSCH L. c. RAY I. c. Saccharum Saturni præstat, & rubro colore flores borraginis tingit. Cum alcali fixo in crystallos abit GLEDITSCH L. c.

[n] p. prior. not. 2. CARTHEUSZER mat. med. p. 433.

[n*] Plini. Transf. n. 252.

[o] Memoir. de l'Acad. de Chirurg. T. I. P. II. p. 70. ed. 12. SENAC Essys de phys. fine p. 152. edit 1735. traité des caux T. II. p. 98. LORRY des aliments T. I. p. 353.

(p) QUESNAY mem. anim. T. II. p. 134.

(q) PRINGLE app. md. p. 401.

(r) QUESNAY edit. I. p. 169. 195. 247.

sed id fere ex adipe fit. Caro cruda, cum pane & aqua, in pultem tu-
sa, leni calore digesta, post biduum fermenti modo æstuat, acidumque
saporem manifestum edit, etiam post initia putredinis (s). Putrida tri-
duana saliva (t) cum pane, & pisce (u) fermentat, & acor superat
putredinem. Ovilla bilis fermentationem potius auget (x). Puerorum
exhalatio sæpe acet, & crustæ lactæ acidæ sunt indolis (y). Acidum,
ingrati odoris sudorem criticum in febre auomala percepit Cl. Medicus
Scotus (z). Acidum oluit ejus feminæ sudor, quam ossa emollita ce-
lebrem reddiderunt (a), & vapor abdominalis (b) in alio exemplo,
cum ossa emollita essent. Cor humanum diutius conservatum acidum spi-
rat, & illostris ejus eventus testis exstat (c). Cerebro panem fermentari
alius auctor est (d). Etiam putrida caro bubula spiritum subacidum de-
dit (e), ut alias analyses omittamus, in quibus chemia acidum liquo-
rem ex sanguine obtinuit. Non ideo penitus inter elementa sanguinis per-
petua acidum reciperem, ut quidem clari viri receperunt (f), id tamen
haec tenus credo oftensum esse, in animalium humoribus latere acorem,
qui perinde ut putredo, in cadavere manifestius se exserit, et si utique
neque perinde constans est, ut alcalina degeneratio, & demum, ipsa diu-
turniori evolutione sua, in putredinem totus evanescit (f*). Sed neque
negaverim aliquando acidam intemperiem in corpore humano nasci pos-
se (f**).

§. XXXIII.

(s) PRINGLE *ibid.* p. 356. 397. 398. conf. quæ de lacte diximus.

(t) PRINGLE *append.* p. 401.

(u) IDEM *ibid.* p. 402.

(x) IDEM p. 413.

(y) PECHLIN *obser.* p. 352.

(z) GRAINGER *de febre butacea* p. 33. In purpura ROSEN *Symptom. phys. chron.*
scurb. p. 16. Habet etiam ILL LUDWIGIUS *patholog.* p. 64. 122.

(a) NAVIER *sur l'amollissement des os* p. 62.

(b) ZELLER *de fibriller. glandul. prot. nat.*

(c) SENAC *traité du cœur* T. II. p. 111.

(d) *Traité des ferment admirables.*

(e) NAVIER I. c. p. 34. seqq.

(f) Raymundus VIEUSSENS *tr. des liqueurs* P. III. c. 2. & in *Journal de Trévoux*
1709. M. Novemb. Franciscus QUEENAT, qui in eo acido naturam melancholie ponit
acon. anim. T. III. p. 53.

(f*) *Mem. de l'Acad. de Chir.* T. I. p. 128.

(f**) KRUEGER *patholog.* p. 210. LUDWIG I. c.

§. XXXIII. Odores animales.

Unico verbo licet monuisse, odorem omnium partium, quæ ex animalibus prodeunt, nobis plerumque ingratis videri, quoad multa aeris partem eorum elementorum diffusaverit, quæ odorem excitant. Ipse moschus (*f****), & zibethum, & marsupialis (*g*) animalis odoratus fucus, dum recens est, integrisque viribus, fraret, neque ferri potest: vultus idem fracta olfactilium particularum violentia, grata nos adscit. Eodem modo & putrefacta bilis (*g**), & stercus etiam humanum, & animale oleum (*h*), dissipata vehementia, odorem acceptum adquirunt. Inter quadrupeda calidi sanguinis (*h**), avesque & pisces non memini aliquam speciem certa fide reperiri (*h***), quæ suo non plerumque peculiariter odore displiceat. Infecta paucula extant, quorum odor placet (*i*). Sed hæc in olfactus historia ornatus persequemur.

§. XXXIV. Analysis, que igne fit.

Sequitur, ut eas mutationes exponamus, quæ fiunt, quando ignis violentia ad sanguinem humanum accessit, quam chemicam vocant analysis, & ut ea elementa describamus, in quæ sanguis in ea ignis tortura discedit. Non ideo tantum tribuimus huic nimis rapida, nimis violenti ignis operationi, ut ab ea vera (*k*) elementa sani sanguinis sincera remus

(*f****) CHARDIN *Bin* T. IV. p. 46.

(*g*) TYSON *Anatomie of the Olfaction* p. 16.

(*g**) ALSTON *of quakins* p. 35.

(*b*) In disp. me piaſtice Gottinge a. 1747. proposita. Ex miscela gummi sagapeni, galbani, opopanaxis aliiſque duguetis, odor moschi natus est. *Mém. de l'Acad.* 1706. p. 6.

(*b***) Inter frigida Cayman & Crocodilus vehementem moschi odorem spirat. CHARLEVOIX *St. Domingue* T. I. p. 27. ROCHEFORT *ibid. des Antill.* p. 242. ut aquas late imprægnat ROCHEFORT.

(*b****) Eli de pardali AELIANUS habet L. V. c. 4α.

(*i*) Aromatici odoris in hyoscyamo infuscum BIRCH T. II. p. 483. Meloe suavissimæ odore est KOELREUTER *infed. coleopter.* p. 42. Scarabæus DEM p. 9.. CASTELL p. 5. LISTRE *infed. ibid.* T. II. p. 110. n. 30. CARDAN varict. p. 169.. & formicæ aliquæ LISTRE *ibid.*

(*k*) Vera elementa serum per analysis chemicam se ostendere Cl. viri persuasi fuerunt. DODARTUS olim in *Projet pour servir à l'histoire des plantes* p. 169. deinde RAYMUNDUS VIENUSSENS *epist. de sanguine* II. p. 153. & I. p. 4. præf. *traité des liqueurs* p. 30.

remus renasci: aut eos sales, ea olea, eos spiritus, in hominis viventis sanique errore esse persuadeamur (*l*), quales ignis ex sanguine obtinet. Tunc enim demum ea elementa adparent, quando calor ad 276 FAHRENHEITII gradus ascendet, quo certe in æstu nullum animal vitale superest (*m*). Nimis teneræ sunt animalis regni & vegetabilis particulae, neque possunt absque ingenti commutatione tantam igois vim pati (*n*). Blandissimum oleum ab ea vi acerrimum fit; ovum, quo nihil mitius est, penetrabilem vehementiam adquirit; acidissimæ herbæ (*o*) alcalinos liquores fundunt, & quæ alia ejusmodi minus nunc est necesse monere, quam olim necesse fuit. Deinde certum est, sales adeo acres, olea adeo tenacia, spiritus adeo fervidos, terram tam gravem immeabilemque his artibus obtineri, quales quidem aut liquores, aut terras, cum vita integritate consistere posse, ne suspicio quidem locum habere debeat. Multo minus speramus, eam esse in sanguinis libra mutuam horum elementorum inter se ipsa rationem, quæ inter liquores est, qui ignis vehementia ex ea sanguinis libra elicuntur, ut tantumdem in vivi hominis sanguinis libra aquæ, spiritus, olei, salis sit, quantum quidem ex ea libra aquæ, spiritus, olei, salisve destillat. Nimia hæc spes est (*p*), & a facillimis experimentis refutatur. Conmisi enim inter se liquores, quos ignis ex sanguine separavit, non blandum illum temperatumque curorem, sed rancidum & acre & diversissimum magma reddunt, in quo ne unicus quidem sanguinis globulus restituitur. Deinde etiam in ea spe non oportet nimis esse laetos, ex analysi sanguinis temperamenta hominum diversamque indolem nos detecturos. Inter ducentos rusticos, quorum sanguinem HELMON-

TIUS

(*l*) Dudum momuit, ne ab ejusmodi analysi vera principia rerum speraremus, prius Robetus BOYLE in *Chymista sceptico*, deinde Leonardus a CAPOA *dell invento
za degli medicamenti* p. 53, inde Fridericus SLAER of sugar p. 30. HENKEL *pyritolog.* p. 389. Hermannus BOERHAAVE *Lieu. Chem.* T. II. p. 228. Caspar NEUNANN *Chem.
ergr.* T. I. P. 2. p. 64 *Theod. Baron ad LEMERY consr de Chymie* p. 3. De plantarum viribus MARIOTTE *de la veget. des plant.* p. 159. Scotina de irruentiis analysi utiliter docuerunt, non vera eius humoris elementa obtineri Rob. BOYLE appar. ad hys. sang. p. 48. J. Maria LANCISIUS *diff. med.* iv. Georgius CHEYNE *diseaser of body and
mind* p. 212. Herm. BOERHAAVE *ELEM. Chem.* T. II. p. 349. 357. *Præl. ad* ii. 223. L R. M. Thomas SCHWENKE *L. C.* p. 152.

(*m*) BOERHAAVE *L. C.* p. 357.

(*n*) HENKEL *I. C.*

(*o*) *Mem. des savans étrangers* T. II. p. 310.

(*p*) A VIENNESENIO concepta, *Journal des savans* 1698. n. 5. *Epitre II.* p. 147. *traité des Egneurs* p. 34. &c. Contra eam LANCISIUS dixit in diff. iv. tum Medici Romani in ep. ad *Ragminium VIENNESEN.*

tius (*q*) igne exploravit, analysis nullum memorabile discrimen inventit: Et notissimum, est, etiam inter plantas venenatas belladonnam, atque brassicam, eadem fere elementa in analysi representasse.

Non ideo analyses sanguinis utilitate sua destituuntur, dum sapienter noverimus spes nostras recidere, neque plura docere, quam a natura discimus. Oftendit ignis, non quidem sales, non pura in sanguine olea, sed pingues tamen in sanguine particulas esse aliasque ita fabrefactas, ut addita certa ignis vi in urinosos sales transeant. Sed etiam ferri terraū ignis deoperit: certiorem istam, cum de fossiliū reruni genere sit, quarum multæ absque magna degeneratione ignis violentiam ferunt.

Deinde ad morborum curationem aliquid tamen praesidii in analysi est. Ea nos docet febrem aliquam partem ejus effectus producere, quem ignis efficacia generat, salium certe urinosorum evidētia vestigia [*r*], olea ambusta & factida [*s*], aquæ diminutam portionem. Inde per comparatas prudenter sanguinis de fano hominie, & crux de febriente ægro sumti analyses constat, febrem ita sanguinem mutare, ut eadem vis ignis, plus saluum, plus oleorum de data sanguinis copia educat, quam solebat de fani hominis sanguine educere. Nunc, si & humores febrentium absque igne considerati, & eorum per ignem resolutorum elementa consentiunt, humanos humores in febre ad alcalinam indolem degenerare, minime improbabilis conjectura nascitur, hanc degenerationem ea remedia sibi poscere, quæ alioquin salium alcalium evolutionem tardant, aquam, quietem, sales acidos. Ita adgnoscitur quidem ex minori globulorum ad reliquam sanguinis partem ratione, ex tenuitate adeo & decolore pallore, ferri portionem ad reliquum sanguinem, in debilibus ægris & in chloroticiis minui. Nihil hic simplicius videtur, quam ferro isto propinato sanguinis temperiem restituere. Neque Clinicorum experientia dissentit.

§. XXXV. *Aqua sanguinis.*

Si in analysi aliqua est utilitas, attendendum ergo est ad phænomena, quæ viri in arte periti nasci viderunt, quando ignis vim ad sanguinis natum

(*q*) Citatūs a D. LÜXEM tr. des aliment T. II. p. 50. neque enim nunc ad manus est.

(*r*) Acres sales vocat & sulfur Cl. HUXHAM fore throat. p. 58.

(*s*) Conf. n. 29. deinde seqq. n. 18.

turam explorandam adhibuerunt. Cavendum vero est, ne putridi sanguinis analysin proponamus, cuius multum diversa a sano sanguine elementa sunt (*t*). Primum ergo elementum, quod 110 FAHRENHEITIANO caloris gradu in vase clauso de sanguine adscendit, porroque ad gradum usque 212 pergit (*u*) adscendere, id aquam sanguinis vocamus, phlegma alii. Haec aqua omnino idem est, quem de sanguine fugientem descripsimus (*x*), halitus; collecta vero eadem latex est pallidus, fontana & vulgari aqua vix gravior (*y*), blandus, odore & sapore levissimo tinctus (*z*), in quo minimum terrae (*a*) momentum est, parciissimo facile imbutæ, & nonnihil etiam ejus elementi, quod ab igne urinosam indolem accipit (*b*). Idem ab admisto vitrioli oleo paulum cogitur (*c*).

Hujus aquæ ad sanguinem rubrum portio varia a variis scriptoribus definitur. Noster olim præceptor tantam fecit, ut septem partes octavas totius sanguinis sola efficeret (*d*), aut drachmas 112 in 128, neque recessit THOMÆ SCHWENKE experimentum, cui ex quindecim uncisi sanguinis tredecim intra 24 horas exhalarunt (*e*). Potius major ratio HONBERGII fuit, qui in 16 libris, sive 256 uncisi, omnino quatuordecim libras, uncias quindecim, aut uncias in univerlum 239, sive 139½ drachmas in 128 reperit (*f*). Major iterum JOHANNIS HILLI, qui 120 drachmas sive tot uncias aquæ facit, quot sunt sanguinis libræ (*f**). In libra 128 drachmarum, drachmas seri 117 noster olim CL. auditor appendit (*g*). Fere eamdem portionem habet GEORGIUS ERHARDUS HAMBERGER,

(*t*) Id vitium in experimento PHILIPPI VERHEYEN est, & J. BAPTISTÆ VERDUC tr. de *l'Injage des parties* p. 357.

(*u*) HOERHAAVE *Elem. Chem.* T. II. p. 355. T. SCHWENKE p. 120. 139.

(*x*) *Sect. II. II. 4.*

(*y*) VIEUSSENS *tr. des liquens* p. 16. Unica millesima gravior est JURIN *diff. VIII.* p. 106.

(*z*) VERHEYEN L. II. p. 34. HOFMAN *Obseru. Chem.* p. 21. C. R. A. BERGEN *minutissim* p. 15. 16. JURIN l. c.

(*a*) VIEUSSENS l. c. p. 20. Ad grana nempe duo in phlegmatis libra, ex seri aqua, quam parum crediderim differre.

(*b*) VIEUSSENS in præf. ad duas Epist. ad $\frac{5}{4}$ salis volatilis grana in duodecim aquæ uncisi.

(*c*) JURIN l. c.

(*d*) l. c.

(*e*) l. c. p. 139.

(*f*) *Mémoir. de l'Acad. des scienc.* 1712. p. 13.

(*f**) *Mat. Med.* p. 875.

(*g*) RHADES *de ferro jang.* p. 7. ex robusto juvene.

BERGER, nempe 74 aquæ partes in partibus sanguinis 90, five drachmas $116\frac{1}{2}$ in 128 drachmis (*b*). Intra hanc rationem est, quam *Broune* LANGRISH, & quam *Philippus Verheyen*, atque *J. Baptista Verduc* proponunt. Eas enim facili calculo ad drachmas si redegeris, habebit Cl. LANGRISH in 128 drachmis sanguinis aquæ drachmas 105 cum semisse (*i*), *Verheyenius* (*k*) autem & *Verduc* (*l*) quam proxime drachmas 105. *Raynundus Vieuussen* ex sex libris sanguinis aquæ libram (*m*) elicuit. In alio experimento de libris undecim, & uncisi tribus, aquæ habuit libras quinque, uncias undecim, que ratio iterum fere eadem est, non penitus nempe duarum aquæ partium ad siccioris grumi partem unam (*n*). *Robertus Boyle* sex septimas seri reperit, five in libra drachmas $102\frac{1}{2}$ (*o*). Qui sequuntur, minore in aquæ portionem habent. Cl. FLUTTON vix supra 93 drachmas admittit (*p*): Antiqui academici galli drachmas 88 (*q*): *Joh. Colebatch* drachmas 83 (*r*) & *Jacobus Jurin* drachmas 80 (*s*) quæ omnium minima ratio mihi innotuit. Ingens discrimen est, cum ad 128 sanguinis drachmas alii 109 drachmas aquæ, alii non supra 80 habeant. *Gualtherus Nedham* ex grumi sanguinis humani uncisi decem phlegmatis habuit uncias quatuor, unde portio ad sanguinem totum alia exsurgit, uti grumi in sanguine alia portio fuerit (*t*). Et tamen potuerunt omnes ad vera experimenta scripsisse. Nempe *Homburgius*, *Schwenckius* & *Boerhaavia*, qui multum aquæ habent, ii de sanguine quidem aquam omnem abegerunt, donec siccus grumus superesset, eamque aquam omnem in rationes suas retulerunt. Qui parvam aquæ portionem proponunt, ii ab inodoro & blando phlegmate id unice separaverunt,

N 2

quod

(*b*) *Physiolog. med.* p. 7.(*i*) *Modern. practice* p. 80.(*k*) p. 36.(*l*) p. 171. Sed tzedet *Verducis* verba repeterem, qui sua pondera a *Verheyenio* mutuasse videatur.(*m*) *Traité des liquens* p. 26.(*n*) *Ibid.* p. 17.(*o*) *Clymiji. Scept.* P. II.(*p*) Ex centum partibus sanguinis partes aquæ 73. *de sanguin. & circulat.* p. 7.(*q*) *Mémoires de l'Acad. avont 1699. T. I.* p. 406.(*r*) Drachmas 22 ex sanguinis drachmis 34, quez ratio est 83. 228. *doctrine of acids asserted.*(*s*) *I. c.* p. 106. Uncias habet 46 cum $\frac{1}{4}$ in uncisi 78.(*t*) *Birkm T. III.* p. 235.

quod saporem haberet odoremve, atque adeo aquæ portionem discontinuerunt. Quare illi quidem fere omnem in sanguine latentem aquam metiti sunt, hi id unice fatum phlegma, quod magis proprie aqua sanguinis vocatur.

Non inutile putavi fore, si alia experimenta in hominum variii temperamenti, variisque morbis affectorum sanguine instituta repeterem, in quibus aquæ ad reliquum sanguinem alia & alia proportio fuit. Initium faciemus a morbis, in quibus feri portio increvit. Ergo in phthisico homine ratio feri ad sanguinem fuit proxime 90 ad 128 (*u*). In heptice feminæ sanguine, phlegmatis valde urinosi fuerunt supra 107 partes in libra (*x*). Hoc in exemplo sanguinis resoluti testimonium habemus, qualis a phthisi expirari potest; in priori haec tenus etiam feri portio major fuit, cum **IDEM** auctor fani sanguinis serum valde parcum recipiat (*y*). In phlegmatico homine de uncisi 13 sanguinis fisci crux manerunt drachmæ 20, unde ratio nata est 103 $\frac{1}{2}$ aquæ in 128 drachmis sanguinis, quam excitavimus (*z*).

Contra idem auctor in cholericò homine rationem feri reperit 104 $\frac{1}{2}$ in melancholico 105 $\frac{1}{2}$, in femina melancholica 101 $\frac{1}{2}$ (*a*).

In scorbutici hominis sanguine, aquæ minima portio fuit, ad 11 drachmas grana 10 in drachmis 26, inque libra drachmarum 55 (*b*). Sed & iste scriptor spiritum ad aquam sanguinis noluit connumerare.

In podagrici agroti sanguine aquæ meræ tres quartas five 96 partes 128^{mas.} posuit (*c*).

C. B R O W N E L A N G R I S H, qui in libra sanguinis de fano homine sumti 105 $\frac{1}{2}$ aquæ drachmas repererat, idem in homine quinquagenario, & plethorico reperit drachmas 104 grana 50, nempe aliquanto minus. In febre ardente die secundo feri drachmæ 104 $\frac{1}{2}$ in 128 drachmis sanguinis fuerunt (*d*): & die fere quarto 103 drachmæ (*e*), ut miceris, non majus feri decrementum fuisse in morbo, qui urinam adeo flammam, adeo sero pauperem fere comitem habeat.

Hæc

(*u*) **C O L E B A T C H** l. c. p. 416. nempe drachmæ aquæ 14 ex 20 drachmis sanguinis.

(*x*) **I D E M** p. 419. nempe 52 drachmæ feri in sanguinis drachmis 62.

(*y*) In fano homine drachmas in libra 83, in phthisico drachmas 90. admittit.

(*z*) **R H A D E S** l. c. p. 8.

(*a*) p. 90.

(*b*) p. 420.

(*c*) l. c. p. 50.

(*d*) p. 82.

(*e*) Ibid.

Hæc experimenta, nimis equidem pauca, videntur tamen ostendere, minui aquæ copiam in plethora, podagra, febre valente, & scorbuto (*f*), augeri contra in phthisi, inque temperamento phlegmatico.

Sanguis bubulus humano multo spissior est. In libris enim quatuor sanguinis crassamenti fuerunt librae omnino duas (*g*). Contra in viperæ sanguine ex 80 granis, humoris fuerunt $62\frac{1}{2}$ sive super tres partes quartas aquæ [*g**].

§. XXXVI. *Spiritus sanguinis.*

Rarissimum est extra putrem statum ante phlegma spiritum adscende-re [*h*], et si exemplum invenio; in omnibus aliis periculis, quamdiu calor non superat aquæ ebullientis gradum, similis fere aqua, unice paulo sub finem acrior adscendit, & in fundo vasis siccus [*i*] aliquantum empyreumaticus grumus superest, qui cum vitrioli oleo, & aliquanto validius cum nitri spiritu effervescit [*k*]. Huic nunc sanguinis sapere vehementior ignis subiicitur, cuni arena æstum eo longe majorem concipiatur, quo aqua ebullit. Ita prodit liquor utcunque pinguis, oleosus, amarus, subrusus, naturæ jam manifestius urinose, quam *Robertus Boyle*, multis celebratum experimentis, *spiritum sanguinis* vocavit. Is ex sale volatili sicco in aliqua superstitis phlegmatis portione dissoluto [*l*] constat. Similis enim spiritus paratur, si saltem volatilem sanguinis in aqua solveris, & una destillare coègens. Aqua vero & sal in spiritu ea ratione miscentur, ex *Raymundi Vieusseus* experimento, ut in drachma phlegmatis, grana salis volatilem viginti & septem [*m*] colliquescant. Urinosam naturam, quam alcalinam volatilem vocant, odor facile prodit, & cum spiritu salis alkylæ acidis liquoribus familiaris fervor [*n*]. A spiritu tamen urinæ & cornu cervi aliquo discrimine differt [*o*].

N 3

Præter

(*f*) In quo aliqui augeri crediderant *Sutton* p. 104.

(*g*) *Nerdman* l. c. p. 234.

(*g**) *Mem. de l'Acad. des sciences*. 1731. p. 26.

(*b*) *Colbatch* l. c. p. 407.

(*i*) *Borrhaave* l. c. p. 316. *Homberg* l. c. p. 13. *Vieusseus* p. 26. Ali- cali animalæ non discedunt, neque solvitur, nisi ad aquæ ebullientis calorem *Baron ad Lemery Cours de Chymie* p. 805.

(*k*) *Grew* l. c.

(*l*) *Boyle apparatus* p. 91. 93. *append.* p. 16.

(*m*) *Vieusseus* *préface aux deux dissertations*.

(*n*) *Boyle apparatus* p. 97. *Homberg* l. c. p. 12. *Grew* l. c. p. 252.

(*o*) *Boyle apparatus* p. 27.

Præter eum salem oleum in sanguinis spiritu continetur: cum aqua enim lactescit [p], cuinque nitri spiritu, post solitum fervorem, crusta oleosa pavoninis coloribus varia nascitur [q]. Sed neque acidæ naturæ vestigia obscura sunt. Idem enim rubescens spiritus succum heliotropii rubro colore tingit [r], maxime si mox aliquantum concesseris, ut volatilis urinosus sal avolet [s]; neque hic a rufa pariter de plantis stillante spiritu distat [t]. Sed etiam ex urina putrida [u], & ex carne [x], quæ contabuit, rufus latex obtinetur, in quo notæ acoris superflunt. Idem liquor, a volatili sale separatus, quod rectificare vocant, manifesto austero & acido sapore est [y]. Scaturigo quidem hujus acoris nihil valde obscuri habet; a sale marino non oritur, cum ex sanguine viperarum, piscium, in dulcibus aquis habitantium [z], & aquaticarum avium omnino similis, & perinde acidus spiritus eliciatur. A male superata vegetabili indole potius nasci videtur [z*], quæ sponte sua ad acorem vergit; omnia vero animalia aut ipsis plantis aluntur, aut certe aliis animalibus, quorum virtus ex herbis est. Deinde, cum pinguedo animalis insigniter aceat [a], nihil mirum fuerit, si in pingui spiritu acoris vestigia fuerint. Cæterum acrior utique, & totus igneus de sanguine spiritus adscendit, quando de admista calce destillat, quæ acorem superstitem destruat [b].

JURINUS duplum sanguinis spiritum fecit, debiliorem primum, qui pondere tamen aquam superat, adque eam se habet uti 1007 ad 1000 [c], inde meraciorem, qui sit uti 1080 ad 1. [d].

Rationem, quam spiritus ad sanguineum grumum siccum habet, ex quo prodit, adeoque ad totum sanguinem, iterum variam reperimus, Raymundus VIEUSSENS ex uncii 179 sanguinis in priori experimen-

to,

(p) VERHEYEN L.C. p. 33.

(q) BOYLE append. hist. sangu. p. 39.

(r) HOMBERG L.C. HAMBERGER p. 10.

(s) MACQUER Chymie pratique T. II. p. 467.

(t) HOMBERG Mem. de l'Acad. 1709. p. 354.

(u) IDEM ibid. 1712. p. 274.

(x) NAVIER I. C. Cum labore cafei putridi.

(y) HOMBERG Mem. de l'Acad. 1712. p. 12. POTT Miscell. Berolini. T. VI. p. 21.

(z) HOMBERG L.C. p. 15. Lucium picrem nominat

(z*) NERUMANN edit. ZIMMERM. p. 1210.

(a) L. L. p. 31. 32.

(b) BOYLE hist. sanguin. append. p. 30. 31. APPARAT. p. 155.

(c) JUSIN p. 106.

(d) Ibid.

to, & crassamenti siccii libris tribus, spiritus eduxit drachmas 28 grana 30 [e]: in alio vero experimento ex sanguinis integri libris sex uncisi quatuor, siccii vero cruoris uncisi viginti, omnino spiritus uncias decem, drachmasque septem, sive plus dimidia parte spiritus elicuit [f], quæ quidem copia priorem multum superat. *Gualtherus NEEDHAM* ex sapæ sanguinis humani uncisi sex spiritus uncias tres obtinuit. Proxima *ERNESTI* est ratio qui dimidiæ parti sanguinis suui spiritum æqualem habuit [f*], dimidiæ ergo partem totius sapæ [g] grumi vero $\frac{1}{10}$ *Jacobus JURIN* [h], vel *Johannes Brown* quo artifice, Cl. vir ad experimenta usus est, de uncisi sanguinis 78 habuit, cruoris siccii uncias 41, drachmas duas, deque his 41 uncisi spiritus debilioris uncias septem, merioris uncias septem & drachmas sex, adeoque fere $\frac{1}{4}$ f, plus nempe tertia sanguinis siccii, sanguinis vera totius $\frac{1}{3}$ *Casparus NEUMANN* [i], ex sanguinis siccii drachmis 28, integri vero sanguinis libra una, obtinuit spiritus unciam, sive partem sanguinis decimam sextam, grumi non penitus tertiam. Proximum est *VERHEYENII* experimentum, in quo fere $\frac{1}{5}$ fuerunt spiritus [k]. In experimento alio a *J. B. VERDUC* relateda alia spiritus portio est fore $\frac{1}{3}$, nempe drachmæ quatuor cuni dimidia ex 78 [l]. *HOMBERGIUS* ex libris sanguinis sedecim spiritus, sed una cum sale habuit uncias duodecim, partem nempe totius sanguinis duodecimam [m], si de libris 12 unciarum sermo est. *Robertus BOYLE* [n] ex siccii sanguinis uncisi viginti quatuor, spiritus appendit uncias 6 cum dimidia, partem adeo fere tertiam. In his periculis ratio spiritus ad grumum sanguinis siccatum est a dimidia ad tertiam fere partem, in priori enim experimento *VIEUSSENS* sanguinem nimis siccasse videtur. Inde si grumus ruber sexta pars est sanguinis totius, spiritus pars erit aut duodecima, aut decima octava sanguinis. Facile vero aliqua diversitas vel

ex

(e) *Traité des liquens* p. 18.

(f) Ibid.

(f*) *Anat.* p. 72.

(g) l. c. p. 235.

(h) l. c. p. 106.

(i) l. c. p. 763.

(k) Ap. *VERDUC* p. 371. drachmarum trium ex septem uncisi.

(l) *VERDUC* p. 367.

(m) *Mémoir.* 1711. p. 13.

(n) *Apparat. ad belli. sang.* p. 50.

ex solo nomine oriri potuit, uti laticem de sanguine adscendentem quisque diutius phlegmatis nomine, aut præcocius spiritus titulo appellare maluerit.

In experimentis *Johannis Colbatch* morbi diversitatem fecerunt. Ex hominis sani sanguine spiritus portio fuit fere septima (o) aut partes 19 ex 128. in phthisico $\frac{11}{12}$ (p), in tussiculosa femina 24 & fere 25 (q), earumdem partium, in duobus ægris scrophulosis fere 32 (r), perinde in hysterica (s), in rheumaticæ feminæ sanguine 39 [t], in scorbutico partes 40 $\frac{1}{2}$, [u], in podagræ calculosa muliere 43 [x], in hypochondriaco 51 $\frac{1}{2}$ [y], in chlorotica semina 55, quæ rationes fere enormes videntur [z]: sed memores esse oportet, hunc auctorem solum volatilem cum spiritu numerare. Cæterum ex ejus experimentis adpareret, in podagra [z*], morbo hypochondriaco, & hysterico portio nem urinosa sanguinis maximam esse. Ex *Needhamo* denique repetto, taurini sanguinis spiritum ex crassamenti libris duabus fecisse ad uncias novem supra libram [a], majori adeo in ratione, quam in ullo humani sanguinis experimento.

§. XXXVII. Sal volatilis.

Cum eo spiritu, & post eum, & ante oleum sanguinis [b], & cum eo oleo, adscendit de grumo croris sal volatilis solidus, albus, vehementis odoris, & indolis summe penetrabilis. Adhæret idem ori excipuli, & cælio ampullæ retortæ, ex qua adscendit. Plerumque aliquam olei portionem

(o) Nempe drachmæ quinque ex sanguinis drachmis 34. *doctrine of acids affected* p. 418.

(p) p. 416.

(q) p. 419.

(r) p. 417. 421.

(s) p. 415.

(t) p. 414.

(u) p. 420.

(x) p. 417. Addit ante phlegma adscendisse.

(y) p. 421.

(z) p. 420.

(z*) *Colbatch* l. c. in ratione 6 & $\frac{1}{2}$ ad 4. In scorbuto perinde *Essay concern. acid. and alkali.*

(a) l. c. p. 274.

(b) *Boerhaave* l. c. p. 356. *Hill mat. med.* p. 874.

portionem adhærentem (*c*) habet, quando vero seorsim obtinetur, adscendit ramosa arbicularum specie (*d*); singula vero ejus salis granula parallelepipedata, cubica, octaedra, & regularium polygoniorum (*e*) corporum similia sunt. Si calcem sanguini adjecteris, nullus sal. siccus obtinetur, ejusque locum spiritus, solito & copiosior, & valentior occupat (*f*): si vero salem tartari (*g*) pro calce addideris, spiritus quidem debilior, plurimum vero salis volatilis adscendet.

Vehementer cum acidis liquoribus servet (*h*): spiritu vero rectore amissio, minima parte sui ponderis levior, omnino inodorus supereft (*i*).

Quam in universo sanguine portionem obtineat, difficulter certe dicatur. *Caspar Neumann* ex libra sanguinis, crorisque siccii drachmis 28 obtinuit drachnum salis siccii dimidiā, quæ ratio totius sanguinis est (*k*) $\frac{1}{12}$. *Gualtherus Needham* de sanguinis siccii unciis sex, quas possit habere pro sapo de 20 unciis sanguinis extracta, salis volatilis drachmas duas paravit, sive partem $\frac{1}{5}$ (*l*). *Jacobus Jurin* ex siccis 78 unciis sanguinis drachmas salis volatilis septem, sive partem fere $\frac{1}{9}$ (*m*) elicuit. *Robertus Boyle* in priori (*n*) experimento siccii sanguinis uncias exploravit 24, obtinuit salis volatilis drachmas decem cum semisse, quæ portio totius sanguinis est fere $\frac{1}{3}$. Siccum enim sanguinem quartæ parti totius massæ comparat (*o*). In alio (*p*) experimento ex siccii etiam sanguinis unciis 12, obtinuit salis volatilis uncias duas, drachmas duas, triplum certe prioris, quæ enormis ratio efficit ad $\frac{1}{2}$ totius massæ, & nimis a priori aberrat. *Vicusenius* in experimento priori (*q*) ex unciis 100 sanguinis, unciis vero viginti siccii croris, obtinuit drachmas decem, sive $\frac{1}{10}$. In
alio

(c) *Virusens* pref. cit.

(d) *Boyle apparatus*, p. 34.

(e) *IDEM* ibid. p. 35. & *append.* p. 18. Rhomboideæ particule in sanguinis spiri-
tu *Grassi Osmol.* p. 15. 16. & in sale volatili humani sanguinis *Boyle Chem. Receipt.*
T. IV.

(f) *IDEM apparatus*, p. 155.

(g) *Append. bish. Sang.* p. 34.

(h) *Grew* l. c. p. 251. 252.

(i) *Boyle apparatus*, p. 31.

(k) l. c. p. 763.

(l) l. c. p. 235.

(m) p. 106.

(n) *Apparatus*, p. 50.

(o) *Ibid.* p. 46.

(e) *Append.* p. 3.

(q) p. 28.

alio (*r*) exemplo de 179 unciis drachmas sex, grana 18, five portio-nem non majorem, quam $\frac{1}{2}$, quæ ratio vehementer aberrat. *J. Conra-dus B A R C H U S E N* (*s*) ex sanguinis absque fero unciis quatuor, grana habuit 55, five partem $\frac{1}{4}$, aut ultra. *J. B. V E R D U C* in alio experi-mento de drachmis 78 elicuit sesqui drachmam, five $\frac{1}{4}$ (*t*). *Philip-pus VERHEYEN* (*u*) de sanguinis siccii 55 drachmis drachmas duas talis obtinuit, five $\frac{1}{5}$. totius vero cruxis fere $\frac{1}{12}$.

In febre portio salis volatilis augetur. In octo unciis sani sanguinis de juvene missi repererat *Brovne L A N G R I S H* grana 38 five partem fe-re $\frac{1}{12}$ (*x*). Sed idem in viro quinquagenario in eodem (*y*) pondere sanguinis grana reperit 46 five $\frac{1}{5}$: in febre ardente die secundo grana 65 si-ve $\frac{1}{6}$ (*z*), die quarto omnino grana 94 five fere $\frac{1}{4}$ obtinuit (*a*). In podagra ex libra sanguinis prodierunt grana 68 five $\frac{1}{7}$ si de medica libra fermo fuerit (*b*). Quare ex principibus febris effectibus videtur, salis vo-latilis urinosi portionem augere.

In taurini sanguinis (*c*) libris quatuor fuerunt drachmæ duæ, scrupulus unus grana sex, five fere $\frac{1}{12}$ si libræ civiles sunt, aut $\frac{1}{10}$ si medi-cæ duodecim unciarum.

S. XXXVIII. *Oleum sanguinis.*

Una cum sale volatili, aliquanto tamen serius, adscendit flavum ole-um (*d*) sanguinis, hactenus fluidius, & altero, quod continuo sequitur, levius, ut de eo sponte fecedat, si commiscueris.

Nempe si ignem urseris, succedet albus fumus (*e*), & rufum, & tenax inde, piceumque oleum, non absque periculo, si collum retortæ phialæ minus amplum fuerit, & sanguis vehementer igne subito pellatur.

Utrumque

(*r*) p. 18.

(*s*) *Puff acrostata* exp. XL.

(*t*) p. 368.

(*u*) *L. II.* p. 35.

(*x*) *L. c.* p. 80.

(*y*) *Ibid.* p. 81.

(*z*) p. 82.

(*a*) 83.

(*b*) *PINELLI* p. 50.

(*c*) *NEEDHAM* *I. c.* p. 235.

(*d*) Succinum dictum *Roberto BOYLE* apparat, ad his: *Sang.* p. 40. & ex eo *Domi-nico SANDRIS* p. 52.

(*e*) *BOERHAAVE* *I. c.*

Utrumque oleum cum acidis servet (*f*), ut tamen non in isto solum oleo, sed etiam in animali illo DIPPELIANO (*g*) vestigium acide naturæ superfit, chartaque cœrulea rubro (*h*) inde colore vicietur. Destillatum idem rufum, sicutdæmque spiritum reddit, qualis ex sanguine prodit (*i*).

Hoc oleum partim ex vera per sanguinem mista pinguedine nascitur, quæ nonnunquam, in obesioribus animalibus, etiam oculis conspicuam se offert (*k*), & in recenti etiam sanguine demonstratur, quando in aquam destillando cadit. Rubram enim & oleosan, & aquæ innatantem cuticulam efficit. Alia pars ex rubris globulis prodit. In iis enim inflammabilis natura manifesta est. Sanguis ab omni fero & aqua omni separatus, merace ruber, folisque nunc adeo factus globulis, durus fit, fragilis, & ignem capit alitque (*l*). Et ruber pulvis percolatione & elotione de sanguine paratus, aut crusta, quæ de sanguine post exhalationem omnis aquæ superest, vasisque stutneis adhaeret, in igne nictat, crepitat, inflammat. Alio etiam modo III. GAUBIUS cum aqua ebulliente cruorem solvit, ut in floccos beat; ita in pulvrem spissescit, quæ per colum trajecta, & leni calore siccata friabilis est, flammamque concipit, & ardet (*m*).

Ex ea sanguinis pinguedine cum alumine pyrophorus (*n*) conficitur, neque ab eo oleo differt, quod aut ex cornibus, aut ex crano denum humano paratur, & spem æterni luminis fecit (*o*), quod lentissime deflagret, & exiguum ejus olei pondus aliquot mensum flammulae sufficiat. Pyrophorum olim CARDANUS dixit, faciem de sanguine humano digesto & destillato natam, in finum sepultam, & ignis avidam (*p*).

Oleum hujus simile, quod descripsimus, ex omnibus animalibus, & animalium partibus omnibus paratur: folæ formicæ, quantum innotuit,

O 2 præter

(*f*) BOYLE L. C.

(*g*) MANGOLD vermifibla vortheile D. 43.

(*h*) IDEM ibid.

(*i*) VIEUSSENS pref. aux deux dissertations.

(*k*) Adeps in suis sanguine RUTSCH thesaur. anat. I. assert. I. n. 3. Habit etiam MALPIGNIUS de omento p. 235.

(*l*) BOYLE append. p. 24. BECCHER phys. subterr. L. I. S. 5. c. 2. p. 308. STURBÆON phlebot. p. 46. 106. 107. HOFMAN objec. Chem. p. 210. medic. system. T. I. p. 95. Vinc. MENGHINUS in Comment. Bonon. I. fixe cit. WESTPHAL de tubere testiculi illi p. 6. ELLE L. C. p. 8.

(*m*) p. 159. 160.

(*n*) LEMERY Memoir. de l'Acad. des scienc. 1714. p. 404.

(*o*) III. Principiis de S. SEVERO experimento, quod in proprio libello descripsit Lettres concernant une découverte &c. Naples 1753. 4. conf. Hamburg. Magazin T. XL XIL n. 6. quo loco ea spes aliquantum minuitur.

(*p*) CARDANUS de substitute p. 516.

præter animale oleum etiam aliud oleum, illi simile dederunt, quod de pinguibus plantarum feminibus *expressum* (q), vulgo notum est, exque iis demum animalculis oleum æthereum verum parari potest (q*). Animale oleum a vegetabili empyreumatico aliquantum differt (q**).

In proportione, quam oleum ad sanguinem universum, aut ad siccum sanguinem habet, iterum maxime diffeatur. Ex integri sanguinis octo uncisi, in fano juvēne, *Browne LANGRISH* obtinuit olei grana 52 (r) & ex quinquagenarii viri sanguine grana 72 (s). Prior ratio est $\frac{1}{6}$, altera $\frac{1}{7}$. Proximum est experimentum *Jacobi JURIN*, qui ex uncisi sanguinis 78 unam unciam olei elicit (t), si sextuplum grumi rubri sanguinis copiam feceris. *Robertus BOYLE* (u) habuit olei (u), quando de libra una drachmas duodecim destillatione facta appendit. Solet autem minorem grumi ad sanguinem portionem facere. *Caspar NEUMANN* ex uncisi tribus cum semisse sanguinis siccii drachmam olei elicit dimidiā, quæ ratio ad sanguinem est $\frac{1}{3}$ si sextuplum grumi feceris (y). *HOMBERGIUS* ex totius sanguinis uncisi 256 olei utriusque uncias quinque coget adscendere five $\frac{1}{5}$ (z). *Raymundus VIEUSSENS* (a) in priori experimento de uncisi 179 sanguinis habuit olei uncias quatuor, drachmas tres, quæ ratio est $\frac{1}{40}$. In altero de 100 uncisi sanguinis, unciae olei prodierunt due, drachmæ quinque, grana 40, quæ ratio est $\frac{1}{20}$ (b), si recte pondērā interpretor, in quibus utique facile erratur. Ex siccii sanguinis uncisi tribus Cl. VISSCHERO (c) vīsa sunt adscendisse drachmæ olei quatuor & aliquanto plus, quæ ratio, sextuplo sumto grumi sanguinis, est fere $\frac{1}{8}$. Partem sanguinis effecit in VERDUCII experimento (d). In alio experimento *Robertii BOYLEI* de sanguinis drachmis 81 & granis 13 olei factæ sunt drachmæ duæ grana 48 (e),

five

(q) *Mémoir. de l'Acad. Roy. des Scienç. de Berlin* 1749. p. 40. 41.

(q*) *Neumann* ex edit. ZIMMERM. p. 1268.

(q**) *Idem* ex edit. KESSEL T. I. P. II. p. 350.

(r) *I. c. p. 80.*

(s) *I. c. p. 82.*

(t) *p. 106. Addit.* aliquid olei capiti mortuo adhæsisse.

(u) *Append. p. 7. 8. Magna hæc copia illi. vīo vīsa est.*

(y) *I. c. p. 763.*

(z) *I. c. p. 13.*

(a) *p. 18.*

(b) *p. 28.*

(c) *Diss. de cholepoiesi* p. 7.

(d) *Drachmas duas cum dimidia ex 78 dr. p. 368. 369.*

(e) *Apparatus ad lib. sang. p. 40.*

five fere $\frac{1}{2}$. *Philippus VERHEYEN* de suo, putrido quidem cruento ex drachmis 56 olei crassi (nam subtile oleum hujus viri auctori- bus spiritus est) obtinuit scrupulos octo, five supra partem $\frac{1}{4}$ (f). *Gualterus NEEDHAM* ex unciis decem grumi de humano sanguine se- parati, fecit olei unciam, partem adeo vigesimam totius sanguinis, si gru- mi duplum feceris (f*).

Denique ex drachmis 34 sanguinis olei elicuit drachmas tres, vir ex suo vite genere haec tenus chemiae peritus *Johannes COLEBATCH*. Haec enormis olei copia est fere $\frac{1}{11}$ totius sanguinis. Adparet, adeo diversos eventus in Cl. virorum periculis suis, ut alii fere $\frac{1}{80}$, alii pene $\frac{1}{4}$, olici de sanguine extraherent. Potuit in nonnullis experimentis aliqua spiritus portio in carbone sanguinis haesisse. Aliquod etiam discrimen ex aetate, & temperamento, & fano, aegrove statu eorum hominum interpretamur, quorum sanguis ad experimenta exhibitus fuit. Videmus, ex Cl. *Browne LANGRISH* in adultioris hominis sanguine olei majorem portionem suis- se (g). Idem vir Clar. in febre ardente, die secundo olei habuit tan- tum, ut $\frac{1}{4}$ sanguinis sicci efficeret (h). *Johannes COLEBATCH* (i), cuius pondera alioquin a reliquorum scriptorum ponderibus vehementer dissentient, habet olei in scorbutico portionem aequalem decimam tertiam parti sanguinis; in rheumatica fere $\frac{1}{12}$, in chlorotica pariter $\frac{1}{12}$, in hy- pochondriaco homine $\frac{1}{8}$, in tussiculosa femina fere $\frac{1}{11}$, in scorbutica scro- phulosa aegra perinde, in hysterica $\frac{1}{8}$, in scrophuloso homine $\frac{1}{12}$, in phthisico $\frac{1}{12}$, ut omnino portio olei maxima esset in sanguine hominis scorbutici, minima in phthisico. In podagrico *PINELLUS* partis oleofae reperit in- ter $\frac{1}{10}$ & $\frac{1}{11}$. In bubuli sanguinis libris quatuor, & crassamenti libris duabus, fuerunt olei drachmæ tres, five $\frac{1}{12}$ aut certe $\frac{1}{11}$ pars, valde certe exigua, si reputaveris spiritus 25 uncias suisse (l).

Hoc ex oleo, & ex pilis, lana, unguis, lumbricis serico, stercore humano parari potest, & ex viliori oleo sanguinis cervini omnino parari solet, celebre illud (m) *animale oleum DIPPELII*. Sive sanguinem in

O 3

aquoso

(f) I. c. p. 37.

(f*) I. c. p. 235.

(g) p. 80. seqq.

(h) Ibid.

(i) p. 416. seqq.

(l) I. c. p. 50.

(m) *Breslauer Sitzungen* 1718. M. Januar. S. CARL Commerc. Lit. Noric. 1733. n. 31.
KRAMER ibid. 1734. n. 4.

aquoso balneo, cum multa aqua destillet, ex b. socii mei H. *Fridericus TEICHMEYER*⁽ⁿ⁾ consilio: sive repetito rectificetur ^(o), sive alio, magis composito, modo cum spiritu salis & tartari destillato oleo iterato coholetur ^(o). Id oleum deposito fatore, gratum nunc odorem spirat gratumque saporem ^(p) præstat. Vires medicas alii aliter estimant. Paradoxus inventor pro summo remedio vendidit, quo convulsio omnisque nimius in nervorum universitate motus compesci possit. Anodynamam potestatem admittit *Burchardus David MAUCHART* ^(q) & alii laudant ^(r); ad vulnera vero commendat *Cl. CARTHEUSERUS*. Alii multo minores spes de eo oleo concipiunt ^(r*). Felix & gratus medicus *Balthasar Iudovicus TRALLE* ^(s) spiritum cornu cervi, aliaque id genus animalia olea iisdem pollere viribus monet: anonymous autem, qui *DIPPEL* medicum opusculum vertit, & commentarios suos adjecit, omnino totum rejecit ^(t): neque mihi in vivi hominis corpus & sanguinem olea animalia unquam placuit recipi. Olim *Olaus BORRICHUS* adnotavit, oleum cranii humani fatore exutum una vires deponere, ignavumque fieri ^(u).

§. XXXIX. Carbo sanguinis.

Atque nunc imprimis oportet recte temperare ignem, ne massa reliqua crux quasi fermentet, intumescat, & adsurgat ^(x); ita manet in fundo vasis retorti fæx digerrima, splendida, spongiosa, porosa, levis, friabilis, salia, amara, empyreumatica, urinosa odore ^(y), inflammabilis ^(z), quam olim *J. Eaptifa ab HELMONT* ^(a), inde *Hermannus BOER-*

⁽ⁿ⁾ Etiam *MAUCHARTUS* de oleo animali credit satis esse, si bis destilletur.

^(o) *CARTHEUSER PHARMACOLOG.* p. 230. 24^o. *NEUMANN* edit. *ZIMMERI*.

p. 1241.

^(o*) *ROHTE CLEMIS* p. 223.

^(p) In disq. me præside defensa *GOTTING.* 1747.

^(q) L. c. Monet tamen sponte sua contumpi.

^(r) *KRAMER* L. c. *MANGOLD*.

^(r*) Ad epilepsiam & cataractam crystallinam, ad solvendos illitus scirrhos *AG. Acad. MAGNET.* T. I. p. 297. sq. & 339. De epilepsia *KRAMER* L. c.

^(s) *EXAM. MEDICAM. TERROR.* p. 155.

^(t) *VIT. ANIM. MORB.* *EGB* medic. p. 158.

^(u) *HERMETIC. AEGPT. SPLENT.* p. 332.

^(x) *BOERRAVER* L. c. *BOYLE APPARAT.* ad *bijf. sang.* p. 48.

^(y) *NAVIER* L. c. p. 33.

^(z) *BOYLE APPARAT.* p. 6.

^(u) *OPUS.* p. 91. n. 5.

BOERHAAVB carbonem dixit (*b*) sanguinis, multi alii caput mortuum non recte dixerunt, cum varios sales contineat. Ejus ad sanguinem related portio iterum varie appensa est. *Robertus BOYLE* (*c*) ex libris duodecim sanguinis uncias quatuor drachmas duas carbonis obtinuit, quæ portio est sanguinis $\frac{1}{4}$ vel, si de libra medica sermo est, fere $\frac{1}{4}$. *Hombergius* ex quatuor libris sanguinis reliquas habuit 34 carbonis five $\frac{1}{2}$ (*d*). *Raymundus VIEUSSENS* ex centum (*e*) uncias sanguinis siccæ fecis vidit superesse uncias quatuor drachmas sex, quæ ratio est fere $\frac{1}{5}$: in alio vero experimento, valde diversi eventus (*f*), ex 179 uncis, uncias omnino 22 & drachmas septem fere $\frac{1}{2}$. *Gualtherus NEEDHAM* de grumi rubri uncias decem, quæ potuerunt crux totius copiam dare unciarum viginti, habuit drachmas decem, five $\frac{1}{2}$ (*g*). *Caspar NEUMANN* ex libra unciam five pariter $\frac{1}{2}$ (*h*). *Jacobus JURIN* ex 179 uncis uncias octo cum semisse (*i*) five $\frac{1}{2}$. *Brovne LANGRISH* (*k*) ex octo uncis, unciam unam grana 52, five $\frac{1}{2}$ & ultra. *Antonius de HEYDE* ad quintam partem totius sanguinis estimat (*l*). *Philippus VERHEYEN* ex 78 drachmis habuit drachmas 16 five $\frac{1}{2}$ (*m*). Iterum enormis est in experimentis diversitas, quæ potest ab olei portione pendere, quam alii de carbone patienter abegerunt, alii reliquerunt admisstam.

In morbos hominibus, si fides est *Johanni COLEBATCH* (*n*) alia & alia carbonis portio est. Sano homini, totius molis sanguinis efficit $\frac{1}{2}$, in tussiculose pene phthisicæ feminæ sanguine $\frac{1}{6} \frac{1}{2} \frac{1}{6}$, in scorbutico homine $\frac{1}{2}$, in rheumatico $\frac{1}{4} \frac{1}{2} \frac{1}{4}$, in calculosa podagrifica $\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2}$, in phthisica $\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2}$ fere, in chlorotica $\frac{1}{6}$, in alia scrophulofa $\frac{1}{6} \frac{1}{2} \frac{1}{6}$, in hysterica $\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{6}$, in scrophulofa $\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{6}$, in hypochondriaco $\frac{1}{4}$.

Bubulus

(*b*) *I. c.* p. 354.

(*c*) *Append.* p. 5.

(*d*) Ex siccâ crux uncias viginti p. 28.

(*e*) p. 18.

(*f*) *I. c.* p. 235.

(*g*) *I. c.*

(*h*) *I. c.*

(*i*) *I. c.*

(*k*) p. 80. 81.

(*l*) *Oif.* 87.

(*m*) *I. c.* p. 35.

(*n*) *I. c.*

Bubulus sanguis in libris sex habuit uncias 10 sive pene $\frac{1}{4}$ (o).

§. XL. *Sal sanguinis in igne fixus.*

In hoc carbone multa latent, terra, sal fixus, sal marinus, sal acidus vehementer fixus, ferrum, oleum denique ponderosissimum. Id oleum demonstratur ex deflagratione, quam is ipse carbo patitur. Exustus ergo, per aliquot horas, relinquit cinerem subrufum, ex terra, cum sale mixtum. In lixivium redacto cinere, terra de sale secedit, qui in igne fixus superfuit. Cineris BOYLEUS sex drachmas & semisse, ex duodecim sanguinis siccii uncisi abstulit, quæ portio, ex BOYLEI calculo, est $\frac{1}{4}$. Caspar NEUMANN ex siccii pariter quooris unciiis tribus & semis, & libra sanguinis integri, retulit calcis drachmas septem, sive pene $\frac{1}{4}$, si de libra medica sermo est.

Qui ex hoc cinere sal obtinetur, ambiguæ naturæ est (p). In igne quidem persistit, cæterum alia signa habet marini salis, alia lixiviosi, ut omnino ex utroque genere commixtus sit (q). Lixiviosum esse, vulgo admittitur (r), cum acidis enim liquoribus fervet (s), & in aere deliquescit (t), neque crepitat (u), & reperitur in animalibus nullo utique marino sale (x) utentibus. Fixum etiam in igne salem lixiviosum nuper ex ossibus recoxit Cl. MACQUER (y), exque sanguine J. Henricus POTT (z). Eum, ne colliquescant testæ docimastice, artifices elidunt.

Sed si lixiviosi salis signa habet, non desunt marini salis evidenter vestigia. Syrupum violarum viridi colore minime tingit (a): sapore marinum

(o) NEEDHAM I. c. p. 234.

(p) HELMONT. *blus human.* n. 39. TACENUS *hypocrate. elym.* c. 21. Multum esse, addit HELMONTIUS.

(q) BORRIGIUS *ad. baptiens.* vol. 2. De sale carnium animalium, sanguinis, bilis, urinæ, ossium perinde loquitur. Inde habet POTERIUS *de febrib.* L. I. c. 23. POTT miscell. Berol. T. VI. p. 27. VIUSSENS pref. aux deux diff.

(r) In *deux différat. Epist. ad Lipsiensis Philos. Transact.* n. 241. PINELLI I. c. p. 50. DEIDIRE princip. p. 10. &c.

(s) BORRIGIUS I. c. *Brevire LANGRISH* p. 81.

(t) VIUSSENS *traité des lixivius* p. 44. *deux diff.* p. 6.

(u) Ibid. *deux diff.* p. 6.

(x) IDEM Ibid. p. 43.

(y) I. c. p. 478.

(z) *Miscellan. Berolin.* T. VI. p. 27.

(a) BOYLE *apparat. ad bifi. sang.* p. 45. BOERHAAVE I. c. p. 356. Confirmat tamen, utique tingere VIUSSENS pref. aux deux diff.

num æmulator (*b*), argentum in aqua forti dissolutum albi pulveris specie præcipitat (*c*), aquam fortem in regiam commutat (*d*), denique in crystallos abit (*e*), tessellatas (*f*), & tetragonias. Ejusmodi etiam sal ex spiritu sanguinis (*g*) obtinetur, aut ex ficco sanguine (*h*), ejusve carbone (*i*) educitur: tum ex carnis vitulinæ, bubulæve lixivio (*k*), ex urina (*l*), cervorum cornibus (*m*), humanis & animalium ossibus (*n*), carne animalium carnivorum (*o*), lacte (*p*), & universis rapacium bestiarum carnibus (*q*), ipsoque demuni urinofo phosphoro (*r*). Sed etiam in plantis ejusdem fatis indicia sunt (*r**). Idem copia salem fixum suprat (*s*).

Hujus multa talis diversa ad sanguinem portio est, quam diversi scriptores referunt, ut enormis hic varietas sit. *J. Conradus BARCHUSEN* ex unciis octo sanguinis ovilli, de sero suo separati, atque adeo fere ex unciis sedecim sanguinis totius duo grana habet, five $\frac{1}{140}$, sanguinis (*t*). *Gualtherus NEEDHAM* ex carbonis sanguinis five extracti unciis sex, & sanguinis rubri unciis decem, atque adeo ex 20 fere unciis sanguinis totius, habuit grana 8 five $\frac{1}{100}$ (*u*). *VIEUSSENUS* in altero experimento

(*b*) *BORRICH*. L. c.

[*c*] *BOYLE* L. c. *BROWNE LANGRISH* L. c. p. 82.

[*d*] *BOYLE* p. 46.

[*e*] *BEDDINGEY* *Essays d'Anat.* disc. 2. *SANDRIS* p. 10.

[*f*] Vide locc. seqq. conf. *RADDE* p. 7.

[*g*] *GREW* *Cosmolog. sacr.* p. 15. 16. *BOYLE* app. p. 36.

[*h*] *LANCESIUS* ad *MERCATORI* metalloboecani p. 37. & in *dissert.* IV.

[*i*] *SCHWENKE* p. 150. *MACQUER* *chym. prat.* p. 458. Habet eundem *POTTIUS* *de febrib.* L. L. c. 23.

[*k*] *Memoir. de l'Acad. des scienc.* 1730. p. 124.

[*l*] *HENKEL* *flor. Saturni* p. 243. *VIEUSSENS* *reftory* ad *med. Rom.* *NEUMANN* edit. *ZIMMERM.* p. 1221. *WALLERIUS* ad *HIARNE T.* II. p. 70. *POTTIUS* L. c. *RUTTY* *synops.* T. I. p. 457.

[*m*] *GEOROI* *Memoir. de l'Acad. des scienc.* 1732. p. 19.

[*n*] *HAVERS* *de offb. MACQUER* p. 478. *GEOROI* L. c. p. 17. 18.

[*o*] *HENKEL* L. c. In aselli carne, *BARCHUSEN* post acronata. exp. 10. ad gr. 5. ex unciis quatuor.

[*p*] *MACQUER* p. 455.

[*h*] *BORRICH* *sapient. egyp. fermet.* p. 401. sales nempe cubicæ figuræ.

[*r*] *ALBINUS* *de phosphoro*, *BOERHAAVE* T. II. proc. 95. Ex capite mortuo phosphori *HOMBERG* *Memoir. de l'Acad.* 1712, p. 274.

[*r**] *Crystalli* salium plantarum pleraque cubicæ sunt *Graw* *Cosmolog. sacr.* p. 15. 16.

[*s*] *POTTIUS* L. c.

[*t*] Post acronata exper. xl.

[*u*] L. c. p. 235.

Haller Physiolog. Tom. II.

P

mento (x) de fanguinis siccii uncisi viginti, aut totius fanguinis uncisi centum, drachmas duas, grana sex, cum dimidio habet, five $\frac{1}{2}$. In altero experimento ex 179 uncisi fanguinis integri elicuit unciam semis, grana novem, five $\frac{1}{4}$ (y). In tertio de libris quinquaginta unciam unam elicuit five $\frac{1}{8}$ (z). Idem ex olei uncia grana salis octo (a) ex-traxit. *Caspar NEUMANN* de libra scrupulum dimidium, five $\frac{1}{16}$ (b). *Thomas PINELLUS* ex podagrino, cui sal fanguinis abundat, de libra una drachmam dimidiatur five $\frac{1}{16}$ (c), si libra medica est, vigesies maiorem copiam quam quidem *BARCHUSEN*. *Robertus BOYLE* ex siccii cruris uncisi duodecim sex scrupulos elicuit five $\frac{1}{16}$ (d), quae, si quadruplum sumseris pro sanguine toto, portio iterum est $\frac{1}{128}$ totius fanguinis.

Sed etiam iste sal in variis corporis humani temperamentis morbive alia est copia aliaque. In fano juvene *Brounne LANGRISH*, in uncisi fanguinis octo repererat grana quinque five $\frac{1}{8}$ (e). In quinquagenario grana fuerunt octo five $\frac{1}{16}$ (f). Secundo die febris ardentis nonnisi grana quatuor (g) & semifse, & quarto die grana sex, five $\frac{1}{16}$ ejusdem salis invenit, sed in febre manifestius lixiviosi (h). In sanguine bubulo salis fixi de libris sex fuerunt scrupuli 5, grana 4, five $\frac{1}{16}$ (i).

§. XLI. Acor sanguinis.

In eo sale fanguinis, qui ignis violentiam tolerat, primus (i^*), ni fallor, *Raymundus VIEUSSENS* five ex proprio experimento, five ab aliis monitus (k), acidum liquorem invenit. Majorem nempe, quam haec tenus

[x] *Traité des liqueurs* p. 28.

[y] p. 18.

[z] Epist. tr. des liqueurs p. 71.

[a] *Dense dissertationes*.

[b] *Oper. chem.* T. III. p. 763.

[c] l. c. p. 50.

[d] *Apparad.* p. 6.

[e] p. 80.

[f] p. 82.

[g] p. 82.

[h] p. 83.

[i] *N E Z D H A M* l. c. p. 134.

(i^*) Habet tamen *POTERIUS* ex face sanguinis de qua spiritus destillavit, salem copiosum, subacida dulcedine, nitri & ammoniaci salis adhuc l. c.

(k) Habuisse a Cl. SIDOBRE, *Petrus CHIRAC* in *réflexions préliminaires aux trois lettres*.

haec tenus tentatum fuerat, sanguinis copiam in calcem reduxit, inde lxivio facto, salem fixum novo & vehementer igne torcit (*l*). Ita paucum omnino acorem, & de quinquaginta sanguinis libris omnino drachmas quatuor grana octodecim (*m*), inque alio experimento, ex uncia salis fixi sanguinis drachmas tres vere acidi, meraci liquoris obtinuit (*n*). Prior portio est totius sanguinis $\frac{7}{14}\frac{1}{3}$, altera $\frac{1}{13}\frac{1}{3}$. Eum nunc acorem, sub principia hujus seculi, medicorum principes non valde lubenter recipiebant, qui nuper acidam illam T A C H E N I A N A M & H E L M O N T I A N A M morborum theoriam refutassent, neque facile persuaderentur, in animalium sanguine verum acorem reperiri. Quare, quod invenerant acidi liquoris Romani Medici (*o*), & princeps L A N C I S I U S (*p*), tum H. B O E R H A A V E (*q*) aliique (*r*), id omne ad salem marinum retulerunt, qui pertinax in liquoribus humanis residet, nuper in sudore a T heodoro T R O N C H I N (*s*), celeberrimo medico detectus. Bolum alii (*t*) accusarunt, quam destillationi suae V I E U S S E N I U S addiderat, in quo certe terrarum genere verus acor vitriolici generis latet. Alii utrumque fontem conjunxerunt (*u*), aerem accusarunt alii (*x*); nuper denique Itali medici, breviter nodum gordium secarunt, ut hunc acidum laticem omnino reperiri negarent (*y*).

Contra VIEUSSENIUS decus suum inventumque acriter tuebatur: & quidem non ex bolo (*z*) esse facile ostendit, cum perinde absque bolo, adhibita arena (*a*), bolove (*b*), de qua omnis acor follicite eductus fuisset, aut denique sanguinis solis fæcibus (*c*) adjectis, perinde

P 2

de

(*l*) In deux dissertations: in Epist. ad quasdam medicin. facult. in tr. des liqueurs p. 70. &c.

(*m*) Traité des liqueurs p. c.

(*n*) Ibid. p. 73.

(*o*) Ibidem. Transfall. n. 254.

(*p*) Ad M E R G A T I metalloch. p. 37. diff. IV.

(*q*) I. c. process. 101. 126.

(*r*) H A N N de sale fals. p. xxx.

[*s*] In L. Colic. p. 17. In vitriariorum inclusis congelatum saltem vidi, num manus esset, non memini me inquisivisse.

[*t*] Conf. VIEUSSENS deux diff. p. 11.

[*u*] PISTOIAE de opera quam præstat acidum & alkali p. 159.

[*x*] Cui sanguis diutius expositus fuisset PINELLI p. 224. 229.

[*y*] In pref. ad GHISI Lettere, in qua citantur experimenta Florentiz facta a.

1747.

[*z*] Etsi in bolo acidum sedet VIEUSSENS diff. p. 19.

[*a*] Traité des liqueurs p. 66.

[*b*] Deux diff. p. 16.

[*c*] Traité des liqueurs p. 113.

de sanguine acidus liquor stillet. Sed neque a sale marino esse, cum idem ex bovis (*d*) vitulive [*e*] sanguine acor obtineatur, addit: quam quidem *VIEUSSENII* apologiam *HOMBERGII* [*f*] industria confirmavit. Is enim vir ex omnibus animalibus ejusdem indolis acidum spiritum paravit.

Alium etiam a marino sale in humanis humoribus acorem latere, phosphori arguento ostenditur, in quo non salis marini unice acor, sed etiam aliis, vitriolici ingenii, per experimenta eruitur [*g*], & majori copia quidem, quam ille de muria acidus latex [*h*].

Nobis adeo facillimum videtur, acidi spiritus, qui de sale fixo sanguinis adscendit, partem a marino sale esse [*i*], partem ab acida vegetabili natura, quam nulla vis vitae animalis penitus destruit. Inde intelligitur, quare si liquores evidentissimum acorem & plurimum contineant, qui partum a natura vegetabili dissentiant, & celerrime generantur [*k*]: cur partior ex ordine acoris copia in iis corporis animalis partibus sit, quae longo vitae labore generantur [*l*], nullus ergo ex solidis [*m*] animalium partibus obtineatur, uti convincitur ex collata analysi ossium [*n*], cartilagineum [*o*], ungularum [*p*], cornuum [*q*], carnium [*r*], tendinum [*s*], pilorum [*t*], serici [*u*], cerebri [*x*], nervorum [*y*], unionum [*z*], calculi

[*d*] *Deux diff.* p. 16.

[*e*] *Traité des liqueurs* p. 61.

[*f*] *Mémoir. de l'Acad.* 1712. l. c.

[*g*] *BOERHAAVE* l. c. prop. 101. *HOMBERG* l. c. p. 274-275. *PENTZKI de phosphoro marina*.

[*h*] *PENTZKI* ibid.

[*i*] *HENKEL rediicio*. p. 177.

[*k*] Lac, butyrum, adeps L. L. p. 31.

[*l*] Ut in bile.

[*m*] *GERIKE Chym.* p. 176.

1249. [*n*] *GORTER Chirurg.* p. 24. *NEUMANN ex edit. ZIMMERM.* p. 1148. *MACQUER* l. c. p. 478.

[*o*] *BARCHUSEN* l. c. exp. 14.

[*p*] *BARCHUSEN* exp. 20. *NEUMANN* p. 1351.

[*q*] *BARCHUSEN* exp. 1. *FRANK de magisib. moustros.*

[*r*] *NEUMANN* l. c. p. 1206. *BARCHUSEN* exp. 12. *B. LANGFISH* p. 54.

[*s*] *IDEM* ibid. p. 51. *BARCHUSEN* exp. 13.

[*t*] *NEUMANN* l. c. p. 1306.

[*u*] *NEUMANN* ibid.

[*x*] *NEUMANN* T. III. p. 656. ed. nov.

[*y*] *PINKELLI* p. 163.

[*z*] *NEUMANN* p. 1285. ed. ZIMM.

calculi [a] humani. Facile enim intelligitur vegetabilem cibum mutari plurimum, donec in solidas animalis partes mutetur. Male adeo DIPPELIUS (b), glandulas animalium acidum laticem stillare docuit, & si unquam ex carnis acidus liquor prodiit, eum adipi non separato non iniqui tribuimus (c).

Cæterum in eo a VIEUSSENIO recedere oportet, qui acidum in sanguine fluctuare scripsit, ut moneamus, non ideo sincerum in sanguine acorem esse, quia ex eo ab igne expellitur, uti in farina non est, et si cum aqua pasta acepsit.

§. XLII. Terra sanguinis.

Sale privata terra simplicissima superest (d), quæ calci accedit, & cum acidis effervescit (e). Ejus iterum ad sanguinem ratio varie sumta est. Cl. noster RHADES, cuius experimenta pleraque vidi (f), & plurimi facio, æstimat ad $\frac{1}{35}$ totius sanguinis. Raymundus VIEUSSENS ex uncisi centum sanguinis grana obtinuit 165 (g), quæ pars est $\frac{1}{27}$ aliquantum tamen terræ in (h) oleo eupyreumatico latuit. Ex duodecim uncisi siccii sanguinis Robertus BOYLE (i) scrupulos habuit quatuordecim, five $\frac{1}{2}$, si siccii crux portionem ad toum sanguinem subquadraplam feceris. In alio experimento ex uncisi 24 grana produxit 129 (k) five $\frac{1}{2}$. Clar. FLUTTON æstimat ad 35 millesimas five $\frac{1}{2}$ (l). VERHEYENIUS ad duas drachmas ex uncisi septem sanguinis (m) five $\frac{1}{2}$.

P 3

In

[a] BOKERHAARKE *prædict. de calc.* p. 13. ROBINSON *of the stone p. 47. 57. SLAKE pbl. trans. n. 157. MARTS apud BIRCH T. IV. p. 252. De calculis sternentis Mem. de Chir. T. III. p. 15. ex bile, puto, natis.*

[b] Vit. anim. mort. & medic. p. 53. 129. Negat ipse commentator p. 129.

[c] NAVIER I. c. p. 34. seqq.

[d] JUNKER edit. gall. T. I. p. 508. Hinc ossium animalium eluti cineres igni resistunt, & ad exploratorias testas feliguntur. In phosphoro vitrescibilis reperta est apud PENTZKI p. 22. & in offibus pariter humanis apud HENKEL in flor. satyrizante p. 372. etiam terra vitrescibilis latet, si major vis ignis accesserit.

[e] BOYLE *de origine qualit. & form.* p. 139.

[f] *De ferro sanguinis p. 10.*

[g] *Traité des liqueurs p. 28.*

[h] IDEM.

[i] *Append.* p. 6.

[k] *Apparatus.* p. 46.

[l] I. c.

[m] p. 37.

In hircino sanguine solam absque sale terram reperit *Johannes Hill* (*n*).

Eadem terra multis modis etiam absque chemia demonstratur, in urinæ sedimentis, concretionibus fabulosis, osseis. In sanguine scorbutici & arthritici hominis sebaceum quid crassumque natabat, quod in gypseam & fere lapideam naturam abiit (*o*); & arenularum etiam meminerunt Cl. viri, quæ in sanguine fuerint (*o**). Eadem terra, de ossibus humanis aceti ope extorta, in crystallos (*p*) vertitur.

§. XLIII. *Ferrum sanguinis.*

Sed neque hæc terra simplex est aut sincera. Dudum innotuit, terras paßim (*q*), & aquas minerales aliasve, ferrum continere, aut certe calcem, quam magnes trahit. In calculo humano particulas dudum *LISTERUS* reperit, quæ magnetem sequebantur (*r*). Inde repertum est, in cespitum cineribus, in fece a destillato oleo lini, & terebinthinae (*s*) reliqua, in plantisque plurimis exustis (*t*) cineris particulas continentri, de quibus magnes micas aliquas trahit. Aliquamdiu receptum fuit, hoc ferrum unice in plantis reperiiri, & ab animalium partibus abesse, paulatim vero etiam in animalibus repertum est (*u*), in lumbricis (*x*), & in variorum animalium ossibus (*y*), parca equidem copia, inque carne (*z*), & urinæ terra (*a*). Primi in ipso hominum sanguine Itali reper-

(*n*) *Mater. med.* p. 874.

(*o*) *Act. medic. Budissin.* p. 73.

(*o**) *C. Aug. a BERGEN* diss. cit. p. 26. lapillorumque *Epb. Nat. Chr. Dec. I. ann. I. obf.* 65.

(*p*) *NAVIER* I. c. p. 9 & in meo *mémoire sur la format. des or Exp. 81. 93.*

(*q*) *Conf. GALEACIUS* I. c. p. 38. *Comment. Bonon. T. II. P. II.* & celebre experimentum ferri, quod *STANILIUS* ex argilla cum olio paravit.

(*r*) *De aqua medic.* diss. II. p. 143.

(*s*) *MUSSCHENBROECK* *Essays de physique* p. 289.

(*t*) *Mémoir. de l'Acad. des scienc. 1704. 1705. 1706. 1707. & 1708. NEUMANN* p. 152. edit. *ZIMMERM.* & in *lett. public.* anno 1732. editis p. 373. *GALEACIUS* p. 29. qui equidem plus ferri in iis stirpibus reperiiri addit, que circa ferrarias officinas naſcentur p. 31. 32.

(*u*) *NEUMANN* I. c. Addit. *MENGHINUS* ciuca ferrarias Ilvæ officinas hoc ferrum Ilvensi simile esse *Comment. Bonon. T. II. P. II.* p. 262.

(*x*) In his abundat *GALEACIUS* p. 29.

(*y*) *MENGHINUS* p. 251. in cane perpacum, in homine ex libris duabus quintam grani partem.

[*z*] *MENGHINUS* ibid. *GALEACIUS* p. 29. Plus tamen quam offa habent.

[*a*] *SCHLOSSER* de *sale turice* p. 15.

pererunt, *Josephus BADIA* [b], *Dominicus Gusmann GALLACIUS* [c] & *Vincentius MENGHINUS* [d]. Inde in germania experimenta repetita sunt, tum a Clarissimo juvene RHADES, me auctore & teste [e], tum ab erudito anonymo, cuius experimenta in *hamburgensi diario* existant [f], aque Cl. WIDMER [g]. Ergo, si de sanguine in crucibulum recepto vivo igne celeriter aquam & oleum cum odore [h], & flamma [i] dispuleris, abibit totus vitalis liquor in calcem rubram, croci martis haec tenus similem. Huic obiter tritae calci, si magnes propius adhibeat, aut ferrum, magnetica vi armatum, ita subito ad eum magnetem, vis satis magna micarum de calce sanguinis partim advolabit (k), & partim sponte adhaerebit admoto (l), aut certe adglutinabitur, si calor accesserit (m). Sed etiam in sanguine ad lenem ignem siccato particule sunt, quas magnes adtrahit (n), ægrius equidem, quam in ea calce, quæ violenti ignis vim toleravit [o].

Veram esse terram ferri constat, quod adjecto phlogisto quoconque corpore (p), & etiam absque ea additione, si ignis (q) vehementior fuerit, micæ de sanguine extractæ in verum ferrum fusæ confluunt. Ex eadem materie cum ammoniaco sale, flores flavi parantur (r), & siccus cruor cum sale lixivioso fusus solutusque ab adjecto spiritu vitrioli cœruleum Borussicum pulverem præcipitem deponit (s), nullo aut ferro aut vitriolo adjecto. Cum gallarum solutione calx sanguinis [t] atramentum efficit, uti
cum

[b] *Opuscul. scientif. filolog.* T. 18. p. 242. in sanguine virginis epilepticæ.

[c] *Comment. Bononi.* I. c. p. 20. seqq.

[d] Ibid. p. 241. seqq.

[e] In diss. *de ferro sanguinis* Gotting. 1753.

[f] *Hamburgisches Magazin* T. XIII. n. 1.

[g] *Vom murggräflichen bade* p. 188.

[h] RHADES p. 6.

[i] IDEM ibid.

[k] RHADES p. 7. Vocat particulas primi generis III. MENGHINUS p. 245.

247.

[l] MENGHINUS I. c.

[m] MENGHINUS p. 248.

[n] MENGHINUS p. 259.

[o] p. 160.

(p) *Hamburg. Mag.* I. c.

(q) MENGHINUS p. 262.

(r) RHADES p. 11.

(s) IDEM ibid. Hoc pigmentum Societati Regiae Scientiarum obtulimus.

(t) RHADES p. 12. *Hamburg. Magaz.* I. c.

cum vitrioli oleo atramentum dare dudum **M A L P I G H I U S** [u] videbat, & sedimentum a destillatione sanguinis superstes, cum acido vitrilico vitriolum subviride, atque martiali simile restituit [x]. Denique vitrum metallicum fusco colore tingit, ut ferrum solet [x*].

Num vero haec ferri terra in plantis [y] inque sanguine jam sua adsit, num per calcinationem denum nascatur [z] oleo ad terram remisto, quæri haecenus potest, ut tamen memores sumus, absque ea violentia, tamen de sanguine & sero ferrum nasci.

Reperitur autem in hominis & animalium sanguine, ut in canis, equi, bovis, avium, anguilla ranaeque cruento. Homo omnium plurimum habet [a], inde quadrupeda [b] calida, parcior rani est [c], avibus [d] iterum minor copia, paucissima in piscibus (e). Paratur potissimum ex ipso cruento, exque rubris globulis (f). In sero (g) inque crusta pleuritica (h) & albumine (i) reperitur utique, sed minori longe copia, & omnium parcissimum in adipi (k). Ex uncii sanguinis undecim Cl. R H A D E S grana calcis habuit 23 (l), quæ eluta redierunt ad terræ ferreæ grana decem cum semisse, five partem pene $\frac{1}{3}$. Alias ex uncii duodecim calcis cruentis grana prodierunt 24. terræ trédecim grana cum dimidio, five partes $\frac{1}{17}$, & alias paulum diversa ratio fuit. Anonymus (m) croci copiam ex duabus sanguinis libris aestimavit ad drachmas tres, grana

(u) *Pofthuu*, p. 3.

(x) *R H A D E S* l. c.

(y) Verum in plantis ferrum esse defendebat **L E M E R Y** l. c. ann. 1706. 1708. Negabat plenum metallum esse, & per ignem denum nasci adiecerabat Cl. **G O R D O N** ann. 1707.

(z) Ita in *Hamburg. magaz.* T. XV. p. 44.

(a) *M E N G H I N U S* p. 251.

(b) Ibid. Crocus ferreus in homine habet se ad eundem in bove crocum uti 350 ad 300.

(c) Tertia fere pars calcis ferrumi est *M E N G H I N U S* p. 250.

(d) *M E N G H I N U S* ibid. & p. 257. 258. Dimidio minor portio est, quam quadrupedum.

(e) *M E N G H I N U S* p. 250. 257.

(f) *I D E M* p. 255. 257. 258.

(g) p. 254.

(h) *W I D M E R* p. 189.

(i) *I D E M* ibid.

(k) *M E N G H I N U S* p. 252.

(l) p. 7.

(m) l. c.

na 15, quæ quidem copia multo major est, quam in prioribus experimentis. *Vincentius MENGHINUS* (n) ex globulorum humani sanguinis unciis duabus elicuit calcis scupulum, quam magnes trahebat, eratque in ejus viri experimentis ferri portio ad sanguinem ut 1 ad 120 (o).

Non obscurum ceterum est, unde ferrum in sanguinem adveniat. Nam & aquæ bene multæ ferrum a volatili acido dissolutum vehunt, & terræ pleræque in toto terrarum orbe aliquam ejus metalli portionem continent, & plantæ denique, quibus alimur, eodem abundant. Quare vero homo plus ferri in sanguine suo, quam animalia habeat, quadrupeda vero aves piscesque supereant, non facile dixeris, nisi forte portio globulorum in eadem ratione sit, quod vix probabile videtur.

§. XLIV. Aer sanguinis.

Etsi alio loco de hoc elemento dicere præstat, non omnino tamen in chemicæ analyseos historia omittendum videtur, cum non a putredine sola, sed in primis etiam a vehementiori igne de acre liberetur, cuius omnino non exiguum portionem efficit. Cum enim Cl. HALES sanguinem suillum ex retorto vase vitro igne ad plenam siccitatem usque urgeret, utique triginta & tres aeris pollices de sanguinis cubico pollice in excipulum transferunt (p) totidemque unciis aquam repulerunt, quæ in eo excipulo continebatur. Quare, cum aer fere millies sanguine levior sit (q), utique fere trigesima tertia pars totius sanguinis verus est aer, ita in reliquo humore dissolutus, ut nulla ejus bulla adpareat (r). Cl. FLUTTON (s) aeris portionem ad 147 millesimas estimavit. Sed is quidem calculus nimius est. Plus in cruento, quam in sero, aeris esse videtur.

§. XLV.

(n) p. 263.

(o) p. 249.

(p) *Vegetable Statik* exp. 49.

(q) Ad aquam aeris pondus se habet ut 1 ad 85c. fere, sed sanguis aqua gravior est, fere uti 1053, ad 1000. p. 40.

(r) LEBUWENHOEK *Philos. transact.* n. 145. *Second mem. sur le mouv. du sang* p. 188. n. 3.

(s) L. c. p. 7.

§. XLV. *Alia elementa humorum nostrorum.*

Ex carne vervecum, aut ex lache potius equino (*t*), verum inflammabilem spiritum elici, clari autores sunt. Sed de eo, ceterum parva probabili, humorum animalium elemento, rectius dicetur, quando de lacte fermo erit.

Elementum electricum in sanguine etiam reperitur, & quando de vena hominis electricam naturam induit salit, pluvia inde lucida exit (*u*).

SEC TIO III.

Serum sanguinis.§. I. *In universum.*

HOC nomine flavescentem, & aquosam sanguinis partem intelligimus, quæ de cruro decedit, & ex continuato sudore aucta, flavum efficit laticem, qui rubrani insulam circumfluit. Ejus quidem laticis non simplex natura est, quamdiu tamen varia ejus elementa confusa unicum in liquorem miscentur, sapor seri falsus (*x*) est, ut tamen ab igne falsedo augeatur. Lixiviosæ naturæ, aut acidæ (*y*) signum nullum edit, dum sincerum est. Pondus hujus laticis aliquantum, quam rubræ parti sanguinis minus est (*z*), uti suo loco exposuimus, ceterum quam aquæ majus. Rationes aliquantum diverse reperiuntur. Jacobus JURIN ad aquam reputit esse, uti 1030 ad 1000 (*a*), & paululum aliter Georgius MARTINE uti 1032 ad 1000 (*b*), quando friget, calidum enim rarescit, & ad

[*t*] Conf. *Comm. Lit. Noric.* 1732. libd. 21. & 1738. h. 42. Deinde olim *CARDANUM de subtil. L. VIII.* LUCAS Relat. de la tartarie quæ prodit in *Recueil des voyages au nord T. X.* p. 23. *Recueil d'Obj. cur.* T. II. p. 241. & in *descriptione Ajaunica Cathaueriet suecice edita.*

[*u*] Des Hais de bempleg. per electric. curand.

[*x*] *Opusc. scientif. physiol.* T. XVIII. p. 230. Aqua hydropica salsa est DUVERRNEY *Mém. de l'Acad. des scienc.* 1701. p. 151.

[*y*] BOERHAAVE *ELEM. Chem.* T. II. n. 114. *Bonum de mensir. univers.* p. 479. RHADEX p. 18. De sero hydropico. GMELIN *Cognosc. Lit. Noric.* 1745. libd. 52.

[*z*] p. 39. 40.

[*a*] *Diff. VIII.* p. 103.

[*b*] *Edim. Essays* T. II. p. 101.

ad aquam nunc est, uti 1021^g ad 1000 (c). *Johannes TABOR* fere eandem rationem facit, nempe 1032 $\frac{2}{3}$ (d). *Georgius Ehrhard HAMBERGER* uti 1036 ad 1000 (e) & *Petrus v. MUSSCHENBROECK* uti 1027 ad 1000 (f). *Johannes SILBERLING* uti 1037 (g) (ad sumnum) ad 1000, & quando minimum, uti 1027 ad 1000. *Adolphus Fridericus HOEFMAN* pondus feri ad aquæ pondus ponit se habere, pene uti 1034 ad 1000 (h).

Idem pondus augetur in febre, ut serum hominis febrentis, sit ad serum sani hominis, uti 10363, 10381, 10399, & 10409 ad 10300 (i), vel uti 571, 572, 574 ad 551 (k). Cum ætate hominis hoc idem pondus decrescere auctor est *Bryan ROBINSON* (l), ut serum anno ætatis octavo pendeat 10277, anno 72 unice 10266 improbabiliter certe experimento, cum æquum sit creditu, in universis corporis humani humoribus tertæ portionem perinde cum senio crescere. Nisi forte in senibus aqua, in juvenibus gelatinosa pars in sero dominatur. Sed agnini tam sanguinis serum levissimum reperit *HAMBERGERUS*, ut sit ad humanum uti 494^g ad 502^f (l*). Ali quanto albumine levius est, uti quidem exspectari poterat, cum in albumine membranæ sint, partes vero solidæ fluidas pondere superare soleant. Ovi pondus est 1090 cuticulæ vero albæ ex sero natae pondus 1082 (m), habetque se serum ad albumen, uti 569 ad 575 (n).

Lympha lac paulum pondere superat (o).

Q. 2

§. II.

[c] Ibid.

[d] p. 64, uti 569 ad 551.

[e] *Physiol. med.* p. 5, nempe uti 502^f ad 485. Vaccini vero feri rationem ad aquam facit, uti ut 505^g ad eundem numerum, canini ut 500, agnini ut 494^g.

[f] *Inflit. Physi.* p. 364.

[g] Nempe uti 299, 298, & 296 ad 288, de pondere sp̄cif. humor. corp. bunn. p. 14.

[h] *Nov. hypoth. physiol.* p. 6, nempe uti 1938, 1875.

[i] *Bryan ROBINSON Anim. Oecon.* T. II. p. 430.

[k] *TABOR* p. 64.

(l) l. c. p. 415.

(l*) l. c.

(m) *DAVIS philos. transact.* n. 488.

(n) *TABOR* p. 65.

[o] Serum est ad lac uti 569 ad 567 vel 568. *TABOR* p. 64.

§. II. *Seri pars quæ cogitur sive gelatinosa.*

In sero, aquam, perpetuo fluidam reperimus, tum mucum, qui hancenius consistit, ut a fluida natura paulum distet, denique gelatinam, quæ variis ex causis tremulum in gelu cogitur. Quando totum serum commixtum est, totum etiam addensatur, ut omnino in eo natura gelatinosa dominetur, neque aquæ copia, quæ in sero maxima est, vim potest impeditre, qua gelatinosæ moleculæ se trahunt. Aquæ vero portio tanta est, ut in decem libris partis albuminosæ seri libra (*p*) una, uncia decem cum semisse repertæ sint, etsi facile credo Johanni Bonn, qui incertam concrescibilis gelatinæ portionem esse mouuit (*q*). In sero sanguinis taurini tamen plus dimidia pars aqua est (*r*), in humano sero longe major, ad $\frac{2}{3}$ in Cl. RHADÆS experimento (*s*). Fluiditas modico cum calore major quam grumo est, ut omnino crux sponte coeat, serum vero de fano sanguine sudans non perinde sponte sua addensetur, inque fani pariter hominis cadavere fluidum semper reperiatur, nisi in animalibus calidioribus, quibus in pericardio in gelatinæ naturam sponte coit [*t*]. Sed ejusmodi animalibus ipsa etiam urina (*u*) viscida est, & coagulo proxima. Multis tamen modis serum sanguinis cogitur. Extractum ignis ope de animalium carnis serum, in frigore sponte sua stat, inque gelu abit: in eadem frigida pars certe lymphæ, de qua paulo plura dicere oportebit, in tenerissimi gelu speciem colligitur. Deinde calor (*x*) paulo major, quo aqua nondum ebulliat, graduum tamen 148 & (*y*) 150, thermometri FAHRENHEITIANI, utique serosam sanguinis partem cogit, hoc cum discrimine, ut crux ruber nulla sui jactura facta consistat, serum vero magnam sui ponderis partem prius amittat, quam in gelu coeat, quam partem ad duas tertias

Johannes

(*p*) VIEUSSENS traité des liqueurs p. 20.(*q*) De mensu suo univers. p. 454.(*r*) BERCHL. c. T. III. p. 235.(*s*) p. 21.[*t*] L. IV. p. 284.[*u*] Urina cervi refrigerata ad sebi modum concrescit EPH. NAT. CUR. DISC. I. ann. 8. abf. 30. & semen arietis BUFFON T. V. p. 21.(*x*) BOYLE apparatus p. 133. PETIT epist. II. p. 25.(*y*) SCHWENCKE p. 139. BOERHAAVE Elem. Chem. T. II. exp. 116. 117. SHEDD BARK T. II. p. 31. VERDUC T. I. p. 355. In lymphâ eadem natura est VERHEYEN T. II. p. 103. & in sero hydroponico non putrido BLAIR miscell. p. 128. HESTER de hydrocele p. 15. LITTRÉ Mem. de l'Acad. des scienc. 1701. p. 503. GEMELIN Commerc. Lit. Noric. 1745, hebd. 59.

Johannes TABOR (z), ad tres omnino quartas partes *Antonius de HEYDE* (a), estimat. Curiosus olim auditor noster Cl. RHADES (b) serum sanguinis in caloris 148 gradu FAHRENHEITIANO opacum reddi, ad 150 vaporem emittere, ad 151 in gelatinam cogi, ad 152 albuminosum coagulum imitari observavit. In Cl. *Francisci BOISSIER* experimento, reductis gradibus, lympha gradu fere 141 incipit albescere, gradu vero 158 vel 160 cogitur in corium (c).

Coagulabilis ista indeoles seri sanguinis primum *Guilielmo HARVEIO* (d) innotuisse videtur, qui serum coctum in mucilaginem abire vidit, quod inde experimentum a *BARTHOLINO* (e), *PECQUETO* [f], aliisque repetitum est. Post eum Cl. *GOLZADIUS*, *Hieronymo BARBATO* [g] Patavii eamdem seri naturam demonstravit, & prior forte, & ante a. 1650 hibernus medicus aliter persuaso *FRIZIMELICR* eam densabilem indolem ostendit [h].

Sed etiam absque tanta ignis violentia serum sanguinis, aut sponte per quietem in vivo animale cogitur, aut ex morbis. A quiete quidem coire saepe vidi, in animalibus minime aut calidis, aut grandibus, neque enim alia alba illa gelatina est, qua circa vulnera arteriarum [i] & venarum plurima circumfunditur, & qua eadem in ipsis vasibus sanguinem vehentibus non raro adeo solida consistit, ut per solidas vias ruber crux sibi vasorum aperiat [k]. Eadem, procul dubio, etiam in homine postem ejus operculo constituit, quod magnorum vulnerum arteriosorum ostia claudit [l]. Deinde ad serum sanguinis pars magna polyporum pertinet, quam pallor [m] ipse prodit,

Q 3

&

(z) p. 64.

(a) Obf. 87.

(b) I. c. p. 17. 30.

(c) *De inflammatis*. p. 240.(d) *De gener. anim.* p. 161.(e) *Labb. thorac.* p. 46. *bif. 49. Cent. III. anat. renov.* p. 134.(f) *Diss. anatom.* p. 42.(g) *De sero sanguinis* p. 153.[b] Apud *BENINGER* *Centur.* I. obf. 13. qui idem testis oculatus fuit.[i] *Second memoir. Exp. 88. 153. 154. 155. 157. 163. 167. 170. 171. 176. 183. 189.*

RE MUS p. 65.

[k] *Exp. 180. 183.*[l] v. g. *PETIT Mem. de l'Acad. des sciences*. 1732. p. 392. 393. Pelliculam vocant *Plac. Transfici.* 1755. n. 10. quae super vulnera nascatur, & septum per lucidum la Fosse obf. p. 71.[m] *CHIVLET obf. 16.* Polypi albi & subalbi *MALPIGH. pagellum.* p. 45. *BARRERE obf. anat.* p. 100. ed. nov. p. 104. seqq. *VANDERMONDE* T. II. p. 97. 58. *PISSENIUS de Diabete* p. 131. ex *ELIDAO PADUANO*.

& quæ fecit, ut vetusti scriptores, polypos cum adipe (n), cum sebo (o), cum medulla (p), cum pituita (p*), cum gelatina (p**), cum muco (q), cum tendine denique (r) compararent. Ex filamentis albuminosis polypos olim *Samuel COLLINS* (s) deduxit, & *TYSON* (s*) & polyporum fundamentum lympham esse illi. *SENAC* (t) auctor est.

Iterum vix potest dubitari, quin idem sanguinis serum materiam *cru-
stæ* illi satis celebri præbeat, quæ in sanguine natat, quoties cum in-
flammatione, pulsusque duro febris acuta conjungitur (u), & quam vul-
go *pleuriticam* vocant, et si etiam intermittente in febre (u*), & in an-
gina, in catarrho (u**), in variolis (u***), in colico dolore (x), in rheumatismo (y), in podagra (z), in maligna febre (a), in hydro-
phobia (b) passim reperitur, & a seminarum gravidarum sanguine raro
tota abest (c). Multa quidem in hac crusta paradoxa sunt, quorum
causas

[n] *WELSCH* *epifugm.* obf. 15. *HOFMAX de pingued.* n. 23. Pingues adeo credit
III. *BOEHMER*, ut etiam inflammabiles faciat de *præcav.* *polyp.* gener.

[o] *HIPP.* *BOSCUS in facute. anat.*

[p] *SMETIUS miscell.* T. X. p. 523. *BLANCARD chirurg.* p. 431.

[p*] *TULP.* L. I. obf. 27. *PISSENIUS* l. c. Ad 20 uncias in dextro ventriculo
BLAS L. I. obf. 19.

[p**] *SEVERIN de occult. abscess.* p. 277. in utroque cordis finu, venis, & auriculis cordis *BAYZE* *apoplex.* p. 52. §3. coagula lymphatica *SAUVAGES de inflamat.* p. 240.

[q] Mucus in membrana contentus polypum efficiebat *BOEHMER* l. c. Cum pi-
tuita comparabat *BLAS* L. I. obf. 19. & in *HORNUNGII cista* similia reperiuntur
p. 456.

[r] *PECHLIN de nigred.* *etbiop.* p. 26.

[s] *Systen. of anat.* p. 770.

[s*] *Anat. of a pygmy* p. 10.

[t] T. II. p. 460. tum *BARTROLINUS* L. I. *bift.* §2. C. *BAUHIN theatr. anat.*
ex *VESALIO* p. 218. Albam cruflam describit *MALPIGHIUS*, cuius interstitia fau-
guis ruber occupet de *polyp.* p. 126.

[u] *SCHELHAMMER de febr.* p. 55. In febribus intermittentibus sanguis spissus &
pituitæ similior *CARTHEUSER* de febre intermitt.

[n*] *QUESNAI de la saigné* p. 408. nov. ed.

[n**] *QUESNAI* ibid. p. 400.

[n***] *de HAEN* II. p. 24. 43. T. III. p. 132.

[x] v. *SWIBETEN* T. III. p. 169.

[y] *VERATTI* p. 57. *AKCSEWSKIE curat. pod.* p. 96. 97. *QUESNAI de la*
saigné nov. ed. p. 400. *De HAEN* II. p. 24. *STURBE* *phlebotom.* p. 123.

[z] *COSTE sur la goutte* p. 21. *De HAEN* rat. med. II. p. 24.

[a] *BARKER diff. on the present. scv.* p. 10. *FRANK alleiuja* p. 325. A de *HAEN*
rat. med. p. 166.

[b] *Journ. Encycloped.* T. L. p. 83.

[c] *De HAEN* rat. med. p. 109. & P. II. p. 25. *QUESNAI* l. c. p. 400.

causas nondum recte tenemus (*d*). Magis manifestam oriri, quando sanguis arcto vase excipitur, minus si amplio, magis iterum si sanguis insigniori falso eruperit, vidit Cl. vir Thomas SCHWENKE (*e*); addit Cl. de HAEN, sanguinem quo magis guttatum fluxerit, & quo rapidius, eo densiore innatantem habere crustam (*f*). Deinde, de eodem homine, eodem tempore missus sanguis in aliis vasculis crustam impositam habet, in aliis nequaquam (*g*). Denique sanguis sub ea crusta non ideo densior est, & niger fere, saepque potius magis dissolutus subest (*h*).

Utcumque haec obscura sunt, primum tamen facile ostenditur, de fero crustam nasci (*i*), cum de cuore separetur (*k*), & grumus ruber (*l*) suis manifestis dotibus subsit, neque idem in eam naturam ullo modo mutetur, aut crustae partum efficiat (*m*); neque huic sententiae obest, quod praeter crustam serum fluidum nonnunquam adeat (*n*). Recte adeo hanc crustam cum polypis *Andreas PASTA* (*o*) comparavit, cumque albumine *Franciscus QUESNAY* (*p*).

Deinde iterum certum est, a vehementer fere semper cordis actione nasci (*q*), ut sanguis in principio pleuritidis nondum coactus, secundo tertio quartove die crusta pleuristica obducatur (*r*). Una fere pulsus durus & magnus conjungitur (*s*), etiam quando febris abeat [*t*]. Porro eo durior & densior nascitur, quo major febris, duriorque pulsus est [*u*].

Hinc

[*d*] Theoriam lege, si placet, apud Cl. SHEBBEAR T. II. p. 21. Quid sit ea pellis profitetur se necire G. v. SWIETEN T. I. p. 652.

[*e*] I. c. p. 160. de HAEN T. III. p. 130.

[*f*] p. 103.

[*g*] p. 103. conf. CREGHORNE p. 246.

[*h*] IDEM p. 104. 108.

[*i*] SAUVAGES L.C. QUESNAY de la saignée ed. nov. p. 414.

[*k*] IDEM ibid.

[*l*] SCHWENKE p. 155. VERATTI L.C.

[*m*] QUESNAY de la saignée ed. nov. p. 400. 408.

[*n*] SCHWENKE, de HAEN. Idem tamen serum esse fatetur p. 157. ut ejusmodi serum sit, quod jamjam in cuorem sit transitum. Sed ea mutatio incerta est, neque cum aliis phenomenis consentit.

[*o*] De motu sanguini. p. 70. 76.

[*p*] I. c. p. 414.

[*q*] QUESNAY I. c. p. 400. 408. SCHWENKE p. 163. de HAEN. &c.

[*r*] BOERHAAVE prax. med. T. I. p. 265. G. v. SWIETEN T. III. p. 169. T. I. p. 177. PISONI spicileg. curis. p. 122. de HAEN p. 102. In variolis B. LANGRISH Plaies direct. on the finalpox p. 5.

[*s*] Danianus SINOPREUS parvus. med. p. 332.

[*t*] IDEM.

[*u*] SCHWENKE p. 156. QUESNAY p. 408. SINOPREUS p. 387.

*

Hinc in febribus catarrhalibus, crusta mollis est, dura in pleuritide [x]. Frigore etiam per aereum dominante frequentiores crustae reperiuntur [y].

Non ideo a calore febrii nascitur [z], qui nunquam eo adsurgit [a], ut gradum 148 adtingat [b], serumque cogere possit. Sed neque a diffusulo sanguine provenit [c], cum eadem cause & sanguinem dissolvant & serum, neque me dubia Cl. SWIETENII ab opinione dimovent [d]. Cum enim calor 148 graduum lympham, omnesque humores lymphæ similes cogat, in crustam pleuriticæ similem, etiam ea crusta ad densationis potius, quam dissolutionis genus pertinet. Totus in pleuriticis sanguis perinde cogitur, cum color faciei eodem cum crusta sanguinis pallore sit [d*].

Iterum, etiam in vivo homine serum nonnunquam in laminas concrevit [e], & vulgo lympham pulmonem intus infarcit [f] densumque & solidum efficit, eademque per superficiem visceris exsudans, notissima crusta hoc viscus obducit [g], inque aquis hydropticorum, sponte sua in membranas abit. Eadem in aneurysmaticis saccis videtur spatiam membranam arteriæ addere, qua ejusmodi receptacula obduci solent [h].

Eadem procul dubio materies est, quam serum ad polypos suppeditat [h*].

Ex sero etiam, neque ex cruento, oritur membrana MERRETI, qui partem sanguinis innatantem, serumque adeo, frigore in glaciem coactam, &

(x) *Mémoir. de l'Acad. de Chir.* T. I. p. 184.

(y) *BURGGRAV. de aere ag. Et locis Francof.* p. 80.

(z) Conjectura fuit Cl. QUESNAY, qui propriam opinionem candidus antiquavit *tr. des fevres* T. I. p. 119.

(a) Calor in pleuritide 102. 104. graduum *CLEGHORNUS* p. 245. 246.

(b) p. 36.

(c) *QUESNAY de la saignie* p. 406. *fibr. contin.* T. II. p. 36. 37. 39.

(d) p. 652.

(d*) *SCHWEINS* p. 164. Vide de lymphæ in calidis morbis coagulatione *SENA* T. II. p. 94.

(e) *BINNINGER Centur.* V. *obs.* 4.

(f) De phthisicis consentit Ill. *SENA* T. II. p. 467. De peripneumonicis vide *opusc. patholog.* *obs.* 14.

(g) *SENA* T. II. p. 97. 424. 425. *VALKAKENHII medic. rationi.* p. 100. 105. *KLAUNIG* *observ.* 12. *Galer. di Miner.* T. VII. p. 12. *De HAN* *med.* P. II. p. 17. 18. 43. &c.

(h) *Opusc. patholog.* *obs.* 19. *PETIT* *mémoir.* de l'Acad. des scienc. 1736. T. 10. f. 6. *RIVA* *Eph. Nat. Cur.* Dec. I. ann. I. *obs.* 18.

(h*) De *HAN* P. II. p. 17. dec. quem vide eruditæ ostendentem, ab ea materie etiam pus nasci: etiæ mihi quidem & sedes & natura puris inflammabilis hactenus repugnare videntur.

& post regelationem iterum frigori expositam, in membranam abilissime vidit (*i*), frigore enim serum sanguinis, & citius quam aqua, tardius quam crux in glaciem vertitur (*k*). Idem parum a gelu rarefit, paulo tamen quam crux magis.

Si paulo lentius crux serum coit, in firmiora tamen abit coagula, sive a vita viribus, sive a morbo, sive a calore vehementi, sive a spiritu acido, aut a vini parte spirituosa cogatur. Ita recentiores in primis galli monuerunt (*l*).

Major etiam vis ignis serum in speciem gummi fragilem & friabilem (*m*), neque potro solubilem convertit, ut summam denique duritatem acquirat (*n*). Sed etiam pleuritica crusta cum stillatio vini liquore in durissimum corium abit (*o*), & serum, leni exhalatione, sensim in gluten tenacissimum translat, collae scriniorum non dissimile (*p*). Denique albumen siccatum in gummi insipidum, & friabile addensatur (*q*).

S. III. Eadem dotes in lympha reperiuntur.

Idem sanguinis serum, aliquando modico rubore (*r*) tintum, alias omnino pellucidum, *Lymphæ* nomine in peculiari vasorum genere movertur, quod descripsimus. Fuerunt utique, qui negarent, lympham per vas aquosum meantem sero sanguinis similem esse: fuerunt qui eam lympham exhalare (*r**) scriberent; fuerunt contra, qui lympha magis aquosum serum (*s*) facerent, magisque falsum. Verum certum est, lympham recentem, perinde de gelatinosa (*t*) natura esse, perinde, post aliquam exhalantis

(*i*) BIRCH T. I. p. 164. anno 1663.

(*k*) DIESOLD de aere in liquid. humor.

(*l*) HELVETIUS éclaircissements p. 16. PETIT Memoir. de l'Acad. 1732. p. 392. 393. QUESNAT de la saignee p. 11. ed. vet. SENAC tr. du cœur T. II. p. 92.

(*m*) ELLER Mem. de Berlin T. XI. p. 25. T. VII. p. 7.

(*n*) Usi comparat LANCISIUS L. p. 10.

(*o*) SCHWEINHE p. 166.

(*p*) RHADES p. 17. A. de HEYDE obs. 67.

(*q*) Sæpe vidi, tum NEUMANN ex edit. ZIMMERMANN p. 1257. De ovo STURM phys. gener p. 133. & Eph. Nat. Dec. II. ann. III. obs. 58.

(*r*) PECHLIN obsero. p. 147. PEYR obs. 13. F. SYLVIUS diff. VIII. n. 7. VERHEYEN L. II. p. 206. Flavum DRUSSING de funct. microc. diff. VII.

(*r**) PECHLIN ibid. VERHEYEN ibid. LISTER de humor. c. 40. p. 350. ed. b.t. MALPIGH. postib. p. 162.

(*s*) Element de physiol. p. 46.

(*t*) DREILINGOURT, Nicolaus STENONIS f. apud BARTHOLINIUM Centur. IV. epist. 79.

Haller Physiolog. Tom. II.

halantis portionis jacturam, ut serum sanguinis cogi (*u*), adservatamque, etiam sponte coagulari (*x*), & cum vitriolo (*y*). Sed etiam falsum faporem [*z*] cum fero utique communem habet, & reliquas dotes [*a*].

Idem, aut paucissimis dotibus diversum serum, iterum reperimus in albumine [*b*], in vapore exhalante pericardii, pleuræ, peritonæi, in haliitu, quo minimæ cellulæ corporis animalis replentur, in hydatidibus, in hydropticis aquis, quæ ex vapore congesto nascuntur, in denso infarctu minimarum cavearum pulmonis totiusve corporis. Omnibus enim his liquoribus natura coagulabilis, & sapor, & reliqua communia sunt. Hydropticum serum [*c*], dum recens est & a putredine purum, perinde subfalsum est [*c**] & a calore cogitur, & ab alcohole, acidisque liquoribus. Idem, perinde ut sanguinis serum, coagulabilem naturam deponit [*d*], quando adservatum corrumpitur. Eadem liquoris hydatidum natura est. Sed etiam in cellulis aut cuti subjectis, aut muscularum carnibus interpositis, eam gelatinam saepissime vidi, non sine rubore. In tumore femoris succus in calida coagulabilis stetit (*e*), & in mammæ parte cancrosa (*f*), densaque. Sed in scrophulis, venereoque malo infectis corporibus lympha adeo spissa (*g*) visa est, ut sanguinis de amputato membro fluxum fitteret. In iisdem, venereo malo tactis, & venæ materie alba pituitosa ple-

næ

(*u*) BARTHOLIN *obs. lymph.* p. 79. *lymphas. homin.* p. 44, 45. DIESMER BROCK *anat.* c. 13. L. I. WEPFER *dub. anat.* p. 99. BRUMMER *de pancreate* p. 61. *de gland. duoden.* c. 4. BILLER *de motu cord.* p. 44. VERHEYEN L. II. Tr. I. p. 22. DEUSINGO *diff. de function. microcosm.* & accurate in Donaldi MONROO *diff. de hydropo.* p. 17. 18.

(*x*) KOHLHANS apud BARTHOL. *defens. contra RICOLAN.* p. 75. In gummi cait in hepate PECHLIN *obs.* p. 147.

(*y*) MALLEPIN. *pathol.* p. 152.

(*z*) RUDERICK *infid.* p. 80. BOUIN *prognost.* 13.

(*a*) BARTHOLIN *var. lymphas.* p. 79.

(*b*) Ut densius est, ita aliquanto facilius in servida coit, de HARN p. 97. PERRIER p. 32.

(*c*) THEMEL *obererageborg journal* T. II. p. 121. RHADES p. 30. Serius aliquantum GMELEN *Comm. Lit. Nor.* 1745, *tabd.* 51. VIXUSSENS *obs. d'anat.* *de prot.* p. 198. Sedimentum gelatinosum & mucosum reliqueret, quando exhalavit SENAC T. II. p. 421.

(*c**) DUVERNEY *Mem. de l'Acad. des scienc.* 1701. p. 152. Blandum albuminosum GMELEN.

(*d*) n. 4. p. 181.

(*e*) *Mem. de l'Acad. de Chir.* T. I. P. I. p. 151. P. II. p. 66. ed. 12.

(*f*) BICKET *de cancro* p. 164. conf. SENAC T. II. p. 98.

(*g*) PETIT *Mem. de l'Acad. des scienc.* 1732. p. 394.

næ reperiuntur (*h*) & lacerti pituita obducti, & eadem in coarticationes ossium, & circa periosteum congesta hæret (*i*). In morbis pulmonum diuturnis lymphaticum infarctum jam tetigi (*k*).

Sed eadem est porro lympha, quæ de carnibus animalium ab aqua calida educitur, jurique naturam alibilem impertit. In jure vitulino ^{xxv} (*l*) ejusmodi glutinosæ materiæ fuerunt, quæ in gelu consisteret. A calore enim cum aqua mista, contra a frigore, & nonnunquam modico acidii liquoris (*m*) momento, in tremulum tenerumque gelu consistit in culinis notissimum.

Junioribus animalibus aliquanto plus ejusmodi gelatinosi laticis *infest* (*n*). Video illi. Virum (*o*) ex vetustis gallis, & ex corde, plus gelatinæ *exspectare*; sed negat Cl. FREKE omnino ex vetulis animalibus gelatinam obtineri, & certe vulgo junioribus potius animalibus, vitulique, non bovis carne ad parandam gelatinam utuntur, & consentiunt experimenta Cl. virorum BECCARII & MONTII (*p*), quibus constat ex bubula carne omnino gelatinam non potuisse parari.

Alia animalia aliis magis concrescibiles humores habent, herbivora que magis quam carnivora. In cochlea humor ipse vitalis in gelu (*q*) modum *consilit*, & ex cancerorum (*r*) lapidibus gelatinæ, neque exigua portio obtinetur, sed duodecim omnino grana ex lapidum duabus drachmis.

Neque deedit piscium carni sua gelatina, minime Italis ignota (*s*), exque nonnullis aquatilium speciebus lentifissima (*t*). In universum tamen gelu de piscium, ranarum, cancerorumque carnis minus copiosum obtinetur (*u*), neque perinde facile *consilit* (*x*), ut ex viperæ carne ter-

R 2

tiam

(*b*) *ASTRUC de morb. vener.* p. 652. Polypus frequens in venereis **MALPIGII.**
poly. p. 128. & crux coriacæ de **HORN** II. p. 24.

(*i*) *Nic. MASSA de morbo neapol.* p. 109. 110.

(*k*) *Opusc. patbol.* obsf. 14. **SENAC T.** II. p. 467.

(*l*) *Comment. Bonon.* T. II. P. L.

(*m*) *VIRIDET du bon chyle* p. 153.

(*n*) *WILLIS de cerebro* p. 134. ed. Lond. 1664. §.

(*o*) **SENAC T.** II. p. 99.

(*p*) p. 122. 123. **WILLIS I. c.**

(*q*) *LISTER de cochleis* p. 30.

(*r*) *CARTHEUSSE mater. med.* P. I. n. 4.

(*s*) *VALISNER oper. omni.* T. III. p. 167.

(*t*) *CHREYN de sanit. infirm.* p. 38.

(*u*) *Comment. Bonon.* I.c. p. 100. seqq.

(*x*) *Ibid.* Cancerorum jus noua concrevit, ranarum debiliter.

tiam ejus copia partem suppeditant, quam vitulinam quidem (y). Denique in jure cancerorum, aliorumque aquaticorum animalium aliqua urinosa indolis fere signa adparent (z).

S. IV. Serum in continuo tempore dissolvitur.

Eadem quae crux, etiam sero natura est, ut leni calore, etiam quinquaginta graduum thermometri F A H R E N H E I T I A N I, intra paucos dies deliquescat (a), tenuius fit, putrefascit (b), fateat, ad urinosam indolem accedat (c), aerem generet, volatile demum avoleat: serius equidem, quam ruber crux (d). Dum putreficit, sedimentum puris non dissimile deponit (e). Idem quando computruit, naturam coagulabilem totam exsuffit, ut porro neque ab igne, neque a vehementer acore, neque a stillatice vini liquore cogatur (f). Eadem & albumini (f*), & amnii aquæ [g], & ichthyocolla (h), & aquæ hydropicæ (i), hydatidum ve [k] accident, ut adservatae & putrefactae porro eam naturam deponant, que ad gelatinam tendit, & nunc ad ignem totæ exhalent.

Sed etiam crux inflamatoria in aqua colliquescit (l), modico cum calore, & vehementer putreficit (m) Quare uti crux (n), ita serum a febre ita mutatur, ut porro post aliquot venæ sectiones, superata morbi

vi,

(y) Ibid. p. 102.

(z) p. 91, 92.

(a) BOERHAAVE *Elem. Chem.* T. II. p. 115.

(b) PRINGLE p. 416.

(c) RHADÉS p. 28. 29. BOERHAAVE *Elem. Chem.* T. II. p. 350. POERNHE de album. ovar. & ser. sang. convenient. p. 32.

(d) PHILOS. *Transl.* n. 442. SCHWENKE p. 134. Lympha in asciticis & plebitis hydrope vix putreficit, nisi adit visceri corruptio BOHN *lethal. subh.* p. 149. Equidem CL. LORRY de sanguine patrem rubram ultimam putrefactare *des alimens* T. I. p. 417. & sanguinem sero privatum vix contabescere scribit p. 300. Verum hæc de siccato & ab omni humore nunc libero sanguine interpretor. Namis enim ex anatomie novi, quam facile partes rubrae & sanguine plenæ computrefacunt.

(e) PRINGLE p. 418.

(f) BOERHAAVE *Præcl.* T. III. p. 674. SCHWENKE p. 134.

(f*) MALPIGHII *de form. fet.* p. 12.

(g) MALPIGHII *ibid.*

(h) LISTER *de aquis medic. angl. diss.* II. p. 90.

(i) SCHACHER *tum. ovar. pilo.* FLOREZ *prætermatur. state of hum.* p. 99; negoti nempe ab igne, ab alumine aut a vitriolo cogi posse.

(k) POHL *hydrop. saccat.*

(l) HAENL. c. p. 86.

(m) PRINGLE p. 417.

(n) p. 45, 46.

vi, nullum nunc corium pleuriticum in emissio sanguine reperiatur (o). Ab eadem febre serum supra modum falsum fit (p). Serum in peripneumonia ita mutatur, ut ab acore vix cogi se patiatur, neque 150^{mo} sed 189 demum ignis gradu cogatur (q), & altero die jam viridi colore syrumpum violarum tingat (r).

Minora tamen in universum naturæ urinosa signa ostendit (s), quam crux, etiam quando computruit, & aliquando a recente jam fracidum parum habuit discriminis (t). Dudum Robertus BOYLE [u] monuit, debilem ex fero spiritum prodire, etiam quando computruiisset. Causa procul dubio hujus a crux diversitatis in aquæ abundantia est, quæ seru magna partem efficit, inque olei, falsarumque particularum parciori [x] portione.

Difficilis aliquanto id serum colligescit, quod in igne coivit, aluminisque coacti speciem induxit [y]. Serius adeo, & octavo demum die [z] sensim solvit, & fluidam naturam recuperat. Id autem serum, quod cum alcohole induruit, id utique per annos manet insolubile [a].

S. V. *Mucilago seru sanguinis.*

Aliquanto minor [b] in fero copia est diluti muci, qui modo sub tenerimæ & pellucidæ telæ specie in sanguine apparet [c] multum versus a natura coagulabili, quam lymphaticam sanguinis partem gal-

R 3

li

(o) D. SINOPERUS l.c. p. 272. 331. &c. SAUVAGES de *Inflammation*. p. 244.

(p) TABOR p. 79. In febribus intermittentibus serum minus acre, quam in contumis B. LANGRESH *prædictæ* p. 232.

(q) RHADÈS p. 29.

(r) Ibid.

(s) PBLIUS. *Translat.* n. 496.

(t) POERNER l.c. p. 31.

(u) *Apparat. ad hist. sang.* p. 64. 75.

(x) Sect. III. n. 8.

(y) SENAC T. II. n. 408.

(z) SCHWENCKE p. 167. Penitus solvi negaverat III. PETRI Epist. II. p. 25.

(a) BOERHAAVE l.c. p. 353. adde de HAEHN l.c. p. 86.

(b) SENAC T. II. p. 97.

(c) SENAC T. II. p. 100. QUESNAT *ucon. anim.* T. II. p. 358. 359. Olim cum, de venis pedis educatum, debilioribus corporibus imprimis tribuit Godofredus MOEBIUS p. 219. & SINIBALDUS in *apoll. bifronte* p. 112. Habet etiam CL. SCHWENCKE p. 173. 173.

li dixerunt (*c**). Eadem mucilago, accuratius nuper descripta (*d*), in aqua adparet, quæ centesimo gradu calida sanguinem de vena missum accepit, & nunc refrigeruit, pellucida, glutinosa, tactum fugiens (*e*), post aliquot horas fusca, solidior (*f*), cuius minima quasi furfurea portio in vini spiritu supereft (*g*), neque in membranam unquam transitura (*h*); in aqua post aliquot dies sponte evanescit (*i*), & a calore funditur (*i**).

Adeps lymphæ paßim miscetur, inque aqua hydropica (*k*), & hydatidum (*l*) latice visus est, & in membrana de porci sanguine (*m*). Casu vero potius crediderim admisceri.

Sabulum in lympha (*n*), per mōrbos adparuit, & in siccato sero teneræ moleculæ adparent (*o*), quales in tophos podagricos ex muco densantur (*p*). Sed hæc elementa a fani hominis lympha absunt.

Aerem utique generat, aliquanto minori copia, quam crux, quando ad 80 gradum calefit, aut sub vitrea campana, aeris exterioris pressione liberatur, bullas enim eo in statu generat, inque spumam vertitur (*q*).

S. VI. Quid sero ab admisitis variis salibus accidat.

Quæ ab admisitis diversi generis salibus, aut æthereis oleis in sero adparent, & mutationes ipsi fere cum sanguinis parte rubra communes sunt. Cum neutro quidem salium genere effervescit, ne ea quidem lympha, quæ in majorem aliquam caveam effusa stagnavit (*r*). Cum acer-
rimo

(*c**) SENAC T. II. p. 97. QUESNAY L.C.

(*d*) De H A S S p. 97. seqq.

(*e*) p. 97. 98.

(*f*) p. 98.

(*g*) Ibid.

(*h*) p. 98. 99.

(*i*) p. 99. 100.

(*i**) QUESNAY de la saignée ed. nov. p. 413.

(*k*) SCHACHER L.C.

(*l*) BARTHOLIN histol. 84. Cent. IV. Unctuosarum in hydatidibus particularum membrinit BIRCH T. IV. p. 377.

(*m*) RUYSCHE sbef. I. aff. I. n. 3.

(*n*) Adl. Budijin. p. 73.

(*o*) ELLEN mem. de Berlin. T. XL p. 25.

(*p*) IDEM ibid.

(*q*) DIEBOLD de aere in humor. corp. human. p. 4.

(*r*) G MELIN Comunere. Lit. Nor. 1745. tabul. 52.

rimo tamen nitri oleo paulum ferret, oleoque vitrioli (s). Adeo exemplum ubi cum liquore heliotropii potius ruber color natus est (s*). Sales medii perinde, ut rubrum sanguinem, ita serum diluunt, redduntque liquidius (t), & efficiunt, ut etiam ab igne difficilis cogatur (u). Etiam a liquore terrae foliate tartari serum resolvitur (x). In aqua nitrata crustae pleuriticae deliquescent (y).

Cum acidis liquoribus ex vegetabili regno paratis potius diluitur (z), tum serum, tum gelatina in corpore humano ex vasis suis effusa (a). Miror ab aceto cogi visum Cl. viro (b), quale quid nunquam mihi contigit videre.

Cum acre meraco coagulatur, potissimum si austera naturam conjunctam habuerit, cum solutione aluminis (c) adeo, & vitrioli (d), & omphacio (e), quod de plantarum baccis elicetur. Aut totum (f) etiam a meracissimo vitrioli acido cogitur, aut pars major (g), ut reliqua aqua supersit. Rubrum colorem ab ejus contactu induit (h). Reliqui

(s) GAWL I. c. Cum acidis liquor hydatidum sedimentum dejicit BIRCH T. IV. p. 317.

(s*) DUVERNEY I. c.

(t) EICHEL I. c. p. 13. 14. SCHWENKE p. 195. RHADES II. 35. p. 24. 25. Cum nitro miftum demum 156 gradu cogitur. Coagulum fieri sponte se dissolutur RUTTY p. 52.

(u) RHADES p. 26. Serum purum 151 gradu thermom. Fahrenh. a calore cogitur, serum nitro miftum demum 156mo.

(x) PHIL. TRANS. II. p. 472.

(y) DE HARN p. 101.

(z) EICHEL p. 14. RHADES p. 24. POERNER p. 28. RUTTY p. 210. Non cogi Ant. de HARN p. 56. Tamen non impedit acetum, quin 140 gradu caloris cogatur RHADES p. 28.

(a) Memoir. de Chirurg. T. I. P. II. p. 86.

(b) PETIT Epist. II. p. 36.

(c) RHADES II. 32. p. 22. SCHWENKE p. 196. 197. RUTTY p. 217. Etiam albumen FLOYER I. c. p. 62. & aqua hydropica DUVERNEY I. c. PHIL. TRANS. p. 472. RUTTY p. 217. TAB. AA. & vehementer.

(d) SCHWENKE p. 197. MALLPIGHIIUS posticum. p. 162. VERDUC de vitriolo ceruleo de l'usage des parties p. 319. Serum non valde sed albumen magis cogit idem RUTTY p. 239. Aquæ vitriolicæ Shadwell & Cronebaum serum sanguinis & albumen cogunt RUTTY p. 210. 268. 292. Lympna ductus thoracici a vitriolo cogitur MALLPIGHIIUS posticum. p. 162.

(e) EICHEL p. 16. Cum adstringentibus SCHWENKE p. 196. 197.

(f) PICCARNE elem. med. mutb. p. 42. PETIT Epist. II. p. 31. 36. RHADES p. 22. POERNER p. 28. De lymphna ductus thoracici MONROO.

(g) FREIND p. 178.

(h) PETIT I. c. p. 36.

qui acidi & de salibus stillatitii liquores (*i*) partem feri maximam in album gelu cogunt, ut aliqua tamen portio fluida (*k*) maneat, nisi major acuris copia admista fuerit (*l*). Etiam hydropleas aquae ab his acidis spiritibus coguntur (*m*).

A salibus lixiviosis fixis serum addensatur (*n*), ut in mollius gelu consistat, & pars coacta præcipitetur (*o*) & ipse, non quidem ab oleo tartari cogi, sed tamen flocculos in fero, & opacitatem nasci vidi. Cantharidum extractum lympham cogit (*o**). Qui diluere dixerunt (*p*), forte ab aquæ copia sibi passi sunt imponi. Non mutari alii maluerunt (*q*). Aqua calcis ichthyocollam dissolvit (*r*). A liquoribus urinosis volatilibus turbatur serum (*s*), & pelluciditatem amittit, non tamen coagulatur (*t*). Idem admitti intercedunt, ne serum ab acidis spiritibus addensetur (*u*). Serum hydropicum (*x*), & polypum (*y*) dicti sunt solvere. Canthrides perinde eam indolem a fero auferre dicuntur, qua coagulationi aptum fit (*z*). Sed haec prioribus repugnant.

Sincerus liquor, qui de vino stillat, in fera parte superiori filamentosam (*a*) lanuginem excitat, & serum eo magis coagulat (*b*), quo recentius

(*i*) PETIT *Lettre II.* p. 31. 36. PITCARNE p. 41. Cogi a spiritu nitri & alumini VERDUC l. c. solutione sublimati hydrargyri BOYLE *apparat.* p. 60. saturni saccharo VERDUC.

(*k*) FREIND p. 178. SENAC T. II. p. 197. SCHWENKE p. 197. RHADES p. 22. 23. Ideo negat cogi a spiritu nitri, forte nimis debili *Ant. de HEYDE* obs. 87. & a spiritu salis VERDUC l. c. Lympha in lacteum coagulum cum spiritu nitri coit VERDUC p. 383.

(*l*) EICHEL p. 16.

(*m*) MALPIGH. *post.* p. 162. DUVERNEY *memoir. de l'Acad. des scienc.* 1701. p. 155. 156.

(*n*) *Ant. de HEYDE* l. c. PETIT l. c. p. 31. 35. RHADES p. 23. POERNER l. c. RUTTY p. 46. De fero hydropicum DUVERNEY.

(*o*) SCHWENKE p. 197. De lymphâ ductus thoracici MONROO l. c.

(*o**) RUTTY p. 217.

(*p*) EICHEL p. 14.

(*q*) PITCARNE *Elem.* p. 42.

(*r*) WHYTTE *on lime water* T. II. p. 102.

(*s*) RHADES p. 23.

(*t*) HAEN p. 96. Non mutari PITCARNE l. c.

(*u*) BOYLE *appar. ad biss. sang.* p. 74. PETIT l. c. p. 36.

(*x*) SENAC T. II. p. 479.

(*y*) MALPIGH. *postib.* p. 162.

(*z*) BAGLEVI *exper. IV.*

(*a*) EICHEL p. 18. POERNER l. c. In aquis hydropicis GMEZIN *Comm. Lit.* l. c. Lactescere de HAEN p. 96.

(*b*) BOERHAAVE *Elem. Chem.* T. II. p. 153. SCHWENKE p. 198. MONROO de lymphâ ductus thoracici. Etiam ab oleo terebinthina cogitur IDEM.

centius est, & integrius, liquor vero vini & meracior fuerit, & calidior. Quod enim aliquot jam dies adservatum (*c*) fuit serum, ejus fluida natura a vino spiritus efficacia vix quidquam patitur, & ea forte ratio fuerit illius discriminis, quod inter Cl. viorum experimenta intercedit (*c**). Etiam albumen adulteris pulli male cogitur (*c***). Eadem lympha cum spiritu vini (*d*), & ab igne (*e*) saepe tubescit.

Hæc ceterum experimenta cum toto fero facta, tamen potissimum ad ejus partem gelatinosam pertinent.

S. VII. Seri ab igne mutatio.

Analyses, quas vocant, seri apud scriptores medicos satis raræ sunt. Antiquissima debetur *Gualthero NEEDHAM*, qui, in pinta seri de humano sanguine, uncias phlegmatis quinque cum drachma, spiritus alcalini uncias sex, salis fixi scrupulos duos, salis volatilis nihil quidquam repetit (*f*), neque olei. Ex bovis vero sanguine separatum serum ex libris quatuor dedit aquæ sive phlegmatis libras duas, & tantumdem crassamenti residui. Ex eo crassamento spiritus elicuit vir Cl. libram unam, uncias novem, olei drachmas tres, volatilis salis scrupulos septem grana sex, capitis mortui drachmas 26, in quo drachmæ duæ grana quinque salis fixi fuerunt (*g*). Mireris utique abnormali in analysi seri humani & taurini diversitatem.

Inde *Raymundus VIEUSSENS* duo experimenta fecit. In priori (*h*) libræ duæ, uncis sex seri dederunt, lenem ad ignem, phlegmatis (*i*) primo limpidi, inde subsætidi libras duas drachmas sex, nempe $\frac{2}{3}$ sive $\frac{1}{2}$ partes totius seri. Residuum, molle & corneum, ad uncias quinque

(*c*) p. 132.

(*c**) Si misceatur aqua reginæ hungaricæ, vel sulfuris tindura, vel spiritus volatilis alcalinus crusta, coriacea nulla nascitur *LXIX* diff. p. 81. Id ad aquæ ubertatem retulerim.

(*c***) *MALPIGHI* *form. fet.* p. 12. *BELLIN*. *mot. card.* p. 27. 28. *MAITRE JEAN* *form. du polet*, p. 181. 182.

(*d*) *Comm. Acad. Petrop.* T. I. p. 269.

(*e*) *DE UISING* *de fundl. microc.* diff. 7.

(*f*) *BIRCH* T. III. p. 235.

(*g*) p. 234. 235.

(*h*) *Traité des liquens* p. 31.

(*i*) *SENAC* T. II. p. 108. Phlegma non carere efficacibus particulis adaptet, cum similis de albumine stillatius liquor myrrham solvat *Macquer Glyc.* *Inst.* T. II. p. 488.

Haller Physiolog. Tom. II L.

S

quinque in retorti vasis fundo supersuit, idque sponte induruit; Id igne denuo admoto dedit spiritus uncias tres sive partes $\frac{3}{8}$ salis volatilis (*k*) crystallis laminatis adhaerentis drachmas duas cum semisse, parca utique a*t* totum serum portione uti *s* ad 608; olei nigri (*l*) crassi drachmas sex cum semisse sive 1*3* partium in 608. Caput mortuum Ipongiosum pondere sex drachnarum fuit & granorum 2. Id Ixivio facta salis fixi grana dedit octodecim (*m*). In altero experimento feri decem libris usus (*n*), phlegmatis libras tres, iubatidas elicuit. In ejusmodi phlegmatis libra duo fere sunt (*o*) grana terrae. Sed vas vitreum crepuit, quo auctor usus est, & magna pars fluidioris feri periit. Residui fuerunt unciae 26 cum semisse. Ex eo denuo phlegmatis, nam ita vocat, uncias sex habuit, rubelli, vehementer olentis (*p*). Deinde spiritus rufi sponte avolaturi drachmas decem, olei nigri, levioris spiritu, drachmas 19, salis volatilis drachmas sex. Ex residuo rarissimo carbone, cuius uncias quatuor appenderat, prodierunt salis fixi albi drachmæ septem (*q*), terræ drachmæ sex. In hac analysi phlegma videtur effecisse feri $\frac{133\frac{1}{2}}{160}$ sive fere $\frac{10\frac{1}{2}}{160}$, spiritus debilior $\frac{4\frac{1}{2}}{160}$ fortior $\frac{10}{160}$, oleum $\frac{1\frac{1}{2}}{160}$; sal volatilis $\frac{7}{160}$; sal fixus $\frac{7}{160}$; terra $\frac{7}{160}$. Inde rationes elementorum adparent.

CL VISSCHERUS (*r*), ad experimenta, ni fallor, GAUBIANA ex feri secchiuncis tribus habuit salis volatilis urinosis unciam unam cum semisse, olei utriusque drachmas tres, capitum mortui drachmas septem cum semisse.

Quænam sint crystalli prismaticæ in liquore hydropsi peritonæi repertæ, non dixerim (*r**). Ex sero hydropico uncia olei duæ de quinque libris destillarunt, & liquor sale volutili plenissimus (*r***). Ex eodem sero sal fixus alcalinus, cumque acidis liquoribus fervescens factus est (*r****).

CL

(*k*) BOYLE appr. p. 65, 66.

(*l*) VIEUSSENS p. 32. Ruborem habet BOYLE ibid.

(*m*) VIEUSSENS p. 34.

(*n*) p. 19.

(*o*) p. 20.

(*p*) p. 21.

(*q*) p. 21.

(*r*) in diff. de cholepois p. 50.

(*r**) Obs. of a society at London n. 2.

(*r***) Mémoir. de l'Acad. avant 1699. T. I. p. 506.

(*r****) VIEUSSENS de rem. & proxim. p. 71.

Cl. noster RHADeS ex uncis seri quadraginta (*s*), elicit aquosum laticis uncias octodecim cum semisse, sive $\frac{7}{8}$: deinde liquorem (*t*) qui sensim magis & magis urinosa naturam induit, spiritum nempe cum oleo mixtum, ad septendecim uncias cum semisse sive $\frac{15}{8}$. In eo liquore duplex oleum fuit, aliud leve, quod aquæ innataret, grave alterum, quod subsedit. Porro salis volatilis semuncem sive $\frac{1}{16}$, & olei empyreumatici drachmas sex elicit sive $\frac{1}{8}$. Carbonis inflammabilis fere undecim drachmæ fuerunt sive $\frac{11}{16}$. Ex eo carbone in lixivio obtinuit vir Clar. drachmas terræ nigrae sex sive $\frac{3}{4}$, unde crystallorum salis communis habuit grana quinque, sive $\frac{5}{16}$. Idem rationem suorum elementorum facit ejusmodi, ut in partibus 235 seri, aquosum laticis sint partes 215, salis volatilis sex, olei empyreumatici octo cum semisse, olei levioris ceracei una, terræ fixæ tres cum tribus quartis, salis marini una (*u*). In carbone aliquantum dissentit Ill. Archiatrorum comes (*x*), & ægrius ignem concipere, tamen & in ipso flammulam nasci, oleumque incendi, de lympha residuum in igne potius salis modo crepitare moneat (*y*). Serum modoflammam aluit, modo unice crepitavit (*y**) STUBBE.

Cl. POERNERUS varios de sero stillantes liquores separat, quorunq; alii aliis magis urinosi, acres & empyreumatici sunt (*z*).

Serum podagrī hominis dedit spiritum volatilem urinosum, æque acrem ut ipsa urina (*z**).

Quando cum sanguinis analysi seri igne torti phænomena conferuntur, adparet, quantum quidem in tanto experimentotum diffidio eruere licet (*a*), aquæ in sero plus esse, salis volatilis aut perinde (*b*) aut plus omnino (*c*), olei non minorem portionem esse, aut majorem (*d*). Sed

S 2 etiam

(*s*) I. c. p. 19.

(*t*) p. 20.

(*u*) p. 21.

(*x*) *Traité du cœur* T. I. p. 118.

(*y*) p. 95.

(*y**) *Phlebotomy* p. 115, 116.

(*z*) p. 19, 30.

(*z**) PINELLI p. 180.

(*a*) Sect. II. n. 34. seqq.

(*b*) n. 38. collato experimento BOTTELLI cum RHADESSIANO. Triplo plus in sanguine esse, non recte NEEDHAMUS I. c. p. 235.

(*c*) Collato experimento VIEUSSENSIS I. c.

(*d*) In RHADESSIANO oleum est $\frac{1}{8}$ seri. In prioribus n. 38. vix illa portio tamta est.

etiam salis non minor est ratio (*e*), nec terræ minus inest (*f*). Ferum a fero aut abest, aut parvissima inest copia (*g*).

SECTO IV.

Elementorum sanguinis proportio & utilitas.

§. I. *Unde temperamenta nascantur.*

QUæ hactenus numeroſa collegimus experimenta, ex iis quidem demonstratur, in sanguine aquam in universum dominari (*h*): inefſe pæterea adipem (*i*), ſive materiam, quæ ignem concipere apta fit, & in oleum sanguinis igne admoto vertatur, & particulas, quæ ab ignis vehementia in urinofum volatilēmque (*k*) ſalem mutantur, & marinum ſalem (*k**), & terræ momentum (*k***), cæterum horum elementorum ad ſe invicem rationem variis ex causis mutari. Vehementem corporis exercitationem, & febrem (*l*), aquæ portionem minuere, sanguinis vim adtracti' em, & densitatem augere (*m*), augere etiam globulorum rubrorum copiam (*n*), cumque iis pondus ſpecificum (*o*): eamdem vehementiorem aut diuturniorum acrimoniam sanguinis & aptitudinem intensioreni reddere, qua aliquæ sanguinis particule in urinofam ſalcedinem tendunt. Contra ignavia & vobis ſelut animis, & debilitas (*p*) ex amiffo ſanguine nata, ſeri copiam augent, & aquæ atque globulorum numerum minuant, ut liquidus, & pallens ſanguis ex vena fluat. Sed & ferum aut augeri copia potest,

(*e*) Sero $\frac{1}{2}$ ſalis marini in eſt, portiones n. XL. in ſanguine propositæ ſere minores ſunt.

(*f*) Sero $\frac{1}{2}$ ſo qua portione plerisque n. 42. diſtae minores ſunt;

(*g*) In albumine & ſehrili crux WIDMER p. 189.

(*h*) Cœd. 1. n. 35.

(*i*) n. 18

(*k*) n. 35. 37.

(*k**) n. 40..

(*k***) n. 42. 43.

(*l*) n. 35

(*m*) n. 5.

(*n*) LAVORETTI p. 74.

(*o*) MORGENS phisofic. princip. p. 117.

(*p*) n. 8. 35.

potest, aut minui, iisdem pene ex causis, multaque in primis rubri crue-
ris jactura.

S. II. *A globulorum rubrorum abundantia.*

His ex causis aliquae *temperamenta* nascuntur. Nempe veteres medi-
ei mutuam quamdam elementorum sanguinis proportionem dori, neque
temere posuerunt, et si nondum per experimenta constat, quibus nume-
ris ea globulorum seri, particularumque oleosarum, aut ad falsari indolem
pronarum portio exprimatur, quæ legitima quæsi, optimæ valetudini pro
exemplari sit. Facile vero intelligitur, si aliquod horum elementorum
pro reliquorum portione supereret, etiam totius corporis temperiem fieri,
quæ hactenus ab optimo habitu recedat. Valde vero discrimen augeri
evidenter appetet, si in alio homine aqua abundaverit, in alio globulo-
rum vis, aut partis, quæ ad ignem urinosa sit.

Ergo globulorum rubrorum numerus, uti in diversis animalium ge-
neribus, ita in hominibus diversis aliis, & aliis esse potest. Si eorum
ad aquam major ratio fuerit (*q*), ruberrimus sanguinis color erit, major-
que densitas, pondusque specificum, *Athleticus* inde habitus *HIPPOCRA-
TIS* (*r*) nascitur, quem plissimus cum sanguineo temperamento (*s*) ve-
terum hactenus comparare, ut simus memores, veteres cum ea temperie
molle quid, & laxum fibræ genus conjunxisse, quod a globulorum nu-
mero non sequitur. Ab eo enim aucto vires cordis totiusque corporis au-
gentur. Neque plethora est, ea enim vox nimiam totius sanguinis, ut ex
variis elementis mixta est, copiam ponit, quæ resistentiam valorum
supereret, eademque distendat. Evidenter vero plethora exen plu in
iis animalibus (*t*) reperimus, quæ plus sanguinis ex alijs animalibus
incisis arteriis, admiserunt, quam emiserant, aut vasis suis oblique nimia
distensione poterant recipere. Varia inde syn pemata passa sunt (*u*), & cor,
venæque sanguine distentæ fuerunt (*u**), ut rimus laevius etiam per uri-
nam

(*q*) *MARTINE Essays of a Society at Edim.* T. II. p. 82. *QUESNAR* passim.

(*r*) In *aphorism. princip. Conf. B. RONENSON of food and discharges* p. 65.

(*s*) Id temperamentum inde derivat *MARTINE* l. c.

(*t*) *BIRCH* T. II. p. 179. 190. 191.

(*u*) *IDEM* l. c. Alterum animal vulpes erat, quæ omnino inflammatis intestinis im-
teruit.

(*u**) *Ibid.* p. 136. cum duabus libris majorem sanguinis portionem accepisset.

nam erumperet, quæ mala eo superfluo sanguine per incisam venam emisso sublata sunt (*x*). Sed etiam in homine vasorum nimis sanguine plenorum, & subitarum inde mortium, exempla habemus (*y*): neque a brutis animalibus id vitium abest, quando aut nimium laute (*z*) pasta fuerunt, aut vasorum resistentia per sanguinis missiones fracta fuit (*a*). Posse vero in iisdem vasis & multum rubri sanguinis contineri & parum, per experimenta ostendi (*b*).

§. III. *A particularum libertate, quæ ad urinosam naturam tendunt.*

Si vero in sanguine eæ particulæ abundaverint, quæ ad ignem urinosam (*c*) indolem induunt, tunc utique id temperamentum producitur, quod veteres *cholericum* vocarunt. Potuit ea intemperies ab ipsis parentibus congenita dominari: poterit ex alimentis nimis carnosis nasci. Idem enim omnibus animalibus ferocibus, deque præda viventibus, temperamentum est, acerrima bilis (*d*), sudor oolidus (*e*), fæces alvi intolerabiles (*f*), urina fætidissima (*g*), lac tenue & olens (*h*), gravis anima, quæ omnia humorum ad urinosam indolem degenerantium evidenter signa sunt. Tanta vero volatilis naturæ vis una eminet, ut sanguis cholericorum hominum intra 24 horam totus exhaleret, & lamellas siccas relinquat (*i*). Conjunguntur autem hac cum cacoehymia, capilli sœpe rufi (*k*), carnes duræ, compactæ siccæque, macilentia, cor magnum (*l*), puluis

(*x*) IDEM T. II. p. 179.

(*y*) COCKBURN on *sea-sickness* p. 264.

(*z*) LISLE of *husbandry* L. II. Requirit missionem sanguinis IDEM.

(*a*) LAWRENCE *System of agricult.* de vitulis. In homine venæ sectiones plethoram faciunt, & necessitatim novæ missiones sanguinis augent G. v. SWINSTON T. I. p. 15. BOND of the *niggle-mare* p. 76. 77. Plethorae feminæ maximæ hemorrhagias facile tollent SCHWENKE p. 23.

(*b*) Second mem. *sur le mons. du Sang* Exp. 70. 77. 92. comparat. cum Exp. 71. 91. 92. 95. 183.

(*c*) VIEUSSENS *journal de Trévoux* 1709. m. nov.

(*d*) Ostendetur, medicatam bilem a rapacibus animalibus repeti.

(*e*) Sudor oolidus athletæ carne capilla unice, pasti apud veteres celebris est.

(*f*) A colore diverso reticuli mucosi subcutanei figura temperamentorum sumit RUSSELL *acm. natur.* p. 156.

(*g*) De tigride p. 91. 92.

(*h*) Urinosum adque mundandos pannos utile, ut urina, GESNER *bijl. anim. quadruped.* p. 189.

(*i*) BURGGRAV. *de aere aq. &c loc.* Francf. p. 39. 40.

(*k*) BAGELIVS *de leone oper.* p. 267.

(*l*) L. IV. p. 451.

pulsus valens & celer, robur etiam in minori corpore sumnum, & ex propriarum virium conscientia nata audacia, & ira, omnia nempe, quæ de cholericis hominibus vetusti medici scriperunt. Tartari unice carnes amant, herbasque contemnunt, destinata bestiis pabula (*m*): idem apprime feroce sunt & crudeles (*n*). Solebat BOERHAAVIUS de homine narrare, qui ex compacto solis perdicibus visititare coactus, neque eam vitæ rationem ferre potuit, neque eam morum humanitatem conservavit, quæ ipsi propria fuerat. Satis ego memini, summam a viperarum usq; impatiens me observasse Contra mite Brachmanum ingenium & Indorum, solo cibo vegetabili vitam sustentantium, & similis animalium herbivororum placidior indoles, denique summa debilitas, quæ ex vietū vegetabili homini gravis supervenit, satis ostendunt (*o*), quanta rationis vivendi in temperamento definiendo potentia sit.

Similia fere vietus carnosí producunt cælum æstuosum, vita labore exercitata, venatio, spirituosi potus copia, febris denique, quæ omnem eam acrimoniam, urinæque & sudoris factorem, & conjunctum vigorem muscularum cordisque summum subito generat. In phlegmaticis hominibus ipse variolarum prior status alacritatem & actuosam indolem generat (*p*).

§. IV. *Ab aquæ nimia copia.*

Sed neque contrarium temperamentum quidquam habet obscuritatis, in quo ratio globulorum rubrorum, & salsuginis ad aquam nimis modica est. Una vis densabilis sanguinis minor est, & rubor, & calor minuntur. Porro in toto corpore, inque ipso pariter corde, fibrarum minus coherentium, aqua ineptiarum, mollium, laxitas, ad corporis motum inertia, cor parvum, pulsus parvus, & mollis, venosi crux tarditas, hinc vaporum ad cor reducum stagnatio, cellulose telæ aquosus tumor, sudor, urina, aqua, ciborum degeneratio in eam corruptionem, ad quam sponte tendunt, flatus, &c. In pauperibus solo vietu vegetabili utentibus fænguis flavus fere & absque rubore (*p**).

Hæc

(*m*) *Relat. des missions T. I. p. 21. J. de Luca relat. des voyages au nord T. II p. 102.*

(*n*) In pupero bello anni 1740 & 1741. lego Tartaros maiorum Feuermoni prostratorum fænguinem fuxisse.

(*o*) *Lobb de calente p. 245.*

(*p*) *KIRKPATRICK analys. of inoculation p. 62.*

(*p**) *STUBBE p. 117.*

Hec omnia & sponte sua in hominibus ita natis dominantur, & variis modis in corpora humana introduci possunt, quæ nondum a medlocitate recesserunt. Quies corporis, cibus vegetabilis lacteus, somnus nimius, longo usu ad eam temperiem ducunt, subito vero virium quæcunque vehementior exhaustio, sive ea a prægresso valido morbo nata sit, sive a sanguinis rubri quæcunque jactura. Innumerabilibus exemplis constitit, sero omnino, aut nunquam, legitimam globulorum copiam reparari, si quando subita eorum nimiaque evacuatio acciderit. PAULINA, Senecæ celebrata uxor, cum de venis incisis magnam sanguinis vim emisisset, a NERONE vivere coacta, nunquam per totam vitam genarum nativum ruborem recuperavit, neque Achilles GASSERUS (*q*), cum ex dente avulso plurimum crux amississet. Sed etiam a spontaneis sanguinis evacuationibus (*r*), a narium hæmorrhagia, quod exemplum coram video, & ab hæmorrhoidibus (*s*), & ab hæmoptysi (*t*) hydrops supervenit, & a nimis demum de vena sanguinis missionibus (*u*), etiam ab unica (*x*), sed abnormi, evacuatione, etiam in validissimis animalibus, & ab aquosis morbis (*y*) alienissimis.

§. V. Temperamenta veterum.

Quæ haslenus proposuimus, satis cum veteris scholæ (*z*) placitis converiunt, non perinde, quæ dicenda supersunt. Schola nempe Galeni-

ca

(*q*) RUMLER off. 72.

(*r*) Celebris inde apud DIONEM ADRIANI Aug. hydrops. Alia exempla varia magno numero existant apud SPIGELIUM anat. p. 222. J. Jac. WEPFER de apoplexia p. 123. GLESSONIUM de hepate p. 309. ZECCHIUM conjunct. med. p. 36. HILDANUM Cint. II. off. 18. BAUSCHI de atite in poem. Epib. Nat. Cur. Dec. I. ann. II. off. 48. DELTUM Aman. Dec. I. Cof. I. Cornelium TRIOEN off. p. 18. 19. & olim HIPPOCRAT. L. VI. S. 4. n. 5.

(*s*) ZACCHIAS mal. hypoch. p. 50. De GORTER Chirurg. p. 160.

(*t*) Jul. Offrai de la METTRIE anores de medec. off. 20. De hydrope pericardii loquitur.

(*u*) HIPPOCRAT. p. 11. XI. SYDENHAM de hydrope, GALENUS meth. med. L. XII. addito exemplo. J. Jac. WEPFER, RAULIN des varias. de l'air, p. 104. &c.

(*x*) Cum quinque libræ sanguinis fano homini detraictæ fuissent WEPFER de apoplex. p. 329.

(*y*) In cane experimentum fecit Fridericus HOFMANN de elasticit. fibr. p. 17.

(*z*) Sanguis, pituita, bilis duplex Princeps auctor est scriptor libri de natura bonis, qui existat inter hippocraticos, & alterius etiam libri apud novos auctor, qui pariter inter hippocraticos est. Inde RUFUS eam sententiani tenet de appellat. part. p. 43. 44. edit. CLIXCH, aliisque passim dogmatici.

ca (*a*) ad quatuor elementa, quatuor etiam in sanguine humores posuerat, qui elementis responderent. Ergo medici sanguinis in varios humores secessionem contemplati, quæ sponte fit, *bilem* in sanguine, a flavo colore, dixerunt aquam *eam*, quæ placentæ sanguinæ innatæ, quamque serum dicimus, quam eamdem in proprio suo receptaculo meraciorem, serio bilis nomen mereri tenebant. Porro *sanguinem* vocarunt, qui suo se rubore prodit, & quem peculiariter cruentem diximus. Aquam, quæ præcipuum utique & sanguinis, & aliorum humorum animati corporis elementum est, phlegmatis nomine designaverunt. Denique, ne deesset humor, qui *terræ* inter elementa responderet, *atram* bilem inter sanguinis præcipuas partes admirerunt, tristius nempe coloratam illam sanguinis sentinam, quæ vasculi fundum contingit, quo cruentus continetur; cuiusmodi etiam materiem vomitu rejici viderunt, & quo nomine recentiorum medicorum aliqui eum sanguineni dignum judicant, qui diu in vasis corporis humani stagnavit (*b*). Hanc super theoriam pene totam pathologiam, & curationem demum morborum ædificaverunt, & alia medicamenta affirmaverunt flavam bileni, alia atram educere: esse etiam quæ phlegma peculiariter expurgent.

Nunc ex ejusmodi quatuor humoribus sanguinem ajebant temperari, justamque omnium principiorum commissione perfectissimum temperamentum efficere; si vero aut sanguis supra legitimam suam quasi dosim abundaret, sive bilis, sive terra, atrave bilis, sive phlegma, quatuor tunc simplicia, & præcipua temperamenta ajebant oriri, a bilis abundantia cholericum, ab aquæ ubertate phlegmaticum, a sanguinis aucta portione sanguineum, & denique a copia atræ bilis melancholicum.

Contra hæc totius medicinæ fundamenta varia equidem, acute satis, monuerat J. Baptista HELMONTIUS (*d*), ut tamen medici clanculum veteris scholæ placita pergerent amare. Nam WILLISII (*e*) principia spiritum

(*a*) *De elementis* L. II. c. 2. *de atra bile* c. 2. *Conf. Avicennam* F. u. I. doctrin. IV. *Sanctorumque* in idem *F. u.* Quæst. LXV. LXX. aut *Fernelium physiolog.* L. VI. c. 8. aut fere priuatum quemque a *Galen*o ad *Helmontium* scriptorem, qui in manus venerit.

(*b*) *Sennac T.* II. p. 266.

(*c*) *Conf. Galenum de elementis &c.*

(*d*) *Humoristar. passiva deceptio.*

(*e*) *De febribus* c. 1. 2.

tum , salem , terram , aquam & oleum facile eo retuleris , & STAHLIANA elementa (*f*) , aquam , principium inflammabile , terramque , ex quorum quidem alia & & alia abundantia illi . hujus viri schola & eadem temperamenta restituit , quæ GALENUS posuerat , & perinde ornavit (*f**).

§. VI. Nihil in his temperamentis firmi est.

Nos contra sinceri ut simus , & unice verum sequamur , continuo videmus , quartum in sanguine principium nullum reperiri . Neque enim vitiouse reftagnantem sanguinem huc traxisse licet , quando de elementis circumflui motique sanguinis sermo est : neque mucosa & mitissima seri pars pro atra bile recipi potest , quam veteres nigram , acidam , cum pulvere effervescentem , in liene ajebant habitare , et si iudicem veteres pituitæ nomine melancholicum humorem nonnunquam insigniverunt . Nullo enim modo vel eminus probabile est , in vere melancholicis hominibus , aut pituitam abundare , aut pituitæ ubertatem cum terrei principii abundantia consistere (*g*) , aut vitiouse acres humores (*h*) ad atram bilem pertinere . Ita enim aut senes omnes melancholicos redderes , nam in iis procul dubio terræ elementum auctum est : aut demum morbosam colluviem , que morbus est , haberes pro temperie . Pituitæ certe ubertas phlegmaticæ est intemperiei , quæ longissime a melancholica distat . Atram vero imi grumi superficiem ostendemus , a sola inversione rutilum colorem recuperare (*i*) .

Sed neque reliqua sanguinis principia firma sunt , et si faniorem sensum forte admittunt . Serum illud flavum neque amarum est , uti bilis (*i**) , neque inflammabile , ut eadem bilis est , quam primum nimia aqua exhalavit .

Deinde nimis subtiliter quatuor unice temperamenta facta sunt , quæ innumerabilia sint , ut cuique homini fere suum sit . Absque saltu , continuis gradibus , lentoque ordine , a summa acris & robusti temperamenti violentia , ad imam phlegmaticæ intemperiei inertiam descenditur (*k*) . Conscii veri dudum veteres composita ex principibus temperamenta excogitabant , cum tantam simplicitatem viderent a natura non tolerari .

§. VII.

(*f*) Theor. Med. p. 301. histot. temperam. &c.

(*f**) Non longe recedunt VIESENHANUM sulphur , & f.1 acris , sal acidus , terra , aqua , deus diff. p. 114. Nisi quod sales STAHLIUS refutabat .

(*g*) QUESNAT econ. anim. Tom. III. p. 25. seqq.

(*b*) LORRY dei abim. T. II. p. 64. 75.

(*i*) L. VI. Sect. 3. n. 17.

(*i**) Serum valde flavum vidit H. STUBBS , amarum nonnquam l. c. p. 116.

(*k*) Fatebatur olim nou dari temperamenta , J. Henricus SCHULTE physiog. p. 134.

§. VII. *Partes firmæ temperamenta faciunt.*

Denique, non potest solis in humoribus, ullo modo, temperamentorum principium ponи. Etsi enim, quæ ex vietu sequitur certi elementi abundantia, hactenus ostendit (*l*), non debere humores ab hac contemplatione excludi, certum est tamen, humorum, quam vocant coctionem, sanguinisque adeo salubrem constitutionem, & sallum & oleorum demum ubertatem, a motu peristaltico, a cordis (*m*) efficacia, a celeriori vel lento circuitu, aque solidis partibus præcipue pendere; ut a firmarum partium fabrica, non a fluidis humoribus pendet, diversissimorum sallum oleorumque ex diversis seminibus de eadem terra nutritis, in adulta planta dominium. Non est hujus loci, hæc ex ipsis principiis demonstrare, paucis interim liceat verbis exposuisse, a robore partium solidarum (*n*) aque ingenio irritabili, majori utroque aut diminuto, causas temperamentorum fere pendere, eaque principia prædere ea, quæ ex vietu possint supervenire, humorum discrimina. Robur partium solidarum & conjuncta natura irritabilis temperamentum cholericum facit: robur absque irritabili indole temperamentum *bæoticum*, *quadratum*, rusticum, parum dictum medicis, aque phlegmatico penitus diversum, pariter quidem insensibile, sed una firmum, & suo labore stans: a melancholica intemperie perinde alienum, quod irritabilitate sua excedat. Ergo indoles solidarum partium apprime irritabilis, cum debilitate, melancholicum, hystericum, & hypochondriacum temperamentum constituit: debilitas denique non irritabilis, id quod phlegmaticum vocamus.

Non adeo a fluidis partibus, aut a vietu, quam a congenito stamine temperamenta pendere multa demonstrant. Idem homo, cum diversissimo vietu, vegetabili, & animali, mores suos & vitia dotesque sue temperiei conservat, quod ipse in me aut omni carnium vietu, aut vino abstinentे,

aut

(*l*) p. 143.

(*m*) A corde & vasis magnis in robustis, parvis in debilibus, non adeo absone temperamenta derivat. CL JANN physiol. g. p. 124.

(*n*) Minime dissentunt Cl. viri Erneſtus STAHL theor. med. p. 322. & in histor. temp. Joſephus LIEUTAUD physiolog. p. 61. Franciscus QUESNAY aconous anim. T. III. p. 444. LOKRIL. c. p. 64. &c. quin tonis & partium firmarum robur ad temperamenta plurimum conferant. Neque ill. PRÆCEPTORIS fibra debilis & laxa alio reficit. Magis etiam, & fere unice, ad partes firmas methodica fœcti respicit, & super Georgius BAGLEVIUS de fibra motrice & morboſa p. 13. inque praxi celeberrimus medicus Thiodorus TRONCIN.

aut iisdem vicissim uso expertus sum. Infantes eodem lacte nutriti, nulla in vietu diversitate, alii impatiens & iracundi, alii blandi sunt aut somnolenti, & diversa temperaments prius demonstrant, quam a vietu causisque exterioribus aliqua humorum diversitas accesserit. Qui magnas per haemorrhagias, aut vehementes salivationes humores suos pene omnes amiserunt, novisque succis regeneratis vivunt, idem temperamentum recuperant. Diversae plantae ex eadem terra, aut ab aqua communis alimento, diversissimos succos, non dubie ideo sibi præparant, quod primigenium firmarum partium fabricam aliam, aliamque habeant. Cum sanguine vitulino, aut de vervece infuso non unus homo, tamquam suo vixit, neque suos mores, etiam penitus singulares, mutavit, cum tamen alienos ab humano sanguine vitulinos humores videtur in intima recepisse (o). Sed etiam ægre aliqua per analysis diversitas hominis inter sanguinem aut ovis, bovis, & leporis, aut ovillum inter & gallinaceum (p), aut oculo & microscopio, aut chemica analysi adpareat (q), cum tamen & horum animalium mores atque temperaments, & hominum proculdubio ab istis bestiis mores & indoles, longe recedant, neque ullo modo iracundo animali, cum timidissima ove conveniat. Cerebrum etiam humanum, & cerebrum ex animale sumtum eadem fere elementa in analysi suppeditant (r). Quare etiam, ut olim adtigimus, HELMONTIUS monuit (s), inter ducentas analyses sanguinis de diversissimis hominibus emissi vix discrimen adparere. Sed etiam occisa a veneno americano animalia nullum degenerationis in sanguine vestigium habent (s*) & aut ab opio (s**). Et minime quæque circumstantiae phænomena diversa reddunt, quibus plurimum tribuitur (s***), & sanguis in fanissimo homine vitiosus, inque morbis pulcherrimus adparuit (s****). Adeo ii quidem medici, qui ex sanguine de vena emissio natu-

(o) Arthur COE a homo paulum calidi cerebri *Philos. Transf.* n. 28. BIRCH T. II. p. 215. aliud etiam stultior, gallus DE MYS *Lettre* I. p. 14. *Pbil. Transf.* n. 27. 32. Sed etiam animalia ex diversissimæ indolis bestiis communicato sanguine vixerunt, suosque mores tenerunt. Conf. L. III p. 234. 235. Nolim LOWERI & HANNES historiis uti, qui ipso jure carnium, loco sanguinis per vasa circumeunte, hominem vicitasse reliquerunt.

(p) *Act. de HEYDE* obs. 87.

(q) *Ibid.*

(r) VIEUSSENS *traité des liqueurs* p. 210. Video RUTSCHEUM etiam coagula sanguinis vitulini & humani diversa facere *Cur. remos* p. 21. forte ex eo odio, quo bonus seinx omnem illam ab animalibus repetitam anatomen premebat.

(s) p. 95 96.

(s*) SHEBBARE T. II. p. 129. (s**) LOESER & Araney p. 569.

(s***) Sanguis pleno impetu irrumpens fortius crassamentum facit, nullum qui debiliter erumpit FUJATI *Morb. Natur.* p. 90. Ex nare pulcher, ex vena eorum tempore tunc sanguis STUBBE p. 111.

(s****) STUBBE p. 106. 107. *BALLOON Epid.* L. II. p. 191.

naturam & pericula morborum rectius credunt præfigiri posse, quam ex pulsu aliis signis vulgo receptis, merito monendi sunt, ne nimis sibi in his principiis placeant (t).

§. VIII. *Globulorum rubrorum utilitas.*

Quid quæque sanguinis portio corpori animato boni præstet, sequitur ut exquiramus. Globulorum utilitas diverso modo sumi potest: uti vel densitatem sanguini impertiri, vel rotundam figuram sibi propriam acceperunt, aut ferri participes sunt. Absque densitate sanguinis firma valetudo confistere nequit (u). Facile intelligitur, ex densiori succo densiore & fortiori fibrarum generari: facile intelligitur, densorem sanguinem majori cum robore a corde propelli, & mæandros vasculorum minimorum melius superari, cum aqua vasis capillaribus distendendis non sufficiat, ut omnino ea collabi necesse sit, quam primum a sola aqua replentur (x). Si cadaveris vasa sebo repleta, & alia terebinthinæ oleo turgida, comparaveris, quæ eadem vi repleta fuerunt, cylindrica illa reperes, hæc plana, ut vim distendentem sebi cum cylindro, vim distendentem olei cum piano comparare queas. Solum densissimum argentum vivum anfractus epididymidis superat, viamque in testem internum sibi aperit: aqua aliive liquores nulla vi, quæ æque fortis sit ac illa, quæ mercurium impellit, eo possunt promoveri. Nempe eadem semper vi cordis posita, momentum sanguinis cum ejus densitate crescit. Creditum est, etiam (y) cor melius a densiori sanguine stimulari, cum procul dubio fibrae cordis internæ profundius a ponderosiori sanguine emoveantur, & canis dispereat (z), quando ab impulsâ aqua sanguis nunc valde diluitur. Monimus (a) quidem alias aquam, & imprimis levissimum aerem, cor efficacissime ad motum stimulare: deinde cor vehementer agitari, & omnium maxima irritabili vi pollere, quando nondum quidquam rubri adparet (b). Non ideo repugnaverim, sanguinem melius quam aqua (c), cor irritare, siquidem cum aqua, & aquoso sanguine

T 3

vis

(t) G. CHETNE cur. of disease. p. 141.

(u) BOERNAEVE plurimis locis. C. HOFMANN institut. p. 29. SENAC. T. II. p. 492.

(x) HALLES bennastat. p. 145.

(y) A solo rubro sanguine HARVEI de gener. p. 51. A ponderoso melius SENAC Tom. II. p. 172.

(z) HALLES p. 115. Ens de causa motum cordis alternans producente n. 47.

(a) L. IV. p. 468.

(b) BUFFON T. II. p. 353. conf. T. II. p. 105, mem. sur le poules.

(c) Ibid.

vis laxans , & irritationes consopiens conjungitur. Si vero & densior sanguis pondus majus representat , & cor celerius ab ejusmodi sanguine stimulatum contrahitur , sequitur ut duplice ex causa vis augeatur , qua humores impelluntur. Hinc , ut interim hanc adnotationem præmittamus , calor cum densitate sanguinis increscit , & cum aquosa ejus tenuitate ita minuitur , ut aquosus crux , etiam vehementer motus , calorem non parem generet (*d*) , aquæ exemplo , quæ celerrimo motu levissime intepescit , & seminarum teneriorum , quas neque hystericae convulsiones , neque febres ad eum gradum calefaciunt , qui in fano agricola nascitur.

Denique summa densitatis in sanguine prærogativa est , ut in rubro va-
forum systemate maneat (*e*). Aquosa enim pars sanguinis de arteriis in cel-
lulosam telam fugit , & inania vasa deserit , inque cavernulis cachechica re-
stagnat ; ea , et si non sola , ratio est , quare hydrops ex sanguinis rubri
imminuta portione superveniat. Vena enim incisa , aut arteriola aperta pri-
mum certe rubrum crux emittit , qui vulneri proximus sit ; tenuiores vero
humores , ut longe a vulnere remoti , lentiusque circumacti , non perinde ad
fedem minus resistentem confluent , neque pari proportione effunduntur (*e**).
Hinc a frequente venæ incisione , aut hæmorrhagia , in vasis tenuis & aquo-
sus sanguis supereft (*f*) , ut in me ipso , post plurimum de nare amillum
sanguinem expertus sum. Verum si major nunc humoris tenuioris copia in
vasis rubris est , non potest ea in vasis rubris retineri , nimis enim facilis
calidæ aquæ ex arteriis in cellulorum habitum exitus est. Hoc maximum
vitium est glutinis (*g*) de filuro pisce , aut Husone cocti , quando in va-
sa cadaveris calidum inpellitur ; continuo enim in cellulosa telam de vasis
fugit , quæ male plena relinquit. Inde fugiente in cellulosa telas aqua san-
guinis , et si etiam aliæ rationes sunt , a cachexia promptus in hydropem
(*h*) transitus , potaque uberrime aqua continuo in corporis habitu effun-
ditur. Sanguinis autem rubri globuli eam ad poros quoscunque exha-
lantes mensuram nocti sunt , ut in fani hominis vasis maneant , nisi vis ma-
jor , neque cum naturæ legibus consentiens , eos poros dilataverit , ut in va-
fa

(*d*) QUESNAY eff. p. 285.

(*e*) RIDLEY Anat. of the brain p. 50. 51. BOERHAAVE inflit. rei msd. n. 61.
LANCESIUS p. 18.

(*e**) Conf. QUESNAY de la saignie p. 15. Rubri sanguinis 180 partes effluent ,
alborum succorum partes 40.

(*f*) MICHELOTTE in Historia Angelis Pisces p. 14. Essays of a Society at Elitz-
burg. T. II. n. 20. MORTON physiolog. p. 18.

(*g*) L. I. p. 38. L. II. p. 102.

(*h*) p. 144. Unica in insula hispaniola vena sectio Europeos , aliunde debiles , ita debili-
tat , ut in hydropem transeat CHARLEVOIX hist. de St. Domingue , T. I. p. 14.

fa minora, urinæ, intestinorum, cutisque denique etiam ruber crux ur-
geatur (*i*).

Adparet adeo, & plures etiam rationes supersunt, quæ latentes istas
causas adjuvant, quas exposuimus: adparet inquam, quam necesse sit,
recte corporis exercitatione, & victus contemperata ratione densitatem san-
guinis conservare (*k*), amissam vero eodem remedio, & carneo victu, &
ferro, & ejusmodi medicamentis restaurare, quæ cordis contractionem ad-
juvant. Adparet perinde, quam plena periculo CORNILLI BONTEKOE
(*l*) facta fuerit, qui male accusata sanguinis crassitie (*m*) integritatem va-
letudinis fere unice in tenuissimo sanguine posuerit, eamque aquosam indolem
aqua, cui thea infusa suisset, unice conatus sit adsequi. Iterum mirari possit
Cl. viros suisse, qui rubram sanguinis partem fere inutilem esse suspicari po-
tuerint (*n*).

Num alibilem naturam crux possideat quæri potest. Multi negant (*o*):
& certe videtur, albuminosam, elasticam, figurabilem, filaque trahentem
lymphæ naturam ad generandum id gluten aptiorem esse, quod partes fir-
mas corporis animalis & constituit, & reparat. Deinde nutritionis quasi re-
gnum latius, quam ruber crux patet, & perpetuo ordine paucum cum san-
guine pisces, nullis vero rubris cum globulis ea animalia nutruntur, quæ
exsanguia dicuntur, quod rubro vitali humore substituantur. Absque gelati-
noso vero elemento neque animal ullum, neque planta nutritur.

S. IX. Figuræ sphæricaæ commoda; tum ferri; olei.

Etsi utique aureus globulus lamina ex eodem metallo facta non den-
sior est, certum est tamen, sphæricam figuram cum eodem volumine mini-
mam superficiem habere, minimam adeo ab iis particulis fluidis resistentiam
pati, cum quibus per vasa fluit, atque adeo motus accepti tenaciorem esse.
Haec ratio est, quare funestis illis telis plumbeis ferreisque, constanter
sphæri-

(*i*) L. I. p. 38. L. II. p. 118.

(*k*) BOERHAAVE L.C. TABOR C. I. p. 71. QUINCY *essay the third on the animal fibre.*

(*l*) *De thea* p. 67. CREEYNE *theory* p. 143. BLANCARD &c.

(*m*) Recte monuit BOERHAAVIUS, perniciose hypotheseos debellator, recte
III. ARCHIATRORUM comes T. II. p. 266.

(*n*) *De St. Leger Thet.* In hæc verba *Ego proxima qua corpus aliter materies a rubro
sanguine diversa.* Paris 1743.

(*o*) IDEM ibid.

sphærica figura impertiatur, ut & longissime per aerem ferantur, & vehementissime feriant. Non repugnat adeo, & rubra vascula minima a rubris sphærulis potentius distendi, & aperiri, & ad minores humorum series, per eos globulos, integriorem a corde motum adserri, quæ nostri olim PRÆCEPTORIS conjectura fuit (p). Frictionem etiam a sphærica figura minui, atque parietes minimorum vasorum minimum pati adtritum, vulgo notum est, cum globi unico punto parietem cavi vasis contingant. Denique ad oscula minora subeunda sola hæc figura aptissima est, quæ secundum quacumque directionem feratur, atque eadem semper facilitate fubeat, cum in omni alia figura longior aliqua diameter sit, quæ in transversum acta ostium sibi præcludat, nisi multo latius fuerit (q).

Ferrum, quod in globulis est (r), non dubie densitatem ipsis majorem conciliat. Etsi enim ejus exigua ad totum sanguinem portio est (s), ad globulos tamen, qui sanguinis minorem partem efficiunt, major est multo, cum aqua quinque omnino sextas partes (t), pars vero globosa nondum (u) integrum quidem sextam sanguinis partem efficiat, siquidem ad eam albuminosum elementum plurimum confert. Ferrum autem & septuplo sanguine gravius, & præterea multo, omni alio sanguinis elemento, durius solidiusque est, & propriam sibi firmitatem cum rubris sphærulis communicare videtur. Aliiquid etiam ad calorem generandum conferre, probabile reddetur, cum omnium, quantum novi corporum, a frictione, & ab iactu repetito, vehementissime incalescat, solumque a malleo candeat.

Neque ad calorem nihil confert oleum, sive inflammabile principium, quod in globulis abundat (x), neque tamen a sero abest (y). Ejus multiplex utilitas est, princeps autem, quantum intelligo videtur, coire cum aqua, cumque ea animale gluten componere, quod neque absque aqua fluidum satis foret, neque absque oleo satis viscidum (y*), aut ad conferruminanda terræ elementa satis virium haberet. Idem oleum flexilem natum fibris impertit, quæ ex terra sola friabiles fierent. Denique plerisque humoris

(p) n. 261.

(q) Conf. ea quæ de secretione ex PITT CARNIO adferuntur. L. VII.

(r) p. 118. seqq.

(s) p. 120.

(t) p. 98. 99.

(u) p. 47. 48.

(x) p. 107.

(y) p. 139.

(y*) ROBINSON *Essay on animal economy* T. II. p. 416.

humoribus animati corporis aliqua copia inest, quam a sanguinis communi penu mutuentur, nonnulli vero fere unice aut potissimum ex oleo constant, ut adeps, medulla, bilis, cerumen, sebum subcutaneum.

§. X. *Seri sive partis flavescentis utilitas.*

Pars albuminosa feri, ad fibras generandas, sedque constitutionem a deo totius animati corporis primaria materia est. Ut vulnera vasorum claudat, oculorum testimonio confirmavi (z). Albumine setum volucrum ali, nempe sero (a); simili gelatina piscium & quadrupedum oviparorum embryos primis diebus unice nutriti: similem in amnii aqua coagulabilem naturam esse, & ad alimentum homini nascituro praestandum aptitudinem, suis locis ostendemus. Ut mucus in gelatinam, haec in membranas & viscera, demumque in animalis partes solidas consistat, per experimenta ostensum est (b).

Hos ad usus oportet definitam in sero viscidæ materiæ ad aquam portionem esse. Si aquæ portionem auxeris, gluten dilabetur, amissa parte, quæ terreas particulas ligat: robur omnium fibrarum frangetur, laxatis vinculis quæ divisa elementa uniuiri: demum nihil de sero ad nutritandas partes adhaerbit, sed præteribit, quæ farcienda fuerant, ut omnino nutritium humorem ab excreimento ex natura coagulabili distinguamus (c). Porro albuminoso succo sua densitas necessaria inest, ne in vasa minora transeat. In fano homine nullæ ad ignem, aut ab acore, coagulabiles particulae in urinam, in lacrimum, in alios tenuiores transcurrunt, ne quidem in febribus (d). Augē elementi aquei portionem, transibunt utique & fieri, quod a ratis & vitiosis corporum conditionibus (e) factum est, ut alkibilis humor per urinam, sudoresque disperdat, quale in diabete inque colliquativo sudore exemplum est. Non ideo negavero, multa vi circularis motus denique serum

(z) *Second memoir, &c.* p. 189.

(a) Per experimenta CL. BEGUELIN nuper in T. XIX. diarii bamberg. magazin. recusa.

(b) *Ser la forme du poulet* T. II. p. 179. HARVEY p. 125.

(c) LOWE p. 6. ed. Bat.

(d) *Quelcay des fevres cont.* T. II. p. 494.

(e) Serum ad iugum coagulabile in urina *Phil. Transf.* n. 221. Urina in phthisico pellucida, & coagulata, ut ranarum, quod vocatur sperma *Eph. Nat. Cur. Dic.* I. ann. 8. obs. 30. Urina vero puerorum gelatinam infidere, nimis pro toto genere adiuvatur *BROUZEZ educat. medicin.* T. II. p. 181.

rum adtenuari, resolvi, exhalare. Verum tunc suo defunctum munere, naturam coagulabilem depositi.

Contra necesse est, ut rubro sanguine serum aliquanto tenuius sit, ne globuli se comprehendant, inque coagula coeant, ad quæ aliunde proni sunt (*f*). Hinc fit, ut diminuta aquæ portione serique, crux aquam in morbis acutis repellat (*g*), neque sibi sinat admisceri. Sed etiam proprio cum canali crux reum coailitum sunt qui metuant (*h*), neque penitus praeter rem, cum in ductu arterioso, in aneurysmatibus, in arteriis ligatis hujusmodi coalitionis exempla sint, inque rariss nonnullis vitiis, qualia ipse descripsi (*i*).

Muco plurima sua utilitas est, alias ornatus expoundenda. Sensiles nervos ab acrimonia aeris, urinæ, a frictione tuetur; siccitatem ab organis deglutitionis, loquela spiritusque avertit, olfactum temperat, alias corporis partes cum mobilitate replet, ut in funiculo umbilicali, in articulorum capsulis exemplum est. Idem oleum cum aqua optime commixcit (*i**).

§. XI. *Aqua, salis, acris, ignis in sanguine utilitas.*

Ipsum serum aqua amissa stat, cocti albuminis simile, neque vitalem circuitum absolvere aptum foret, nisi multa ab aqua viscidum gelu dilueretur. Serum amissa aqua in gummi speciem coit. Aqua omni alio liquido magis expedite per canales minimos iter obit. Sepe expertus sum, per tenuissimos anellianos tubulos aquam exprimi posse, non ita coloratos liquores. Aqua in 80 pulsibus idem iter describit, quod spiritus vini in 86, raparum oleum in 100, argentum vivum, adeo mobile, in 124 pulsibus absolvit (*k*). Absque aqua oleum iners restagnaret, & cogeretur.

Iterum aqua fibras animales irrorat, a siccitate aque coalitu servat. Incredibile est, quanta a sola aquæ difflatione in partibus animalium degeneratio superveniat. Ipsi adeo molles tenerique nervi, unice ab amissa aqua, in rigidos, succini similes, præ duritate fragiles funiculos abeunt.

Sed eadem aqua omnium humorum corporis animalis principem portionem

(*f*) p. 41. *Sc.*

(*g*) *HUXHAM en seors* p. 8.

(*h*) *ILL SENNEKKE* p. 100.

(*b**) Cujus interno parieti membranam cruentam ex sanguine natam adhæsisse vidi.

(*i*) *Opuscul. patholog.* obs. 19. *Pblol. Transf.* n. 483. 492.

(*i**) *Essays of a Socie. at Lonam.* V. I. ad fin.

(*k*) *HAYMAN Comit.* in *Bonon.* T. VI. p. 322.

tionem sola suppeditat, nonnullos vero humores fere sola praestat, ut tenuiores illas exhalationes, Sanctorianam cutaneam, lacruman, sudorem, salivam, humores pellucidos oculi; vasaque minorum generum, quorum liquor non cogitur, aqua pene sola perfluuntur, omnes alias nimis crassos humores refutatura.

Sales animalium pene urinosi, videntur necessariam quibusdam humoribus acrimoniām praeſtare, aut ciborum digestioni aptam, ut in bile, aut sollicitandis suis receptaculis, ut in semine, cerumine, ſece alvina, necessariam. Idem, ipsum per repetitum humorum motum nimis meraci, nimis volatiles, nimis acres, urinæ, ſuoris, alvi ſecum, perspirabilis humoris partem conſtituunt, & de corpore avolant, noctiſtri si retincentur. Iterato vero moneo, sales me dicere, non quod sales jam veri ſint, ſed quod apti nati ſint, qui cum certo caloris gradu in ſinceros ſales abeant (k*).

Aeris dotes & utilitates nondum ſatis notaे ſunt. Id interim certum eſt, ad gluten pertinere, quo omnium firmorum in universa natura corporum elementa cohaerent, ut omnino neque fere metallum, neque os, neque lapis, neque testa, neque ſal, diſſolvatur, quin aer extricatus prodeat. Quid in humoribus nostris utilitatis exerceat idem, num fluidum naturam conſerver, aut ad alias mutationes, putredinis haſtenus adſines, clanculum diſponat, neque hoc loco, neque uſquam forte exponi poterit.

Ignis omnis in rerum natura motus, omnisque fluiditatis auctor, etiam nostrum ſanguinem procul dubio a congelatione liberat. Muſto vero maiorem ignis vim poſſidemus, quam ad hos quidem uſus erat neceſſe. Nam neque pifcibus 1. 3. aut 5. gradibus calentibus ſanguis, dum vivunt, congeſtatur. Quid is major calor utile praeſtet, non ſatis certe notum eſt. Neque enim humores nostri, quam pifcibus, liquidius vafa ſua oberrant (l), neque diſſimiles noſtrorum humorum in iis adeo modico calore tepeſtibus animalibus humores naſcuntur, nihiloque inertior bilis eſt, &, quod miſrum videri poſſit, ſales, muſto quam nobis, in frigidis animalibus meraciores parantur, ut in vipera, ape, cantharide. Sed neque deterius pifces aut

V 2 cibos

(k*) Non dari in ſanguine particulas calidas, quæ cumulate febrem faciunt *Leopardus, a Capo a rageion.* T. II. p. 39.

(l) Hoc addo, ut ne credatur, fluiditatem humoribus a calore accidere. Aqua equidem calida expeditius per vafa animalia trauiſt, inque 46 & 52 ſecundis minuitis id iter abſolvit, quod frigida in 77 & in 80 eiūſmodi nihiſius perfeicit *Hætus benzafat.* p. 130 Verum nostri quidem humorē potius viſcidiōres ſunt iis, qui pifces animant. Majori cum calore aqua diſſicilius trauiſt, & vafa conſtrigit, quoniam 36 *Reaumurii* gradiū, aut 104 Fahr. excedit. *Sauvages de inflam.* p. 337.

cibos digerunt , aut minus expedite moventur , aut minori sunt robore , aut breviori vita. Est certe aliquis pulmonem inter & calorem consensus , in quem alibi inquiremus.

§. XII. *Fons & penus unde sua sanguis elementa habet.*

Etsi ad hanc questionem , post enarratam demum ciborum & digestio-
nis historiam , plene responderi potest , tamen interim , donec post aliquot
annos eo nos labor noster ducat , pauca temporis praeipuisse licet.
Ex adipe vegetabili & animali globuli lactei (*m*) procul dubio finguntur,
ex ipsis globulos rubros parari non est improbatum , postquam cum ferro
fubacti fuerunt densatique : eamque soliditatem adepti , ut medium per lym-
pham , non mutata figura sua , neque variato volumine circumeant , inque
aqua subsideant , qui in lacte natabant. Inflammabilem naturam ab origine
retinent. In pullo sanguis ex pingui vitello (*m**) sub oculis nostris gene-
ratur , cum flavedinem evidentissimos per gradus deponat.

Serum sanguinis ex animali gelatina vix mutata facile renascitur. Ve-
rum , cum etiam ex solo vegetabili cibo animalia simillimam nostræ lym-
pham parent ; & homo solo pane cum aqua sanus vivat , simillimosque
humores generet eorum , quos alii ex laetiori diæta lucrantur , sequitur
etiam ex vegetabili mucilagine (*n*) animalem gelatinam parari posse : ut
tamen in hoc exemplo , inque globulorum formatione , acidus sal corpo-
rum vegetabilium in ammoniaci similem salem humanum mutetur , qui ad
ignem urinosam naturam induit. Olei etiam major portio huic gelatinæ
accedit (*o*).

Oleum sanguinis ex natura vegetabili minus mutata reformatur , cum
acidæ indolis manifesta vestigia retineat (*p*).

Sal sanguinis manifesto ex acido sale (*q*) generatur , qui in vegeta-
bili

(*m*) Ex adipe , de butyracea lactis parte decedente , globulos rubros parari *Franciscus QUESNAT* *anom. anim.* T. III. p. 53.

(*n*) *CANTHEUSER* *mater. med.* T. II. p. 551.

(*m**) *FABER* ad *HERNANDEZ*. Ex ovis testudinum verum oleum ad solem fit ,
levius olivarum oleo. *GUMILLA* *bifi. narrat. de l'Ornoque* V. II. p. 69.

(*o*) *IDEM* *I. c. Lorry des alimens* p. 317.

(*p*) *L. I. p. 31.*

(*q*) *BOERRHA AVE* *Elem. Chem.* T. II. p. 327. *SENAC* *I. c.* T. II. p. 216. *QUES-*
NAT *anom. anim.* T. II. p. 575. 373: &c. *NEUMANN* *ed.* *ZIMM.* p. 1210. T. III. *ed.*
posthum. p. 40.

bili fabrica plurimus habitat, iterum boum exemplo, qui verissimos urinosos sales in sanguine habent, solis acescentibus herbis pasti, bombycumque & aliorum infectorum, quæ ex acidis ciborum succis pene perfectos urinosos sales elaborant, hominumque, qui etiam solo adeo acescente lactis fero, multos per annos vitam sustentarunt: neque rara exempla sunt mutati in alcalinum salem acoris, cum & putredo similem effectum præstet, & ignis, quarum causarum illa quidem ex acidissimo citro pomo salem urinosum volatilem, & hæc ex oxydis acido sale fixum lixiviosum (*r*) aut ex acore nitri cum pulvere carbonum in retorta, quam vocant, tubulata detonantis, urinosum volatilem (*s*) salem producit. Similem efficaciam hic diuturnus calor animalium humorum, rapidusque motus papillatum præstare videtur. Ita farina repetito pasta, destillata, sola fere urinosa elementa suppeditat (*t*). Peculiares aliquos nitrosos animalium sales (*u*) non satis intelligo, quos ostenderimus, plerosque ex urinosa volatile tribu, aliquos ex lixiviosa fixa, alias ex muriatica classe, paucissimos acidos esse, qui veteris formæ vestigia retinent.

Ferrum animalia facile ex plantis (*x*) habent; terram & ex cibis quibuscumque, & ex ipsis denique aquis: quæ eadem solidum fibræ elementum, totique animato corpori suam firmitatem præstat. Ex vegetabilibus recepta, naturam vitescibilem magna ex parte fere mutat, & in calcariam transit, forte quod cum oleo intime per tritum uniatur (*y*).

(*r*) Ex acido salis crystallini acetosellæ in igne subito fit sal fixus, dum pars acida in squam transit *N E U M A N N* T. III. p. 40.

(*s*) *P O T T* *fortsetzung der untersuchung* p. 34.

(*t*) *N E E D H A M* *nouvell. off.* p. 273..

(*u*) *S E N A G* L. C.

(*x*) p. 118.

(*y*) *J U N K E R* *chym.* ed. Gall. p. 518.

ELEMENTORUM PHYSIOLOGIAE

L I B . V I .

ARTERIARUM ET VENARUM OFFICIA

S E C T I O I.

Sanguinis motus qui axin sequitur arteriae.

§. I.

HOc toto volumine theoria passim continetur, quæ anatomes luce catet, neque ad evidentem demonstrationem potest profici. Multa ergo hic hiulca, multa dubia superfunt; quæ certa ea pauciora, aut ad pulsum pertinent, aut per ea experimenta nascuntur, quæ vivorum animalium perspicua cutis permisit. Non alibi magis jatromathematica secta dominatur, quæ fluentis per conicos & cylindricos canales sanguinis motum, retardationem, celeritatem, qua secundum axin vitalis humor progrereditur, momentum, quo in parietes arteriarum dilatandos nititur, harumque velocitatum effectus in mutandis humoribus definire conata est. Si non licet multa firma docere, faciam tamen, ne debilia pro certis, & pro vero hypothesin offeram. Neque enim hanc physiologizæ particulam omisisse licet, quam & in toto reliquo opere frequenter, & tamquam fundamentum reliquæ theoriæ, repetere necesse sit: & absque qua de secretione, & nutritione, de obstructione denique, inflammatione, febre & universa fere morborum aut lentorum, aut velocium pathologia vix quidquam dici potest.

Possit videri, contra leges boni ordinis me peccasse, quod sanguinis per arterias venasque fluentis phænomena nunc demum exponam, postquam dudum arterias descripsi venasque. Verum non potuit certe sanguinis per arterias motus intelligi, nisi cordis prius vires, atque adeo fabricam, & contractionem delineasset: neque intelligi, quæ vasorum sanguinem vehentium

vehentium sint officia, nisi sanguinis & reliquorum, quos continent humorum indolem exposuisse.

S. II. Sinus maximus aortae.

Quando de arteriis in universum sermo est, præstiterit aortam contemplari, ad quam omnino major pars arteriarum, tamquam ad truncum rami pertineant: de pulmonis enim arteria proprio capite dicendi locus erit (*a*); quatenus peculiares hujus arterie affectiones sunt. Ergo ex ventriculo quidem superiori, posteriori, quem vulgo ad brutorum animalium fabricam finistrum dicunt, sanguis in aortam (*b*) pellitur, cuius arterie prima stamina alio loco exposuitus (*c*), ad arteriarum nempe coronariarum oscula. Quæ ultra ea ascendit arteria, quasi laxato cingulo, quo carnes cordis nascen-tem truncum comprehendebant, aliquanto latior est, quam intra cordis quidem ambeuntem anulum. Eam latitudinem se habere ad cordis ostii ambitum ut 37 ad 32, auctor est *Franciscus Boissier* (*d*). Cæterum ejusmodi sinus in piscibus (*e*), ranisque (*f*), majorem video, ut frigidi maxime sanguinis bestiis manifesto tubere aorta supra cor intumescat (*g*), quem non pauci quidem anatomici pro aurium altera (*h*) habuerunt, alii rectius intellexerunt. In eo tubere cellulas rugasque *Duverneyus* detexit (*i*), quas laminæ spiralis nomine descriptis, & cùjusmodi cellulas in anguilla vidi. In homine, & adultiori maxime, amplitudo quidem manifesta est, et si nimis forte ambitione *maximum aortæ* (*k*) *sinum Valsalva* dixit. In juniori homine in universum aortæ ostium, quam in seno angustius (*l*) est, & nunc in fele nupero partu exclusa co-

rami

(*a*) *Lib. VIII. de pulmone & respiratione.*

(*b*) *Lib. II. p. 44. 55.*

(*c*) *Lib. IV. Sect. III. n. 17. p. 447.*

(*d*) *Mem. de l'Acad. de Berlin. 1755. p. 38.*

(*e*) Inter frigidos pisces in salmonem *Antonius v. Leeuwenzhoek* *Phil. Transf.* n. 319. & ante eum *Samuel Collins* *System. of anat.* T. II. tab. 15. f. 1. in *mustela Geringo*. de pectoris. *Salmon.* in xiphia *Hartmann* *diff.*

In phoca, calido pisce, habet *M. A. Severinus uniusperipas.* p. 32. Solidissimam enim & gibbosam aortam dicit.

(*f*) Se ouï *Mémoire sur les parties sens. & irrit.* *Exp. 548. 551. 554.*

(*g*) In anguilla l. c. *exp. 526.*

(*h*) *Couf. Lib. IV. p. 306. & Robredo de pisces. *Salmo.* p. 10.*

(*i*) *Mem. de l'Acad. Roy. des Scienç. 1669. f. 6. 7.*

(*k*) *Dissert. posthum. I. tab. 2. f. 1. p. 131.*

(*l*) *Fr. Sauvage et Mem. de l'Acad. de Berlin. 1755. p. 34. &c.*

ram ne vestigium quidem ejusmodi finus video : vidit tamen in variis animalibus illustris MORGAGNUS (*m*) , & in fetu vestigia reperit (*n*) : ut omnino non ab urgente sanguine nata latitudo , & nativum quasi aneurysma sit , sed ab ipso Naturæ primo instituto fabricatum prodeat (*o*) . Ut se in pulli incubati corde habeat (*p*) , pulsatilis haec tenus bulbus , alibi exposui : sed eum bulbum maturior vitæ vis intra cordis carnes retrahit.

§. III. Ejusque arteriæ arcus.

Eadem aorta , ad egressum subclaviæ dextræ priorem ad diametrum reddit (*q*) , quæ ipsi ex corde prodeunt fuit . Sed ab ipso ex corde egressu curvam lineam describit , *arcus* est quem volo , quem & physiologia cognitum ponit , & ad evitandos veterum errores haec tenus descripsisse necesse est.

Alia nempe hic homini , quam animalibus fabrica est . Pleræque equidem , quas ego quidem dissecui , bestiæ , arcum in aorta habent , quæ de corde prodit , ramos vero alter educunt , avibusque præterea is arcus dextrorum curvatur . Ergo in homine aorta arteria , quam primum de corde exiit , dextrorum aliquantum (*r*) dum adscendit , inclinatur . Inde , & magis quidem atque magis sinistrorum flectitur , & una , sed continuo magis in transversum deprimitur : aque suprema sede sua , sinistrorum quidem descendit (*s*) , & una deorsum , ut vertebrarum dorfi corpora consequatur , quæ sibi porro sint pro fulcimento . Eas quando attigit , recta fere , sed tamen una dextrorum aliquantum , sive antrotum descendit , ut mediis se vertebrarum corporibus inponat .

Hæc nunc arteriæ principis inflexio non satis accurate cum aliqua bicruri curva mathematica comparari potest . Neque enim parabolæ convenit , cum crura nimis habeat parallela , neque circularem (*t*) rotunditatem imitatur , cum crus sinistrum pene rectum , dextrum dextrorum primo , inde sinistrorum flexum

(*m*) Epist. Anat. XV. n. 2. § 6.

(*n*) n. 5. p. 13. deinde T A U V R Y olim in vitulo , excitante MORGAGNO.

(*o*) SCHREIBER almag. p. 228.

(*p*) Mem. sur la formation du cœur dans le poulet T. II. Sect. VI. n. 5.

(*q*) V ALSALVA polihym. p. 131.

(*r*) WINSLOW epist. T. III. tr. der arteres n. 5 , SENAC. du cœur T. IV. f. 1. icon. Anat. fascic. VI. p. 1.

(*s*) Vide eum arcum passim , sed in primis SENAC T. IV. f. 1.

(*t*) Huc MICHELOTTUS Comment. Bonon. T. I. p. 449. 450.

flexum noctis sit. Sed neque a sanguinis projectione ejusmodi curvitates unice, aut primario nascuntur, quarum princeps potius causa in cellulosa tela sit, quae arteriam ad vicinas firmiores sedes eam in figuram adliget, quam natura requirit. Quare soluta, suis de vinculis, arteria relictitudinem recuperat.

In eo vero vetustas (*u*) maxime erravit, quod ramum ex aorta alterum, sursum deduxerit, deorsum alterum, unde nomina illa adscendentis aortae & descendentes nata sunt. Avibus equidem totidem truncis ex aortae arcu, sua cum carotide conjuncte subclaviae exeunt, dextra, sinistraque (*x*). Bovino generi, quod coram non habeo, video aortae adscendentem truncum a clarissimo scriptore tribui (*x**). Canum, felium, alioremque quadrupedum, ea fere est fabrica, ut ex aorta nascente arcu grandis truncus nascatur, qui porro in subclaviam dextram, & carotidem utramque dividitur: sinistra subclavia seorsim fere prodit (*x***).

Homini, hactenus soli inter ea animalia, quae mihi incidisse contigit, tres rami (*y*) distincti de convexitate magni arcus proveniunt, ut omnino voce aorte adscendentis absque errore nequeamus uti. Eorum ramorum primus subclavia dextra est, quae porro sui lateris carotidem generat: altera est carotis sinistra, tertia subclavia ejusdem lateris. Is naturae ordo ratio mutatur, frequentius tamen, si aliquantum a recepta divisione natura recessit, quartus de aorta ramus prodiit, qui vertebralis sinistra est (*z*).

Si

(*u*) Obscure *GALENUS de arter. & venar. diff. c. IX.* manifestius *Jacobus BERENGARIUS Carpensis Iag. brev. in Anat. corp. hom. p. 32. b. Carolus STEPHANUS de diff. part. corp. hom. p. 134. Andreas VESALIUS d. fabrie. corp. hom. L. III c. 12. p. 486. Tab. anat. vas. tot. corp. in L. III. Y. Z. X. D.* Ab eo pene omnes, & nonnulli recentiorum.

(*x*) *Second Memoire sur le poulet* p. 87.

(*x**) *MORRISON of comparat. anatomy* p. 41.

(*x***) Huc tabula *CASSERRII de voce & anato. T. XV. five hom. Tabl. post. L. X T.I.*

(*y*) Vide interim, si placet, iconem nostram fasciculi VIII. tum iconem Cl. viri ARENT. CANT. T. IV.

(*z*) *Fuscio VI. p. 1. & ante me Jacobus LEONCENA VESLINGII olim incisor Phil. Transf. n. 180. J. Godofredus de BERGER Ad Erudit. 1658. p. 296. J. Zacharias PETSCHE obseruat. miscell. in Tom. VI. mea collectionis recuf. n. 45. J. BIGNI. WINSLOW L.C. n. 21. CHRISTOPH. JAC. TREW. Commerc. Lit. 1734. b. ed 24. Georgius MARTINEZ ad EUSTACHI. 143. BARRAUT. Angiolog. p. 387. Leinde Phil. ADOLPHUS BOERNER obseru. Anat. fasc. I. p. XI. Cl. LOESKE obseru. Anat. p. 26. Journal de Medecine 1747 duc. & Cl. HENKEL Zweyter Sammlung p. 11. qui quidem Vir Clar duas reperit vertebrales ejus lateris arterias, hanc, quae processum collum transversum quantum subit, & aliam, quae septimum.*

Haller Physiolog. Tom. II.

X

Si quando rariori exemplo aut quadrupedum fabrica in homine obtinuit (*a*), aut quatuor rami diversi (*b*) ex corde prodeunt, aut subclavia dextra serius nata retro truncum aortæ suam ad sedem occulta erexit (*c*), aut mammaria dextra de ipso arcu nascitur (*d*), aut insula facta (*e*) aorta duplicatum in arcum abit, aut aorta absque arcu bifida est (*f*), aut alia demum ratione (*f**). Natura hanc principem arteriarum originem fabricata est, adeo tamen haec rara sunt, ut in quadringentorum cadaverum incisione nihil ejusmodi viderim, neque ante me, celebris olim ex manus medicantis & dissecantis solertia, *Gnilielmus CHESELDEN* (*g*). Multuri vero debemus claris viris, qui aut iconibus ad naturam factis (*h*), aut sermone præterea (*i*), quo epidemicum errorem redarguerunt, paulatim aortæ adscendentis fabulam, & dedecorosum in re facili errorem medicorum repetitis tandem laboribus superarunt; ut pauci sint, qui nostro ævo eo vocabulo utantur, cui sensus excusabilis vix invenitur.

§. IV.

(*a*) *CASSEBOHM* apud *J. Zachariam PETSCHE* l.c. n. 47.

(*b*) *Phil. Cour. FABRICIUS* Ad. Acad. Nat. Cér. Vol. X. obs. 36. *Phil. Adolphus BOEHM* in programmata, quod in T. II. mear. disp. recusum est, f. 1. *WINSLOW* l.c. n. 19. *BARBAUT* l.c. *Journal de Medecine* 1758. M. april. Eo inclinat icon *JACOBI DRAKE*, hacceptus aliquantum a *COWPERIANA* diversa T. XX. Quatuor ramos, & quintam vertebralem vidit *J. Z. PETSCHE* l.c. n. 44.

(*c*) *Loeser* l.c. *HUNAULD* *bifurc.* de l'Acad. Roy. des Sciences 1735. p. 20.

(*d*) *P. Ad. BOEHM* in progr. cit. f. 2.

(*e*) *Optimus HUMMEL*, nucus olim Bernae incisor, *Comit. Lit. Noric.* 1737. bebd. 21. tab. 2. f. 3. 4. *Phil. Conradus FABRICIUS* anat. pract. p. 118.

(*f*) *Journ. des Savans* 1668. n. 3. in infante.

(*f**) Arteria thyreoidea inferior, ex magno arcu nata apud *Henricum Albertum NICOLAI* direct. *tafor.* n. 7. p. 28. Duo ex aorta trunci, quorum alter in carotides, in subclavias alter divisus est *HUMMEL* l.c. f. 3. 4.

(*g*) *Anat. of human body* Edit. VI. p. 184.

(*b*) *Barbolomaeus EUSTACHIUS* Tab. XV. f. 1. 4. 6. T. XVI. f. 1. 2. &c. *Hieronymus FABRICIUS* ab *Aquapendente* de form. fetu. T. VI. f. 15. utcumque in fetu. *VESLINGIUS* *Syntagma*. anat. T. X. f. 2. N. O. O. J. L. *BRONCENA* l.c. *Richardus LOWER* de corde c. 1. p. 36. tab. 2. f. 4. 5. 6. *Raymundus VIEUSSENS* *Neurograph.* T. 21. cui laudem prime verioris iconis tribuit *Cl. MARTINE* l.c. *Gnilielmus COOPER* in append. ad opus *BIDLOI* T. III. & apud *DRAKE* T. XX. *Phil. VERHEYEN* anat. corp. hum. T. 27. f. 1. *H. RIDLEY* ic. 5. post observationes. *Jobannes MERY* nov. *système sur la circulation du sang*. f. 1. 2. *Albert CAST* impet. anat. T. IV. *Lancisi* s. de corde & arterijs. T. IV. f. 1. 2. *SENAC* tr. du caser T. IV. f. 1. *GARNET* *Geot. Splanchnologie* T. II. p. 161. Tab. 15.

(*i*) *Jobannes RIOLANUS* in *animadvers. in Laurentium* p. 691. inque *anatomia* *Nath. HIGHMORE* p. 163. *Coronis DRELINCOURTIUS* s. qui aortam curvo cum baculo comparavit, apud *BEAUMONT* de *circul. sang.* Leid. 1698. *G. COWPER*

KUS

§. IV. *Rami principes.*

Horum cæterum ramorum maximus est subclavia dextra, quæ sursum introrsum (*k*), & paulo post rectius sursum carotidem sui lateris emitit (*l*). Subclavia vero, quæ peculiariter hoc nomine designatur, sensim inclinata, & transversa denum, super claviculam (*m*), & pone id os, sui lateris brachium adit. Ea subclavia, quæ angustiori sensu hoc nomine conservat, sinistriodali sua aliquanto amplior est (*n*), etiam me observante. Rationem reperi uti 35 ad 29, & uti 27 ad 25, & uti 24 ad 20. III. SANACUS, numeris usus majoribus, eas rationes fecit, ut 23309 ad 15129 (*o*). Deinde Cel. olim SYLVA (*p*), magnam rationem, nempe diametros fecit uti 18 ad 14. Si satis ea ratio firma est, & repetitis experimentis confirmatur, intelligitur, quare dextrum brachium homini in universum & majus, & una valentius sit (*q*).

Carotis sinistra & sursum protenditur & una sinistrorum (*r*), non evidenter sua fodali dextra minor, & major aliquanto, si ill. SENACI membræ valent (*s*). Cæterum satis intelligent, qui multum in metiendis factorum cera vaorum luminibus laboraverunt, quam facile hac in opera erretur, & quam non difficulter major aliquantum siphonis impetus, aut flexio aliqua, aut laxata cellulosa tela sanguinem in alium, aliunde ramum potentius ducat.

Subclavia sinistra suum ad latus magis inclinata adscendit ultima (*t*).

Qui porro his a truncis rami arterioli nascantur, eos oportet in bra-

X 2 chis

rus ad T. XXIII. BIDOT. Fridericus RUTSCEN in Epist. III. ad GAURIUM & in tbcf. I. p. 21. tbcf. IV. tab. 3. f. 2. s. s. Johannus Baptista MORGAGNUS advers. anat. l. p. 19. n. 16.

(*k*) CANT. Lc Tab. nostr. tot. corp. ant.

(*l*) Idem ibid. Fasfc. VI. T. L

(*m*) Superclavias dixit J. RIOLANUS antropol. p. 344. Eubirid anat. pass. p. 41a. Conf. Tab. nostr. fasfc. VI. L

(*n*) HELVETIUS lettre au sujet de la critique de M. BRISSE p. 181.

(*o*) L. c. T. I. p. 246.

(*p*) Traité de la saignée p. 189.

(*q*) Cum non robustius unice, sed etiam aliquanto majori sit volumine, non potest majus robur brachii dextri a maiore sanguinis in arteriam subclaviam ejus latris minorem irruentis velocitatem explicari. *Comparative anatomy* p. 112.

(*r*) Fasfcul. VI. iconum anatomiar. T. I.

(*s*) Rationem sinistri carotidis ad dextram fecit 23336. ad 15104 L. c.

(*t*) Fasfc. VI. iconum. anat. T. L

chiis quidem ab anatome repetere (*u*) , hic porro non exponendos. Nam in capite accuratius aliquanto carotidum & vertebralium arteriarum ramos requiremus. Sed plicas etiam , quæ sunt sub horum trium grandium de aorta prodeuntium truncorum originibus , eas alibi expositas (*x*) , hic non repeto.

§. V. Motus sanguinis quo secundum axin arteriarum pergit.

In aortam nunc arteriam , ejusque ramos omnes sanguis de sinistra cordis cavea magna velocitate impellitur. Sed is , quem a corde accepit , motus duas omnino in directiones resolvitur. Prima , quam fere solam physiologi vulgo metiri solent , & contemplari , ea est , qua sanguis a corde secundum rectam lineam secedit , aut secedere sumitur , ut per axin arteriarum , lineasve rectas huic axi parallelas , recta a corde per aortæ , & ejus ramorum axin , ad extremos arteriarum fines , inque venarum initia didatur , qualem fere lineam possis a cordis exitu ad arteriam temporalem fatis rectam ducere : eum motum imaginaria illa cylindrus sanguinis sequitur , quam Laurentius BELLINUS (*y*) ab omni in parietes arteriæ illosione immunem sibi finxit. Eum motum *progressivum* vocant , cumque possis in frigidis animalibus oculis facile usurpare : eorum enim globuli sanguinei omnino secundum axin arteriarum , lineasve ad axin parallelas , rectissima directione procedunt (*z*).

§. VI. Hujus motus velocitas.

Hic ipse motus est , cuius velocitatem physiologi , & in primis jatromathematici quæsiverunt , quoties cordis vires calculo subjicere sunt conati (*a*). Est tamen aliqua diversitas inter mensuram velocitatis , quæ ad cordis motum definiendum requiritur , & mensuram ejusdem velocitatis , qua per arteriam fertur. Nempe priorem calculum ingreditur temporis ratio (*b*) , quo cor in systole versatur , quo solo nempe tempore cor totam sanguini aortam perfluit.

(*u*) In fasciculo VI.

(*x*) L. II. p. 67.

(*y*) Prop. XXV. FOERLLA AVE prædict. Acad. T. II. p. 286.

(*z*) Mémoire sur le mouvement du sang p. 235. &c.

(*a*) L. IV. p. 449. seqq.

(*b*) Ibid. p. 447.

perfluentis velocitatem impertit. Hoc loco vero querimus medium velocitatem (*c*), qua sanguis per aortam effluit, continuo flumine, lentiū utique, quam in priori calculo, cum tempus nunc, quo spatium priori calculo inventum percurrit, non sit unius systoles cordis, sed unius omnino pulsus, eritque hæc velocitas tanto minor ea, quam prius invenimus, quanto systole cordis brevior est tempore pulsus totius. Sed hæc ratio, et si eam definire vix possumus, tamen subtripla, aut major est : cum diastroles tempus systolen fatis manifeste superet (*d*).

Hanc emendationem, si in KEILII calculum introduxeris, erunt pedes 52, quos sanguis ex corde prodeuns, in uno minuto primo percurrit (*e*) ; si in HALESIANUM, erunt pedes paulo minus 50 (*f*). In uno adeo pulsu, positis pulsibus unius minutus 75, erit celeritas ex priori calculo pollicum octo in uno pulsu, ex posteriori aliquanto minor.

Claudius Nic. le CAT, ad dimidium in secundo minuto pedem eam velocitatem reducit (*f**). FRANCISCUS BOISSIER, VIR CL. in nupero calculo eamdem iterum diminuit. Auget enim ostium aortæ, uti monui, facitque, ex adulto homine diametri 10. 11, lin. (*g*) ita id ostium aortæ mediocriter extense ad lineas 126. 6 æstimat (*h*). Deinde faltum HALESIANUM, tanquam ex ultimo conatu animalis productum, a 7 pedibus reducit ad 16 pollices, volumen vero sanguinis duabus uncis æquale, ad 4989. lin. quadr. (*i*) : ita reddit iter ab unda sanguinis, in fano homine, de corde in aortam propulsæ, ad tres pollices cum parte quarta in toto pulsu : & si aliquanto plus sumseris sanguinis, ad uncias tres, erit etiam aliquanto minor velocitas. Denique systolen & diastrolen cordis æquo tempore peragi, IDEM auctor est (*k*), ut adeo celeritatem a systole cordis natam vehementer minuat.

Si hunc calculum cum celeritate sanguinis comparaveris, qua sub mi-

X 3 * croco-

(c) STARELLIN *de vi cordis* p. 8. SAUVAGES *de inflamm.* p. 215.

(d) L. IV. p. 449. 454. &c. Ad quinquefiam partem reduxit J. R. STARELLINUS I. c. p. 17. & III. SCHREIBER in *Abmagaz.*

(e) p. 459. proximus numerus MORGANIANO, qui vir 55 pedes in minuto primo percurrit maluit.

(f) p. 454.

(f*) *Diss. sur le mécanisme du mouvement des muscles* p. 83.

(g) *Mém. de l'Acad. de Berlin* 1755. p. 34. *

(h) p. 36.

(i) p. 37.

(k) *Le bambouf.* p. 34.

croscopio ranarum arterias perfluit, non adeo longe a calculo recesserit observatio. Tanta enim in iis animalibus velocitas est, ut oculis globulos sanguineos per arterias sequi non possis, & in tempusculo vix adsignabili, eam lineæ fere longitudinem percurrent, quam possit campus metiri microscopii (*l*). In pulmone ranæ, non per truncum, sed per ramos sanguinis in $\frac{1}{700}$ horæ pollicem perfluxisse creditur: quod tempus est totius pulsus fere tertia pars, atque adeo ea ex observatione in tantillo animale, cuius cor est ex minutioribus, velocitas sanguinis fere eadem esset, quæ in aorta hominis (*m*). Saltus merito diminuitur. Fit enim ex art. ria loco, de quo solo resistentia denta est (*m**), multumque superat velocitatem naturalem (*m***). Plura experientia, de minoribus vasis alibi locum invenient.

§. VII. Adfectiones aliquæ.

I. Motus per axin celerior.

Cum sanguis ex corde expulsus neque totus axin possit tenere sui canalis, neque ejusdem indolis, ponderisque, particulis constituantur, non eadem cum velocitate omnes, de eodem corde expulsa, particulae incident. Primumque in universum motus per axin ipsum aliquanto (*n*), quam in lineis ab axi remotioribus, propiusque parietem positis, celerior est. Ad axin enim, qui moventur globuli, rectam lineam brevissimam tenent, secundum quam pressio cordis in promovendo sanguine operatur, & in qua adeo velocitas accepta, quoad ejus fieri potest, conservatur integerrima. Quare etiam in vivi animalis arteriis linea sanguinis, quæ axin tenet canalis arteriosi, aliquanto celerius progreedi videtur (*o*).

§. VIII.

(*l*) *Mémoire sur le mouvement du sang*, exp. 67. 71. 81. 82., 84. 88.

(*m*) *HALES* *barograph.* p. 62.

(*m**) *BELLINI de sangu. miss. prop.* I.

(*m***) *In second. mem. sur le mouv. du sang* Sect. VII. tot.

(*n*) Motus aquarum ad latera tardior est *BERNOULLI hydrodynamic* p. 36. Conf. *SCHREIBER* *almag.* p. 244.

(*o*) *Exp.* 134. & *p.* 154. *REMUSS* *p.* 43. in *vena* *equidem* & *sed in arteriis* *eadem* ratio valeat. Habet etiam *MALPIGHI* *polistrum*, *p.* 92. *BIANCHI* *bif. hep.* T. II. *p.* 281. *RIDRUX de fecr t. anim.* *WALTHER* in *diss. ejusdem tituli* n. XI. *SCHREIBER* *Elem.* *p.* 323. *SAUVAGE* *sur l'assimil. des médicaments* *p.* 26. & olim *CARTESIUS de form.* *jet.* *p.* 213.

§. VIII. *Diversum momentum particularum diversi ponderis.*

Deinde, si in sanguine particulæ vehuntur non ejusdem innati ponderis, non dubium est, quin axin ex teneant, quæcunque pondere proprio reliquas superant. Communis omnibus a corde velocitas impertitur, massa vero his particulis major est, & impetus adeo major, ut reliquas de rectissima linea, quam ex corde eentes sequuntur, suo labore (p) depellant. Ita, jam *CARTESIUS*, cum ex eodem sclopo plunbeos globulos & subereos exploderet, vidi lineam in axi sclopi in rectum eductam a plumbeo globulo teneri ad latera vero spargi subereos.

Video Cl. virum, nostrumque dum vixit amicum A. F. WALTHERUM, huic diversitati parum tribuere, quam a prima quaque arterie contractione credit conturbari (p*). Sed eumdem proxima diastole restituit.

Deinde, ex eodem experimento vis, qua ponderosior globulus feretur, major erit, quam vis qua fertur globulus levior. Video coram *Petri Ant. MICHELOTTI* (q), & *Francisci BOISSIER* (r), virorum clarissimorum contrariam demonstrationem, qui minorem celeritatem a graviori globulo recipi ostendunt, & in ratione quidem inversa, subduplicata densitatum, & lego nobilissimum virum *Rupertum GHERARDI* (s) hæc porro ornantem.

Verum IDZM propriam objectionem resolvit. Sanguinis enim succedentes sibi columnas majorem semper argento vivo celeritatem impertire fatetur, donec eandem cum sanguine velocitatem adipiscatur (s*). Tunc vero utique momento feretur majori, præcipitat secretiones, obstructas glandulas aperiet, & demum vasa rumpet, ut in cane per experimentum constitut (t).

Ex eadem ratione globulus ruber & axin tenebit, & longius procedet, quam quidem particula aliqua ramosæ figuræ, quæ sub majori volume non plus habet materiæ, quam quidem globulus, neque adeo perinde objectam quamcunque resistentiam superat (u). Sunt enim resistentiae, ut quadra-

(p) SCHWENKE *hematolog.* p. 78. NEEFELD in *primit. Polonic.* de secreta. II. 130.

(p*) De scurif. acip. p. IX.

(q) De separat. fluidor. p. 120.

(r) Ad *hematostatics* Cl. HALES p. 43. 44.

(s) Del uso del mercurio nella medicina p. 66.

(s*) p. 27.

(t) Argentum vivum canis vene injectum fuerat, sedecima inde septimana fluidum id metallum in pulmonis subnato ulcere repertum est. *Miscell. curios.* T. III. Conf. WALTERS *strength of the air.* p. 84. 113. BOEKHAAVE de viribus med. p. 226. 227. 228. & olim *PITCAIRNIUM.*

(u) Irregularia ad littora pelluntur *des LANDES* T. I. p. 107.

quadrata radiorum, nempe ut superficies, massæ vero ut cubi radiorum. Globulus ergo majorem molem resistentiae opponit & superficiem minorem. Ipsa cylindrus resistentiam experitur, quæ est ad resistentiam objectam globulo, ut 3 ad 2 (∞).

Icerum, ex eadem ratione, vchementius promovebitur globulus, qui-
unque major fuerit (y). Is enim perinde sub eadem superficie plus habet
materiei, quam ejusdem densitatis minor globulus, per eundem notissimum
calculum, qui superficies facit ut quadrata, massas ut cubos, ut impetus
fint, uti radii (z). Si globulus ex sex globulis minoribus compingitur,
superficies ejus fere duplo minuitur (a), viresque, si omnia eadem manent,
omnino decrescent (a^*).

Nunc, in exemplo, globulus ruber utique gravior (b) est sero aliis-
que partibus, quæ cum globulis sanguinem constituant: globuli ergo ru-
bri & axin tenebunt, & velocius movebuntur, & motum diutius servabunt,
quam adeps quidem, aliaque leviores, neque forte perinde globosæ figuræ
partes.

S. IX. Retardatio motus progressivi.

Eius cause.

Velocitatem diximus, qua sanguis ex corde sinistro in aortæ princi-
pium expellitur. Verum de ea velocitate perpetuo decedit aliquid, dum
sanguis a corde recedit, eaque celeritas qua per minima vasa fluit multo u-
tique minor est, quam ea, qua ex corde primum exsilit. Plerique phy-
siologi, & princeps KEILUS retardationem sanguinis admirerunt, mul-
tumque in eo studio laboravit secta Jatromathematica, quo ea velocitatis

(x) *s'GRAVEZANDEN* p. 1918. seqq;

(y) Globulus plumbeus major longius ab eodem sclopeto propellitur, quam minor
ejusdem metalli globulus NOLLET *leçons de physique* T. I. p. 216.

(z) HARTSOEKER *cours de physique* p. 46.

(a) Erit nempe globulus major ad globulos minores $\sqrt[3]{b} : b : \frac{1}{3}$ ad $\sqrt[3]{b} : b$. si radii
fuerint a & b . Ponendo $b = 1$, erit superficies globuli majoris $\sqrt[3]{b} \cdot b \cdot \frac{1}{3} = \sqrt[3]{16}$ quæ
radix est inter $\frac{13}{4}$ & $\frac{16}{3}$. Sed sex superficies minorum globulorum erunt $= 6bb$ & $= 6$.

(a*) PUJAT *de morb. Naron.* p. 109.

(b) L. V. Sect. II. p. 38. 39. 60.

fængulni impressæ diminutio ad numeros mensurasque definitas revocatur. Prius autem, quam clarorum vivorum placita & proponamus, & expendamus una, removendæ nobis erunt de causis sanguineni retardantibus aliquæ. quæ cordi eisdem obsistunt, & debent inter resistentias numerari, quas validissimum id organum superat, ita tamen, ut sanguinis per arterias fluentis velocitatem vere non minuant (*g*).

§. X. *Pondus incumbentis atmosphæræ.*

Totum utique corpus humanum premitur undique a gravi aere, cuius pressio eadem est, quæ foret ponderis aquæ, cuius altitudo triginta fere triumque pedum esset, basis vero quindecim pedum quadratorum, ea enim creditur corporis humani mediocris esse superficies. Ita nascitur enormis pressio, quam 34000 (*g**), 35000 (*h*), & 36000 (*h**) fere librarum estimant. Id pöndus utique corpori humano grave incumbere, per experimenta ostenditur. Si enim de aliqua peculiari particula cutis humanæ, quoquaque modo, aeris pressionem removeris, tunebit ea contiouo, & rubebit, & insigniter sanguine replebitur. Causa phænomeni est, quod æqua vi ex corde expulsus sanguis, pressione sua eas corporis animati partes extendat, a quibus solis vis distensioni opposita ablata est. Is vero effectus obtinetur admeto igne, quo aer alicui cutis particulae circumfusus ita vehementer rarefit, ut pene inane spatium cutem inter & inpositam, in exemplo, cucurbitulam nascatur (*i*). Ita pondus irruentis atmosphæræ cucurbitulam quidem tanta vi ad cutis sedem inani spatio subjectam adprimit, ut omnino adglutinari videatur: inter concavam vero faciem cucurbitulæ cutemque, spatium aere summe rarefacto plenum nascitur, a quo ipsa cucurbitulæ adhæsio pressionem atmosphæræ avertit. Quare tota area cutis, quæ cavae cucurbitulæ subest, nullam nunc ab atmosphæræ pressionem patitur. Ea ipsa ergo cutis sedes a sanguine, quem cor impellit, distenditur, qua nihil resistit, inque hemisphaerii

(*g*) Lib. IV. p. 458.

(*g**): *SAUVAGES des effets de l'air* p. 7. nempe 34300. L.

(*h*) Accuratus hac tradetur libro VIII. Lege interim Cl. WAINEWRIGHT & *SAUVAGES des effets de l'air*.

(*h**) *AUDI MUSCHENBROCKIUM*, qui corporis superficiem aliquanto majorem facit.

(*i*) *PECQUET diff. anat.* p. 68. *BAYLE problem.* XIII. *WOLF verfuch* I. n. 179.

phaeii speciem in cucurbitulam adsurgit. Idem effectus sequitur, si igne quidem abstineris, ceterum siphonem cuti adipliceris, & extracto embolo feceris (*k*), ut spatium aere vacuum cutem inter & embolum nascatur. Non ideo oportet dissimulasse, haec experimenta etiam alia a causa fieri, quod nempe vis incubentis in totum reliquum corpus atmosphærae, cutis particulam, solam a pressione liberam, cogat eminere, eoque, tamquam ad fedem minime resistentem, humores impellat. Idem enim omnino effectus sequitur, sive intus novam prementem vim generaveris, sive resistentem extus potentiam abstuleris. Hinc cucurbitula cum igne etiam in cadavere (*l*) folitum in cute tumorem excitat. Verum etiam haec contemplatio pondus in-
gruentis in animale corpus atmosphærae stabilit.

Eadem causa est elegantis artificii, quo PAPINUS (*m*) primum, deinde HOMBERGIVS (*n*), aliique (*o*), & noster olim STÆHELIVS (*p*) coloratos liquores in vasa viscerum, porosque ovorum urgere docuerunt. Tubuli nempe latius ostium vasculo argento vivo, aut colorato certe liquore, plenum demergunt, angustum vero finem in arteriam ligant, quæ ad viscus pertinet, sub campana repositum. Educto aere, pressio, quam id viscus solebat ab atmosphæra pati, aufertur, resistentia ergo tollitur, quæ introituro per canalem liquori oblistebat, & liquor sponte, ut videtur, ex vasculo in tubulum, inque omnia visceris vasa illabitur, eaque æque replet penitus, ut quidem vis emboli potentissime adacti replevisset.

Iterum pressionem aeris in corporis animati superficiem nitentis aqua imitatur, quæ in demersa sub profundum mare vascula tanta vi nititur, ut credita sit poros vitri pervadere, aut certe in optime clausas phialas viam sibi aperire, alias vero frangere visa sit (*p**): inque urinatoribus, quibus aliquæ cutis particulæ (*p***) a pressione tutæ sunt, dum reliquæ sub 24. aquæ orgyis merguntur, tanta vi nititur, ut sanguinem de oculis, naribus

(*k*) BOYLE new exper. phys. mechan. touching the spring of the air exp. 35. SENGUERD inquis. exper. exp. 6.

(*l*) PECQUEZ p. 69.

(*m*) Gypso usus, apud BIRCH hist. of the royal societ. T. IV. p. 295. &c.

(*n*) HOMBERG memoir. de l'Acad. Roy. des Scienc. 1699.

(*o*) Polycarpus Gottlieb SCHACHER in disp. de admittibili. anatom.

(*p*) Apud CL SCHINZIUS de calce p. 35. Ipse vero ejusmodi ova, a clero olim amico donata, possident.

(*p**) Mem. de Trev. 1741.

(*p***) Experimentum in femore fecit Blasius PASCAL de l'équilibre L. II. c. 2 n. 6.

naribus, & auribus visa sit expressissime (*q*), & cunei quasi in aures intruvi sensus nascatur (*q**) & tympanum denique diffingatur (*q***).

Verum hæc tota, ut immensa sit, aeris pressio nihil quidquam auseit de celeritate sanguinis circuitum vitaleni obeuntis, & nesciuit pro causa auxiliatrice contractionis arteriosæ a magnis viris haberi (*r*). Nempe acris incumbens pondus resistit equidem dilatationi, quæ a cordis impetu omnes arterias dilatante sequitur. Sed paulo post, quando cor nunc laxum quiescit, premittit eadem in arterias, earumque parietes ad axin urget, sanguinisque iter promovet, æmulum certe munus nocta fibrarum, quæ arteriam orbicularium ambeunt. Non posse cerebri vasa depleri, quia ab aere non premuntur, clari viri est observatio (*s*), & omnino in cadaveribus hominum ex frigore emortuorum sanguis in vasa encephali congeritur (*s**).

§. XI. *Pondus partium corporis humani, quæ arteriis incumbunt.*

Utique musculi, & adeps, & cutis, aliaque corporis humani elementa, arteriis undique circumfusa, resistunt, dum sanguinis nova unda arterios dilatat, easque partes omnes possis pro pondere habere, quod a cordis vi, arterias distendente, elevatur. Facilius hoc pondus, certe obiter estimamus, quando popliteum alterius pedis, pedis alterius genu imponimus. Ita arteria poplitea, hinc resistenterem nocta alterni pedis patellam, inde proprii femoris ossa carnesque, hoc ipsum, & una impositum pondus centum & ultra librarum, alium nempe hominem genu acceptum, absque ulla difficultate elevat, quoties arteria poplitea, a sanguine de corde expulso in dia stollen cietur. Magnum inde, ut priori libro ostendimus, cordis robur adparet, nam in omnibus arteriis eum nixum exercet, qui in unica tot libras elevat. Verum nihil inde velocitatibz sanguinis decedit; nam paulo post, idem quod cor elevavit pondus, in arteriam decumbit, eam comprimit, & sanguinem una cum contracta arteria promovet.

(*q*) SAUVAGES effets de l'air p. 13. BURCH T. I. p. 352.

(*q**) Phil. Transact. n. 349.

(*q***) BONANNI's recreatio med. Æd ocul. p. 247. sc vide L. VIII. Sect. III.

(*r*) PECQUET p. 74.

(*s*) F. QUESNAY de la saige p. 18.

(*s**) QUELMLAIS de frigor. effid. ROSENKRANZ beschrijft p. 241.

§. XII. Vis contractilis sive elater arteriae.

Enormis est, quam tot arteria cordi opponunt, resistentia. Membranæ robustæ sunt, neque facile extensiles, adeo duræ, ut aortam filo vix constringas, numerus arteriarum incredibilis, area major, quam quisquam fere aestimaverit, angustia in minimis summa, cum aucto parietum robore conjuncta. Et tamen hoc totum innumerabilium arteriarum systema, a velocitate sanguini impressa una dilatatur, & undique tumet. Totum enim corpus animale in cordis systole distenditur, & quasi intumescit (*t*). Deinde in minimis potissimum canalibus arteriosis, unici globuli capacibus, unaque, ut alias repetimus (*u*), fere robustioribus (*x*), quo a corde remotiores sunt, omnium globulorum extimi diametri arteriarum latera contingere, & cuneorum fere modo distendere (*y*) dicuntur, non absque probabilitate.

Verum etiam haec enormis, cordi utique objecta, resistentia paulo post viribus sanguinis motum promoventibus accedit, cum tantumdem procul dubio arteriae contrahantur, quantum paulo prius dilataæ fuerunt.

Cæterum ex hac arteriarum vi, qua cordis motui resistunt, similia fere eorum phænomena explicantur, quæ modo proposuimus. In pediluviiis, aut vaporariis, tepor, subrepensque per cutis poros aqua, arteriarum, venarumque parietes laxat, ita cordis dilatantes vires auget, dum aufert resistentiam. Vedit Cl. GAUTIER in ranis vase ita dilatata, ut duos globulos nunc transmitteret, quod unicum admirerat (*z*). Ergo eam corporis humani partem magis, quam reliquum corpus, communis cordis impetus dilatabit, totusque artus & tumebit (*a*), & rubebit. Non ideo sanguinis per eum artum motus aut acceleratur, aut expeditur. Cum enim vim contractile vasorum minuat, tantumdem aufert de viribus in arteriarum systole sanguinem promoventibus, quantum viribus addit, quæ in diastole operantur. Hinc laxato vasorum labore, fublata adeo aliqua ex causis sanguinis

(*t*) SENAC T. II. p. 200.

(*u*) Aqua, cui brachium immisum, tumescit, quando arteria micat, & vicissim subfides BIRCH L C. T. II. p. 412.

(*x*) Ex Cliftono WINTRENGHAM vide T. II. p. 73. Non ergo magis flexilia sunt, neque magis dilatantur arteriole minimæ, ut satış receptum est, & a FRANCISCO BOISTER Viro Clar. pronunciatum de pulsa p. 8. cons. IV. 27.

(*y*) Vide n. 14.

(*z*) Observ. T. III. p. 408.

(*a*) HENKELS betbesda p. 126. 127.

guinis motum promoventibus (*b*) , a pediluvii pedum oedemata nascuntur, & augmentur. De pondere aquæ in pediluvio cutem urgentis hic omittit dicere, cuius omuino minor, quam vis laxantis aquæ, est efficacia. Sed neque caloris in sanguinem recepti vim contempnor, qui utique non in submerso artu, sed in toto corpore hominis sanguinis motum accelerat (*c*).

§. XIII. *Figuræ mutatio.*

Aliquantum plus veri est in hac causa, quæ sanguinis vires retardare dicitur. Utique enim, & fuisus hæc describentur (*d*), sanguinis in arterias impulsu impetus flexiones omnes mutat, & partem arteriæ cordi propioreni ultra partem remotiorem protrudit (*e*), angulumque flexionis reddit acutiorum: arterias una in majorem & amplitudinem & longitudinem producit (*f*), & haec tenus vis a corde accepta in his mutationibus consumitur, tantunque decedit motui progressivo, quantum in arteriarum figuris mutatur. Deinde responderi potest, paulo post, in arteriæ systole, flexiones omnes in priorem brevitatem redire, angulum flexionis increscere, arteriæ axin in se ipsum reduci, & hanc ipsam restitutionem sanguini impulsionem eam reddere, quam arteriarum membranæ sibi sumferant. Est tamen aliquid in hac arteriarum mutatione, quod vere de velocitate demit. Frictio nempe, cum mutata elastici, durique systematis vasculosi figura, plurima conjungitur: sed frictio, uti notissimum est, in omnibus machinis majorem partem impensæ celeritatis destruit. Quare de hac retardationis causa liceat repetere (*g*).

§. XIV. *Veræ cause retardationis in motu sanguinis progressivo subnascientis.*

Sequitur autem, ut eas causas consideremus, quæ vere velocitatem a corde acceptam diminuant. Primo loco eam enumerasse liceat, quæ fit a dilatato tubo arterioso, five a lumine trunci minori, quam sunt conjuncta lumina ramorum.

V 3

Rem

(*b*) SCHWENKE *bennatol.* p. 76.

(*c*) HENKEL *ibid.*

(*d*) n. 20.

(*e*) Mem. sur le mouv. du sang *Exp.* 45. 56.

(*f*) *Exp.* 48. 57.

(*g*) n. 23.

Rem, ut in anatomie arteriarum descripta est, proposuit *Guilielmus Cole* (*b*), indeque deduxit, sanguinis circulationem retardare, quæ circa cor nimis rapida sit. *Ornatius KEIL* modestam quidem trunci ad ramos rationem sibi sumpsit, quæ potius infra veram sit, nempe 10000 ad 12387 (*i*), numerosas vero divisiones adoptavit triginta (*k*), quadraginta (*l*), & denum quinquaginta (*m*), unde retardationes sanguinis enormes sequuntur, in ratione nempe ad nascentis aortæ celeritatem 615. 5233. & 44307. Deinde in mesenterio aliam rationem velocitatis primæ ad ultimam dare, uti 5261. ad 1. Denique per venosas mesenterii radiculas sanguis, secundum Cl. virum, ea fluit celeritate, quæ est ad nascentis arteriæ mesentericæ celeritatem, uti 1. ad 14613 (*n*).

Magno cum plausu hæc theoria fere ab omnibus physiologis (*p*) hujus sc̄culi recepta fuit, neque calculum suum penitus negavit *Petrus Antonius MICHELLOTTUS* (*q*), non perinde ceterum *KEILIANARUM* hypothesum fautor.

Longe aliam rationem fecutus est nuper *Vir Cel. Franciscus SAVAGES* (*r*). Ex ratione nempe 10000 ad 10274, aortæ nempe ad suos ramos, primum progressus (*s*), posuit arteriolas rubras minimas unius globuli rubri capaces esse : diametrum ergo habere 1/40 pollicis æqualem (*t*), hinc calculo posito reperit, divisiones intercedere 23 inter ultimam arteriam, primamque (*u*), numeruni valorum minimorum in ea divisione esse

4,

(*b*) *Digress. de ser. p. 97.*

(*i*) L. II. p. 78. *de velocit. sang. p. 46.* experimento a femoris arteria sumato.

(*k*) *KEIL* ibid.

(*l*) Arbitrario calculo usus.

(*m*) Ibid.

(*n*) *De secret. anim. p. 88. 89. 93.*

(*p*) *Archibaldus PITCAIRNE de modo quo cibi alterantur n. 8. Job. TABOR E. xere. III.* (Sed is utique minorem rationem trunci ad ramos sumisit.) *Thomas MORGAN philosophical principles. p. 121. 123.* mutatis etiam numeris usus : *Augustinus Fridericus WALTHER de sanguinis accelerat. et retardat. Josephus SYLVA de la saigné p. 112.* : *Antonius FIZZES physiol. conspect. p. 46.* : *Cl. ORLOVIUS de motu sanguinis per arterias & venas n. 45.* : *Cl. BUTLER of venæctione p. 12. 13.* : *Bryan ROBINSON Essays on animal economy ap. 63. 65. prop. X. &c. Jar. NEIFFELD de secret. n. 217. Franc. BOISSIER de inflammatis. p. 219. &c. Principium ubique idem ponunt, in numeris different.*

(*q*) l. c. p. 99.

(*r*) In *Memoir. de l'Acad. des Scienc. de Berlin pour l'année 1755.*

(*s*) p. 44. Ex *KEILIO de secret. anim. p. 87.*

(*t*) Ibid.

(*u*) p. 44. 45.

4, 603, 000 (*x*), eorumque conjuncta lumina aortæ lumine una tertia fere parte latiora, cum id lumen pollici æquale sit, lumen vero ramorum coniunctorum $\frac{1518}{1800}$ pollicis æquet (*y*). Cæterum non supra divisiones 15 in mesenterica arteria ad venas usque reperit (*z*).

Ego vero, ut ab anatomie principium faciam, non credo aut trunci ad ramos rationem, aut divisionum numerum definiri posse. Illa quidem in magnis rami parva est, & fere fœsqui altera (*a*), ut summa luminum ramorum pro 3, lumen trunci pro 2 haberi queat. Sed ea trunci ratio videtur eundo augeri, ut omnino in minimis, unius globuli vasculis ratio luminis trunci ad ramorum lumina dupla sit (*b*). Adeoque in minimis ramis contraria ratio obtinet, ejus, que in majoribus dominatur. Deficit autem experimentorum fides, qua definiatur, quot divisiones magnam trunci ad ramos rationem habeant, quot parvam, neque lex nota est, qua hec ratio it diminutum.

Sed neque numerus divisionum notus est. In humano corpore, ab aorta orsus, numeravi ad retis usque arteriosi in convexitate intestini positi ultimas conspicuas fissiones, divisiones omnino 20, quibus aliquot divisiones adiecisse æquum fuerit, cum ultimas arterias unius globuli oculus noster non adtingat. Si nunc ratio fœsqui altera constans foret, esset in vigesima divisione ratio trunci ad ramos, uti potentia vigesima numeri 2 ad potentiam numeri 3, sive uti 1048576. ad 3, 585, 218, 301, que ratio ad istam reddit; 1 ad 3420. Verum ex eo calculo retardatio, perinde ut in KEJILIANO, niunia sequeretur, & etiam major fieret error, si plures divisiones admiseritis.

Et in universum, quo minorem trunci ad ramos medianam portionem sumiseris, & quo plures divisiones feceris, quo majorem denique sumiseris arteriam capillarem, eo major emerget luminis ramorum ad lumen trunci ratio. Ipse vir clar. eodem loco, patentiores in visceribus arteriolarum fines recipit (*c*), & expeditiorem inde per viscera circuitum (*d*). In mesenterio demum rationem ramorum 5200 ad truncum facit arteriæ mesentericæ

(*x*) p. 45.

(*y*) p. 45.

(*z*) p. 42.

(*a*) L II. p. 80, 81.

(*b*) Ibid.

(*c*) BOISSIER I. c. p. 43.

(*d*) p. 49.

terica sedecuplam (*e*), valde certe a priori diversam. Ad numeros verum reducere, omnino praeocis videtur consilii, neque in anatomie fundamentum habet.

In calculo Clarissimi BOISSIER statim adparet, gratuito arterias minimas omnes sumtas esse unius globuli capaces, cum & in LEEUWENHOEKIANIS experimentis (*f*), & in meis (*g*) denique, multæ arteriolæ minimæ plurium globulorum diametro sint. Quo plures autem globulos admireris, eo magis tamorum ad truncum ratio crescat. Manifestum vero est, minimam arteriolam, & ab aorta remotissimam esse, quæ in venam continuatur. Ut videatur hæc trunci ad ramos portio infra veram esse.

§. XV. *Inde omnino sanguis retardatur.*

Ex hydraulicis notissimum est (*h*), celeritatem liquidi in cono inverso, cujus sectiones continuo majores fiunt, continuo decrescere, & in singulis ejus coni sectionibus celeritates semper esse in ratione luminum, ut tanto minor velocitas superfit in dilatati coni qualibet sectione, quanto ea sectio lumen coni liquorem recipiens superat. Neque difficile est perspectu, unde hæc celeritatis diminutio proveniat. Pauca nempe particula fluidi celeritatem, in angusto lumine acceptam, nunc in ampla sectione in plurimas particulas diffundunt, ut multas ab unica particulas propelli necesse sit; inde vero æquum est exspectare, numerosiorum particularum singulas retenturas eam velocitatem, quæ sit ad velocitatem ejus particula unice plures impellentis, ut numerus particularum ad unitatem.

Hinc in canale amplio, qui cum angusto canali communicat, velocitates sunt in utroque canali, in ratione orificiorum inversa (*i*). Hinc in vase ramoso, per cuius truncum & ramos aqua a vi emboli agitur, etiæ ramorum lumina summam trunci lumine majorem constituent, tamen de ramis omnibus nihilo plus affluit, quam de trunco (*k*), etiæ ampliores sunt, & in ramis

(*e*) p. 42.

(*f*) Conf. L. II. p. 94.

(*g*) Ibid. p. 140.

(*h*) D. BERNOULLI *hydromanic* p. 87, conf. p. 176. & Petri v. MUSCHENBROECK *Institut. physic.* p. 326. *Essays de physique* p. 391. BOERHAAVE *Prædict. ad n. CCXII.*

(*i*) ORLOV. *de motu sang. per arter. & venas* n. 35,

(*k*) Adeoque in ramis aqua leviter fluit, majori copia effluxura, si in ampliori ostio celeritas eadem superficit Fr. BOISSIER *de l'insufflum.* p. 213.

ramis dilatatis, in experimento, celeritas effluentis liquidi decrevit (*l*). Hinc, cum ejusmodi systematis ramosi unicus ramus dilataretur, velocitas in toto systemate decrevit (*m*). Hinc in tubulis, quorum diametri erant 372. 185. & 90. sive fere 8. 4. & 2. aquae eodem tempore effluentis quantitates fuerunt 179. 33 $\frac{1}{2}$ & 6 $\frac{1}{2}$, minor nempe pro portione celeritas canalis latioris (*n*), & angustioris major. Hinc aliquo ramorum obturato aquæ copia augetur, a 100 ad 109 (*n**). Ita in tubis duris & inanis res se habuit.

Sed etiam in corpore animato aliqua experimenta exstant, quæ confirmant, eamdem etiam in hoc tuborum genere legem obtinere. Ita manifesto vidi, in aneurysmatibus, sive natura ea generaliter (*o*), sive arte ea aliqua produxissem (*p*), sanguinis certe celeritatem in arteriæ parte dilatata, memoribili ratione diminui. Neque alia procul dubio causa est, cur & in meis experimentis (*q*), & in claror. virorum (*r*) adnotationibus aneurysmata sive fornice polypoſo & grumoſo obducantur, inque cavea aneurysmata sanguinis coagula conſtanter reperiantur.

Vidi vero, ex eadem ratione, sanguinem sub aneurysmate iterum accelerari (*s*), & angustiore tubum celerius a globulis paucioribus percurri. Vidi denique, cum truncus ramum emitteret angustiorem, celeritatem in eo ramo majorem fuisse (*t*).

Ex ipsis manifesto sequitur, sanguinis per arterias fluentis velocitatem in aorta quidem maximam esse, in prima jam divisione minui, & magis & magis in repetitarum divisionum minoribus furculis decrescere, donec in minimis

(*l*) BRYAN ROBINSON *Essays on animal economy* p. 64.

(*m*) Ibid. p. 80 81.

(*n*) Ibid. p. 31. 32. 33.

(*n**) SAUVAGES. *de pulsu* p. 22.

(*o*) *Mémoir. sur le mouvement du sang Exp.* 88. 52 101.

(*p*) *Exp.* 93. 94.

(*q*) *Opuſcul. patholog. obs.* 4. 19. In vivis animalibus *Exp.* 97. Conf. Cl. BOISSIER L c. p. 127. in HALKS *hemat.*

(*r*) FANTON ad *obs.* 1. p. 2. MORGAGNE *advers. Anat.* II. p. 81. VALISNIERES T. III. p. 198. LANCISTE de corde &c aneurysm. p. 232. 251. 258. *Comm. Acad. Petrop.* T. III. p. 402. 402. *Hist. de l'Acad. des Sciences* 1711. p. 31. *Mémoir. de l'Acad.* 1707. 1724. *Eph. Nat. Cur. ed. X. obs.* 29. MAUCHART *de pulsu crepitante.* In aneurysmate arterie popliteæ sanguinis grumosi libræ sedecim. MATANTI *de aneurysma.* p. 139.

(*s*) *Mémoir. sur le mouvement du sang Exp.* 80 49. Negavit ita fieri Cl. VANDELLI *phil.* I. p. LXVIII. quem minor fidem negare meis experimentis, cum sibi fident habent posse.

(*t*) *Exp.* 72.

nimirum arteriarum finibus minor superfit. Quanta vero portione diminuatur ; tunc demum intelligemus, quando constantem legem cognitam habebimus, qua lumina ramorum trunci lumen superant, & quando arteriarum minimarum mediocris diameter rectius definita erit ; atque adeo numerus divisionum a trunco aortae ad minimam arteriam certis in numeris expressus notusque habebitur.

§. XVI. Frictionis vis retardatrix.

I. A vasis longitudine.

Potentissima causa retardatae velocitatis, qua ex corde sanguis expellitur, est utique frictio, sive aditus particularum fluidi contra asperam superficiem internam canalium, quos id fluidum percurrit, quo præterea omnem consumtionem celeritatis acceptæ referimus, quæ plurima fit in mutatione figuræ canalium & particularum adeo exigua discessione, qua eos canales constituant. Ea frictio in canalibus aquilegum maximam potestatem exercet, sive lignei fuerint, sive metallici, sive terrei : efficitque, ut de ultimis tubolorum ostiis multo minor in dato tempore quantitas effluat, quam quidem ex castelli amplitudine, & aquæ per lapsum adquisita celeritate, liquebat exspectasse.

Ut liquidior fermo fiat, quatuor minimum modis frictio profluentium aquarum celeritatem frangit. Ergo ipsa longitudo tuborum, etiam amplorum, & cylindricorum, tamen frictionem auget, cum constrictam superficiem, asperorumque punctorum numerum augeat, contra quæ elementa fluida adsteruntur (u). Hinc aquæ ductibus prælongis aquæ celeritas maximopere minuitur, & aquæ transfluentis aut copia, aut saltus decrescit (x). In tubo mille ulnarum, in experimento, undecim duodecimis partibus minus de ultimo labro effluxit, quam ex calculo oportebat in dato tempore effluxisse (y). In systemate suo tuborum reperit Clar. olim amicus

(u) NOLLET *lecons T. I.* p. 232. 236. 249. 253. Franc. BOISSIER in *Memoir. de l'Acad. des Scienc. de Berlin* 1755. p. 47. Qui a superficie frictionem non augeri, sed esse in ponderis incumbentis ratione, docuerunt, ii de solidorum frictione unice intelligi debent, neque etiam eam frictionem recte afflant. Frictio a duplicita superficie quarta parte aucta est, a duplicita pretione dimidia parte NOLLET p. 233.

(x) MARIOTTE *traité du mouvement des eaux* p. 492. edit. Belg. MUSCHENBROECK *Essays de physique* p. 389. BOISSIER *Mem. de Berlin.* 1755. p. 47. diff. sur la manière dont les medicaments &c. p. 25.

(y) J. Théop. DESAGULIERS *philoj. transact.* n. 353.

cus noster *Bryan Robinson* effluxus aquarum esse in ratione inversa radicum quadratarum longitudinum tuborum (z), in eadem nempe ratione, quam calculus postulabat (a). Iterum, perinde in duris tubis minimeque dilatabilibus comperit *J. Adolphus Wedelius*, diminuta longitudine tubi, quantitatem effluentis aquæ augeri (b). Denique in flexilibus tubis, ad animata corpora pertinentibus, experimentum fecit *Franciscus Boissier* (c): in felis nempe intestinum tubulum adligavit; inventis, celeritates, atque adeo quantitates effluentis ex fine intestini aquæ, esse fere in ratione longitudinum inversa, ut per intestini pollices 36 intra 1050 temporis partes ea copia aquæ exiret, quæ intra partes temporis æquales 350 ex intestini parte 18 pollices longa elaberetur, & intra 134 partes temporis easdem de intestini particula non supra sex uncias longa, quem quidem experimenti cum calculo consensum admiseris. Alibi idem vir clarissimus, decurtato tubo, cæterum æque lato, tamen copiam transfluentis aquæ augeri confirmavit, spertis vero ramis, de tubo adeo nunc longiori, minorem aquæ portionem prodire (d).

§. XVII.

II. *Ab angustia tuborum.*

Angustia tuborum, quos liquor percurrit, utique frictionem auget, deque celeritate demit, auget enim puncta contactuum liquoris ad partes tubi sui, minuitque numerum particularum, quæ in latiori canale inoffensæ per liberum lumen canalis transibant (e). Dudum viderunt aquileges, ex tubo duplæ diametri plus (f) aquæ fluere, quam ex duabus tubis, quorum diameter prioris tubi subdupla est, atque omnino quadruplum aquæ fluere ex tubo, cuius diameter ad minoris tubi diametrum se non penitus uti 4 ad 1, sed uti $\frac{15}{4}$ ad 1 habet (g).

Porro

(z) Effluxus nempe fuerunt 175. 133. 57 $\frac{1}{4}$ ex tubis quorum longitudo erat 8. 4.
2. l. c. p. 29.

(a) HELSHAM *course of ledgers* p. 47. 215. J. DOM. SANDRIS *de sanguine* p. 24
(b) *De velocitate sanguinis a statu corporum &c.* n. 30.

(c) *De pulm* p. 10.

(d) *Mémoir. de l'Acad. de Berlin* 1755. p. 47. 48.

(e) MARIOTTE l. c. p. 427. JUIN *Philos. transact. n. 355. dissert.* p. 59. -

(f) NOLLET *lessons T. I.* p. 25. *Mémoir. de l'Acad. Roy. des Scien.* 1709. p. 275.

(g) *Mémoires l. c.* p. 277.

Porro repererunt, in perangustis tubis incredibili fere portione vim frictionis retardantem crescere. In tubulo nempe, cui trium linearum diameter est, minuitur celeritas tribus totis decimis (*h*); deinde in vase, quod eundem arctatur, aut in quoconque denum minori tubulo, aiunt, celeritatis diminutionem tanto majorem esse, hac prima diminutione, quanto vasis minoris diameter minor fuerit dianetro trium linearum. Si adeo vas capillare diametri fuerit, quæ est globuli rubri, nempe non major quam $\frac{1}{740}$ pollicis, que diameter est trium linearum pars 48^{ta}, erit etiam decrementum velocitatis in arteria minima ad decrementum velocitatis in arteria capillari, tantum, ut non supra $\frac{1}{740}$ partem effluat ejus sanguinis, qui quidem efflueret, si hæc angustatio non intercederet; enormis ratio, neque incredibilis, notissimum enim est per tubulos vitreos, multo quam $\frac{1}{740}$ pollicis laxiores, nulla fere vi liquidissimam aquam embolo pelli. Sæpe memini, & hic repeto, me anelliano siphone aquam quidem haec tenus per tubulos argenteos subtiliores ursisse, quam primum vero ea aqua coloratas particulas receperat, nihil ultra secutum fuisse. Si nunc arteriam trilinearem comparaveris cum aorta, constabit etiam eam arteriam multum de celeritate amississe, quæ in aortæ principio est, in tubulo ergo capillari, si hæc firma sunt, multo minorem, quam $\frac{1}{740}$ partem velocitatis superesse, qua cor sanguinem expulit.

§. XVIII.

III. Frictionem auget celeritas.

Quo velocius liquor quicunque canalem suum perfluit, eo plures in dato tempore particulæ fluidi ad solidam tubi superficiem confricantur, eo ergo frictio major fit, quod est simplicissimum (*k*).

§. XIX.

(b) SAUVAGES in *homœostatis* p. 110. 111. 41.

(k) MUSCHENBROECK *essays de physique* p. 185. DESAMONTONS *Mém. de l'Acad.* 1699. p. 260. DESAGULIERS *course of experimental philosophy* T. I. p. 193. Resistentiam nempe vir Clar. estimat, uti productum frictionis in tempus & velocitatem; DESAMONTONS frictionem, ut pondus in velocitatem ductum.

§. XIX.

I V. *Et figuræ in vase mutatio, ob plicas.*

Dixi (*l*),¹ arterias quidem ex situ suo motas restitui paulo post, in que ea restituzione fluidum vitale urgere, neque adeo vim totam perire, qua latera arteriarum distenduntur, & mutantur, & qua arteriae inflexæ pars secunda a principio motus educitur & repellitur (*m*).

Magnam tamen partem motus accepti in mutatione minimarum particularum, quæ canalem constituunt, perire, utique certum est. Mutationem vero, quæ sit in flexione corporum, magnam cohaesione minimorum elementorum vim inferre constat, cum ea sola, repetita, omnia aut solidissima, aut flexilissima corpora, paulo citius paulo rumpantur.

Sed etiam in solidissimis & levissimis tubis curvitas celeritatem minuit, dum particularum fluidi in parietes illapsus, atque adeo contra minimas asperitates earum particularum confrictionem auget. In canale enim ad angulum rectum flexo, facile intelligitur, maximam, partem fluenti recta il-labi in secundi lateris gnomonis parietem ulteriorem.

Quare, etsi in ejusmodi caualibus, liquidissimo humore plenis, nullam retardationem admiserunt viri clarissimi (*n*), experimenta tamen ostendunt, utique etiam in his tubis flexionem magnam partem acceptæ celeritatis destruere (*o*). Datam aquæ copiam rectus canalis transmittit intra tempuscula novem. Idem, aut æqualis canalis, quater flexus, 14 tempuscula requirit, ut eadem aquæ copia perfluat, & 18, si octies flexus fuerit.

Non ideo continuo oportet BELLINI (*p*) calculum probare, qui vim plicarum in minuenda celeritate nimii fecit, & singulam plicam tantam de velocitate primigenia portionem demere adfirmavit, ut celeritas a plicæ actione delecta, sit ad eam primigeniam velocitatem, ut unitas est ad pli-carum numerum. Ita in canale quater millies octingenties plicato, celeritas est, secundum virum clar. ad celeritatem ejusdem tubi in restitudinem ex- porrecti

(*l*) n. 12.

(*m*) *Ant. Fizes de liene* p. 116.

(*n*) P. A. MICHELOTTUS I. c. p. 139, 140. WALTHER in *progr. de inflammatione*. J. Adolphus WEDDEL in *disp. de velocitate sanguinis*

(*o*) HAMBERGER I. c. p. 102, 103, 104.

(*p*) *De ferment. & g'andul. prop.* XL p. 161, 162. *Cystine theory of the gout* p. 74, 75.

porrecti, uti unitas ad 4800. Hic enim calculus tum demum verus est, quando tota fluidi celeritas per plicatum repetitionem destruitur. Quare neque alterius clari viri (*q*) calculum sequimur, qui etiam majorem plicarum in celeritate destruenda rationem fecit, ut sex plicae duplo majorem velocitatis portionem destruerent, quam quatuor.

Aliud genus plicarum internum est, tum in arteriis, quarum facies interior rugis quibusdam plicisque exaratur, ut in arterioso pueri modo natu ductu, in arteria bronchiali, lienali, hepatica (*r*); aut alias plicae nonnullae ad originem ramorum eminent (*s*). Illae aliquam utique, haec vero parvam omnino frictionem excitare poterunt, eodem fere modo, uti viae scabities rotas magis, quam perfecta æquoris planities moratur.

Facile vero intelligitur, utramque retardationis causam eo potentius operari, quo canalis plicatus minor fuerit. Eo minor enim erit numerus particularum, quæ absque illapsu ad parietes per canalem flexum transfluent.

§. XX. *Ob figuram conicam.*

Alia causa retardationis, quæ cum priori ad idem fere redit, est in figura conica, directa. Nam etiam haec figura facit, ut liquor in canalis parietes illabatur, eos distendat, eorumque ambitum mutet. Vel leviter enim meditatus intelliget, posse quidem totam massam sanguinis pro filorum serie haberi, qualia utique in animalibus frigidi sanguinis etiam oculi ostendunt. Deinde in singulo ramo arterioso, cuius amplius ostium admittit sanguinem, angustius emituit, reliquis omnibus æqualibus, absque illapsu quidem exire filorum sanguinis numerum illius æqualem, quem minus ostium transmittit; reliqua fila omnia, quæ anulum faciunt, quo ostium minus a majori superatur, utique in parietem arteriæ illabi, eumque conari distendere, donec lumen vasis minus lumini majori æquale sit (*t*). Etiam ex ista causa aliqua pars celeritatis sanguinis primigenie destruitur, est enim haec arteriæ diffitentio vera flexio, ex breviori curva in longam magis. Hinc, si cylindro tubum conicum adpenderis, eo celerius evacuatur, quo ille tubus magis

(*q*) *NETFIELD de secret.* n. 175.

(*r*) *WEISS de arter. viscer. prop.* & *L. II. p. 66.*

(*s*) *L. II. p. 67.*

(*t*) *BELLIN propos. XXV. de motu bilis SCHREIBER Element.* p. 311. *FRIESS de Lens* p. 119. *BOERHAAVE* ad n. CXXII.

gis divergit (u), eo tardius adeo, quo magis convergeret. Hinc cum in venam arteria per vulnus utriusque commune pateret, ipsa arteria latior facta est (u^*). Hanc speculationem addidi, veram, si arteria conica convergit. Verum curatior anatome utique detexit, arterias series esse cylindrorum, ad singulos ramorum exortus minorum (u^{**})

S. XXI. IV. *Ob majores angulos.*

Nunc ad angulos transitus, in quibus pariter sanguis retardatur, & pars ejus velocitatis perit, qua primum a corde prodiit. Velocitas a corde accepta optime conservatur in ea sanguinis arteriosi parte (x), quæ per axim fluit, aut axi certe parallela manat, & ad quam vis motrix, parietum nempe cordis contradictrio, ad perpendicularum operatur. Sequitur ut tanto plus de ea velocitate pereat, quanto majori sub angulo, ad lineam per axim ducentem facta, sanguis e trunco arteriae in ramos discedit, sive, fluida de fistulis, æque latis, & oblique erectis, & ex trunco exhibunt celeritatibus, quæ sunt in ratione perpendicularium linearum, quæ obliquas elevationes metiuntur (x^*). Omnis enim motus obliquus potest in duos resolvi (y), qui, in exemplo, erunt motus quidem progressivi, quo a corde sanguis recedit, alterque, quo secundum angulum quemcunque ab axi, & linea recta motus progressivi directrice, ad latus declinat. Ut enim haec linea augetur, omnibus æqualibus, ita certe minuitur linea motus progressivi, sive spatium, quo eodem tempore sanguis a corde recedit. Simplificius adhuc, si sanguinem in hypothesi vix quidquam diversa a vero, habeas pro globolorum catena, dubium non est, quin globuli a corde velocitate primigenia imbuti, longissime propellant globulos, qui in eadem linea recta jacent, & quos ad perpendicularum feriunt: minus vero longe propellant eos, qui ad angulum aliquem cum primis, motum impertinentibus globulis, disponuntur, & ad quos oblique motum suum transmittunt, tanto minorum, quo est obliquior, & quo angulus lineæ directionis obliquæ cum linea motus progressivi recta maior est. Minor enim erit velocitas anguli semirecti

(u) BERNOULLI hydrodynamic. p. 44. 176.

(u^*) Obs. of a soc. at Lond. T. I. p. 340.

(u^{**}) L. II. p. 57.

(x) p. 166.

(x^*) SANDRIS I. c.

(y) Conf. HELSHAM course of lectures T. II. E. 4.

mirecti , minor recti , minima obtusi . In recto sola pressio lateralis superest , deleta pressione recta : in obtuso etiam de pressione laterali nullum perit , cum lateralis pressio tunc obliqua fiat , secundumque angulum cum linea rectum angulum intercipiente factorum augmenta lateralis pressio minuatur.

EIAM hanc retardationem rejicit avunculus olim noster J. ADOLPHUS WEDEL (z) , & effluentis liquidi eamdem quantitatem in experimento reperit , quoconque demum angulo ramus , in systemate tuborum consentientium , a trunco natus fuisset . Brevitas forte systematis hic in vito fuit . Cl enim viri gener , quem etiam libentius laudo , postquam graves mecum inimicitiias exercuit , GEORGIVS EHRHARDVS HAMBERGER (a) , in simili systemate repetitis periculis reperit , majorem quidem celeritatem fuisse in ramis ad angulum acutum de trunco natis , minorem in iis , qui angulum cum trunco rectum interciperent , minimam denique , in majoribus in primis angulis , si ad obtusum angulum ramus prodiret . Sed etiam in fluminibus , aqua eos ramos , qui ad angulos rectos obtusos de precipuo fluamine prodeunt (b) , detrectat subire . Porro Cl. BOISSIER siphoni duos tubos vitreos appendit , quorum alter erat in directione trunci , alter cum ea directione angulum intercipiebat . Longius utique progressus est , migrante embolo , aqua que in tubum directum prodibat (c) . Inde sequitur , in ramis minorem , quam in trunco sanguinis velocitatem esse (d) . Soleo vero hac occasione monere , ne projectilium corporum consideratio admisceatur , quorum iter ex gravitate , & motu trajectory temperatur , & in quibus angulus semirectus ad maximam distantiā corpus motum promovet (e) . Motus enim projectilis mensuram alię , quam labentis liquidi , adfectiones ingrediuntur .

§. XXII.

(z) *De velocit. sangu.*(a) *Physiol. Med.* n. 176. p. 105. & n. 318. *diff. sur la sécretion en général* p. XL.(b) *PLACENTINUS de vena seditione* p. 66.(c) *De l'inflammation* p. 282.(d) *SCHREIBER almag.* p. 245.(e) G. J. S'GRAVEZANDER *Instit.* n. 510. HELLSHAM *course of lectures* n. 184. 186. MUSCENBROEK *essays de physique* p. 121. &c. BIRCH I c. T. III. p. 100. experimento in globo facto , quallem granatum vocant , in quo tamen infra 45 major projections favor fuit .

§. XXII. *Hec ad corpus animatum transferuntur.*

Non desunt experimenta, ex quibus probabile fiat, etiam in animato corpore leges hydraulicas valere. Ita a longitudine vasorum retardationem nasci suadent aliqua, & alia demonstrant. Majorum animalium pulsus rari sunt (*f*), minorum celeres, interque homines illi. Archistarorum comes J. *Baptista SENAC* (*g*) pulsus procerorum militum pauciores deprehendit, quam virorum minoris staturæ, quibus nempe brevior a corde ad carpum via esset (*h*). Deinde arteriola exigua, plus omnino fundit sanguinis, quando ex magno arterioso trunco prodit (*i*), quam alia etiam latioris diametri arteria, quæ extremis membris propior nascitur. Quare non penitus immerito Clari viri, nostrique (*k*) in primis amici receperunt, tardiores in sanguine motus esse, quo longius a corde recessum fuerit.

Sed ab angustia potissimum magnorum canalium magna retardatio merito exspectatur, quæ tanta est, ut nostra quidem vascula omnibus capillaribus tubulis minora sint, & per ejusmodi poros mechanica emboli via, aut ponderis impulsu, liquorem aliqua cum celeritate promovere nequas-

Si enim minima vascula per nas aliquanto majoris esse luminis, quam est globuli rubri diameter reperies aut non majora esse, quam $\frac{1}{140}$ pollicis, aut omnino, ut ego quidem existimo, minora (*l*). Inde intelligitur, quemlibet nunc globulum superficie internæ canalis sui in omni flexu sui canalis adPLICARI, cum in majoribus vasis multa certe pars sanguinis inoffensa flexum superet. Deinde id fluidum, quod rubro sanguine subtilius est, utique plurima parte sui ad parietem sui canalis fricatur.

Si vero eousque hæc consideratio ornetur, ut sumatur, tota sua superficie (*m*) globulum minimum totam superficiem fui capillaris vasculi radere: si præterea addatur, adeo angustam per minima vascula viam esse, ut

(*f*) Vide Sect. III. n. 16.

(*g*) *Traité du cœur* T. II. p. 150.

(*h*) SCHWEINER L. c. p. 25.

(*i*) H. FRANSECUS le DRAON *observat. de Chirurg.* T. I. p. 139.

(*k*) SCHREIBER *almanach* p. 218. Negavit dilatitudinem a corde, & longitudinem arteriosi canalis moram in sanguinis celeritate facere Josephus MORLAND *force of the heart* p. 20. 21. & MORGAN *physiop. princip.* p. 44. 45. itum natura non satis recte explorata.

(*l*) L. V. p. 58. 59.

(*m*) SCHREIBER L. c.

ut globuli rubri ne conservata quidem figura sua transitum inveniant, inque ovatas omnino moleculas transeant, quarum minor nunc diameter iter sibi per suum vasculum aperit (*n*), facile quidem video, incredibilem frictionem nasci, si lumina minimorum canalium minora ponas maximis globulorum sanguineorum circulis, & eos globulos omnes toto maximo circulo suo, contra totos circulos luminum canalium minimorum incuneatos impingere, atque eos parietes ita distendere ponas, ut figuram suam a resistentibus luminibus cogantur mutare. Augentur enim aliunde frictiones, quoties corpora, que punctis unice se contingunt, nunc totis superficiebus se contingunt.

Verum eam figuram in globulis mutationem nondum video ad eam evidentiam pervenisse, ut tutto theoriam superstruere liceat (*p*), & quidem mihi semper hic nimii aliquid visum est, facitque, ne eam admittam, celeritas minime exigua, qua vidi eos globulos per suarum venularum angustos mæandros circumferri, cum omnino ab ea distentione angustiorum luminum maximam retardationem æquum foret exspectasse.

§. XXIII. Plicarum vis in corpore animalium.

Si in duris & immotis canalibus aliqua plicarum & frictionum retardatrix potestas est (*t*) erit multo major in canalibus flexilibus & elasticis, quorum figuræ ab illapsò fluido vitali (*u*) omnino mutantur, inque ea mutatione pars motus progressivi consumetur. In unica equidem plica, arte facta, flexuæ unico arteriæ venæ vivi animalis, non potui satis certo eam retardationem percipere (*x*). Sed in animalibus utique arteriæ non unica flexione incurvantur, que motus impressi exigua particulam consumat: repetitæ & numerosæ sunt, & grandium truncorum flexiones (*y*), &

(*n*) L. V. p. 58.

(*p*) L. V. p. 59.

(*t*) p. 18 1.

(*u*) SCHEIBER Almag. p. 228.

(*x*) In duobus experimentis videbatur inde sanguis retardari Exp. 135. 181. in tertio neutiquam Exp. 136.

(*y*) Maxime arteriarum, quæ partes adeunt, quarum variabilis est longitudine, linguallium, facialium, splenicarum. Vide L. II. p. 84.

& minimorum, plurimis locis, vasorum, frequentiores tamen in utero, reneque. Ita, dum singula plica tantillum de velocitate demit, coniunctus multarum effectus utique majoris erit momenti (*a*). Ita in epididymide minime obscurum est exemplum, argentum vivum, fluidissimum certe metallum, vi magna columnæ impendentis (*a*), aut excitati, ut ego solebam, vacui spatii, impulsu, ægre tamen totam vasis unici, sed innumeris meandris plicati, longitudinem relegere, & lentissime demum eo motu defungi, si omnino cauto labore eo urgeatur, aliud vero levius liquidum, aut coloratam aquam, nulla vi emboli eo adigi, ut ad caput usque epididymidis veniat. Hinc a retardato sanguine, flexæ, & contortæ arteriæ intumescere solent (*a*) eaque serpentina figura in adulto homine augetur.

Sed etiam, ut in nonnullis experimentis (*b*) meis, ita in aliis saepè vidi, quantum etiam unica plica in motu per canalem aliquem retardando possit. Saepè, dum coloratum sebum injiciebamus, ut a brachio excluderem, cadaveris infantini brachium unice super pectus reponebam, ut acutus brachialis arteriæ cum subclavia flexus fieret. Ita, quæ magno cum impetu in extensum brachium irrumpit cera, eadem a solo hoc flexu aversa, in brachium ferri desinebat. Ita umbilicales, grandissimæ arteriæ, ob insignem, quem cum extenso puero intercipiunt anfractum, continuo sanguinem desinunt suppeditare. Ita ab extensione colli sola nata est apoplexia, cum sanguis celerius in cerebrum ferretur (*c*).

S. X X I V. Vis angulorum.

In repletione vasorum, quæ siphone fit, & cordis utique vim hactenus imitatur, quod per arterias humanas liquorem qualcumque impellat, saepè observatum est, eos ramos a liquore negligenter fuisse, nihilque a communi penu recepisse, atque adeo per ea vasa celeritatem non fractam unice, sed omnino deletam fuisse, quæ ad angulum retrogradum nascentur (*d*), ut in spinali arteria. Umbilicalium tritacorum, quos modo excitavi, par fere est ratio, cum certe contra propriam sanguinis per aor-

A a 2

tam

(*a*) Quæ est CL. MONROE's encheiresis *de semin. duct.*

(*a*) Hæmorrhagias inde frenari. HABENSTEIN.

(*a**) De carotidibus, vertebralibus, splenicis COWPER. *Pbl. Transf.* 180.

(*b*) p. 181.

(*c*) De la CORDA MENE introduct. *bijstq.* p. 102.

(*d*) COWPER appos. d. f. 38.

tam descendenter directionem, sanguinem sursum revehant, et si vere ad acutum angulum de aorta nascuntur. Deinde in vivo animale sanguinem celestius per truncum fluere, tardius, & pro magna portione, in ramis ad acutum angulum natum, viri in natura colenda exercitati est observatio (e). Inter meas observationes sunt equidem (f), in quibus sanguinis per ramum, quam per truncum velocior motus est. Verum multa sunt, quae hunc eventum, praeter naturae consilium, potuerunt producere, ut libera anaestomosis, in quam ramus se faciliter depleret, aut vicinum vulnus. In alio certe experimento, cuius nullum, quantum novi, vitium fuit, sanguis per ramos ad acutiores angulos natum, celerius fluxit (g), & constanter flumine, quam in iis quidem ramis, quorum a trunco origo maiorem angulum comprehendebat.

Ex hac ceterum angularium contemplatione subtiliter olim deduxit *Georgius Martine* (h) velocitatem in corpore humano, & in ramis cordi proximis, & in iis æqualem esse, qui remotissimo a corde loco pronascuntur: cum rami cordi propiores ad angulos fere rectos orientur, in quibus velocitas frangatur, rami vero ultimi, & capillares, ad angulos peracutos prodeant, atque adeo de motu progressivo minimum amittant. Sed anatome huic speculationi minus favet, cum passim retia minorum vasorum ad varios omnino angulos dividantur (i).

Aucta sanguinis celeritate, perinde ut in tubis inanimatis, etiam in animalium vasibus frictionem augeri, atque adeo hactenus febrem sibi ipsi remedio esse, non improbabilis est conjectura, cum & theoriae contentiat, & in febribus hujus frictionis manifesta vestigia adsint, plus nempe terræ per urinam egeratur, & sedimenta aqua graviora nascantur (k). Febrem vero sibi esse remedio ita intelligendum est, ut de nimio impetu, quem sanguis a corde accepit, plus quam in naturali sanguinis itinere, per frictionem dematur, quæ una cum celeritate sanguinis aucta est.

§. XXV.

(e) *Hales hemastatik* p. 67.

(f) *Exp.* 72. 93.

(g) p. 73.

(h) *De animalib. similib.* p. 187. *CHESELDEN anatomy of human body* Edit. VI. p. 195.

(i) *L. II.* p. 83.

(k) Vide interīm *Cl. B. LANGRISH experiments modern. practices.*

S. XXV. *Aliæ causæ retardationis.*

Resistentia quam sanguis in ramis experitur.

Sunt præter has conditions, velocitatem primigeniam destruentes, animali corpori & inanimatis tubis communes, aliquæ, quæ corpori animali peculiares sunt. Ita ipsa repetita ramorum in animali divisio, retardationis genus efficit, cuius extra animal exempla rara sunt. Minime enim dubium est, quin frictiones ramorum celeritatem minuant, qua trunci sanguis evanescatur; ramorum enim plix efficiunt, quod efficeret pars luminis clausa (*l*). Nam, ut semel repeatam, quanta portione trunci celeritas per ramos minuitur, tanta portio luminis trunci potest pro clausa haberi. Sed ea quasi obturatio motum progressivum retardat, & in lateralem pressionem convertit. Truncus ramosus, cum uno ramo aperto dedit uncias aquæ 29 cum dimidia, omnibus apertis uncias 36 cum *f* (*l**)

§. XXVI. *Anastomoses.*

Arteriarum anastomoses haec tenus sanguinis motum adjuvant, quod periculum obstructionum minuant, ceterum non possunt non inter causas esse, quae sanguinis celeritatem minuant. Sæpiissime enim, etiam majores arteriæ, contrario perfecte ductu sibi occurrent, inque unicum canalem abeunt, cujus duæ sunt sanguineæ columnæ, utraque a corde projecta, quæ in medio arcu contrariæ sibi obnuntur. Ita in arteriis mesentericis, mesocolicis, Willisi circulo, arteriis recurrentibus cubiti, ulnaeque, arteriis epigastricis & mammariis, arteriis intercostalibus & dorsalibus, & aliibi, innumeralibus in corpore humano locis, inque capillarium denique vasorum per totum corpus animale dispersis retibus, arteriae contrariæ in unum truncum coalescent (*m*). Non potest autem fieri, quin contrarii sanguinis torrentes in se invicem nixi, aliquam partem celeritatis suæ sibi mutuo destruant, neque eam exiguum, cum sanguis eo elatere destituatur, qui in collisione obviorum sibi corporum durorum amissam ab ictu mutuo

(1) Conf. Fr. SAUVAGE de inflammat. n. 15. BERNOUlli hydrodynam. loco ult. cit.

(*1**) ROBINSON L.C., p. 66.

(m) L. II. p. 86.

velocitatem regenerat. Sed etiam in vivo animale hos contrariarum columnarum ictus vidi (*n*) satis saepe vividos. Ita, paulo alio modo, sanguis etiam in venis minoribus, quæ in majorem se immittunt, a torrente majoris trunci repulsus de sua celeritate amittit (*o*). Insignis iste anastomosum effectus, nondum, quoad nunc memini, a quoquam scriptorum anatomathematicorum consideratus fuit.

§. XXVII. *Sanguinis viscor.*

Minime vero negligere oportet potentem utique causam retardationis, quæ est a sanguinis visciditate. Neque enim dubium est, quin sanguinis fluida natura a solo motu progressivo sustentetur (*p*), cum in homine, & in aliis animalibus, majoribus (*q*) etiam magis, sanguis suis ex vasis emissus continuo, & intra brevissimum temporis spatum in solidam gelatinæ naturam cogatur. Nunc si motus sanguinis intercedit, ne is vitalis liquor coeat, necesse est ejus motus partem ab ipsa ea visciditate consumiri, cuius effectum motus progressivus destruit, sive, ut simplicius rem exponamus, ejus motus partem in dimovendis a se elementis sanguinis, aque vi adtractili absensi, qua ii globuli in mutuos contactus nituntur, & quam motus progressivus superat. Experimentis enim constat, motu sanguinis in vivo animale languente (*r*), aut destructo (*s*), globulos continuo, amissa, ut videtur, sphæræ figura coire: eoslemque iterum solvi, prioremque distinctorum globulorum figuram recuperare, quando motus restitutus est (*t*). Deinde notissimum est, & in frigidis animalibus vulnera arteriarum liquore rubro, alba circumdato nebula, continuo claudi (*u*), qui compactus sumam arterię obducit, utique non fluidus, cum vulneris obturet, cordis que

(*n*) *Second Memoire* plurimis locis. In eodem trunco *Exp.* 95, 129, 153, 154, 155, 157, 171, 173, 174, 175, 180, 183, 187, 188, 190. Nil intericit, quod aliqua horum experimentorum ad venas pertineant. In contrariis per anastomosum conjunctis vasis vide *Exp.* 132, p. 58. Sed plures obſt, aliis sub verbis latenter.

(*o*) *Exp.* 137, 145.

(*p*) *Conf.* L. V. p. 26.

(*q*) Ut in equo *Bacon history of the Royal Society* T. IV. p. 292.

(*r*) *Exp.* 93.

(*s*) *Exp.* 6, 7, 18, 19, 50, 93, 155.

(*t*) *Exp.* 6, 7, 18, 155. Qui hunc eventum noper regavit *VANDELLUS*, ex repetito experimento procul dubio nobiscum conciliabitur *Ephist.* I. p. LXVII.

(*u*) *Exp.* 153, 154, 157, 160, 161, 163, 166, 167, 170, 171, 173, 177, 178, 180, 181, 184, 187.

que resistat impetu, & in canibus grandiorum etiam arteriarum vulnera a coacti crux grumo sanguinem sundere prohibeantur (x).

Negavit equidem rationem hujus visciditatis haberi debere, acris olim ingenii vir *Georgius Erhardus HAMBERGER* (y). Verum vel sola injecio anatomica facile ostendit, quam magna ratione facilius aqua pura per corporum animatorum vasorum urgeatur, si cum tardo aliquo viscidoque liquore, cera, sebove, comparaveris.

Alia adhuc ratio est, qua viscidii liquores motum progressivum sanguinis debilitant. Nempe ad suorum canalium parietes & sanguinis globuli adtrahuntur, & lymphatica gelatina. Illud quidem phænomenon saepe vidi, ut contra proprium pondus ad parietes etiam exteriore arteriarum globuli rubri retinerentur (z): & dissecta arteria, foramine mesenterio inflicto, tamen sanguis ad circulare lumen discissæ arteriæ retentus defluere negaret (a). Hinc, nam etiam huc priora experimenta redeunt, in parvis animalibus haemorrhagiæ vix oriuntur, quod majori vi sanguis ad arteriarum parietes adtrahatur, quam quidem a corde depellitur (b). In mytilis sanguinem, quem aliqua vascula effuderant, alia reforbent (c). Sed etiam grandium arteriarum, aortæque interiori faciei adeo potenter grumi sanguinei adhærescant, ut huic arteriæ pro membrana sint, ejusque in substantiam, quam vocant, omnino transeant (d).

De lympha saepe & repetito monui, eam albæ nebulae specie medios in rima arteriolæ venæ læsæ globulos ambire (e), & venæ parieti adeo adhærere, ut nihil quidquam effluat, cum detersa ea nebula continuo torrentis ad modum sanguis de vulnere erumpat.

Hæc cæterum adhæsio (f) in minoribus tubulis, etiam inanimatis, inque omnibus fluidis notis constanter dominatur. Argentum vivum fluidissimum, ad levissimum barometri vitrum, vehementer trahitur, ut capillares tubos omittant.

De

(x) SAUVAGEUS in HALYS p. 43. SAVIARD exp. 61. conf. L. V. p. 20.

(y) De cordis diastro n. X. conf. L. IV. p. 442.

(z) Exp. 90. 98. 198. 216. 219. 220. Ita palpebrae interjectum liquorem adtrahunt SAUVAGEUS physiol. p. 176.

(a) Exp. 210. 211. 212. 213. 214.

(b) KRUGER physiologie n. 201.

(c) HALYS hemiflat. p. 96. SCHWENCKE p. 27.

(d) Opusc. patholog. obl. 19.

(e) L. V. p. 125.

(f) Eam inter causas motus sanguinis varii scriptores posuerunt v. g. NEIFELD ~~&~~ secret. p. 85. §6. De vasis lacteis adfirmat WYATT physiol. off. p. 74.

De anellianis tubulis monui, sed hoc loco expedit repetuisse, aquam equidem, quæ minus viscida sit, emboli vi de angustissimis canaliculis expelli posse, coloratum vero liquorem retineri, neque hoc iter absolvere posse, quod crassiores proculdubio particulae canali vehementius adhaeret (*g*).

Nunc si sanguis arteriarum canalibus avet adhaerere, neque tamen in vivo animale sanoque adhaeret, minime dubium est, quin haec potentia a contraria potentia destruatur, eamque vicissim destruat, partemque adeo progressivi sanguinis motus occupet aboleatque.

§. XXVIII. Ergo sanguinis per arterias minimas fluentis celeritas minor est.

Mensura hujus decrementi.

Ex istis causis, & ex aliis, si quæ forte meam diligentiam fugerunt, vulgo consentitur, minori in minimis vasis, quam in truncis, celeritate sanguinem circumferri: & in universum celestatem in minimis vasis tanto minorem superesse, quanto quævis arteriola minor est, & a corde remotior. Ita lentum in vasis capillaribus sanguinis motum esse, primus forte insignis olim naturæ cultor *Johannes SWAMMERDAM* (*h*) monuit: sed etiam *Antonius de HEIDE* (*i*) in vasis capillaribus prius, quam in trunco sanguinem stagnare, sua per experimenta reperit. Porro *Heinrichus MIELLES* (*k*) in majoribus canalis ranæ sanguinem torrentis modoruere, in minoribus rubros globulos, aliquo intervallo distinctos, lentius se insequi, non adeo dudum retulit. Magnam rationem hujus retardationis esse, que tamen calculo erui nequeat, graviter pronunciavit *Petrus Antonius MICHELOTTUS* (*l*): & vasa capillaria lente a sanguine perfusi *J. Baptista SENAC* (*m*), & *Hermannus BOERHAAVE* (*n*), & alii auctores consenserunt. Addit Cl. STEVENSON, globulum rubrum aream.

microscop-

(*g*) Simile experimentum habet *Stephanus HALIS*: *Bamast*. p. 150.

(*h*) In *corollar. ad diff. de respiratione.*

(*i*) *Expt. 8.*

(*k*) *Phil. Transact.* n. 460.

(*l*) *Separ. fluid.* p. 99. 100.

(*m*) *I. II.* p. 158.

(*n*) *Pract. ad Inflit. ret. Med.* n. 222.

microscopio subjectam , exilem utique & unius forte lineæ , intra octo & decem demum pulsus percurrere (n*).

§. XXIX. *Qui mensuram aliquam proposuerint.*

Propius accuratam rationem primigenie velocitatis ad diminutam illam , inque minimis vasis superstitem , exploravit Jacobus KEILUS (o) unicam equidem causa usus retardationis.

Deinde Stephanus HALES , sanguinem in vasis muscolosis ranæ intra minutum primum duas unice tertias pollicis partes percurrere , adeoque 646^{ies} (p) tardius fluere , quam ex corde humano exeuns sanguis , se vidisse putavit : multum equidem non a nostris unice , sed ab Antonii v. LEEUWENHOECK (q) experimentis diversus . Ille enim Vir , in observandis utique naturæ phænomenis & solens , & multa expertus , in anguilla sanguinem intra unum pulsum , aut $\frac{1}{2}$ minuti primi , decimam quintam pollicis partem percurrere , atque adeo pene quinque in minuto primo pollices superare , calculo posito scriptis , quæ celeritas est ad HALESIANAM ut 15 ad 2 . Cum vero rana multo vividius , quam anguilla sit animal , & intra idem tempus plures habeat pulsus , adparet , in rana etiam sanguinem plus quam quinque pollices percurfurum.

Alia etiam ratione in definiendo hoc decremento usus est idem ingeniosus auctor Stephanus HALES (r) . Metitus nempe aquæ pondus , quæ dato tempore de ostio trunci arteriæ mesentericæ efflueret , eam quantitatem cum ea aqua comparavit , quam omnia intestina difficta redundit : ita enim credit exprimi aquæ quantitatem , quæ per omnes ramos arteriæ mesentericæ apertos dato tempore fluit . Eam rationem Vir Cl. tripla non majorem reperit . Deinde , cum arteria mesenterica , ut ingens sit , tamen aortæ sit ramus , inque nascente aorta celeritatem majorem esse facile persuadeamur , rationem celeritatis in aorta , ad celeritatem in arteria mesenterica reperit ut 1. 17. ad 1. Denique liquorem aortæ injectum in venam adeo lente trajecisse experiundo comperit , ut intra quadraginta minuta non supra sesqui pollicem progrederetur (s) .

Porro

(n*) *Essays of a Societ. at Edimb.* T. V. P. 2. p. 821.

(o) p. 174.

(p) *Hämodynamik* p. 68.

(q) *Exp. &c contempl.* p. 196.

(r) *Ibid. Exp. 9.* p. 54.

(s) p. 121.

Multum ab eo viro diversus BRYAN ROBINSON celeritatem in aorta, ad velocitatem in vasis minimis superstitem estimavit, ut 1100 ad 1 (t). Cl. vero Robertus WHYTT, cuius intererat celeritatem a corde acceptam vehementius diminuere, ex KEILIANO calculo globuli sanguinei momentum a corde acceptum negat superare duplum pondus globuli (u): deinde, considerata frictione, probabile existimat, momentum a corde acceptum globuli rubri in arteria capillari minus esse, quam globuli (x) pondus, nempe omnino eum globulum promovere non posse.

Iterum vir Cl. FRANCISUS BOISSIER ex carotidis trunco aperto intra æquale tempus novem partes effluere reperit, ex ramis autem carotidis majoribus non supra septem (y). Deinde in duobus aquæ molis canibus hanc arteriam mesentericam dissecuit, inde, intestinis dissectis ramos ejus arterie plerosque: tunc aquæ quantitatem comparavit, quæ per truncum mesentericum, & quæ per ramos efflueret, & reperit esse uti 20 ad 1 (z): atque magis dentum exquisits ratione, cum truncus daret partes aquæ viginti, ramos primos vidit dedisse partes 16, ramos tertios partes tres, intestina ipsa partem unicam.

Porro idem vir CLAR. rem eandem de integrò nuper aggressus est (a), diminuto divisionum numero, & ratione ramorum ad truncos reducta, deinde in arteriis quidem minimis sanguinem unica tercia parte minus, quam per aortam velociter fluere (b), fluidum vero transpirabile 7, 854,000 lentius, quam de corde sanguinem moveri posuit (b*). Quorum priora quidem ab antiquis Cl. viri placitis valde dissident, cum nostris vero mire convenient, ouæ paucos ante annos edidi (c). Addit denique vir Cl. aliam, aliquamque in diversis corporis animati partibus celeritatem esse, faciliusque per viscera sanguinem fluere, quam per musculos, cum parum aquæ ex arteriis in venas per carnes transcat (d).

Superest

(t) *Of food and discharges* p. 18.

(u) *Physical essays*, p. 20.

(x) Ib. d. p. 16. 17.

(y) *De pulsu* p. 22.

(z) *De inflammatis*. n. 17. p. 247. *Physiolog.* p. 85.

(a) In *Mem. de l'Acad. des scienc. de Berlin* 1755.

(b) p. 47 Idem tamen eodem scripto tantum motus confundi dat, ut in venis plusquam celeritatis in corde adhibitæ superesse non possint.

(b*) p. 46.

(c) In *Mem. sur le mouvement du sang*, editis à 1756.

(d) p. 49.

Superest , ut exploremus , quid ipsa nos natura doceat , & quæ causa sit erroris reliqui. Dudum equidem **M A L P I G H I U S** (e) , cum dicat , sœpe se vidisse , in truncis arteriarum celerius quam in ramis sanguinem moveri , utique innuit , in aliis experimentis , non celerius motum fuisse. Porro legimus apud *Antonium v. L E E U W E N H O E C K* (e*) , infinitis fere locis , velocissimum in arteriis venisque motum se vidisse. Eo quidem testimonio minime abutemur , cum facile intelligamus , velocitatis mensuram esse per cursa spatio : atque adeo si feceris , ut ea spatio majora videantur , effice te utique , ut celeritas major adpareat , & sexages major , si lens vitrea diametrum corpusculi sexages majorum repræsentaverit (f).

§. XXX. *Quid experimenta doccent;*

Ad experimenta ergo accessi , quæ in calidis animalibus utique institui nequeunt , in frigidis vero capta hactenus valent , ut a majori calentium beneficiar corde velocius sanguinem projici memores simus.

Ergo vidi , neque lentibus vitreis convexissimis minimis usus , in minimis , & capillaribus , & unico globulo patentibus venis , sanguinem celestiter moveri (g) , ut fugitivos globulos vix oculus sequatur , quando per flexuosos minimarum venularum anfractus alternis quasi undis procurvant , & situ , & fulgore perpetuo alio micant. Facile vero dederit aequus terum arbiter , per venulas minimas non majori , quam per arterias , celeritate sanguinem moveri , cum venosus crux suum ab arterioso impetu habeat.

Non ignorabam , esse qui idipsum objiciunt (h) , quod adeo nuper monui , velocitatem nempe vitrea lente adhibita augeri. Ergo eani ipsam in minimis vasis fluentis sanguinis celeritatem cum ea comparate institui , qua per vasa majora manat. Facile enim adparet , & in magnis vasis & in parvis , pro eadem portione celeritatem per vitrorum convexorum usum incrementare. Quæritur autem unice ratio celeritatis , quæ in magnis vasis obtinet , ad eam celeritatem , quæ in parvis superest. Ratio autem duarum quantitatuum non mutatur , quando utraque per eundem numerum multiplicatur.

B. b. 2.

Ergo ,

(e) *Posthum.* p. 92.

(e*) *Contin. arcanae naturæ.* p. 131.

(f) *POLINIÈRE cours d'expériences* p. 545. *HAKER microscope made easy* p. 63.

(g) Exp. 129. 121. 124. 125. 126. 127. 128. 131. 138. 143. 144.

(h) Cf. JAMPART in *disp. de capitu incrementi* p. 16.

Ergo, quantum absque micrometro ejus fieri potuit, contuli celeritatem, qua sanguis per majores arterias fluit, cum ea, quam in minimis vasculis arteriosis, venosissime sibi servat. Deinde comparavi etiam constantiam motus, qui in magnis, & motus, qui in parv's vasis conservatur. Vidi, sincerus, nulloque subrepenti systematis amori serviturus, non raro quidem celeritatem in minoribus vasis minorem, quam in grandioribus (*i*) arteriis fuisse: & motum in iisdem, inque venarum unius globuli capacium reticulato opere, citius cessasse (*k*), dum in majoribus subsistebat. Sed etiam in venis, quod alio loco dignius repetetur, minoribus saepe aequiter, quanti in majoribus truncis, inque venis saepe aequo rapide, ac quidem in arteriis sanguis circumfluit. Venae vero minimae eas causas omnes expertæ sunt, quae sanguinem in arteriis retardant (*l*).

Sed contra alii fuerunt eventus, in quibus celeritas in utroque vasorum genere aequa'is (*m*) fuit, fuerunt denique multa exempla, & celerioris in minimis venulis fluenti, & demum constantioris (*n*), ut omnino tunc in minimis vasis motus supereret aliquis, quo tempore in aliis majoribus & vicinis nullus supererat.

Cum minoribus animalibus majorum phænomena contuli. Saepè nempe incisis canum aliorumque animalium arteriis, expertus sum, de exiguis vasculis multo vehementius sanguinem exsiliisse, adque majorem altitudinem, & longiorem distantiā saltum continuasse, quam quidem recepta theoria permetteret. Sunt exiguae arteriolæ, quas mammariarum internarum truncus generat, & quæ passim de coltarum intervallis ad musculorum carnes feruntur (*o*) qui eas costas elevant, graciles etiam in homine trunculi, quarta parte lineæ non latiores, ut in catello vero etiam intra hanc mensuram subsistant. Ex istiusmodi arteriolis vidi, ad tres pedes & pollices quatuor in priori experimento (*p*), in altero ad sex pedes (*q*) pollicesque totidem sanguinem profiliisse. Sed ex arteria iliaca, tanto latiori, sanguis unice ad tres pedes in KEILII (*r*) experimento prorupit, quem

(*i*) *Second Mémoire sur le mouvement du sang.* p. 262.

(*k*) *Exp.* 65. 72.

(*l*) *Exp.* 65.

(*m*) *Exp.* 62. 68. 73.

(*n*) *Ibid.* p. 262. Videl etiam CL SCHWENKE p. 67.

(*o*) *Iconum anat. sajtic.* VIII. p. 65. 66. & in *Fusfic.* VI. Habet & etiam CL KUNNSAUNA de respir. Ultraj. 1754. p. 12.

(*p*) *Exp.* 43.

(*q*) *Exp.* 42.

(*r*) *De vi cordis* p. 56.

quem ex theoria exspectares, longe majorem parabolam descriptorum, quam minutæ illæ inter costas arteriolæ. Sed ipsarum venarum sanguis arteriosi similes saltus nonnunquam edidit (*r**).

Cum itaque in vasis minimis sanguinis velocitas minus decrescat, quam quidem eæ causæ videntur admittere, a quibus sanguinem diximus retardari (*s*), superest, ut inquiramus, quænam causa subsit, cur aliter effectus se habeat, quam causæ pollicentur. Potest autem minor esse causarum retardantium efficacia: potest novus aliquis motus sanguini accessisse, postquam ex corde projectus est: aliam causam erroris dari posse non video.

§. XXXI. Quæ minuant retardationem.

De ea retardatione dixi, quæ non potest non oriiri ab aortæ arteriæ ramis latioribus. Sæpe animo meditatus, aliqua reperio, quæ hanc retardationem minuant, quæ tollant non invenio. Cum rami aortæ primi, qui de arcu nascuntur, aorta majores sint (*t*), cum eorum ramorum quisque, quemcunque tibi sumferis, & in exemplo carotis, denuo duobus suis ramis minor sit (*u*), externa vero carotis iterum lumen conjuncto ramorum lumine minus habeat (*x*), vides, dudum antequam ad angustissimos canales divisione processerit, habere Te canalem angustiorem, qui aorta est, immisum in canalem latiorem, qui est summa ramorum aortæ. Neque eam rationem esse eam quæ 3 ad 2 (*y*), sed longe utique majorem, vel ex ramis trium primarum divisionum aortæ adparet, quoram ad truncum ratio constanter sesqui altera est, & quod excedit (*z*).

Id unice minuit omnium ramorum conjunctam ad truncum rationem, quod in minimis & capillaribus vasis ea ratio multo minor sit. Et omnino ostendimus (*a*), truncum penultimum ramis minimis satis memorabili ratione majorem esse. Hic ergo lex priori contraria obtinet, & rami trunco minores sunt.

In rebus enim: si truncus in duos ramos finditur, frequentissime etiam duo rami in unicum truncum venoso more confluunt, cuius, per legem

B b 3 venis

(*r**) De salvatella LINDEM selecta p. 579.

(*s*) D. 13, ad 28.

(*t*) L. II. p. 80.

(*u*) Ibid.

(*x*) Ibid.

(*y*) SAUVAGES Mem. de Berlin I. c. p. 45.

(*z*) L. II. p. 80.

(*a*) L. II. p. 81. & L. VI. p. 175.

venis scriptam perinde & arteriis, minor erit suis ramis, unde nascitur. Ut adeo pars arteriosi systematis a corde remotior, potius diminuatur, quam crescat, aut certe, si duo vascula unius globuli in unicum duorum globulorum truncorum confluxerint, post eam divisionem canaliculus arteriosus non minor erit, quam fuit ante divisionem.

Si nunc animo expenderis, vasorum in humano corpore multo maximum partem minutam esse, atque capillaris ingenii, adparebit, in maxima parte vasorum animati corporis aliam obtinere legem, quam eam, ex qua retardatio nascitur. Inde sequetur, hanc quidem ob causam, in majoribus truncis arteriosis sanguinem retardari: sed eam retardationem in minimis, contra quam creditum est, iterum minui.

Frictionem non possis penitus refutare, sunt tamen quæ minuant. Plurimum enim per experimenta Petri v. MUSSCHENBROECK (b) de frictione demittur, quando per politissimam superficiem suorum canalium liquor meat. Nihil autem nostris arteriis levius est.

Etiam globosa figura glebularum sanguinis frictionem minuit, quæ puncta contactus cum parietibus quam paucissima admittat (c). Porro mitior motus mollisque appulso. sanguinis videtur frictione lenire, si a frigidis animalibus ad calida analogiam transferre licet. Sæpe vidi globulos in canaliuum suorum arteriosorum (d) & venosorum (e) parietes, & divisionum calcaria illabi, semper vidi absque vortice, absque impetu in eos. parietes ferri.

Quin longitudo de celeritate demat, minime dubitari potest, indeque repetimus, quod pedum & minor calor, & major cedematis metus, & per frigus adurens prima gangrena sit.

Angustiam vasorum miniomorum, quam Jacobus KEIL ad 1000 pollicis aestimavit, nos ad summum eam reperimus, quæ globulum sanguineum facile & absque frictione transmittat. Sæpe vero majorem, & plutum globulorum diametro æqualem (g) experimenta demonstrant.

Minuitur

(b) *Institut. physic.* p. 175. 141. *NOLLET leçons de physiques T. I.* p. 221.
(c) *LANGGUTH de arteria ab officio cordis annulo remota* p. 31. *SCHREIBER.*
Abrégé p. 236

(d) *Exp.* 69. 70. 82.

(e) *Exp.* 125. 131.

(g) p. 176.

Minuitur ita aliquantum vis frictionis, ut tamen mirari possit, non majorem in experimentis reperiri.

Plicarum vim retardatricem ostendimus insignem superesse. Conica vero figura unice, si ularum, certe majorum arteriarum est, cum minima vascula, aut unius globuli capacia, aut in venas recurva, aut alioquin non ramosa, omnino cylindrica sint (*h*): unde incursus fluenti in vasorum parietes utique magna portione minuitur (*i*).

Id autem celeritatis decrementum, quod a viscida natura sanguinis nascitur, non videtur refutari posse: neque adtractio ad canarium parietes nulla videtur.

De diversa celeritate sanguinis in diversis corporis humani partibus alibi locus erit dicendi. Itaque tamen interim dissimulo, me in anatomicis injectiobus, expeditum omnino in artibus ab arteriis in venas transitum reperisse.

Cum adeo, omnibus follicite pensitatis, & rejectis, quæ minus firma admista fuerint causæ tamen celeritatis diminutæ multæ, & potentes suscipiant, neque tamen pro earum ratione celeritas in minimis decrescere videatur, neque erroris causa vera sit indicata, non videtur hactenus problemati esse satisfactum.

S. XXII. Novæ velocitatis causæ non vere.

Supereft, ut ad causas novæ celeritatis configiamos, quæ præter vim cordis sanguini accessit. Eiusmodi causæ variae propositæ fuerunt, nos vero ab iis incipiemus, quas oportet, tamquam alienas a vero eliminare. Fuerunt, neque aut incelebres viri (*k*), aut parvæ auctoritatis, qui ab ipsa angustia minimorum canalium celeritatis in vasis minimis incrementum sperarunt. Vulgari, ut videtur experimento nituntur, qui hanc hypothesin proposuerunt: infundibili nempe, conive cavi, cuius amplius labrum aquam recipit, angustior vero tubulus emittit. In ejusmodi canali utique velocius per angustius ostium aqua erumpit, & in universum fere (*l*) tanto velocius, quo latior fuerit aquæ in castello superficies, quæ in aditum canalis reci-

(*b*) L. II. p. 59.

(*i*) STÄHELIN de pulsu p. 4.

(*k*) BAZZICALUVI theor. tensor. Prop. I. FRID. HOFMANN physiolog. quæ medicina sistatica primus tominus est, p. 112. Oium Gauthierius CHARLETON tripli celerius in arteriis, quam in corde sanguinem fluere feriperat, quod earum hancem triplo effet angustius three lectures p. 28.

(*l*) SCHELHAMMER de pulsu axiom. III. BERNOULLI hydrodynamic p. 112.

recipitur, inque ex euntem gurgitem nitetur. Verum sufficiat monuisse, arteriam quidem (*m*) unicam ejusmodi tubum esse, si cum aorta comparetur. Summam vero lumen vasorum minorum, de qua queritur, lumine aortæ ampliorem, adeoque canalem arteriosum inversum infundibulum esse, quod per angustius ostium aquam recipit, & emittit per amplius.

Subtiliter alius vir (*n*) olim Cl. impetum sanguinis in vasis a corde remittientibus adeo non minui docuit, ut augeretur, inque venis denique, quam in arteriis major est. Simplici utique utebatur ratiocinio, sanguinem arteriis contentum habebat pro una columnæ, cylindro v. c. cuius basis in corde, longitudo a corde est ad venas. Eam columnam datam velocitatem a corde accipere, majorem adeo impetum nasci, si ea velocitas in majorem massam ducatur. Verum, et si vere omnino velocitas in lumen ducta, in aquis fluentibus impetum facit, non tamen sequentur, que postulat Cl. JURINUS, si velocitas sanguini impressa in majori ratione decreverit, quando longius a corde receditur, quam quidem longitudo columnæ sanguineæ increvit (*o*).

s. XXXIII. Vis ponderis.

Num pondus sanguinis aliiquid in circuitu adjuvando aut accelerando possit, est dispiciendum. Non defuerunt Cl. viri (*p*), qui sanguinem per continuum arteriarum venarumque tubum, tanquam per bicurem canalem fluere posuerunt: inde vero sequetur utique, ut gravitas sanguinis per arterias delapsi, cogat sanguinem, adscendere per venam cavam, tanquam crus alterum incurvi sanguinei tubi.

Non alienum est ab experientia, ponderis aliquam in mutanda sanguinis celeritate potestatem effe. Nemo ignorat, venosum sanguinem, & cum eo vaporem resorbunt, difficilis a pedibus ad cor redire, hinc oedema, collecti nempe vaporis massam, omnium prima in pedibus reperiri, hinc varices in cruribus stantis haruspis subnasci: hinc aquosos tumores decumbentis corporis solo situ dissipari, ut pedes ex notissima observatione, per diurni situs effectum, sub noctem tumidissima sint, redeunte vero mane eadem surgenti

(*m*) L. II. p. 81.

(*n*) JURIN de aquis fluentibus p. 40. 47.

(*o*) Dudum contra hanc hypothesin dixit Thomas MORGAN in philosophic. principles p. 78. 79.

(*p*) J. DOMINICUS GUILLEMUS, J. G. KRUGER physiolog. n. 104.

surgentib; fint gracilissima. In debili semina (*q*) diurno in morbo , sanguis ad id latus adeo vehementer incubuit , quo pondus ducebat , ut omnino mors inde , suppresso sanguinis reditu , sequeretur. A decubitu in brachium , amillo sensu , gangræna celerrime succedit , ut mumiæ simile membrum misera circumferret (*r*). Jugularem venam latiorem fieri , & cum ipsa foramen ossi occipitis & temporum insculptum , in eodem latere , aniplius patere , in quod^o solitus fuerit homo caput in somno deponere ; ab accuratis dissectoriis observatum est (*a*). In situ supino sanguis in cerebrum congeritur , per arterias enim facilius subit subtrahita ponderis resistentia , per venas tardius reddit , demto auxilio gravitatis (*b*).

Denum eam vim ponderis in vivis animalibus multa per experimenta confirmavi. Vidi sanguinem venosum celeriter ad cor redire , & per totum venarum mesentericarum sistema expedito fluento ferri (*c*). Inverti mesenterium & vidi , cum nunc intestina loco inferiori essent , sanguinem venosum & in reditu retardari , & , neque infrequenter demum , omnino contra naturæ legem a corde in mesenterium relabi , venasque intestinales congestum distendere. Restituto vero favore ponderis , ut intestina certe corde non humiliora essent , continuo venas mesentericas iterum evacuari , suumque cordi sanguinem reddere experiebar.

Eadem tamen experimenta me docuerunt , in arteriosum vivi animalis sanguinem parum omnino , aut nihil quidquam (*d*) , sanguinis gravitatem posse : neque iter a corde ad extrelos vasorum fines aut a consentiente pondere accelerari , aut a contraria vi gravitationis ultra conspicua portione retardari. Sed neque in vivo homine aliqua , in arteriosi sanguinis motum , ponderis potestas esse videtur , de quo solo hic sermo est. In capite enim , quo sanguis contra proprium pondus adscendit , primus rubor , facilius sudor , & arteriarum pulsatio , & exanthematum & hæmorrhagiarum familiaris sedes est : in pedibus , quo sanguis per aortam suo ex pondere labitur , omnia contraria reperimus , primum frigus , gangræna initia , hæmorrhagias vix unquam

(*q*) *Storch's Kranken warten* p. 64.

(*r*) *Hermann chir. oper.* T. I. p. 36.

(*a*) L. X. often letetur.

(*b*) *Conf. Bond of the night-mare* p. 10.

(*c*) Exp. 204. 206. 208. 212. 218. 222.

(*d*) Exp. 18. 208.

unquam ulla, neque alia, nisi sanguinis tarde moti testimonia (e).

Tubi bicruris comparationem excludit vasorum minuties, & ramosa natura, quæ arterias cum venis conjungunt, quorum frictio tanta est, ut nunquam aqua, qua arteriam repleveris, ex sola vi ponderis in venas transfeat (f). Nam etiam per aortam arteriam, pondus aquæ per carotidem impulsæ, in tubo crurali, magnæ utique arteriæ, inmissio, non potuit aquam in æquilibrio sustinere. (g).

§. XXXIV. Vis nervorum.

An nervorum vis in fano atque tranquillo homine aliquid in promovendo sanguinis itinere possit, inquiri nunc oportet. Suspicionem certe hujus potentiae non levem excitat magna adfectionum animi in mutanda sanguinis velocitate potestas. Ira (h) pulsus frequentiam (i) incitat, in facie manifestum calorem, & ruborem, & haemorrhagias, & labiorum tumorem producit, in ipsa bile (k) motum celeriorem incitat, ut per intestina manifesto effundatur. Contra terror (l), & subitus, maximusque moeror pulsus humilem reddit, & ægre conspicuum, & frigus, & pallorem, & animi deliquium, & denique mortem subitam, non rarum in exemplis, adeoque perfectam & durabilem sanguinis quietem efficit.

Præter animi motus aliæ etiam nervorum adfectiones pulsus, adeoque sanguinis motum aut incitant aut retardant. Dolor & inflammatio cuiuscunque in corpore animato particula, pulsus durum reddit celeremque, qualis est in pleuritide. Pulsus a dolore a 86 ad centum (m) in minuto primo auctum, proprius de pulsu auctor observavit. Magis auget pulsus membran-

(e) Confer, si videtur, quæ contra hanc ponderis in adjuvando sanguine potentiam scripsierunt Cl. viri PECHLIX diff. anat. c. 6. Aug. FRIED. WALTHER de sanguinis accelerat. & retard. Josua WEITBRECHT Coment. Acad. Petropol. T. VII. p. 284, seqq. Franc. QUESNAY de la saignee p. XV. XV.

(f) Confer contra hanc theoriam, quæ Cl. Josua WEITBRECHT habet l. c. p. 288. 293.

(g) Quando nempe columna 4 pedum & 7 pollicum immitebatur, aqua in altero tubo subflutbat ad quatuor pedes, & pollices quatuor HALES hemast. p. 142.

(h) SCHWENCKE hematolog. l. 64. STMHELIN de pulsu p. 17. &c.
(i) Ab 80. ad 104. FLOYEK physicianus pulserwatch p. 91. Detinente ira ad priorem numerum redierunt.

(k) PECHLIX in off.

(l) Confer. Comment. medir. in prakt. BOERHAAV. T. IV. p. 446. seqq.
(m) p. 224.

membranofarum (*n*) partium dolor, quam viscerum, ubicunque nempe sensus acutior fuerit. Olim a *spina* pufsum accelerari **HELMONTIUS** auctor fuit (*o*). Circulatio sanguinis velocior sequitur inflammationem, uti pruritum unguium scalptio, apud *Franciscum de SAUVAGES*. Denique peculiares topicosque in arteriis motus a vi stimuli nasci *III*. *Johannes à GORTER* proposuit (*p*) & glandularum nervos liquorum iter inhibere, etiam si cordis impulsio manferit, *Carolus MALOUIX* (*q*).

Cum adeo certa exempla esse crederent, in quibus nervosum imperium sanguinem regit, eo prioniores fuerunt *Cl. aliqui viri* in eam opinionem, qua recipitur, etiam extra animi emoti turbas, vim nerveam celeritatem sanguinis aut augere, aut minuere vicissim.

Sed etiam de modo cogitatum est, quo nervi sanguinem per arterias incidunt, tardentve. *III. Archiater* (*s*) a liquido nerveo arterias constringi, easque rigescere, & earum elaterem augeri, docuit, inque ira sanguinis motum excitari, uti vicissim in paralysi sanguinis motus debilitatur. Deinde eosdem nervos minima vascula constricta tenere existimat vir *III. ne quidquam sanguinis transeat*, exemplo hysterici frigoris (*t*), & ad cor potius, ipsas per arterias sanguis refluat. Denique animi affectus ipsum cor arctare probabile putat, ut tenuerit sanguinis filum inde prodeat (*u*). Ita porro a spastico venosas obstrunctiones, deteriores arteriosis, deducit *Franciscus QUESNAT* (*x*), & in spasmis hystericiis arterias carotides venaeque jugulares tumidissimas, & corpus demum maculosum vidit nuperus auctor *Cl. MATANUS* (*y*).

In vivo demum animale **MALPIGHIUM** legimus vidisse, motum sanguinis interruptum ab enata convulsione restitutum fuisse (*z*), quale quid etiam ipse putavi me vidisse (*a*).

§. XXXV.

(*n*) *SCHWENCKE* p. 66.

(*o*) *Blas humanae* n. 28.

(*p*) *Chirurg. repurg.* p. 98.

(*q*) *Der seihd. & fluid.* p. 63.

(*s*) *SENAC de coeur T. III.* p. 170, 208. *QUESNAT de la gangrene* p. 330.

(*t*) p. 170, 208.

(*u*) p. 534.

(*x*) *Der fievers* p. 215.

(*y*) *De aneurysmu*, p. 110.

(*z*) *Posthum.* p. 92.

(*a*) *Exp.* 227. &c.

§. XXXV. *Laquei nervei.*

Propius etiam alii clari viri (*b*) ad mechanismum interpretandum accesserunt, quo nervi sanguinis iter regant, neque adeo, ante hos quatuordecim annos (*c*) desperavi, aliquanto magis minus hic ad naturam accedi posse, neque illustres viri defuerunt, qui meam expositionem admitterent. Reperiebam nempe, manifestius, quam ante me factum erat, & copiosius, plerosque trunco arteriosos per nervorum discedentium, iterumque unitorum quasi laqueos transfire: exempla numerosissima inveniebam, in aorta, & subclavia dextra, quas quasi hamo suscepimus nervus recurrens complectitur (*d*): tum in utraque subclavia, quam perfecta ansa (*e*) nervi intercostalis in suum ganglion thoracicum supremum redeuntis interceptit in vertebrali arteria (*f*), quam alii ejusdem trunci rami ambeunt, in temporali (*g*), meningea majori (*h*), cervicali profunda (*i*), arteria mesenterica superiori (*k*), coeliaca, phrenica, renali utraque, arteria humerali (*l*), crurali, arteriis hypogastricis (*m*), vena portarum. Eas enim omnes arterias, aut ansa nervosa, aut multiplex utique nervorum plexus amplectitur.

Nunc videbatur equidem probabile, non nisi ad magnos usus C R E A T R I C E M S A P I E N T I A M , has nervosas ansas arteriis circumdedisse. Neque penitus rejiciendam putavi hypothesin, quæ horum nerveorum laqueorum vim explicat Poterat nervus arteriam, tamquam circumjectus funiculus, arctare. Id potest aut vehementer, aut leviter, aut continuata pressione, aut alterna adiunctione fieri. Si alterna, sed ordinata nervi contractio persisteret, intelligebam, novam circuitus adjuvandi causam accedere, atque eam in fano homine rationem esse, qua vis nervea motum vitalis fluenti promoveat. Si remissus nervus desicit arteriam adstringere, deest altera

(*b*) *Willis de cerebro &c nervis* p. 121. ut tamen ipse propriam hypothesin antiquaverit. *J. Baptista BIAUCHERI hislor. hydat.* p. 22.

(*c*) *De nervorum in arterias impono Gotting.* 1744. & in *T. II. disput. anat.*

(*d*) *Diss. cit. n. 18.*

(*e*) *Ibid. n. 17. & tab. nostr. arter. thyroid. ant. in fasciculo II.*

(*f*) *n. 16.*

(*g*) *n. 14.*

(*h*) *n. 13.*

(*i*) *n. 15.*

(*k*) *n. 20.*

(*l*) *n. 21.*

(*m*) *Ibid.*

altera causa sanguinis motrix, atque adeo ejus fluentum retardatur. Quando denique arteria in medio nervo intercepta, continua ejus nervi constrictione comprimitur, adparebat, tamquam vinculo facta, sanguinem ab ea arteria aversum regurgitare, nullamque porro sanguinis penum ad eum artem venire, cujus arteria constringeretur. Quando alternis quidem adstrictionis & relaxationis vicibus nervea ansa potentius, & convulsive, suam arteriam comprimit, ut in ira credebam fieri, sanguinis equidem circuitus vehementius incitatur, & nova potetas nata est, que ejus humoris iter precipitat. Inde facile est, obiter rem contemplanti, & lensorum animalium adiectuum, & velocium in tardando, suppressendo & incitando sanguinis motu effectus exponere.

§. XXXVI. Cur hæc non firma sint.

Verum multum de ista spe, præcocibusque de gaudiis, per experimenta mea decessit, quæ ostenderunt, nervos utique ab omni vi irritabili esse alienissimos (*n*), non posse adeo vel breviores reddi, ut medium arteriam arcerent, quam sua ansa comprehendunt, vel vicissim laxari. Eo ipso enim tempusculo, quo vehementissime irritatus nervus artum integrum in convolutionem ciet, manet ipse immotus, nullaque imaginabili suæ longitudinis portione aut brevior fit, aut vicissim longior. Uno ut verbo dicam, nos omnes laqueorum nervosorum vires ornabamus, transferebamus ad nervos, quod unice musculorum est, vim contradicitem.

Deinde in concussionibus illis, quæ sanguinem accelerare videbantur, mechanicam (*o*) muscularum subsultant vim subesse non temere supicor, qui arterias agitabant, neque adeo ad nervos etiam hanc sanguinis accelerationem pertinere. Convulsiones enim totius animalis, ab irritata medulla spinali natæ cordis motum non suscitant (*p*), neque cum maximum doloribus pulsus aut major est, aut velocior (*p**). Porro in paraplegia ejus artus arteriam, qui omni motu amissio debilitatus languet, pulsum immutatum (*q*) video conservare, arguento, absque nervorum officio sanguini circumneunti constantem sui motus causam supereffe. Con-

Cc 3

tra

(*n*) Second memoir. sur les part. irrit. & sensibl. Sect. IX. Exp. 209.

(*o*) Second memoir. sur le mouvement du sang. p. 342. FONTAINE Epitre à M. TOSTET. Exper. 55. ad 59. & 104. ad 174.

(*p*) Sur les part. sens. & irrit. Exp. 489.

(*p**) Haarlem verbandel T. IV. p. 511. 523. COZ biliary concret. p. 164. ANG. de febril. intermit. p. 66.

(*q*) Des Hais de hemiplegia. WOODWARD Select. cases p. 65. 77.

tra, in vehementissimis opisthotonis & spasmis seminarum hysteriarum, totum corpus agitantibus, & in arcum curvantibus, neque pulsus incitari, neque sanguinem accelerari, saepe vidi. Sed etiam in uterina placenta, absque suspitione nervi auxiliis sanguis movetur, & in offisis, ut alibi excitavi, arteriis, multis utique senibus (*r*) humor vitalis circumfertur, a quibus omnis irritabilitas omnisque compressio abest: & in plurimis animalibus expedite humores vitales circumfluent, quibus nulla certa cerebri capitisque similis particula est, toti nempe ostreorum & mytulorum aliorumque bivalvium classi.

Quare crediderim nervos, qui arterias adeunt, utique ad vim earum contractilem pertinere, fibrisque earum carneis id mobile principium imperire, quod a nervis carnes mutuantur. Neque credo alienum esse a veri specie, eos nervos posse vel magis irritabiles arterias reddere, vel minus, prout in ipsis ipsis nervis ineffabilis ea mutatio processit, quae pruriens eorum sensum intendit. Sed in primis cordis ipsius naturam irritabilem increscere, aque nervea mutatione celeritatum ejus organi motum, veramque convulsionem produci posse, atque adeo ipsum fontem motus sanguinis nova scaturigine augeri probabile fit, ut ex palpitatione manifestum est, quae in ira, gaudio, aut desiderio, & exspectatione observatur. Sed ea omnia in ultimis latere elementis video, neque ad experimenti fidem revocari posse. De modo, quo affectus animus corpus mutat, alibi rectius dicetur.

§. XXVII. Causæ veriores. Contractio arteriarum.

De contractione arteriarum alibi fusius diximus (*s*), hic tamen multa superfunt, quibus noster sermo carere non potest. Dubium equidem nullum est, majorum arteriarum, quæ alterne micant, diametrum tantum per suam contractionem arctari, quantoni paulo prius a cordis vi aucta fuit, atque adeo regenerari eam vim, quam cor in dilatanda arteria impedit, frustra utique, si ad sanguinis motum progressivum unice respexeris. Si enim major vis contractionis arteriosæ foret, arteria post singulum pulsum arctior fieret: si minor, post singulum pulsum majori foret diametro. Hinc cuncti

(r) VESAL Exam. obf. fallop. p. 36. FISCHER de Senis p. 46. LUCAS of mireval Winters T. I. p. 158. &c.

(s) L. II p. 71. 72. L. IV. p. 435. 440.

cum eodem istu & arteria pertusa fuisset, & vena, atque ex arteria in venam liber commeatus pateret, vena ea in sede mere intumuit (*s**).

Neque dubium est, hanc vim, qua arteriae pressioni laterali resistunt, ejusque effectum compensant, utique magni momenti esse. Etsi enim parum aut crassae fibræ sunt, aut multæ (*t*), quæ musculosam partem arteriae constituant, etsi lenis contractio videtur, qua arteria se in vivo animale digito subducit (*u*), ipsa tamen longitudine immensa areæ musculosæ, quæ ad arterias pectinet, earum fibrarum parvitudinem compensat.

Grandiores enim arteriae omnes, ad eas usque, quæ sexta linea parte (*x*) non latiores sunt, utique unicum constituent continuum, musculosum, tubum, a corde ad ultimos hujus diametri ramos extensum, qui tubus a cordis vi dilatatus eodem, quantum videtur, tempore se arctat, & sanguinem propellit.

Neque ejus contractionis vim video sanguinem retroagere (*y*), ut dimidia ejus potitas in eo, frustraneo, conatu consumatur. Nam globuli certe rubri ranarum, priusquam morbosus status accessit, unice legitimo motu contra vasa minora propelluntur (*z*), quo iter per venas liberum est, novaque a corde succedens unda procul dubio intercedit, ne ad cor ex via arteriosæ constrictiōnis sanguis retroeat. Causa, quare de arteriis sanguis ad cor non redeat, est in arteriosi systematis ad contractionem sollicitatione, quæ non subito in toto eo systemate, unico in tempusculo, sed in multis tempusculis fit, quæ ex ordine sibi succedunt, ut ea pars prima sollicitetur, quæ cordi est contermina, deinde, ut sequuntur, sensim remotiores a corde arteriæ particulæ. Inde fit, ut prima contrahatur, eademque potentissi-

(*s**) *Observe. of a Societ. at Lond.* n. 1. p. 340.

(*t*) L. II. p. 60. 64.

(*u*) *Sur le mouvement du sang.* exp. 44. 50. R. M. U. S. Exp. 2. Nempe adeo lenis is arterie dilatazæ & subtilitatis motus est, ut tipe nullus adpareat.

(*x*) *Sur le mouvement du sang.* Exp. 46. Ultra exteriorem in extinctorum tunicam pulsus non procedit van den Bos de vnu corp. hum. solid. Exp. 9. Non omnino aquæ ceterum in me fuit Cl. olim amitus noller, qui contractionem arteriarum me negari scripti, iis ad totam arteriam translatis, que de minoribus ramulis scripti. *Amsag.* p. 232. n. 144.

(*y*) Ita docuit vir Ill. Petrus ANTONIUS MICHELLOTTUS i. c. p. 36, ut nihil omnino arteriarum contractio viribus sanguineum promoventibus addiceret. Sed etiam Clarissimus SCHREIBER, qui ceterum de succedente fibi in variis arteria partibus sanguinis motu nobiscum sentit, cylindrum tamen sanguinis dimidiam, & in minoribus valis maiorem, ad cor repellit scripti. *Alnagast.* p. 240. Adeo alienam a vero hanc persistalticam successionem motus arteriosi credit Cl. SHERBREARE, ut tamquam argumento ad abluendum contra vim cordis utatur *Principi. of Prudite.* p. 204.

(*z*) In omnibus experimentis meis.

tentissime pars aortæ , quæ carnibus cordis continetur , aut proxima adsidet ; eaque sola utique sanguinem contra cor retroagit (a). Inde reliqua tota arteriæ longitudine sanguinem non urget tetrosum , cum ea in parte arteria eo ipso tempusculo , quam maxime in contractione versetur , sed antrorsum , aque corde remotius , qua scđe arteria hactenus neque a novo , quem cor submittit , sanguine irritata est , neque contracta. Hanc successionem requirit necessario sensim retardata velocitas ; quæ sola facit , ut unda nova præcedentem superveniat , eamque , ut alias dicetur , & prorsum ad venam urgeat , & in parietes arteriarum. Sed ea celeritatis in sanguine posterius sequente major ratio decrescit perpetuo , donec in venis nulla sit (b). Dilatatur autem arteria , ut in pul'us historia ostendetur (c) , quia unda prior lentius fugit , novaque unda ipsi celerior supervenit , ut duæ undæ conjuncta in eodem spatio arteriam repleant , atque adeo distendant. Ita fit , ut tempusculum , breve equidem , unius diastoles arteriosæ , in plures particulas dividatur , quarum in prima pars aortæ cordi proxima dilatatur : in altera pars paulo ulterior , in qua minus magna est celeritatis undæ insequentis ad celeritatem minorem undæ prioris ratio , atque adeo minus celeriter , unda sequens antecedentem adtingit. Et ita porro semper paulo serius unda prior a posteriori adtingetur , & serius adeo erit dilatationis arteriosæ tempusculum. Si dilatationes in aliqua temporis successione fiunt , de contractionibus dubium nullum est , quin perinde ex ordine serius in vasis fiant a corde remotioribus. Prima arteria aorta pectoralis , deinde abdominalis , tunc arteria iliaca , postea femoralis , tunc tibialis postica , denique plantaris externa arctabitur. In vivorum insiciorum arteria evidentissimum exemplum est (d). Atque eo modo , tota vis arteriæ , minima particula excepta , in sanguine promovendo utiliter impendetur.

Non ideo non eodem tempore cor micabit (e) , & ultima pedis arteria.

(a) WITTBERG. *Comment. Acad. Petrop.* T. VI. p. 321. & operis mei L. IV p. 414. Ni valvulae forent , in cor utique sanguis retroinet , & retroit , cum scđia & perpetua cordis irritatione , quando valvularum officium cessat L. IV. p. 415. Cowper Philos. *Trau. n. 299.*

(b) Hoc libro Sect. V. n. 3.

(c) Sect. II. n. 3.

(d) L. IV. p. 305. 306. Conf. Clar. vir. *Crescentium de fibribus* p. 26. Morison Philos. *princip.* p. 140.

(e) Ut clari vni cedum viderunt , HARVEI *de gener. animal.* p. 157. SPIGELIUS *in Anat. corp. hum.* p. 172. experimento in eripaceo factò , HOFFMAN *med. consil.* T. VI. dec. III. cas. 3. *in vivo & vulnerato homine* , VERRHEYEN *Anat.* L. II. p. 276. SCHWEICKER *Lematol.* p. 12. SAUVAGES *de Jufus* p. 20. Conf. L. IV. p. 447.

teria. Cum enim sanguis ea celeritate feratur, ut ex corde, perque magnas arterias, pulsus fere 150 pedes (*f*) aut pollices 1800 in minuto primo horae percurrat, & cum adeo, dilatatio totius trunci unius pedis, quem in vivo animale possit oculis observare, fiat in minuti secundi parte pene tertia, plerique mortales successionem adeo brevem oculo non percipiunt (*g*), neque distinguunt, et si sunt, qui se distinguere crediderunt (*h*).

Mensura contractionis arteriorum eadem est, qua dilatationis, cui perfecte æqualis est (*i*). Quare vi cordis minor est, & æquat sanguinis velocitatem totam a corde generatam, diminutam toto motu progressivo. Quare dum arteria contrahitur, pergit eisdem sanguis de vulnerata aorta salire, sed diminuto impetu, & tanto minus altum saltum edit, quo minor est vis ab arteriis generata, ea vi, quæ a corde nascitur. Ex arteria coronaria sanguis a cordis vi ad pollicem elevatur, in systole vero arteriæ absque saltu effluit (*k*). Vedit Stephanus HALLES duobus tribus pollicibus sanguinem altius salire, quo tempore cor contrahitur (*k**) ut omnino saltus a contracto corde natus, tunc quando altius sanguis exsilit, modo decima sexta, modo decima octava parte saltum superet, qui fit in arteriæ systole, in mediocri vero motu sanguinis a vigesima tertia parte ad octogesimam. Hinc octogesiman tertiam partem retinuit Franciscus BOISSIER de SAUVAGES (*k***). Quantum autem arteria se deprimat, nondum definiri potest, cum præterea in omni arteria alia mensura contractionis sit. Arteriæ contractæ ad dilatatum lumen facit, uti 9 ad 4, Cl. de SAUVAGES (*l*), atque adeo diametrum uti 3 ad 2, quæ mihi aut contractio, aut dilatatio potius nimia videtur. Nam oculus saepè nullam in vivo animale percipit, semper exiguum, lenemque. Sed dilatationem alibi estimare conabimur.

Ab

(*f*) L. IV. p. 249. &c. L. VI. p. 164. 165.

(*g*) Quos nempe modo excitavi p. 208.

(*b*) JESU斯 WEITZRECHT I. c. p. 317. In carotide v. GEUNS p. 15. SCHELHAMMERUS olim, inter alium esse, ut tamen percipi non posset, script in L. de pulsu p. 27.

(*i*) p. 172.

(*k*) Exp. sur les part. sens. & irrig. exp. 502. 536. 542. 543. 544. Conf. STRAKKE de reliquo instrumentis quibus sangu. in circulum mouetur. n. 22.

(*k**) Hemall. p. 10.

(*k***) De pulsu p. 18. Elem. physiol. p. 87.

(*l*) De pulsu p. 3. Verum ex theoria & ex comparata contractione fibrarum longitudinem sequentium (qua nullæ sunt) disiectæ arterie hanc mensuram derivat auctor Cl. Sed alia omnia ratio est arteriæ, que difficit se contrahit, a loco nupne firmo ad unice firmum. In mortuo animale quam in vivente, viti quadruplo angustior est F. LAMURE de secret. Verum in hoc casu lenta contractio, cum exsiccatione virtus suas conjungit.

Haller Physiolog. Tom. II.

D d

Ab hac contractione explicatur, quare per minutias etiam arterias multum sanguinis effluat (*m*) ; & quare non subito de vasis in animalis magno vulnere laesis sanguis omnis excat, sed altero demum die, novo vulneri facto (*n*) carnes penitus exalbescant. In utroque phænomeno contractionis vasorum lentior equidem, & cum tempore, sanguinem abundantius expellit.

§. XXXVIII. Unde ea vis absit.

Supereft, ut contemplemur, quanta sedes hujus contractionis sit, & a qua causa cieatur. Vulgo quidem arterias omnes dilatari, omnes contrahi docetur, ut vis contractilis ad definitionem & communem arteriarum naturam referatur (*o*). Mihi quidem haec non adeo liquida videntur. In frigidis certe animalibus sola arteria aorta superior & pulmonalis pulsat (*p*), & truncus mesentericus; ab aorta abdominali aque ramis mesentericis (*q*), uti omnibus dilatatio, ita contractionem unius abeat. Neque enim unquam aut oculo nudo, aut armato, arteriae ullam dilatationem videre potui, aut vicissim contractionem aliquam, neque venulae arteriis interpositae elevantur (*r*), neque minutissimæ rimæ ab arteriæ vi contractili dilatantur (*s*). Sed neque acerrima venena (*t*), quæ arterias solent ad contractionem cogere, in haec vasa quidquam possunt. Denique, cum globulos sanguinis faciliter viderem, nihil quidquam fibris muscularibus simile in iis, non adeo exiguis, plurimorumque globulorum diametrum, habentibus arteriolis vidi: sed alba undique & cellulosa similis est indeles.

Si a frigidorum animalium arteriis plerisque manifesta contractionis abeat, in calidis etiam animalibus infinita vis vasorum minorum nullo certo experimento demonstratur pulsū agitari. Arterias maiores maxime dilatari certum est, cum &

(*m*) KILL quantity of blood. p. 56.

(*n*) KAEM american. Refa T. II. p. 8. Ut nempe vitulinam penitus albam habeant Angli, prima die multum emittunt sanguinis, altera reliquum cruentum hauriunt.

(*o*) Arterias minimas retine pulsare SAUVAGES nov. ad. Acad. nat. cur Vol. I. obs. 36.

(*p*) Exp. 85. 102 Fränkische anmerkungen T. I. p. 20.

(*q*) Exp. 66. 67. 69. 70. 72. 81. 84. 86. 198. vanden BOE de visis corp. hum. solid. exp. II.

(*r*) Exp. 71.

(*s*) Exp. 180. 200.

(*t*) Exp. 75. 76.

& minus resistant, & cordis vim propiorem & integriorem patientur (*u*). Verum in lumine vasorum minorum neque oculus mutationem percipit, neque microscopium, neque tot in experimentis, quando calidorum animalium sanguinem circumeuntēm speculabantur clari viri (*x*), unquam dilatationis meminerunt, aut arctatae vicissim diametri: aut fibrarum musculoarum, quas parvas esse oportet, si globulo rubro minores sunt, quem globulum, iisdem in periculis, clari viri potissimum contemplabantur, & facilime conspiciebant. Sed etiam in pulo, qui in ovo est, aorta ipsa, & reliquæ, præter umbilicales, arteriæ absque pulsu sunt, quem oculi certe etiam armati percipiunt (*y*). Demum, cum observata per numerosa experimenta, arteriarum firmitudo sit ejusmodi (*z*), ut in universum cundo crescat, & arteriæ artuum manifesto, quam trunci cordi propiores, robustiores sint, non est improbable, minima & capillarium de arteriarum tribu vascula eadem in calidis bestiis esse firmitate, quæ est in vasculis, etiam majoribus, frigidorum animalium. Si firmitas eadem est, sequetur ut a diminuto per tot causas cordis impetu nequaquam eleventur: atque adeo vicissim non contrahantur. Denique jam olim monuit, *Franciscus BOISSIER* (*a*), differentiam velocitatis undæ prioris sanguinis undæque posterioris, perpetuo minni, quo longius a corde receditur, atque adeo principem causam diastroes arteriæ in arteriis minimis debilissimam superesse, ut etiam ob hanc rationem dilatatio durioris & magis resistentis minoris arteriæ minus exspectari debeat. Id dederim, in *vasis*, quæ sano homini non micant, per morbos pulsum nasci (*b*), si tempore inflammationem citior cordis impetus in ea vasa sanguinem egerit. Idem enim tunc fit, quod fieret, si cordi propria reddidiles (*c*).

Si pulsus destituitur totum arteriarum fere systema, quod minus est sexta parte lineæ, magna certe pars ejus novæ celeritatis deletur, quæ a contractione arteriæ speratur. Maxima enim pars vasculosi systematis, ad

D d 2 hanc

(*u*) JACKSON de *vena sedione* p. 5. &c. SCHREIBER *Almagest.* p. 222.

(*x*) SAUVAGES de *inflammatione* p. 250. GUILLEMUS COWPER *Prol. Transact.* n. 280. 185. ANTONIUS V. LEEUWENHOEK *experim.* & *consensu* p. 260. in *vespertilione*.

(*y*) *Du polet* T. II. p. 100.

(*z*) L. II. p. 73.

(*a*) I. c.

(*b*) Arteriæ minimæ non pulsant, nisi in febre HARVEI *Exerc.* III. p. 258. A suspicio pulsus ad extremos unguis HENSHAW *arcoebat*. p. 179.

(*c*) De arteriis minorum generum adfirmat CL. NICOLAI *vom pulsusblage* p. 27.

hanc immobilem arteriarum classem pertinet, & musculosa pars arteriosi tubi multo nunc minima superest.

Sed delentur etiam omnia, quæ a vi irritabili & oscillatione vasorum minimorum Clari viti exspectarunt (*d*). Si enim arteriæ minores non contrahuntur, sequitur neque irritabiles esse, neque sanguinis iter promovere. Sed repetere non necesse est, quæ alibi ad hanc hypothesin monuimus (*e*).

§. XXXIX. *Hujus contractionis caussa.*

Contractionis arteriarum causam aliqui scriptores simplicissimam fecerunt, ut ab elatere membranarum (*f*) unice pendeat, quibus arteria constat. Eas enim membranas habent pro chordis alioquin tensis, quæ a vi dilatante cordis, & sanguinis nixu in majorem convexitatem auctæ, atque adeo nunc longiores, quam sunt sibi relictae, in statu sunt violento, ex quo ad naturalem brevitatem dinißæ se restituunt. Experimenta adducunt, arterias etiam a morte aiunt contrahi, & vulneratas plicas agere, vulnusque claudere; quæ quidem vulnerum obturatio a fibris (*g*) longitudinem sequentib; nunc tumentibus derivatur. Elaterem autem, ut alibi monuimus (*h*), arteriæ non modicum inesse pergit, ut distracta duplo se ipsa angustior fiat, antequam se patiatur rumpi, & triplo, & quintuplo longius disiecta se retrahat, quam quidem nervus (*i*), & quæ alia suo loco diximus (*k*).

Plerique recentiorum accedere putarunt vim musculosam vitalemque (*l*), de genere irritabili. Excitant fibras carneas in majoribus arteriis apprime conspicuas, eas ex natura carnibus communi in brevitatem niti recte docent. Quare alii ipsis quidem venenis irritabilem vim demonstrati posse quo

(*d*) W H Y T T *pblol. eff.* p 53. 57. & olim M A L O U I N *tr. des solides & fluides.* n. 12.

(*e*) L. IV. p. 445.

(*f*) P E C H L E R *de purgantib.* p. 478. S C H E L H A M M E R *de puls.* S C R E I B E R *almanach. med.* p. 238. P R O C O P E *analyse de la tritut.* p. 64. 79.

(*g*) M O R A N D *Mem. de l'Acad des Scienc.* 1736.

(*h*) L. II. p. 70. 71.

(*i*) S A U V A G E S *theor. tumor.* p. 8.

(*k*) L. II. p. 70. 71.

(*l*) G. C H E Y X K *pblol. princip. of relig.* Job. de G O R T E R *de motu vitali* n. 48. 49. Q U E S N A I *de la saigné nov. edit.* p. 60. 61. E. A u t o n . N I C O L A I *vom pulsibiliige,* B I K K E R *de natur. hum.* p. 45. vanden B o s *de vivis corp. hum. solid.*

quo tacta arteria contrahatur (*m*), aut resecta ad vermis modum repat, utique (*n*) putarunt, alii certe ab electrica scintilla in aortæ trunco excitata contractionem produxerunt (*o*). Sed & nervos addunt arterias adire (*p*), posse adeo in iis tubis & nimiam vim sensus, sive erethismum locum habere, & verum demum spasmodum (*q*). A spasmo arteriæ pulsus durior fit *Quessnai* (*r*). A contractione carotidis spasmodica apoplexia (*s*). A convulsione fibrarum longarum aortæ palpitatio (*t*). Demum ab irritatione aucta, hinc accelerata arteriarum actione febrem derivant, & id præcipuum *Boerhaave* inventum esse, grati prædicant (*u*). Inde vim irritationis porro & inflammationis deducunt, quæ facit, ut sanguis in aliena & serosa vasa dolentis in exemplo oculi transeat (*x*), absque cordis ope.

Hæc ita decet proponi, ut ne supra verum aliiquid addamus. Musculos arteriarum majorum fibras distentas se restituere non est dubium: neque carnes naturam suam contractilem hic deponere æquum est suspicatu. Quod ab externis venenis, aut a cultri ratione non contrahantur arteriæ (*y*), partim a plurima superjecta cellulosa tela explicò, quæ carneas fibras protegit, partim a fibrarum carnearum parvitate. Vim magnam exspectare vetat ipsa earum fibrarum exilitas (*z*), tum sensus, qui in arteriis per experimenta minimus est (*a*), neque a minutissimis nervis major potest exspectari. Convulsiones adeo in arteriis locum habere, ut oculis conspici possint, nullo experimento confirmatur Augeri irritabilem naturam non repugnavero, ut tamen eam mutationem a mentis potius subtilitate excogitare liceat, quam sensuum testimonio confirmare. Ut irritabilis natura ad inflamm-

(*m*) *Zimmermann de irritabilitate*. p. 24. addit. *Antonii de Heyde* obf. 85. *Lorry Journ. de med.* 1757. Jan. Ab oleo vitrioli vanden Bos exp. 9.

(*n*) *Des part. irrit.* & *senibil.* Exp. 565. 566. 567.

(*o*) *Vanden Bos* diff. cit. Exp. 10.

(*p*) *Nicolai I. c.* p. 5. *Sennac T. II.* p. 270. Nervis in arteriæ diastole compressis, in arteria evacuata le contrahentibus, sytalem tribuit *Georgius Chyrne* I. c. p. 137.

(*q*) *Nicolai bemübung in theoret und praktischentheilen der medic.* III. Stücke. q. 4. &c.

(*r*) *Des fevres* p. 235.

(*s*) *Mihelis in sua prima physiologia linea* p. 222.

(*t*) *Lancis.* p. 129. 130. edit. 1728.

(*u*) *Quessnai tr. des fevres* p. 77. 79.

(*x*) *Wittt physiolog. essays* p. 46.

(*y*) In nostris experimentis tr. de la nature sensi, & irrit. p. 274. *Ramus* p. 37. 48. *vanden Bos* exp. 10. 11. *Caldan in epistola* I. p. 333.

(*z*) *L. II.* p. 61.

(*a*) *L. II.* p. 70. *Fontana* Exp. 43. 45.

inflammatis (b) partes sanguinem congreget, nondum credo explicatum fuisse, & facilius forte a venarum vehentium constrictione aliqua explicari crediderim, etiam penis exemplo, quam ab arteriarum minimarum quæcunque vi contractili.

Denique liceat ex pathologicis addidisse, in hominis perfectiori fabrica hanc arteriosi systematis resistentiam ad cordis dilatantes vires ita contemporatam esse, ut cordi cedat, sed eadem proprio robore se restituat. Si cordis vires superaverint, fundamentum jactum est aneurysmatis (c). Per totum vasorum systema eam debilitatem posse dominari (d) vel ex iis exemplis adparet, in quibus in majoribus quidem arteriis multa per totum corpus aneurysmata fuerunt, in minimis vero ex pari debilitate, diminuta resistentia, & inde natae maculae (e). Ex eadem denique causa arteriae rumpuntur, aut pulmonalis truncus (f), aut frequentius quidem rami aortæ. Huc evidenter pertinent eorum hemorrhagiae, qui artus amiserunt (g). Cordis enim vires eadem sunt, arteriarum resistentium sistema minus. Quando cordis vires non sufficiunt, ipsum quidem amplius redditur, ut vulgo in sensibus amplius est (g), & aneurysmaticum (g**), denique etiam ex hereditaria dispositione (h), neque absque exemplo est, omnino medium disruptum fuisse (h*).

§. X L. Vis derivationis.

Etsi adeo vim arteriæ contractilem nimis ornatam fuisse persuadeor, ad occultæ tamen contractionis speciem, vim non illubens referrem, quam dixi, *derivationis*, & quæ & in vivente animale, & in nuper mortuo, sanguinis

(b) L. II. p. 436. 444. WHYTT *physiol. essays* p. 46. 67. &c.

(c) I. C. C. VII. p. 132. ed. prior. *Phil. Trans.* n. 345. BOERHAAVE T. II. p. 127.

(d) MEKEL *Mem. de Berl.* T. XII. p. 63.

(e) MATAHIS *de aneurysm.* p. 49.

(f) IDEM p. 121. effulsaque sanguinis librae sedecim.

(g) LISTER *de cocleis* p. 60.

(g**) TABOR p. 95. HELVETIUS *éclairciss.* p. 40. MEKEL *Mem. de Berl.* T. XII. p. 55. 63.

(g***) LANCIS. p. 134. recte addit in dextro ventriculo, frequentius malum esse. Habet etiam exemplum TABARRANUS in *obs. Anat.* ed. II. p. 28. aliud MATANUS *de aneurysm.* p. 17. &c.

(h) LANCIS. p. 132. ed. prioris. Adgnosci ex pulsatione dextri lateris, & ad trinopotes propagati credit.

(h*) CONUM. BONON. T. IV. p. 33. 34. FRÄNK *anatom.* T. II. &c.

nis motum sola gubernet. Nempe de incisa arteria , & perinde quidem de secta vena , sanguis maxima velocitate effluit (*i*), eo modo , ut de vicinis truncis ramisque , & secundum circuitus sanguinei leges , & contra easdem (*k*), in vulnus ruat , ut etiam contra ponderis vim (*l*) & directionem naturalem in rimam se præcipitet. Ita etiam in stagnante sanguine (*m*) nova nascitur velocitas , & evulso demum corde (*n*), aut re-vinctis magnis aorte ramis , atque rectâ adeo ab arteriis cordis potentia , tamen sanguis novam velocitatem adquirit , quæ neque a corde est , neque a pondere , neque ab ulla potentia nobis cognita , nisi occultam , atque subtilissimam vasorum minimorum contractionem admittas , quæ sanguinem contentum undique urgat , pari vi , & quæ motum nullum generet , dum omnia vasa integra sunt , tunc autem se exferat , & sanguinem in novum motum restituat , & denique per vulnus exprimat , quando locus aliquis natus est , a quo eamdem pressionem demferis. Non ideo velim me videri contraria dicere priorum , quando contractilem vim ab arteriis eorum animalium minoribus abesse scripsi (*o*). Phænomena eo loco narravi , negavi conspicuum in minimis arteriis contractionem reperiri , & nunc sincerius aliud phænomenon propono , quod non videtur absque aliqua contractione intelligi posse : ea vero contractio a vita non pendet , neque musculosa est indolis , quæ a morte superflit , & ad natum potius elaterem tensæ fibrae cellulosa spectat ; ea enim alio etiam in exemplo , sed lente , & multis continuis diebus (*p*) , arterias calidorum animalium resectas exinanit , diametrumque minuit , & lumen delet. Motum sanguinis hactenus hæc latens contractio adjuvat , quod distentam a corde , fibrarum carnearum auxiliaris sœcia , arteriam arket. Tunc demum conspicua se exferit , quando conditio nata est , nunquam in vivente sanoque animali nascitura , membranarum nempe violatio , ex quibus arteriæ componuntur. Nullum vero manifestum motum videtur producere , quod per arteriosum systema ita sit distributa , ut minimi arteriarum fines omnem pressio-

nem

(*i*) Exp. 198. 200. 219. 220. 221. 222. 225. 228. 230. 251. 253. 255. 266. 272. 275. 276. 280. 287.

(*k*) Exp. 198. 200. 220. 221. 222. 225. 228. 230. 251. 253. 254. 255. 273. 275. 276. 280. 287.

(*l*) Exp. 219. 223. 226. (de vena).

(*m*) Exp. 219. 234. 251. 281.

(*n*) Exp. 198. 219. 226. 221. 222. 225. 228. 229.

(*o*) P. 210. 211.

(*p*) L. 41. v. 72.

nem majorum vasorum, sua reactione æquilibrent, neque finant eam truncorum contractionem ulluni conspicuum effectum edere, quod quidem cum anatomie apprime consentit. Tunc vero utique in effectum eadem pressio erumpit, quando aliqua a parte arteriæ æqua parietum repressio ablata est. Ita putaverim phænomenon exponi posse, quod absque interpretatione (*q*) in priori commentario narravi, ne hypothesin rebus gestis miscerem. Nunc in pleno opere existimavi, non fore indecorum, si aliquanto propius ad veri speciem accederem.

Inde vero fit, ut non vulnere quidem inficto, sed debilitata aliquarum arteriarum resistentia, eo sanguis congeratur. Inde a pediluvio nientes (*r*): iride capitis ab eadem causa levamen, subtracto quo onerabatur sanguine (*s*).

§. XLI. *Motus musculturum.*

Sequitur earum causarum, quæ præter cor sanguinem movent, utique potentissima, musculturum motus, quo omnino statio, ejusque mutatio, gressus, saltus, pronunciatio, respiratio citatior, deglutitio, denique severior animi ad difficile opus intentio pertinet. Et in universum, quicunque musculi celerius, & constantius ab animæ volentis imperio in motum furent excitati, nova inde semper, eaque maxima, in sanguine velocitas excitatatur. Sed etiam in homine, aut animale, quod exanime languore videatur, integrum ceterum, & expers putredinis, aut coaguli, motus intestinorum, vomitus, sternutatio (*t*), aut quicunque vehementior musculturum motus latentem vitam explicat, & sanguinem a quiete ad circuitum efficaciter revocat. Inde a cursu summus rubor, calor, sudor, urina flamma, putredo humorum (*u*), debilitas, omnia demum eadem, quæ sunt iu acutissima febre (*x*), & demum febris ipsa, intra paucas horas functa sequitur (*y*). Inflammationem universi corporis, quæ fit a solo nimis incitato cursu,

leporum

(*q*) *Second Memoir.* p. 338.

(*r*) *KLOEKERS morbi animi.* p. 109, &c.

(*s*) *STORCH von den Krankh. der Schwangeren* p. 210. &c.

(*t*) L. IV. p. 496. L. VIII. Sect. IV.

(*u*) *LISTER de humor.* p. 54.

(*x*) *BOERHAAVE praedid. ad Instit. T. III.* p. 300, 501,

(*y*) L. V. p. 84. &c.

leporum exemplo solebat **PRECTOR** (z) confirmare , aque tetano corpus omne nigrescere , & Ill. medici observarunt , & vulgo quidem notum est.

Perinde vero , ut a contrariis etiam argumenta nostra petamus , certum est , motu musculari neglecto , sanguinem ubique , sed in abdomen maxime , retardari , calorem corporis universi minui , perspirationis copiam decrescere , urinam augeri , adipem in cellulas subcutaneas , in omentum , in hepar congeri , reducem a pedibus vaporem stagnare , colligi , in conspicuam aquam converti , uno verbo eadem symptomata nasci , quæ a diminuta cordis potestate exspectari possunt (a).

Qua ratione corporis exercitatio & muscularum motus sanguini novam velocitatem addant , alibi utique fuisus dicemus : breviter hic tamen enarrari visum est , cum incerta vitæ superstitionis spes , & forte prius dudum communis naturæ legi mihi parendum sit , quam quidem id volumen absolvi potest . Ergo Clari quidem viri docuerunt , musculum , dum contrahitur , expallescere (b) , nempe sanguinem suum expellere , ut adeo vis musculi secundi cordis vice fungatur , & sanguinem per sua vasa cogat fugere .

Verum innumerabilia certe experimenta me convincunt , nihil quidquam agentis musculi rubori decidere (c) , & in vivo animale , vitro convexo ad arteriam adhibito , quæ per musculi superficiem decurrit , omnino sanguinos globulos , eorumque continuatum motum percipi , quando quam maxime caro in contractione versatur , pauloque post velocissimum actionis musculos tempusculum , ea vasa utique sanguine perinde plena esse , ut quidem ante eam contractionem plena fuerunt .

Alio ergo modo oportet , a carnium actione sanguinem promoveri . Nempe inter majores musculos ubique trunci arteriosi , venosique ambulant , & venosi potissimum . Verum musculi , dum agunt , tument , quod notissimum phænomenon interim recipimus . Quoties ergo vasorum fasciculus medios inter musculos incedit , toties utique per totam eorum vasorum longitudinem compressio undique applicatur , quæ parietes ad axin urget , & ejusdem est effectus , ac si ipsis vasorum parietibus nova vis contractilis quasi infunderetur .

In

(z) I. c. p. 501.

(a) Fuisus de his omnibus dixi in *Comment. ad Praelect. Boerb.* T. III. n. 425. & dicam Libro VIII. & XI. XIII.

(b) *Boerhaave Inst. rei Med.* n. 406. & *praelect. acad.* T. VII.

(c) *Premier Mémoir sur le mouvement du sang.* p. 142. *Second Mémoir. sur les parties sensibles & trivit.* *St. IX. Exp.* 226. 234. 238. 240. 241. 242.

In arteriarum sanguinem minus potest muscularum pressio: nam minores arteriae durioribus membranis continentur, & sepe omnino extra muscularum potestatem profundiori loco secundum ossa meant: neque perinde utiliter utique premerentur, quæ valvularum praefidio destitutæ sint, ut omnino non magis ab ea communi carnium pressione sanguinis arteriosi motus adjuvetur, quam quidem, represso ad cor fluento, ab eadem causa retardaretur. Si usquam, iis locis aliquis muscularum in arterias admitti posset, quoties os inter & potentem musculum arteria ponitur, ut tota ejus carnis vis comprimens ab arteria excipiatur, quæ cedere nequit. Potest etiam musculosum cingulum aliquam in corpore animato caveam ambire & arctare, quale in abdomen exemplum est, cuius quidem cinguli, & conjunctæ diaphragmatis efficacit, vis in bile, & venæ portarum sanguine promovendo alias ostendetur: sed vena ad portas, si ad valvulas respexeris, arteria est. In ejus certe vena ramis stagnatio oculis manifestissima se offert, quam primum incisoris manus musculos abdominis destruit (d).

Sed etiam in arteriis celeritatem sanguinis a motu muscularum aucto incitari interim recipimus, & alibi ostendemus. Cordis nempe ab ea causa vires sollicitantur & increscunt, & sanguis in arterias velocius exit.

§. XLII. *Phænomena motus progressivi turbati & languentis.*

Superest ut turbati & languentis, & denique subpressi motus progressivi phænomena exponam, meis fere experimentis usus, quæ ex frigidorum equidem animalium contemplatione sumta, de calidis tamen perinde vera esse videntur, cum & paria in calidis bestiis phænomena observemus, & causam non reperiamus, cur his in phænomenis a frigidis dissident. Oportet autem diligenter, & non absque aliqua patientia in animale vivo phænomena speculari, quæ vividam inter vitæ vim, plenamque mortem intercedunt, & quibus, tamquam gradibus, à legitimo sanguinis motu in plenam quietem transitur.*

Animali vivo primum in motu sanguinis vitium est, lentius moveri (e), eademque debilitatis & mensura est, & effectus. Nam & cordis pulsationes rariores fiunt, & sanguinis per arteriam motus lentescit.

Inde

(d) *Second. Mémoir. sur le mouv. du sang Exp. 103. 45.*

(e) *Ibid. Exp. 65. 66. 68. 72. 81. 82. 85. 91. 188. 189.*

Inde turbatio fere sequitur. Aequabilis in fano animale impetus est; quo sanguis per arterias fluit, veloci, sed una tranquillo rivo similis, in quo neque celerius unquam unda fugit, neque vicissim suspenditur. Contra in animale languente, in aquale fluentum est, & modo tardum serpit, modo nova velocitate restituta ruit (*f*). Cordis nempe vis est, quæ subinde novo conatu sanguinem, quem a venis accipit, in arterias inpellit, ut velocior unda resistem illam priorem acceleret.

Aliud & nuperius aliquando vitium solet esse, ut sanguis, qui lentius per arterias advenit, nunc omnino contra cor retrocedat (*g*). Ita fieri in vivis animalibus experimento constat, ita in hominibus se habere jam ostensum est (*h*). Causa hujus vitiæ fere in derivatione est, ut sanguis arteriosus ad sedem vulneris retrorsum ruat, aut in coagulo sanguinis, aut, & plerumque proculdubio, in minori cordis robore, quod resistentiam vasorum minimorum nequit superare. Morienti pullo sanguis ex umbilicali membrana in fetum reddit (*i*).

Retrocessionem sanguinis, nisi mors excipit, sequitur oscillatio (*k*), frequentissimum in vivis animalibus phænomenon. Qui nempe sanguis ad cor redibat refluxus, eum vis cordis superstes incitata in nativum ordinem restituit, cogitque porro ad extremos ramulos ferri. Sed causa, quæ motum sanguinis invertit, eadem porro se cordi obponit: ergo paulo post sanguis ex ramis in truncum regreditur, novoque a cordis impulsu in legitimum ordinem reducitur, donec vel plena cordis victoria sit, vel, quod nunc ponimus, motus sanguinis omnino subprimatur. Nulla autem linea est, secundum quam sanguis non eat redeatque, non ex ramis in truncum proprium unice, sed ex ramo per canalem medium in aliud truncum, aut per ipsum divisionis punctum angulique verticem. ex ramo in alterum ejus trunci ramum, aut mille demum aliis modis. Diu oscilla-

E e 2

tio-

(*f*) Exp. 67. 69. 71. 73. 81. 82. 84. 85. 91. 175. 182. A. v. LEEUWENHOECK exper. &c contempl. p. 159. 165. 179. ADAMS p. 45. de HAYDK exp. 9. Phil. Transl. II. 460.

(*g*) Exp. 61. 65. 66. 67. 68. 69. 72. 82. 87. 93. 95.

(*b*) L. IV. p. 103.

(*i*) BEAUELIN Hamburg. Magaz. T. XIX. p. 145.

(*k*) Exp. 61. 65. 66. 67. 68. 69. 71. 73. 81. 87. 93. 95. LEEUWENHOECK l. c. p. 164. 165. 186. 188. T. III. p. 211. 212. BOERHAAVE de nju rat. mechan. p. 34. HORCH miscell. Berol. T. VI. p. 115. MELLES Phil. Transl. II. 450. p. 728. FRAMKESCH AMMERK T. I. p. 20. MALPIGHI. Ep. II. de pulm. p. 142.

tio superest, multis saepe horis (*l*), maxime in ramo, qui duos truncos unit. Oscillatio sanguinis motum saepe restituit (*m*).

In deteriori animalis statu, quem ponimus, post oscillationem succedit quies (*n*). Ea a partibus extremis plerumque incipit, ut a corde quidem ad aortæ brevem particulam sanguis (*o*) expellatur; ad reliquam arteriæ longitudinem & ramos, in exemplo, mesenterii, nihil de eo motu veniat quidquam, sed immotus sanguis in iis ramis stet (*p*), aut sensim potius, quod continuo dicetur, de ea tota corporis parte fugiat. Ea vero quies in aliis rami sanguinis prævalet, dum in aliis sanguis moveri pergit, sensim vero major pars arteriarum immota redditur. Ita in homine saepe, diu etiam ante mortem, uno alteroque die, pulsum & pene calorem a manu abfuisse vidi, cum interim caput vigeret, mentisque imperia lingua libere exprimeret. Neque quies in ramis arteriosis absque spe, neque rarum est, a novo cordis vigore sanguinem, qui motum amiserat, iter suum iterasse (*q*): estque incisa arteriæ, venæve hic pene certus effectus (*r*).

Inanitio arteriarum plerumque cum languore incipit (*s*), & in quiete perficitur. Decrescit sensim ordinum numerus, quos globuli in eodem trunco effecerant, ut pauciores (*t*) sensim fiant, & denique tota arteria inanis est: sive nunc occulta illa, jam a nobis excitata lentaque arteriarum contractio in causa fuerit, sive cordis debilis impetus remotiores globulos sensim a se, suoque principio eas in sedes removeat, ad quas nulla porro a corde efficacia pervenire possit. Altero die (*u*) in animalibus frigidi sanguinis plerumque arteriæ inanes reperiuntur. In GUILIELMO III. nullus a morte præter pulmonem sanguis fuit (*x*). Arteria in crure, quod amputabatur, inanis, sanguinem nullum dedit (*x**).

Si

(*l*) Exp. 69. 73. 225(*m*) L c. p. 62. Exp. 66. 93. 95. LEEUWENHOEK T. II. p. 164. 165 T. III. p. 212.(*n*) Exp. 60. 61. 65. 93. 73. 82. 163. 191. 193. 212. 226.(*o*) Exp. 65. 85.(*p*) Ibid. Nonnunquam tamen in truncis stagnat, dum in ramis potro movetur Exp. 62. 68.(*q*) Exp. 65. 185 & alias. LEEUWENHOEK L. C.(*r*) Exp. 154. 163. 164. 166. 178. 179. 180. 181. 185. 187. 189. 191. 193. 216. 229. 233. Non separavi arteriotomen.(*s*) Exp. 71. 73. 92. 172. 182. 184. 187. 191. 195. 217. 218. 224. 216. 233.(*t*) Exp. 73. 154. 183. 185. 186. 189. 200. 215. 228. 231. Non separavi ratus in quibus sanguis inciso vase effluxerat.(*u*) Exp. 73. &c.(*x*) Biblio. Anat. T. III. p. 594.(*x**) Tschirr de amput. non curat.

Si post quietem motus sanguini redierit, etiam frigoris reddit, inenficique porro tubulos frequentat, aucto sensim filo, ut in plenum flumen perficiatur (*y*).

S. XLIII. Causæ motus a morte superstitis.

Supereft, ut dicamus, quis ab ipsa morte in sanguine motus superesse possit; mortem vero hic obiter vocamus, cordis constantem quietem, cum plena sensus, & voluntarii motus suppressione conjunctam. Eo in statu nondum omnis a sanguine motus abeat (*z*), cuius causas paucis exponemus, ut motus progressivi historiam finiamus. Primum, etiam absque corde, aut interrupto certa sanguinis in arterias commeatu, derivationis efficacia aliquamdiu supereft: incisa. nempo aut arteria (*a*), aut vena (*b*), sanguis ad eam sedem rapide concurrit, in qua vulnus est. Vidi ad vingt septem, triginta, a corde avulso minuta prima sanguinem perinde ad vulnus concurrere, ut perfectiori vita solebat. Vidi etiam in minimis vasis unius globuli sanguinem decem a resecta aorta minutis motum suum continuasse (*c*).

Supereft etiam a morte vis ponderis (*d*), eaque, quando aliae causæ cessant, sola humores regit. In canibus, vario in situ dispositis, reperit Vir Cl. Andreas PASTA (*e*), ad eam semper corporis partem sanguinem se recipere, quæ ima fuerit, & quam ex vi gravitatis occupat. Similia in cadaveribus humanis promptum est videre, quorum fere dorsum sanguis replet, vasaque minora distendit, totique cuti intensum ruborem conciliat. Sed etiam reliquæ corporis animalis partes pondere suo in vasa nituntur, & sanguinem ad maiores truncos compellunt.

Paria fere frigus efficit, quod extrellum corporis animalis ambitum constringit, ut cutis artuum nasique tota exalbefcat, & sanguis ad interiora, quæ vim gelu minus percipiunt, undique confugiat (*f*). Stringit

E e 3 enim

(*y*) Exp. 88, 91, 92, 182, 183, 184, 185, 189, 191, 219, 233.

(*z*) Exp. 194, 195, 196, 204, 217, 211, 212, 214, 225, 226, 227, 229, 233, 234, 235.

(*a*) Exp. 198, 212, 220, 221, 222, 225, 228.

(*b*) Exp. 204, 205, 206, 208, 210, 216, 218, 223, 225, 226, 229, 230, 231, 232, 234.

(*c*) Exp. 233.

(*d*) Exp. 206, 216, 218, 222, 224.

(*e*) I. c.

(*f*) Vasa sanguinea cerebri cruento plenissima in homine frigore enecto ROSEN anat. p. 142. QUESMAYZ de frigor. effic.

frigus animalem fibram (*g*), atque breviorem reddit, ut ipsam cutem, non alium stimulum sensuram, ipsamque cellulosa telam scroti in motum cieat, musculosi motus non penitus dissimilem. A frigore fit, ut sanguis in strangulatis hominibus congestus, a morte sponte evanescat (*h*), & vena in ligato brachio turgentes sponte laxentur, si in gelidam merseris (*i*).

Hanc principem causam esse crediderim, quæ facit, ut sanguis etiam post mortem ad majora vasa confluat, & in rubro systemate (*k*) & in lymphatico (*l*).

Vis adtractionis, quæ sanguinem ad parietes membranosos (*n*), adque alios jam natos (*o*) sanguinis acervos adlicit, perinde, dum fluit vitalis liquor, eum pergit regere. Eam enim vim recepi, quod motum aliquem abesse corde superesse viderem, qui neque a pondere esset, neque a derivatione (*p*), neque in vasis unice sed etiam extra vasal consiperetur (*q*). Debilis cæterum est parumque velox: duratione fere motum a derivatione natum aquat (*r*).

Maxima tamen a morte potestas est evoluti aeris (*s*). Eum putrefacti humores animales undique generant, aut ex fixo statu, in elasticam vim & conspicuam bullarum speciem restituunt (*t*), id enim generare vocamus. Eum aerem in vasis (*u*) maximis cerebri frequentissime, in corde ipso, intritum cum sanguine spumosumque sepe vidi. Idem a calore adjutus & expansus vasa dilatatur, quibus continuatur, neque infreenter tumultus, ut, qua via patet, per pulmones in asperam arteriam agatur, atque per os ipsum cadaveris exundat. Ita in puerperis vidi, & apoplectis, & miliari morbo defunctis corporibus, neque raro spectaculum est. Ex cadaveris epidemica febre enecti ore naribusque plurimum sanguinem prodiisse.

Clar..

(*g*) *BIRCH* *bifl. of the Roy. Soc.* T. IV. p. 254.

(*h*) *HARVEI* *exer.* III. p. 252.

(*i*) *IDEM* p. 275.

(*k*) *PECHLIN de purgant.* p. 484.

(*l*) *VERHEYEN* L II p. 101.

(*m*) *Exp.* 197 199. 210. 211. 213. 215. 216. 218. 224. 225.

(*o*) *Exp.* 228. 234.

(*p*) *p.* 339. *ibid.*

(*q*) *Exp.* 208. 214. 215. 216. 218. 222. 224. 225. 233. 234.

(*r*) *L.* IV. p. 433. 439.

(*s*) *LANGIS* l. c. Fermentationem cum vasorum collapsu conjungit.

(*t*) *L.* VIII. Sect. 3. c.

(*u*) *LITTRÉ Mem. de l'Acad. des Scien.* 1714. p. 428. *bifl. de l'Acad.* 1704. obf. 17.

Clar. J. ANTONIUS PUJATI (*x*) auctor est. Sanguis ex apoplectici cadavere cum spuma & sonitu erupit (*y*). In suffocato homine, decima sexta a morte hora sanguis per os exiit (*z*). Midus a morte cruentus (*a*). Per uterum a morte cruo meastruus manavit (*b*), & tertio de naribus die (*c*). Sanguis ex pulmone post mortem per os regurgitavit, in ichorem dissolutus (*d*). Alias historias, minime infrequentes, lubens prætereo.

Neque alia natura est vampyrorum, cadaverum nempe, quibus in Græcia (*e*), Hungaria (*f*), Illyrico (*g*), os fluido sanguine plenum reperitur, postquam epidemicō fere morbo extincta fuerunt. Simplex phænomenon, neque alienum a nostris observationibus, olimque ab Antonio GALATEO descriptum, immensum deformavit supersticio, & partim aliena a vero ornamenta historiæ addidit, partim dæmonum machinas inmisericit. Id facile dederim, alios morbos aliis potentius sanguinem resolvere, aerisque exsolutioni favere.

De vita minima, sive motu sanguinis tardissimo & dubio, quem homines aquis suffocati (*g**) mediis in undis hirundines (*h*), in alpinis antris mures montani (*i*), suis in stagnorum recessibus ranae, & in universum hibernibus mensibus insecta conservant, alio loco opportunius dicemus. Pulsum videtur minimus (*k*) & sanguis motus adeo latus esse, ut calorem non generet (*l*).

S E C.

(*x*) *De morbo naroviensi* p. 149.

(*y*) SCHURIG *Pathograph.* p. 405.

(*z*) HEDDAN centur. III. obs. 12. In historia *Indiae* exemplum habet de hernioſo. (*a*) Bresl. *Sammlung*. 1724. M. Jan. p. 112.

(*b*) BAUER *de nervis* p. 26. SCHURIG *patholog.* p. 110. *Eph. Nat. Cur. Dec.* III. ann. IV. obs. 42. die omnino a morte quarto.

(*e*) MORTON *natural hist. of Northampton Shire* p. 414.

(*d*) *Journ. de Med.* Jul. 1757.

(*e*) THEVENOT *voy. au Levant* T. I. P. I. c. 63. TOURNIFORT *voy. au Levant* T. I. L. 3. p. 159. Vocat Zorcolacis.

(*f*) Celebris circa annum 1730 historia, aut fabula, multis libellis concelebrata fuit.

(*g*) ANTON. GALATEUS *de sua Jagygia conf. RASCZYNSKI flor. natur. Polon.* T. I. p. 357. Vocat Upjevos.

(*g**) *Journ. de Med.* 1758. M. Nov. FOTHERGIEL *philos. trans.* II. 475. art. XI. &c.

(*b*) NEHRING *in palingenes.* p. 71. BOYLE *on frost* p. 132. BLANGAARD *obit.* p. 416. BIRCH *I. C.* p. 137. LINNAEUS *econom. nat.* p. 19.

(*i*) CITTESIUS *abstin. consolent.* *Journ. Oecon.* 1758. M. Mart.

(*k*) *Esse aliquem Hist. des anim.* T. III. p. 313.

(*l*) Neque calorem, neque motum reperit HARVEY ap. BIRCH T. IV. p. 537.

SECTIO II.

PRESSIO LATERALIS.

P U L S U S.

§. I. Unde ea pressio sit.

SI in arterias inanes sanguis de corde se diffunderet, neque celterius per anteriorem finem sanguis affergeret, quam quidem per finem cordi propiorem subit, tunc quidem arteriae a sanguine non dilatarentur: neque alia pressio lateralis locum haberet, quam communis illa, omnibusque propria liquoribus, in quemcunque canalem effusis, quibus peculiare, aque solidorum corporum natura diversum est pressionis genus (*m*), quo undique in omnem ambitum sui vasis nituntur, neque toto pondere in partem infimam gravitant, ut quidem solida corpora solent.

§. II. Arterie semper plenæ.

Sed alia in arteriis corporis animalis pressio reperitur, quæ multis modis ab illa communi pressione distat. Et primo quidem arteriae animalis vivi suo vitali humore perpetuo plenæ sunt. Non repeto, quæ alias protuli, ut ostenderem, multum in vivi animalis arteriis sanguinem esse (*n*), multum etiam in ipsis cadaveris (*o*) arteriis reperiiri; supereft nunc ut ostendam, neque vacuum spatium in arteriis relinqui, quod a sanguine non repleatur, neque quidquam in arteria inane relinqui, sive ea in systole sua arctetur, sive vivissim a nova unda expandatur (*p*).

Occurrit continuo facile experimentum. Si enim arteriam percussis, sive eam in systole minimave diametro, etiam minimo, neque ultra parietes penetrante, vulnere læseris, sive in maxima, perinde sanguinem effundet: argumento, etiam in contracta arteria sanguinem præsto fuisse, qui per ri-

mam:

(*m*) MUSCHENBROCK *inflatus*. n. 784. &c.

(*n*) L. III. S. I. n. 1.

(*o*) n. z.

(*p*) Monuit jam CHARLETON *three lectures* p. 25.

mam exsiliaret. Porro , quoties sanguis de arteria vulnere paulo diutius effluit , toties utique continuo (*q*) fatus prorumpit , etiam in arteria statu minimo , sive in systole , quæ sit ante novæ undæ in arteriam receptionem : et si enim in arteria systole humilior fatus est (*r*) , est tamen perpetuus , neque desinit fluere , quando cor vicissim sua in diastro quiescit . Experimentum in arteriis coronariis , intercostalibus , cruralibus , carotidibus , & ipsa denique aorta feci , neque quemquam dari crediderim , qui facilissimo periculo refragetur .

Verum in animalibus frigidi sanguinis proprius utique ad naturam contemplandam progressus sum , cum per membranas pellucidentem vitalis humoris sanguinis motum contemplarer : sapissime enim vidi , arterias animalis vegeti sanguine , dum is quidem movebatur , perpetim plenas esse , tum quando sanguis a cordis contractione novo impetu projectus primam undam accelerabat , tum paulo post , quando vicissim ea acceleratio evanuit , & cor laxatum quiescit . Id autem potissimum oportebat ostendisse , prius arteriam sanguine plenam esse , quam novam undam a corde impulsam accipit . Auctorum , cum facile possem , consensum non repeto .

Video contra hoc experimentum nonnulla , neque absque veri specie posse objici : & in meis ipsis incisorum animalium historiis minime rarum esse , in ranis aliquot diebus malignius pastis (*t*) , arterias aut omnino inanes reperiri (*u*) , aut certe paucas intus globulorum lineas (*x*) superesse , dum interim reliqua cavea inanis videtur , & omni liquore vacua est , quem oculi detegere possint . Idem phænomenon frequens est , quando per repetitas venarum incisiones (*y*) sanguinem exhaustimus , aut sponte etiam cruenti globuli de arteria sertim se subduxerunt (*z*) .

Neque tamen vellem quemquam his meis abuti experimentis . Potest in arteria semiplena inane spatiū poni , ita adversarii : potest acer inesse ; potest

(*q*) HARRVZ proams ad Exercit. de sanguinis circulatione p. 4. Exerc. I. p. 53. Exerc. III. p. 216. 270. HALAS hamajazik p. 41. 11. 16. &c. TRALLEZ conjurer. tit. p. 18.

(*r*) p. 213.

(*t*) Second Mem. sur le mouv. du sang Exp. 74. 84. 218. 233.

(*u*) Exp. 73. 75. 84. 85. 102. 218. 225. 226. 233.

(*x*) Exp. 73. 75. 81. 85.

(*y*) Exp. 75. 172. 225. 226.

(*z*) Exp. 71. 73.

potest denique, quæcunque in arteria pars a sanguine non occupatur, ea pel-lucente repleri liquore. Inane spatum nemo admiserit, qui meminerit, in idipsum spatum continuo sanguinem omnem se diffusurum, ut in eam sedem veniat, a qua omnis abest resistentia. Aerem inesse nemo dixerit, qui nobiscum viderit, quam diversa facie (*a*) aer, in maximas bullas unitus, in arteriis visui se offerat. Superest ut id omne, quod in arteriis inane videbatur, pellucido, & inconspicuo liquore plenum sit. Eum humorem multa præterea confirmant: sanguinis per id, quod in arteria inane videbatur, aut adstrictæ, aut partitæ viæ (*b*), quæ non possent arclari aut dividi, si nihil in arteriis esset, quod constringeret, aut divideret: motus, quem globuli rubri unice a corde habent, & qui utique in eo semi inani statu arteriarum, inque interrupta globulorum serie supereft, neque a primo globulo, cordique proximo, ad ultimum continuari posset, nisi aliquis medius interestet huius, qui a primo globulo (*c*), ad longe remotum alterum, motum a corde impressum transferret. Quare eas voces, quibus inanes, aut certe semivacuas arterias passim insignivi, ita omnino intelligi velim, ut oculorum exprimant testimonium, neque ideo resistantis, quæ ex rationis usu, atque argumentis aliunde repetitis flunt.

Subtilius argumentum est, quod sere ex theoria olim summis III. PRÆCEPTOR, mea vero experimenta confirmant. Nempe arteria, secundum BOERHAAVIUM (*d*), uti sanguinis facit jactoram, ita perinde lumine minuitur, ut in minima diametro omnino perinde plena sit, ac quidem est in maxima. Solebat autem hominum cadaveribus se tueri, qui ex phthisi interiissent (*e*), quorum utique in vasis & vivis & mortuis paucissima sanguinis copia supereft. Eam rem ego quidem in vivis animalibus de frigida classe, vidi manifestius. Sæpe nempe in ranis, sub principium experimenti, arteriarum pene nullum est lumen, ut crassissimas inter membranas exiguum canalis decurrat, cuius diametrum paucissimi unici ordinis globuli metiantur (*f*). Eisdem inde arterias redeuns cordis vigor, maxime si venam incideris, ita sanguine replet, ut lumen duplo & triplo latius

nunc

(*a*) p. 128. n. 8.(*b*) Exp. 88. & 180. etiæ hic albus liquor magis conspicuus fuit.(*c*) *Phil. Transf.* n. 460. & in *Second Mémoire* p. 188. 189. ubi vid: excitati loca accett.(*d*) *Præd. ut præpr. influtat.* T. II. p. 247.(*e*) Dissecui hominem, cui sanguinis supra duas uncias non supereft J. de GORETTER de *profir. infensib.* p. 185. Conf. *Scavasse Bannarol.* p. 123. SCHULTEA MISTER de *pusu* p. 67. RONJEAUT testimoniū de Guillemo III. & supra p. 210.(*f*) Exp. 70. 77. 91. 92. 183.

nunc fiat, membranarum vero crassitiae pro eadem portione minuatur (*g*). Hoc experimentum meditatus reperiet utique, arterias, & cum magno lumine plena esse, & cum parvo, atque adeo pro ea portione sanguinis, quam amittunt, laxatis parietibus angustiores reddi, lumenque ita decrecere, ne quidquam inane in earum tubis sit. Si in hominum cadaveribus post iteratas venarum incisiones, & arterias & venas vacuas repererunt, ut modicum crassi sanguinis in dextra aure superesset (*h*): si paucum inanum arteriarum recurrat memoria (*i*), potuit utique in cadavere laxata arteriarum natura speciem inanitatis referre, quæ in vivo homine, dum fierior se arteria sustinuit, nulla fuit.

§. III. *Sanguis impulsio ab unda insequente.*

Si arteria aorta plena est, novusque sanguis in plenam arteriam projicitur, superest ut is sanguis, qui nunc in arteria est, cedat priori, atque ab eo impellatur. Non oportet dissimilasse eum quidem, qui nunc aortam replet, sanguinem non quietum esse, sed motu in prioribus pulsibus a corde accepto incitatum fugere. Si velocius fugeret, quam nova a corde unda insequitur, utique non percelleretur ab ea nova unda, & superesset eam inter prioremque sanguinis columnam inang spatiū, in quod nova ea unda absque obstaculo se diffunderet. Verum ostendimus (*k*), velocius priorem undam non fugere, cum ea, quæ nova sequitur, totam eam velocitatem conservet, quæ in sanguine cogitai potest, aliqua vero portione ea velocitas eo magis minuatur, quo magis a corde receditur. Sed neque eadem velocitas est prioris undæ, quæ novæ: quod si æque velociter fugeret prior, ac quidem altera sequitur, neque illa impulsu pateretur, neque ista obstaculum experiretur ullum. Minus autem velociter cum prior unda fugiat, quam nova insequitur, necesse est superveniti a novissima unda antecedentem, atque adeo hanc ab illa percuti (*l*). Quo major erit velocita-

F f 2

tis

(*g*) Exp. 91. 92. 94. 183.

(*h*) SEVAC. I. c. T. II. p. 151. Simile exemplum cordis ventriculorum & aurium inanium, post magnas sanguinis jacturas habent FRANK AMMERK T. III. p. 417.

(*i*) Parum sanguinis, aut nihil quidquam in arteriis a morte reperiebat HARVEIUS apud BIRCH *History of the Royal Society* T. IV. p. 535.

(*k*) Sect. I. n. 9 seqq.

(*l*) Franciscus BOISSIER de SAUVAGES in HALUSII *bemalat.* p. 246. 247. 248. *theoria pulsus* p. 19.

tis in utraque differentia, eo magis evidens erit prioris undæ impulsio, & manifestiori ista a nova unda vetustior illa percutietur. Ita in animalibus vivis (*m*) impulsio, quam prior unda patitur, tunc denum ab oculo disflingitur, quando cordis vis elanguit, atque adeo sanguinis velocitas insigriter decrevit. Oculis enim rationem celeritatum facile distinguit, quæ sunt uti 3 ad 2., difficulter alteram, quæ sunt uti 19 ad 20. Quando id discrimen, de quo dicimus, exiguum est, tunc quidem percussio undæ posterioris in priorem nulla videtur (*n*), et si certo est aliqua, cum certo priores undæ posterioribus lentius progrediantur (*o*). Hec est impulsio, qua unda, ventriculi sinistri areæ aqualis, & paucos utique pollices longa, quæ nuper in novissimo pulsu de corde exit, sanguinem ultra eos pollices possum accelerat, vimque novam sanguinis ad extremos ulque artus impertit.

Qui eam impulsionem negaverit, nullam rationem dare poterit, qua sanguis in circulum progrediatur. Corde evulso, ut notissimum est, sanguis continuo quietescit, & pulsus cessat (*p*), nempe sanguis a prioribus cordis contractionibus propulsus motum suum continuo amittit. Si amisit, neque a nova unda insequente cordis novam accipit, superest, ut etiam in vivo animale sanguis continuo stagnet (*q*). Idem est, sive cor destruxeris, sive negaveris, novam cordis vim ad priorem undam pervenire. Si omnino sanguis quietescit in aqua mersis & suffocatis fit, totus omnium arteriarum sanguis ab hac una unda primum emovetur, adque motum revocatur.

Rationes itas celeritatis, qua sanguis ex corde nuper excuns incitatus, & qua fugit anterior, definire suscepit Cel. Vir. *Franciscus Boissier*. Omnia optimum effectum sequi, sive antecedentem undam plurimum a numero & novissima promoveri, ex hydraulicis recipit, quando velocitas motoris, quod cor est, ad velocitatem fluidi movendi, sive undæ prioris, est uti

(*m*) *Second Mem. sur le mouv. du sang* Expt. 67. 81. 84. 85. 91. 125. 163. 173. 189.

(*n*) Hinc in numeris non observata *Antonius van Leeuwenhoek Expt. & contempla* T. II. p. 157. exque theoria *Bryant Robinson Evid. on acou. anim.* Prog. XL. conf. L. IV. p. 439.

(*o*) In aliis observationalibus ipse eam in minimis vasculis vidit *Antonius v. Leeuwenhoek* l. c. T. II. p. 155. T. III. p. 114. deinde *Antonius de Heyde de Venegedi* p. 6. *Henricus Baxxer microsc. made & sy* p. 135. *Georg. Adamus microsc.* p. 45. *Sieboldus Hales* *translat.* p. 33. Conf. L. IV. p. 439.

(*p*) L. IV. p. 429.

(*q*) *J. Fauston* *anatom.* p. 309.

uti 4 ad 3 (r). Verum ex corde sanguinem tanta velocitate prodire, ut ex ipso thalamo cum celeritate profiliat, quæ sit ad velocitatem ultra valvulas superfitem, uti 3 ad 1 (s). Deinde in arteriis universum sanguinem nuper a cordis systole expulsum celeritate ferri, quæ sit ad sanguinis in fine systoles arteriarum motu celeritatem, uti 3 ad 2 (t). Ita ex theoria vir Clar. sed etiam olim Jacobus KELI sanguinis in unda priori celeritatem æstimavit ut 15. Sanguinis vero per venas redeuntis celeritatem, quam habuit pro velocitate undæ nuperæ ab unda priori retardata, fecit ut 6 (u), quæ cum prioribus utcunque consentiunt. Nobis enim & fatus sanguinis vivorum animalium, & motus per arterias mesentericas, paucum alia dederunt corollaria, & in ipsis quidem arteriis, cum impulsionem oculus non distinguat, non videtur ea ratione undæ nuperæ celeritatis anterioris velocitatem superare, quæ sit uti 3 ad 2. tantam enim diversitatem non videtur oculi accurati sensum effugere posse. Neque tamen prætermitto, ab arteriis, quas solas oculo armato contemplatus sum, systole & diastolen abesse.

§. IV. *Pressio in latera.*

Arteria in longitudinem exporrigitur.

Hanc nunc impulsionem dimittimus, quæ ad motum progressivum pertinet. Sed alii sunt effectus sanguinis ex corde in arterias injecti, eorumque simplicissimus est, arteriæ productio in majorem longitudinem. Eam in omni pulsu, sive ligata fuerit arteria (x), sive resecta (y), sive flexa (z), oculus in vivis animalibus & hominibus confirmat. In singula nempe cordis contractione arteria longior fit, atque, si flexa fuerit, pars

F f 3

prima

(r) *Mem. de l' Acad. de Berlin* 1751. p. 39. Typographi errorem esse crediderim, quando numeri illi ponuntur 2 ad 4. Nunquam enim vis nova, cuius celeritas esset ut 3 adtingat celeritatem priorem, quæ esset ut 4.

(s) p. 39. ob aortæ latescens lumen.

(t) p. 40.

(u) *De vi cordis* p. 54.

(x) *Second Mem. sur le mouv. du sang.* Exp. 47. 48. 57.

(y) In singulo pulsu arteriam resecam de vulnere emiure vidit *Gerardus v. Swieten* *Comment. in Boern.* T. II. p. 75.

(z) *Second Mem. Exp. 46. 55. Josias WEITBRECHT Comm. Petrop.* T. VII. p. 117.

prima ultra secundam producitur : si resecta ligatave , certe in longitudinem effertur. Eadem omnino fuent, quando in arteriam cadaveris liquor aliquis impellitur.

Quare arteria a sanguine de corde impulsu longior fit, non est obscurum intellectu. A decrescentibus quidem diametris arteriae, quam pro unica habes, facile intelligitur sequi, ut columnarum sanguinearum per arteriam fluentium tanta portio in parietes arteriae inpingat, quanta continetur in anulo imaginario, qui aequalis est differentiae luminis majoris minorisque. Sed ex columnae utique arteriae parietes secundum suam directionem impellunt, nempe a corde removent, quod vocant extendere. Sic etiam in flexa arteria columnae sanguinis, quae sunt in superiori parte canalis, totum effectum suum in ipsum parietem secundae partis arteriae confidunt, eumque a corde removent.

Verum etiam cylindrica arteria longior fit, & recta : nam arterias cylindrorum seriei similes esse, post Cl. virum, nostrumque singularem amicum J. Fridericum SCHREIBER (*a*) alias ostendi. Subtilior aliquanto hujus extensionis ratio est, & a celeritate diminuta sanguinis pendet. Continuo oportebit altius (*b*) repeti, si arteriosum canalem habueris pro uno tubo, atque in eo tubo celeritatem posueris majorem in principio, inque fine minorem, tunc eum finem haberi posse pro angustiori parte (*c*) canalis, sive pro canali, cuius pars clausa sit. Eodem enim tempore & in hac hypothesi, & in priori, minor sanguinis portio de extremo canale effluit. Nunc si ea ultima pars arteriosi tubi clausa est, sanguinis a corde appellentis vis obstaculum ea in sede reperit, & in canalis arteriosi parietes nititur, eosque, secundum directionem, quam a corde accipit, exporrigeri conatur. Si canalis penitus clausus fuerit, tunc etiam magis extendetur, ut fit in corporibus cavernosis penis, sive ea sanguis libidinantis animalis distendit, sive siphon anatomicus ceram in ea corpora impellit. Ita fit in uretere clauso, qui frequentissime ad intestini similitudinem dilatatur. Si tubus idem non totus clausus est, sed ex parte aliqua, tunc minus quidem, sed pro ea ratione extendetur, qua major tubi pars cæcum finem habebit.

§. V.

(*a*) L. II. p. 57.

(*b*) p. 233.

(*c*) Nihil exit per ostium, ut credit VIR CL. analis liberi, cylindrici. Si obstaculum operueris libero motu, statim aqua exsilit STRABE LIN de pulsu p. 9.

§. V. *Præfatio in latera arteriarum perpendicularis.*

Etiā majoris momenti est, quem nunc proponimus, sanguinis in arteriā parietes effectus. Et primo quidem dudum ostendit J A C O B U S HERMANN, & Petrus Antonius MICHELOTTI (*d*), sanguinis globulum, aut columnam, oblique per arteriā projectam, premere parietes sive arteria secundum lineas, quæ in ejus ambitū ad perpendicularē incident. Facilis est demonstratio, cum obliquus iste ductus in duas rectas lineas resolvatur, quarum altera ad axin & ad parietem arteriæ rectissimæ parallela est, altera ad utrumque verticalis. Sed arteriæ nullo in animali a corde in rectitudinem exportiguntur: carumque ipsum principium arcus est. Quare in aortæ potissimum ea prima sede, ejusque parte, in quam axis ostii cordis dicit, aneurysmata frequentissima reperiuntur (*e*), ita vero græci viatosam arteriæ dilatationem vocarunt: quæ manifesto nascetur a nixu sanguinis arteriam undique diffundentis, singulique ab ictibus cordis incitati, Sed etiam in eadem sede frequentissime ossa præter naturam generantur (*f*), in senibus tamen magis (*g*): eæ squamae musculosam inter & intimam aortæ membranam (*h*) concrescunt, molles in principio & lutescere (*i*), inde calli similes, demumque cartilagineæ & osseæ. Eas inter squamas quodcumque molle

(*d*) *De separat. fluidor.* p. 55. 56. 57.

(*e*) In finu maximo VALSALVA p. 131. eaque tota sede, qua aorta dextrorum primo, inde sinistrorum flebitur J. BAEZ, MORGAGNI Advers. Anat. II. p. 21. SCHREINER Elem. p. 325. MICHELOTTI Comment. Acad. Bonon. T. I. LANGIERUS de corde & aneurysm. p. 76. 110. edit. 1728. J. B. SENACTR. de corde. T. II. p. 319. HENKEL medic. chir. Sammlungen II. p. 39. WARNER ad cas. 12. Habeat etiam exempla SAPOLTA de tumor. p. 179. HEISTER annal. Jul. 1716. Augustinus Frid. WALTHER de aneurysm. FISCHER de mofo quo se ossa accommodant p. 32. TIMM obs. 18. H. F. le DRAN obs. 40. Vir eruditiss. Dan. GUIL. TRILLER de oris ventriculi callos. angusti. 17. C. G. STENZEL de aort. fistulam. Phil. Transl. n. 1706. Comm. 1731. p. 30. SCHACHER progr. de mat. ossif. HEUERMANN physiol. T. IV. p. 26. MEIKE Berlin T. XII. p. 44. 49. JENTY cours. T. III. p. 451. HUNTER obs. Soc. Lond. T. I. p. 348. Adjuvavit autem, quod ea pars aortæ, pro ramorum portione tenuior est, secundum CLIFTON WINTRENGHAM. Vide L. II. p. 73.

(*f*) CHESSELDEN Anat. of hum. tib. L. III. c. 6. JENTY L. C. BECK de palp. cord. DEDIEU tumefact. obs. 3. SCHACHER de mat. ossif. HEUERMANN I. c.

(*g*) Opuscul. patbol. obs. 18. 19. 47. 51. CHESSELDEN ibid. RHOD. Cent. III. obs. 43. VESALI Exan. obs. fallop. p. 36. LUCAS of Waters T. I. p. 158. BASS Dec. III. obs. 4. BUCHWALD obs. 3. BIDLOO Exerc. II. n. X. HUNTER I. c. p. 35.

(*b*) Opuscul. patbol. obs. 18. 19. 47. 51. CRELL I. c. SCHACHER I. c. BOEHMEN prestat. Fibras multicolofas annulares osseos scriptum est Mem. de l' Acad. des Scienç. 1735. p. 315. Id quidem nunquam vidi factum esse: conf. Cl. KULMUS tend. Achill. rug. II. 9.

(*i*) J. Frid. CRELL de art. coron. inular. Opuscul. patbol. obs. 47.

molle superest, id a vehementer cordis impetu, quem potentiorum nunc sustinet, deteritur, dissolvitur (*k*), in ulcerâ abit, & denique ita eroditur, ut arteria omnino funesto eventu disrumpi possit (*l*). Exemplum bujus maximi & frequentis vitii & ipse vidi, & alii viri clarissimi descriperunt (*m*). Semper autem, quantum ego quidem novi, ossa natura cum arteriæ dilatatione (*n*) conjungitur, ut a cordis impetu & sanguinis in membranas arteriæ nixu, utrumque vitium communem causam habere confirmetur. Ad idem denique majus aneurysmatis periculum Natura respexit, quando nascentis aortæ arcum in convexitate densiorem (*n**) fecit & crassiorum (*o*). Altera sedes aneurysmatis in ea parte aortæ fuit, ad quam sanguis ab arcu repercussus adludit (*p*).

§. VI. Porro confirmatur.

Sed aliæ etiam cause sunt, magis propriæ animato corpori, quæ pressionem sanguinis in arteriarum latera determinant. Eas modo tetigi. Nempe unda prior, ex prioribus nimis nunc saepè repetitis, tardius fugit, quam sequitur posterior, estque adeo huic undæ pro obstaculo, cum ea progredi nequeat, nisi priorem impulerit, sibique viam coegerit aperire, sive quod eodem redit, non exit de ultima arteria tantum sanguinis, quantum prima cordique proximæ arteriæ origo recepit. Quare denuo, nascitur eadem rerum conditio, quam modo proposui, & potest tota arteriarum universitas pro

(*k*) *Opusc. pathol.* obs. 18. 19. 47. *Cazzet.* I. c. III. *PLANCUS de monstros in syphilicis* ulcerâ & pulsulis frequentes reperit. Iude iupta denum arteria homo periit *MEEKE* T. XII. *Mem. de Berol.* p. 62. 63.

(*l*) *Opusc. pathol.* obs. 51.

(*m*) *CHIFFLET* obs. 15. *DUVERNEY traité des maladies des os* T. II. p. 117. *Lancis. de corde &c; avenir.* p. 218. 237. 251. ed nov. *MELLÈ* medic. *esumis* p. 173. *Hilair. de l'Acad.* 1701. p. 28. *MEEKE* I. c. p. 44. *VATERI* c. *Mem. de l'Acad. Roy. des Scienç.* 1712. p. 79. *lequq. 1733. VALCARENghi in histol.* II. *GUISARD traité des plages* T. II. p. 455. *SCARDONA apbr. de cognoscend. & curand. morb.* T. II. p. 83. in thoraci hydrope *HENKEL* I. c. p. 10. *FISCHER* I. c. p. 32. *SNARRE* operat. p. 205. *Comment nov. Acad. Petrop.* T. III. p. 401. 402. *DAUBENTON* *histol. naturæ.* T. III. p. 152.

(*n*) Aneurysmata arteriæ ossa *Phil. Transf.* n. 269. *MORG. Advers.* II. p. 82. *Lancis.* post. I. *de mort. subit.* obs. 6. *MEEKE* I. c. p. 46. 47.

(*n**) *WINTREBINGHAM Exp.* 12. 13. Ad concavæ partis densitatem converte densitas se habet ut 82. ad 81. ut 40. ad 49 &c.

(*o*) Crassities convexæ partis se habet ad concavæ crassitatem uti 8 ad 7. &c. *ibid.*

(*p*) *MEEKE* I. c. p. 44.

pro unico tubo haberi, cuius pars ultima angustior, atque adeo cuius ultimi finis pars cæca est. Et hic iterum, si perfectè cæca foret arteria, eaque esset unica, totus cordis impetus consumeretur, partim in inserviendo eo cæco fine, partim in dilatando reliquo tubo arterioso, ut spatiū sanguini pararetur, quem cor continuo submittit. Id autem spatiū utique paratur per lateralem pressionem, quæ potest haberi pro pressione sanguinis ab axi ad perpendicularm in latera nitentis. Nunc quidem finis arteriæ cæcus non est, & sanguis in venas pergit transire, neque adeo cordis vis penitus in parietes canalis impensisit. Cum vero lentius in venas sanguis transfat, quam quidem a corde advenit, tanta pars pressionis a corde exhibite in dilatantiam arteriam impenditur, quanta est differentia velocitatis in primo arteriæ principio, inque fine ultimo, eritque pressio lateralisi, si reliqua pars sumferis, tanto major (*q*), quo lentius per minima sanguine movebitur, donec infinita sit, nempe sola motum cordis consumat, quando nullus per minima arteriarum sanguis viam sibi aperit. In cochlea, cum hie me lentissime sanguis moveretur, aorta decies corde amplior facta est (*q**). Sollicite in hac pressione demonstranda versatus est Vir Cl. *Franciscus Boissier* (*r*) & quidem plurimum ea ad interpretandum musculararem motum usus fuerat *Richardus Jones*, neque eam pressionem *Jacobus JUrin* (*s*) ignoravit. Conica figura, cum ostium arteriæ ulterius minuat, adjuvat pressionem lateralem, non facit. Nam etiam cylindricæ arteriæ pulsu agitantur, ut carotides (*t*).

S. VII. *Ejus pressionis mensura.*

Hanc pressionem multa sunt, etiam in vivis animalibus, quæ confirmant; ea nempe phænomena omnia, quæ ostendunt, ambitum arteriæ in vivo animale crescere, vicinasque partes corporis repellere, pulsus equidem, de quo uberioris dicetur, digitique percussio, arteriarum inflammatarum tumor, fulci, quos arteriæ ossibus inscribunt, in osse sincipitis, frontis, occipitis, multifor-

(*q*) *Jones de musc. motu, Sauvages loco modo cit. p. 131.*

(*q**) *LISTER Exerc. Anat. II. p. 29.*

(*r*) *Nov. Ad. Acad. natur. curios. vol. I. obs. 36. p. 132. seqq.*

(*s*) *Diss. VIII. p. 71, 72.*

(*t*) *Moneo, ob Cl. STENELLINE locum nuper citatum.*

multiformi aliisque; aneurysmata; arteriae ossæ obstructæ (*u*) compressæ (*x*); ligatæ (*y*); foveæ, quas sibi aneurysmata in vertebris aliisque ossibus parant, corunave ossium caries (*z*); arteriae a cordis impetu ruptæ (*a*). Mensuram pressionis lateralis ill. D. BERNOULLIUS definivit, ut sit æqualis velocitate integræ, quo sanguis de foramine libero tubi elaberetur, diminutæ velocitate *actuali*, qua per arterias transfluit (*b*), tubumque etiam propositi, in quem sanguis de arteria nitatur, & in quo altitudo ejus pressionis mensura sit (*c*). Difficilis est assignare, quanta pars motus a corde sanguini impressi in dilatanda arteria consumatur, & quanta progressum per venas eodem urgeat tempore. Magnam istam portionem, & priori majorem esse, ostendi potest, & satis ad mensuram veriorem accedi. Nempe uti dilatatio arteriæ est, ita vicissim ejus, quæ proximo tempusculo sequitur, constrictio. Sed ejus constrictoris effectus est sanguinis saltus, qui fit de incisa arteria, dum cor remissum languet. Motus vero progressivus æstimatur ex saltu, qui de arteria, quæ tota refecatur, eo tempusculo fit, quo cor contrahitur, solusque, absque arteriæ auxilio, sanguinem promovet. Sed iste quidem saltus, qui cordi debetur, manifesto eum superat, qui fit ab arteriæ vi contractili, adeoque superat etiam pressionem lateralem, quæ huic contractioni æqualis est. Alio etiam modo ostenditur minorem esse; quod nempe procul dubio systoles cordis tempusculo longius est tempusculo diastoles. Verum in systole arteriarum restringitur

(*u*) *LORD of sever* p. 247. In mamma amputata arteriola radialis æqualis *PALUCCI* p. 302. &c. Mire dilatata arteria recurrentis post revinctam in cubito trudcum *MOLLINELLI de aneurysm*. T. I. f. 2. T. II f. 3.

(*x*) *GARENGBOT oper. de chir.* T. III. p. 220.

(*y*) *WARNER eas. 13. Aneurysma super vinculum.*

(*z*) *VALCARENghi hist. II. SAROKTA de tumor.* p. 172. *HEISTER annal.* Jul. *GUÉSARD* l. c. p. 145. *DAUBENTON* T. III. p. 172. *RUMLER obs. 81.* *DUVERNEY* l. c. p. 217. 452. *MARCOT Mem. de l'Acad.* 1717. *DUVERNEY Comment. Acad. Petrop.* T. V. p. 316. *CHIFFLET* l. c. *NORTWYCK* in pref. ad *NISELIUM*, *LANCASIUS* l. c. p. 218. 232. Clavicula ab aneurysmate erolite *MATANI aneur.* p. 143. 144. iuxta *LEDEAN* nobis 40. vertebrae delete *HUNTER* l. c.

(*a*) *Cout.* l. II. p. 74. l. IV. p. 458. & de arteriis aneurysmaticis *MELLIS* l. c. p. 173. *MICHELOTTI* *Comm. Bonon.* l. c. *MALOET* l. c. *SHARPE* l. c. *VALCARENghi hist. II. GUÉSARD* l. c. *DAUBENTON* l. c. *MOINICHEN* obs. 14. *SEVERINI de nov. abcessi* c. 7. *DO DONAUS* post edit. *hist. c. 35.* *HARDER* apiar. obs. 85. *DUVERNEY* l. c. *Opus. patbol.* obs. 32. hist. 2. *MATANI de aneurysm.* p. 119. 120. 122. *LANCES* p. 110. ed. prior.

(*b*) *Hydrodyn.* p. 242. Cl. *BOISSIER* æstimat per quadratum velocitatis primigenie sanguinis in principium aortæ impulsus, diminutum quadrato velocitatis, quæ super obstruenda in fine arteriæ supereret de quo queritur l. c.

(*c*) *SAUVAGES de inflam* p. 248.

citur a contractione parietum, in tubum medium, inque venas, ea portio sanguinis, quæ easdem arterias in earum diastole dilataverat. Si plus sanguinis in venas mitterent, arteriarum lumen minueretur continuo. Ea ergo copia sanguinis est mensura pressionis lateralis, quæ arteriam dilatavit. Nunc si tempus, quo cor languet, arteriave contrahitur, duplam foret temporis, quo cor contrahitur & arteria laxatur, & tamen in systoles suæ duplo tempore arteriæ non plus sanguinis in venas rejicerent, quam in subduplo tempore diastroles, dimidio ergo minor esset vis cordis in parietes arteriarum nitens, ea vi, qua sanguinem cogit in venas transire (*d*). Accurior mensura pendet a certiori mensura temporis in systole cordis impensi, qua caremus, & quæ omnino inventu difficultis est (*e*). Sanguinis portionem, quæ arteriam distendat, ad $\frac{1}{3}$ totius sanguinis de corde expulsi ultimat SCHREIBERUS (*f*), & olim Stephanus HALES (*g*).

Cæterum eo minor erit pressio lateralis, eadem polita cordis vi, quo expeditior sanguinis circuitus, & eo major, quo majora offendit impedimenta, major adeo, si arteriam ligaveris, oblrxeris, compresseris, alio modo impediveris (*h*). Oltium aortæ pro vario cordis impulsu inde a 36 ad 40 & 50 partes dilatari (*i*) estimat Vir Cel. Inde deducit I D E M Clarissimus Iatromathematicus, in febre multo majorem partem motus a corde impulsu in arterias dilatandas consumi, neque adeo perinde aut antecedentis undæ, aut sanguinis circumeuntis celeritatem augeri, tritum vero in sanguine maximum oriri, inter undam insequentem, & priorem illam, quæ ipsi est pro obstante (*k*). Eam quidem observationem ita interpretor, ut sim memor, si magis dilatantur arteriæ, etiam magis contrahi, atque adeo, nisi velis arterias in febribus in aneurysmata abire, utique celeritatem sanguinis intendi, cum & cor fortius eum humorem projiciat, & arteriæ vehementius contractæ eum potentius promoveant.

Cæterum, quæcunque hujus dilatationis mensura fuerit, certum est, nisi

G g 2 conti-

(*d*) p. 140. 141. SAUVAGES L. C.

(*e*) L. IV. p. 457. Certe quadragesimæ parti totius minutæ secundi æquale fecit SCHREIBERUS ahmag. & STEPHENUS de pulsu p. 17.

(*f*) Alzeng. p. 231. Venis coronariis drachmas duas adsignat.

(*g*) Hamastat. p. 24

(*h*) I. c. p. 131. Aneurysmata oriuntur a sanguine crasso, arteriisque extremis contractis.

(*i*) Mem. de l'Acad. Roy. de Berlin 1755. p. 37.

(*k*) Ibid. p. 39.

continuo a contractione legitima reparetur, magis & magis arteriam dilatari. cum angulus pulsus aliquid diametro addat. Neque obstat, quod arteria tensa magis resistat (*l*), aut chordarum flexiones sint in ratione ponderum flectentium subduplicata, atque adeo aucta vi distidente ut 4, flexio arteriae augentur unice ut 2 (*l**), & in dilatata arteria sanguis retardetur (*m*). Nam sub aneurysmate contracta arteria adfectiones habet vasis pene clausi, & columna sanguinis arteriae dilatatae major est.

S. VIII. Et effetus.

Membranarum arteriae densatio.

Ab eo effectu initium facimus, qui in omni animalium genere, inque omnibus arteriis locum habet. Nempe, dum secundum perpendicularum sanguis in arteriae parietes nititur, primam pressionem impertit intimae membranæ, eamque ab axi ad ambitum expellit, dum exterior illa, laxiorque cellulosa tela ab ictu sanguinis remotior, minus pressa, non pari passu ab axi removetur: ita fit, ut arteriae interna membrana ad extimam propius accedat, & anulus, quem arteriae parietes constituant, minorem in qualibet sectione latitudinem aut crassitatem retineat, dum una in minus spatium compactæ membranæ densantur. Id phænomenon equidem unice in arteriis frigidorum animalium vidi, in quibus dilatatio ab expulsione de corde sanguine nulla sequitur: quin vero in calidis bestiis locum habeat, inque ipso homine, non videtur dubitari posse.

In frigidis certe bestiis manifeste vidi, & frequenter, dum cordis vis languet, & sanguinis copia in arteriis exigua est, lumen arteriae parvum, sed insignem parietum esse crassitatem (*n*). Ea autem arteriae conditio in systole arteriae calidi animalis utique adest. Deinde, quando redux cordis vigor justam sanguinis penum in arteriam impellit, augetur in ranis arteriarum lumen (*o*), & pari ratione membranarum crassities diminuitur. Sed is status diastoles arteriosæ sicillius est. Vidi autem lumen arteriae inanis non

(*l*) SENAC T. II. p. 209.

(*l**) SAUVAGES de inflammatis. p. 254.

(*m*) MORGAN Michon. præd. p. 47. cons. WINTINGHAM L. C. p. 132.

(*n*) Second Mem. sur le mouvement du sang Exp. 91. 92. 183.

(*o*) Exp. 91. 92. 95. 183.

non major , cujus membranarum erat etiam (p) , vidi minus (q) , vidi duplo minus (r) . vidi denique in majori diastro triplo minus fuisse (s) , ut omnino sextuplo arterie paries & minus latus , & una densior reddatur. Ita ex ipso suo elatere arteriarum membranæ paulo post priorem statum , nativamque laxitatem recuperant , quæ syt'os arteriosæ species est , a musculosa diversa , ipsisque arteriis communis , qua fibris carneis determinuntur. Non prætervidit penitus hanc densationem *Jacobus KEIL* (t) : exiguum vero fecit , & facilis dederim , in homine , quam in frigidi sanguinis bestia , minorem esse , cum in his quidem extima membrana interiori , a corde impulsæ , immota restat , in homine vero etiam exterior illa cedat.

In eadem membranarum arteriæ densatione locum habet illa , P R E C E P T O R I (u) nostro celebrata , arteriolarum conpresso , quæ inter majoris arteriæ membranas ponuntur , cui certe compressioni magnaæ theoriæ senii , decrementi (x) mortisque naturalis partem III. olim S E N E X superftruxit. De senio alias requiretur : sufficiat interim monuisse , majorum arteriarum vascula (y) per extimam cellulofam telam distribui , omnium ergo minimam a sanguine per magnum tubum impulsu pressionem pati : neque in vivis animalibus , ut certo vidi , ea vascula aut inaniri , aut expallescere : minima vero utique vascula , parumque nota , musculofam inter & intimam tunicam posita comprimi posse. Neque tamen hanc causam esse , quare adeo frequenter (z) , & in senio frequentius , arteriæ ossescant. Nam eam causam in succo esse effuso , alias ostendi (a) , neque ignoravit vir Cl. J. Fridericus CRELL (b)

Cæterum hæc ipsa hypothesis fecit , ut & III. olim P R E C E P T O R (c) , & sequaces ejus viri discipuli (d) , sanguinem alio tempore in tu-

G g 3 buta

(p) Exp. 69. 71.

(q) Exp. 77.

(r) Exp. 77. 92.

(s) Exp. 92.

(t) *De sang. velocit.* p. 28.

(u) Præf. in Inst. rei M.d. CCXIII. T. II. p. 254. *SCHREIDER* E'm. p. 297.

(x) Inst. rei Med. n. 477.

(y) L. II. p. 68.

(z) BUCHWALD obs. 3. VESALIUS I. c. RASSI I. c. FISCHER de senio p. 46.

Conf. Adolph Herib. WINKLER de libiis corporis vasorum corp. buta.

(a) Opusc. patholog. obs. 47.

(b) *De art. coron. inflar. ossis inducat.*

(c) BOERHAAVE Præf. T. II. p. 251.

(d) SCHREIDER E'm. p. 297. & in *Ahnag. fl.* p. 220.

bum magnum arteriæ recipi persuasi fuerint, alio in vascula, quæ parientes arteriæ percurrunt. Verum non est ea arteriæ dilatatae pressio, quæ vascula in exteriori cellulosa tela circumposita elidat.

§. IX. Dilatatio arteriæ.

Caute oportet hoc critico seculo progredi, quo vix quidquam est, quod hominum ingenium non sollicitaverit. Nos quidem calidorum animalium arterias dilatari, atque earum axin utcunque augeri, in diastole, sanguinisque impulsu persuademur. Sunt tamen, qui in universum in vivis animalibus arterie dilatationem videre non potuerint (*e*), sunt qui vicissim contractionem ab arteriis abesse docuerint (*f*): sunt qui in pulsu arteriam potius transferri, aliquaque in sedem migrare, aliquaque a priori lineam curvam describere posuerint (*g*), quam quidem dilatatione sua ferire digitum; persuasi, non esse in duabus uncis sanguinis voluminis satis, quod sufficiat (*h*), ut aliquod inde sensibus obvium in diametris arteriæ incrementum nascatur. Sunt denique, qui haec tenus arteriam dilatari dant, ut tamen altera diameter decrescat, dum augetur altera, atque adeo arteria in diastole ex transversa ellipsi in ellipsis abeat (*i*), cujus major nunc diameter ad priorem perpendicularis digitum ferit. Has clarorum virorum cogitationes primum considerare necesse est, ut pulsus, inde phænomena continuo sermone licet persequi.

Mihi quidem de phænomeno ipso dubium nullum superest. Etsi enim utique non rarum est, *in vivo* animale inciso pulsum nullum adparere (*k*), neque videri arterias dilatari, tamen frequentes saevis observationes sunt, utique dilatationem & oculis (*l*), & tangentib[us] digito fuisse manifestam, ut arterie arcum majorem describant, dum dilatantur (*m*). Potest autem pulsus obscurari a debilitate, a sanguinis jactura, aut a coagulatione.

Mensu-

(*e*) Apud STEPHELINUM de pulssib. p. 2.

(*f*) G. A. LANGGUTH, quem alias excitavimus, de aorta ab officio cordis amido remota.

(*g*) Jof. WEITBRECHT l. c. p. 316.

(*b*) p. 314.

(*i*) Jacobus PRIMIROSE de strucl. fundam. PLEMPPII p. 87. Dudum contra eum virum scripsit BEASLIUS in Maxim. fund. PLEMPPII p. 135.

(*k*) Ad Exp. 44. Second mem. sur le mouv. du sang Exp. 50.

(*l*) U. I. Exp. 44. 46. 55. 56.

(*m*) CALDANI Ep. p. L. 333.

Mensuram eidem hujus dilatationis ægre video sumi posse , cum unico isto oculi ea dilatatio absolvatur , neque pulsilegium a SANCTORIO (n) promissum satis intelligo , neque ceram aut argillam , cui profundorem foream arteria dilatata imprimat , naturæ progressum indicare crediderim , quæ dilatationi arteriæ resistat. Stephanus H A L E S (o) , ut nuper vidimus , duas tertias partes sanguinis ex corde expulsi in dilatanda arteria consumi posuit , cum tempus , quo arteria est in systole , duplum faciat temporis diastroes. J. Alphonsus B O R E L L Y S (p) arteriæ dilatatae ad contractam arteriam eam rationem tribuit , ut sint inter se uti 63 ad 60 , calculo quidem usus non optimo. In aorta , ex calculo tamen potius quam ex observatione , Cl. B O I S S I E R distensionem æqualem fecit uni quartæ parti lineæ (q) . Ad lineam integræ auxit Cl. olim W E I T B R E C H T (r) , cuius e re erat esse quam maximam. Sed ego quidem hec omnia nondum liquere video , & in aliis & aliis arteriis aliter se habere. Utique tamen arteria poplitea impositum alterum femur memorabili aliquo intervallo elevat , & in pulsu aqua intumescit , in quam federis (s) .

Porro , cum Cl. W E I T B R E C H T a dilatatione arteriæ pulsum fieri ideo negaverit (t) , quod omnino nova unda sanguinis , ex corde effusa , non videatur tantum arteriarum systema ita dilatare posse , ut discrimen oculo manuve distingui possit , accuratius paulum oportet hanc difficultatem repetere. Si nempe aortam pro uno tubo habueris , qui contineat sanguinis libras decem , unciasve 160 , tunc eidem dux ex novæ unciae tubum arteriosum non majori ratione dilatabunt , quam octogesima : quæ quidem mensura , si aortam posueris unciae habere diametrum , in ipsa aorta erit lineæ pars pene octava , in arteria vero radiali , cuius diametrum est trium , in exemplo , linearum , non excedit lineæ partem 26. Si vero , in hoc phænomeno , dilatationem arteriæ vere observatam in diastro posueris æqualem quartæ lineæ parti , aut toti lineæ , facile adparet , imparem esse tantæ dilatationi produ-

(n) Promittit ejusmodi , ut motum & quietem arteriæ metiri & differentias motuum 333 percipere , & denum , qua die & hora ægri a statu naturali recedant , quave hora augmentum febris definat , definire possit metodus vitand. error. p. 189.

(o) p. 24. l. c.

(p) De mot. anim. L. II. prop. 71.

(q) De pulsis p. 29.

(r) p. 34.

(s) B r a n history T. II. p. 426.

(t) p. 34. Numeros mutavi , res eidem c. t.

producendae modicam illam sanguinis copiam, quæ nunc maxime de corde profiliit.

Hactenus huic difficultati conatus est subvenire Cl. *Josephus Brun* (u), ut arteriam in sua systole explanatam, in diastole in circulum abire persuadeatur: & ita ut unice radius anterior & posterior arteriæ crescit, aut solus denique radius anterior: in eo a *PRIMIROSIO* diversus (x), quod non perinde disertis verbis transversam diametrum dixerit minui. Sed arterias vivi animalis minime explanatas, & utique cylindricas (y) esse conicasve, dum tanguine replentur, certum est, sive in systole nunc constituantur, sive in diastole. In demonstratione etiam, quam non dudum dedimus (z) nihil est, quare lateralis pressio, in aliqua puncta arteriæ, gravior incumbat.

Neque *Johannes Weitbrecht* nimis angustam interpretationem adopto. Nam etiam rectæ arteriæ, & nusquam flexæ, pulsus agitantur alterno, & parem habent diastolen. Addit Cl. *Schreiber*, in arteriis minoribus hanc translationem magis locum habere (a).

Duobus modis autem ea, quam proposuit Vir Cl. solvitur objectio: sive minorem facias dilatationem, sive omnino non soli undæ tribuas, quæ nunc de corde prodiit. Manifestum, mihi quidem, videtur, eam undum partim dilatare suam aortæ portionem cordi proxinam: partim impellere undas priores: ab iis undis, suam a prioribus pulsibus velocitatem retinentibus, & a novo impulsu incitatis, urgeri alias undas, quæ a prioribus pulsibus a corde projectæ sunt, & alias aortæ regiones expandunt. In quo enim lubuerit, columnas diviso arteriarum systemate, quælibet columna anterior lentius progrediens, a nova, quæ intequitur, urgebitur. Ab eo vero impulsu undæ nuperæ in priorem, pulsus potissimum nascitur. Neque ideo pulsus minus eodem istu oculi per omnes arterias fiet: id autem unice inde sequetur, quod omnino sequitur, pulsum eundo debilitari, sive minus atque minus arterias in sua diastole dilatari, quo longius à corde sunt remotæ (b).

Quæ nunc posui, ea ex vivorum animalium contemplatione manifesta reddun-

(u) L. c.

(x) Obscuriores Cl. viri voces fecerunt, ut eamdem utiliusque auditoris opinionem esse putaverim *Mens. sur le mouv. du sang* p. 15. Nunc in litteris rectius mentem Cl. *Brunii* edocitus, lubens moneo, minus a nobis Cl. virum recedere, quam recedebat *PRIMIROSIUS*.

(y) L. II. p. 56.

(z) p. 211.

(a) *Almagest* p. 257..

(b) n. 22..

redduntur. Nam quamprimum languet in mortem inclinatum animal, utique manifesto serius atque serius pulsus in arteriis a corde remotioribus percipitur, qualis fere peristalticus per intestina motus proserpit (*c*). Quando etiam isto languore debilius cor nunc salit, omnino solum principium magnæ arteriæ micat (*d*), neque ultra pulsus percipitur, ut saepe me in hominibus moribundis, alias etiam in vivis bestiolis me vidisse, jam alibi exposul (*d**). Cum polypi in utroque ventriculo essent, pulsus in carpo nullus, in pectore tamen aliquis (*d***). In vivo animale hæc tempuscula, distincta utique, ab ipsa sua velocitate confunduntur (*e*). Quam exiguum discrimen sit satis facile intelligitur. Sint in arteria tres sanguinis columnæ, neque enim numerus rem mutat; tempusculum ictus, quo secunda unda fert tertiam, differt a tempusculo ictus, quo percurritur a prima, unico discriminè velocitatis, quo secunda unda fertur, & quo prima. Tota velocitas est ejusmodi, ut pes percurratur ab unda sanguinis in parte minuti primi forte centesima quinquagesima sive tertii 24 (*f*). Decrementum velocitatis maximum, a corde ad ultimam arteriolam, sit, ex clari viri calculo ejusmodi, ut 4 ad 3 (*g*), & ea in fede sanguis percurrat 12 $\frac{1}{2}$ pedes in primo minuto, unumque pedem in ejus minuti parte $\frac{1}{12}\frac{1}{2}$. Sit a corde ad arteriam radialem decrementum celeritatis diminutum ejus, quod nascatur ad arteriam usque capillarem ultimam. Sit decrementum in columna secunda natum, tertia pars decrementi totius. Liberalis calculus est. Nam diminutionem in minimis vasis majorem esse, in majoribus exiguum omnia consentiunt, & experimenta ipsa, alias producta (*h*). Percurrit ergo sanguinis ex corde exeuntis columna prima suum pedem in 24 tertii, feritque secundam absoluto hoc tempusculo. Secunda idem spatium intra $7\frac{1}{2}$ ejus minuti primi, sive tertias 22 $\frac{1}{2}$ percurret, & feriet tertiam. Et tertia, aliquando lentius mota, feriet quartam,

(c) Du BORDEAU rechercb. sur le pouls p. 324.

(d) Second memoire exp. 85.

(d*) p. 220.

(d**) PISSINIUS p. 115.

(e) p. 108. 209.

(f) Conf. L. IV. p. 447. &c.

(g) p. 194.

(h) Quæ saltum in ramis exiguis arteriarum, non tamen capillaribus, ingeniem, neque multo minorem faciunt, quam in trunco est. L. C. exp. 42. 43.

tam, in adii fulco positæ, post tertias 21. Totum ergo discrimen temporum, quo columnæ primæ, & secundæ, & tertiae parietem arteriæ ferunt, est trium tertiarum, sive partis vigesimaliæ secundi minuti, & positis in minuto primo pulsibus 80, discrimen æquale erit vigesimaliæ quintæ parti unius pulsus, quod quidem discrimen anim. non percipit (*i*): aut certe raro, nam & Josias WESITBRECHT (*k*) alio & alio tempore carotidem, alio carpi arteriam suture observat, & ego, obscuriorem aliquam successionem in corde & carpo nonnunquam percepisse mihi visus sum. Vulgo nulla temporis successio observatur, omniesque simul in toto corpore arteriæ pulsare videntur (*l*); alii, subtilius rem rimati nobiscum sentiunt (*m*).

§. X. Quæ pulsus est.

Hæc alterna arteriarum *micatio* est, quam medici pulsum vocarunt; quo nomine dilatatio quidem arteriæ potissimum intelligitur, ut tamen, & imaginarium tempusculum utrumque systole inter & diastole interpositum, eo nomine comprehendatur, imaginarium inquam, perpetuo enim vel crescit arteriæ diameter, & diastole a minima latitudine ad summam pervenit: vel vicissim diameter a maxima ad minimam diminuitur, quod totum stadium est systoles. Vix nostro revo necesse fuerit pulsisim *fascultatem* refutasse, quæ nescio quomodo secundum membranas repat, & de cordis sanguinem advoret. Cum tamen ad experimentum GALENUS provocet (*n*), etiam nostri seculi audientiam meretur. Calamus in arteriam misit, qui progressum virtutis pulsisim interrumpiperet; vidit, si fides est Cl. viro, sub eo calamo pulsum cessare. Neque nuperiores clari viri (*o*), qui parum cæterum GALENI auctoritate movebantur, penitus nihil in hoc experimento veri repererunt.

Dudum tamen VESALIUS (*p*) experimentum repetit, & utique sub

(*i*) L. IV. p. 447.

(*k*) p. 317. Item de poplitea & brachiali observavit J. B. SENAC.

(*l*) GALENUS *Admīstr. Anat.* L. VII. c. 15. HARVEI *Exerc.* I. c. 3, & in *Pract. WALCUS* in *Eph̄. I.* apud BARTHORIUM p. 405, deque auris arteria DUVESANTY *de Poule* p. 202.

(*m*) SCHREIBER *Anmag. II.* p. 258.

(*n*) *Aus sanguis natura in arteriis continetur* c. 7. *Admīstr. Anat.* L. VII. c. ult.

(*o*) Obscuriori certe sub calamo pulsus fieri fatetur HARVEI *Exerc.* III. p. 214. neque aut WALCUS l. c. p. 404. aut VIRUSSINIUS difficult *neurograp.* p. 25. aut J. B. SENAC T. II. p. 224.

(*p*) *De fabric. corp. hum.* p. 819, 810.

sub calamo arteriam micasse vidit, idemque periculum & Thomas CORNELIUS Consentinus (*q*) iteravit, & PLEMPPII defensor (*r*, & Raymundus VIEUSSENS (*s*). Deinde & a corde pulsum fieri idem VESALIUS (*t*) recte, & ante HARVEIUM (*u*) monuit. Porro pulsus cum cordis systole conjungi, Realdus Columbus reliquit (*x*), & HARVEIUS (*y*). Sed nimis facile est undæ iter videre, quæ ex corde advenit, arteriamque elevat, exque arteria incisa profilit: nimis etiam manifestum est, arteria ligata (*z*), aut obstructa (*a*), pulsus cessare, quando sanguinis a corde in arterias fluxus avertitur, & perinde destruculo corde, & una ligatis umbilici arteriis, placenter arterias non pulsare, ipsius GALENI experimento (*b*) & incisa arteria, ut de ejus vulnera sanguis erumpat, ultra sedem vulneris pulsus tolli (*c*).

Omittit aliquos recentiores medicos, qui ab elatere sanguinis pulsus derivant (*d*).

S. XI. *Ad antiquitates pulsus.*

Nimis manifesta oculis est & digitis arteriarum micatio, & in vivo hominis non uno membro, & in animalibus spirantibus neque potuit hominum memoriam diu effugere. Dignitatem vero nostra est, postquam medici & in China (*e*), antiquissimis jam temporibus, & in Græcia signum morbi & naturæ vires definitur a pulsu repetete ceperunt. HIPPOCRATES

Hh 2 arteria-

(*q*) Prozymnae. p. 274.

(*r*) Munit. fund. Plemp. p. 105.

(*s*) L. C. p. 23.

(*t*) L. C.

(*u*) L. C. p. 35. 271. &c.

(*x*) De re anatom. p. 57.

(*y*) HARVEI dist. III. p. 216. 272. WALMUS L. C. p. 393. Second Mem. sur les part. fuis. &c. irris. Exp. 114. 146. 148. 150. 154. &c.

(*z*) FALLOP. de partib. feminar. p. 170. PLEMP. fundam. med. p. 117. ENT. apolo. pro circ. sang. p. 35.

(*a*) VIEUSSENS p. 24. Corde a polypo obstruculo asphyxia MALPICH. postib. p. 45. VALESNERI oper. T. III. p. 191. WELSEN epifrag. obs. 34. RIOLAN ad C. BAUHIN p. 764. PIGENSIUS de diabete p. 116.

(*b*) De util. part. L. VI. c. ult. Conf. L. IV. p. 506.

(*c*) Attil. BULGARI. de cordis effed. p. 17.

(*d*) DEIDIER amat. rafjoum p. 100.

(*e*) Exstat pulsuum theoria in medicis LIPSI opere Nuy-King & ipse citatur auctor HOANG T. tertius imperii princeps. CLASTRA Med. Saxon. p. 16.

arteriarum pulsus non ignoravit, ad numeros tamen, adque subtiliora discrimina non est progressius. Præcipua loca, quæ de arteriarum subfultu habet, paucis repetit. Quibus vehementer in cubito vena pulsat, ii ad infaniam proni sunt (*f*). In velocissimis morborum pulsus creberrimi & maximi (*g*). In lethargo pulsus fæpultus (*h*). Alia loca lector requirit (*i*). *HEROPHILUS* (*k*), subtiliter in hac observatione versatus, pulsuum rhythnum ad numeros mensuramque revocavit, sed ejus quidem viri opera interierunt. *GALENU斯* (*l*) eo majorem in hoc signo laborem posuit, quod ab *Hippocrate* pene desertum videret. Divisiones vero & classes adeo subtiliter composuit, ut ad lectos ægri, pulsuum species difficilius agnoscas, quas separavit. Inter nuperiores medicos justo libro de pulsu *STRUThius* egit (*m*): ad numeros potissimum revocavit *Johannes FLOVER*; ad notas musicas reduxit *F. N. MARQUET* (*n*); novas species, earumque specierum significationes detexit *Franciscus SOLANO de LUQUES* (*n**), & longe ultra *SOLANUM* progressus nuperus auctor (*o*). Meretur res, a medicis aliquot paginarum patientiam.

§. XII. *Pulsus arteriosi sedes.*

Diximus in calidis animalibus majorem partem arteriarum manifeste micare, minores vero arteriolas in frido-homine conspicuo pulsu non agitari (*p*). Aliae tamen in corpore humano regiones sunt, in quibus pulsus & manifestior est, & a medicis frequentius interrogatur: sive, quod arteria paucis musculis protegatur, sive demum, quod os subjectum habet,

(*f*) *Epidem.* II. Sect. V.

(*g*) *Epidem.* IV.

(*h*) *Prænot. Coac.* L. I. n. 145.

(*i*) *Coac. prænot.* L. I. n. 130. 131. 134. & *prænot.*

(*k*) Apud *GALENUM de pulsuum different.* L. II.

(*l*) In quatuor modo citati operis libris, & in IV. I. de dignotione pulsuum, aliisque quatuor de casis pulsuum, iterumque alis perinde quatuor de præcognitione ex pulsuum. Mirifica vero propriez perit in træfagio ex pulibus exempla adducit.

(*m*) *Sphygmica art. super 1120 annos perdita* Basil. 1554. 8°.

(*n*) In libello *Nauceyi* edito a 1747. *nouvelle méthode pour apprendre à connoître le pouls de l'homme par les notes de musique.*

(*n**) In lapide *Hydro Apollinis*, cuius compendium edidit *Jacobus NINELL* cum titulo *New and extraordinary observations concerning the pulse* London 1741. 8. Inciduum imprimitum pulsum primus definitivit.

(*o*) *Recherches sur le pouls par rapport aux crises* Paris 1756. Ejus viri observations confirmavit *Cl. MICHEL* in obſſ. sur le pouls Paris 1758.

(*p*) p. 220. seq.

best, atque adeo firmiter fulta digito tangente melius resistat. Vulgo tangitur pulsus in arteria radiali, dum radii leniter excavato fine sustinetur, prius paulo, quam conflexa circa radii finem ad dorsum manus se recipit (q). Chinenses etiam in eo loco tres regiones arteriae distingunt, quibus proprias suas significaciones distribuunt. Proxima temporalis esset arteria, qua parte supra jugum cutem inter (r), & cellulosum durumque temporalis musculi involucrum adscendit. Sic labialis arteria, dum cutem inter (s) & marginem maxillæ inferioris flexuosa ad faciem tendit: & arteria poplitea medios inter femoris condylos intercepta (t), & ophthalmicæ arteriae ramus (u), qui de orbita ad faciem erepit, & septi narium arteriae (v), & digitorum (y) non obscure micant; manifestissime vero arterie frontalis rami, qui in ipso fonte pulsatili puerorum cum aliis ab occipitali trunco surculis (z) convenient. Sed etiam tibialis anterior arteriae pulsus inter hallucem proximumque pedis digitum facile percipitur (a). Deinde de altero genere, ossibus non fulto, carotidum pulsus plerunque in collo tangitur (b), nisi adeps truncum sepeliverit, & in labii coronaria utraque (c) micatio manifesta est.

Non ideo non aliis in corporis humani partibus micantes arteriae percipiuntur. Aliquando alia a vulgari naturæ fabrica est, uti vidi in dorso manus magis, quam in ultimo radio, evidentem pulsum fuisse, procul dubio, quod arteria radialis majori trunco ad dorsum manus tetenderit cuti vicinior, & simile apud Cl. virum exemplum reperio (d). Alias in morbo causa est. Ita in abdomen aorta duplo amplior pulsus effecisse videtur (e): Est ubi sola macies fecit, ut ejus arteriae pulsus per abdo-

H h 3 minis

(q) Tab. tot. corp. ant. in fasc. VIII. C.

(r) Ibid. p.

(s) Ibid. Z. d.

(t) Ibid. tab. post. ad N.

(u) Fascic. VII. T. VII. f. 1. fasc. VIII. e tab. anteri.

(v) Fascic. IV. T. z. 12.

(y) SCHULHAMMER de cord. &c pulm. offic. n. 63. de pulsu p. 31.

(z) Fasc. VIII. p. 49. T. post. C. V.

(a) Pulsus eo loco tangi posse AMATUS Cent. I. hist. 96.

(b) In febribus acutis vehementer salit SYLVA de la saignie p. 349. BARTHOLINI cent. L hist. 18.

(c) Ibid. x & f & fasc. 4. T. z. y. k. R.

(d) TULP. L. III. obs. 45. BRUHIER de l'incert. des signes de la mort, EICHENBACH contin. obs. var. p. 68. ALBERTI Med. Legal. T. VI. obs. 24.

(e) BLANGARD Chirurg. p. 431. BONTIUS obsero. 8. L. III. med. Ind.

minis tegumenta percipere tur (f). Est ubi gastroepiploica arteria (g), aut celiaca, siliens tacta est (h), quo lienis pulsus refero, a Nicolao TULPI o descriptum (i), adeo non infrequens malum, ut pro symptomate specifico colicæ pictonum a FRANCISCO CITOIS (k) habeatur, & a ZACCCHIA inter hypochondriacorum symptomata referatur (l). Obstrucțio quæcunque, aut sanguinis major congestio, insolite pollutionis causa fuisse videtur. Aorta forte pulsus fuit, quem inter scapulas hypochondriacorum & hystericonum mulierum RAULINUS sepe expertus est (m). Sed etiam cordis pulsus non eodem semper loco percipitur. Sursum dextrosum ad secundæ & tertiae costæ intervallum migraverat (n) in ægro, cui aorta in magno arcu vitiœ dilatata fuerat. Sed etiam ego nuper in juvene totum pectus pulsare & vidi, & audivi, & testigi, cum a morte pulmones densi & viscida pleni materie, cor autem inservit molis esset. Sub cartilagine mucronata cor pulsavit (n).

Contra non absque exemplo est, in carpo nullum omnino pulsum percipi posuisse, aut in altero (o), aut in utroque (p). His hominibus, si integræ valetudinis fuerint (q), potest arteria radialis minima fuisse, uti paullim arteriæ diametro, perinde ut itinere, ludunt, & radialis arteria omnino nonnunquam exigua fuit, cum ejus locum vel interossea arteria teneret (r), vel ulnaris, præter solitum amplior (s). Potest etiam valde profundo loco posita (t) arteria micationes efficiere obscu-

(f) WINSLOWIUM & SYLVAM de la saignée p. 349.

(g) MAUCHART de pulsus crepitante p. XI. Berigt van een Slaappietje te Stottrayck p. 23. COLUMBUS de re Anat. p. 268. Sed etiam PECHLINI historia extat L. II. obs. 6. & SALMUTHEIENS. I. obs. 45. & SEVERINI med efficac. angio og. p. 41. de abcessi. nov. obs. c. X. p. 266. Eo retulit III. SENAC pulsus, quem gastroepiploicæ arterie alii tribuerunt T. II. p. 207. 441. Palpitatio ventriculi cum motu cordis synchrono WOODWARD eas p. 255.

(h) RIGOLAN Enchir. Anat. Patol. p. 218. Memoir. de l'Acad. des Sciences 1750. p. 334. cum a colica intestina gangrenam conceperint. In octogenaria a palitu pulsabat PANASOL Iatrom. I. Pent. V.

(i) L. II. obs. 18.

(k) In proprio de eo morbo libello p. 219.

(l) De hypochondria p. 35. 165.

(m) De vapori p. 19.

(n) J. Philippus BURGGRAF vir clar. in Eph. Nat. Cur. vol. X. obs. 39.

(n*) SACCUS conf. u/t. p. 63.

(o) BARTHOLINI bish. 42. Centur. IV. SPINDELER obs. 10. RHODIUS obs. 44. Cent. II. Eph. Nat. Cur. Dec. I. ann. IX. X. obs. 61. Dec. II. ann. 2. obs. 48.

(p) SPINDELER obs. 29.

(q) Apud BALDUINUM RONSSEUM Eph. XL. RHOD L. II. obs. 42.

(r) Pistic. VI. icon. anatomica. p. 33.

(s) Iu co forte exemplo, iu quo pulsus in carpo nullus, in cubito fortis fuit Recherches sur le pouls p. 323.

obscurores : potest per vulnus tota ea arteria periisse (*u*) ; uti certe duobus in juvenibus vinculo ipse arteriam medicam intercipi jussi , cum chirurgi non alia ratione contumacem haemorrhagiam superare possent : potest contractior fuisse truncus , ut cordi angustia sua resisteret (*x*) , aut denique omnino densato sanguine repleta motum amississe , quale ego vitium in aorta & carotide reperi (*y*) . BONTIUS in vena cava vidit (*z*) . Aliquid ejusmodi subesse videtur in æstro , cujus sinistra manus absque pulsu calore & sensu fuit , & demum in gangrenam transit (*z**) . Sed de his vitiis , deque causis , quæ pulsuum in universum intercipiunt , alias rectius dicetur.

§. XIII. Pulsuum discrimina.

Pulsus frequens & celer.

Pulsus in universum mensura est virium , quas cor in promovendo sanguine impedit ; rariores enim exceptions hic omittimus , quæ faciunt , ut absque cordis vitio pulsus mutetur . Frequens adeo pulsus erit , quoties cor in dato tempore pluries contrahitur . Celer erit , quando cordis systole in quam minimo tempusculo absolvitur .

De celere pulsu & frequenti dubitatum est , num separari possint . Utique diversos esse , & antiqui auctores sunt (*a*) , & recentiores (*b*) , interque eos princeps Georgius Ernestus STAHL (*c*) . Sed etiam mihi manifesto differre videntur . Possunt perinde in minuto primo sexaginta pulsus esse , & tamen cordis systole in breviori tenipusculo absolviri , quam prius

(*a*) Hac conjectura olim STRUTHIUS prægrium funestum declinavit , quod a pulsu defectu medici sumferant L. c. p. 85.

(*b*) STRUTHIUS p. 85. Inde reparato per anastomoses sanguinis in arteriam incisam confluxu , pulsus aliquot a vulnera diebus restituatur Chirurg. Anweisung T. II. p. 800 &c.

(*c*) A contusione arteria compressa coaluit , ut pulsus nullus perciperetur MORAND Mem. de l'Acad. 1756. p. 327.

(*y*) Progr. ad disp. Cel. ZINNII inque opuscul. patolog. obs. 19. 20.

(*z*) L. c. non quidem inde mutato carpi pulsu.

(*z**) De HANX rat. med. T. III. p. 145. 147.

(*a*) GALEN. de different. puls. L. I. c. 7. PHILARETUS. &c.

(*b*) Thomas MORGAN phi. princip. of medicine p. 400. G. C. SCHLEHAMMER de pulsu p. 417. Barthol. de MOOR de methodo o docendi medicinam p. 18.

(*c*) In progr. de different. puls. celr. & frequantis in uoltrar. diff. T. II. recuso.

prius solebat, ut diastole longior sit. Id ita se habere posse ex animalium frigidorum, exque incubati pulli contemplatione liquet. Nam frigidorum (*d*) animalium pauci in minuto primo pulsus sunt, quod intervalla duorum pulsuum maxima sint, non quod adeo lente cor contrahatur. Ita etiam in pullo (*e*), qui ovo continetur, certus vidi, infrequentissimum equidem pulsus fuisse, ut in minuto horæ quatuor, duo, & denique unica cordis esset systole: & tamen singuli pulsus magna celeritate absolvebantur.

Id contra dederim Cl. viris, & contrariæ sententiae auctoriibus, *Friedricho Hofmann* (*f*), & *Archibaldo Pitcarne* (*g*), in homine fano, aut non insolitis ægritudinibus occupato, pulsum celerem difficulter a minus celeri distingui (*h*). Cum enim in unico primo horæ minuto arteria octogesies micet, & tempus, quo salit, vix sit temporis unici pulsus tertia, erit tempus systoles cordis $\frac{1}{15}$ minuti primi, sive tertiarum quindecim. Si his tertii una aut altera tertia acceperit, aut si vicissim decesserit, non facile satis in tactu subtilitatis, inque anima velocitatis erit, ut exile incrementum percipiat vel decrementum. Si tamen rarissimus in homine pulsus obtinuerit, non negaverim, facilius discrimen percipi, & distinxit certo *Stahlus*, ut longissimum inter omnes pulsum faceret febris quartanæ (*i*).

Iterum rationi consentire videtur plerumque celeritatem pulsus cum frequentia in homine conjungi, quamdui vires certe sufficiunt, ut idem pulsus una & celer sit, & frequens. A stimulo enim fortiori, & abundantiori, cor & celerius contrahitur, & una frequentius (*k*)

§. XIV. *Ejus pulsus causæ.*

Et frequentius cor contrahi & celerius intelligo, si stimuletur acrius; aut stimuli sit impatientius. Ergo pulsum frequentem facit, unaque procul dubio celerem, magis irritabilis cordis indoles, ex qua sit, ut ab unda sanguinis.

(*a*) Tarditas nempe in anguilla conf. *Stahlus de pulsu*. p. 16.

(*e*) *Mémoir sur la formation du cœur* T. II. p. 111.

(*f*) *M.-d. system* T. I. p. 113.

(*g*) *Elem. med. mathem.* p. 49.

(*b*) *Stahlus* l. c. p. 17.

(*i*) In motibus distinguui posse *Bellinus de urin. & pulsi*. p. 72.

(*k*) Hzc reciproca facit T. *Morgan* l. c. sed non persuaderet.

sanguinis minori recepta, cor tamen efficaciter, ob innatam quasi pruriginosam teneritudinem, ad contractionem sollicitetur. Hinc celerior pulsus nuper nati hominis (*l*), infantum (*m*), & juniorum animalium, & in universum animalium minoris molis (*n*), quibus uti tota corporis fabrica tenerior, & tenuiora nervorum involucra, ita sensus etiam anterior, & cordis musculi magis irritabiles sunt. Columbae pulsus sunt supra centum, cani 78 & ultra (*o*). Arietis 65 (*p*) Bovi 36 & 38. (*q*). Equo 34 (*r*), Elephanto paucissimi, cum ei animali longissimum respirationis stadium sit (*s*). Sed etiam cochlear adultæ (*t*), quam recens natæ, pauciores pulsationes sunt, plurimæ vero puncto salienti (*u*). Semibus pulsus rarissimi (*v*). Haec denique præcipua ratio fuerit, quare feminis, & vegeti ingeniis hominibus pulsum, etiam in recta valitudine, major sit frequentia. Ob eandem rationem opium pulsus minuere dicitur (*y*), sive intus sumptum fuerit (*z*), sive unice exterius cordi circumfusum (*a*).

Altera causa, quæ facit, ut cor frequentius contrahatur, abundantia est stimuli, cujus denovo varii fontes sunt. Simplicissimus est, qui a magno corde nascitur, magnum voco, quod pro reliqui corporis portione magnum est. Majus autem cor est non junioribus solum, & minoribus animalibus

(*l*) ROBINSON *Ephy* p. 136.

(*m*) STRUTHEUS p. 193. ROBINSON p. 134. LISTER *de humorib.* p. 33. RIVIN *de puls. cord.* Fr. BOISSIER *embryol.* p. 13. *classez morb.* p. 34.

(*n*) L. IV. p. 121. & L. VI. S. 3. n. 16.

(*o*) BRUNNE LANGRISH *Exper. cum aqua lauro-terrafi fact.* V. Omniaio 57. II ALES p. 38.

(*p*) HALS *hemost.* p. 27.

(*q*) SAUVAGES *d. la maladie des bœufs* p. 10. *Mém. de l'Acad. Roy. des Scienc.* 1748. p. 138.

(*r*) HALS *hemostat.* p. 2. & § 2. B. LANGRISH *Exp. IV.*

(*s*) GILLIUS *de elephanto* p. 502.

(*t*) BRADLEY *philos. account of the Works of nature* p. 129.

(*u*) FLOTER *physiolog.* p. 350. Pulsus numerat 134. Primitis diebus pulli cordis pulsus non potuit numerari.

(*x*) Ad 30. 40. SAUVAGES *respir. diff.* p. 5.

(*y*) Ad 20. intra minutum pulsus demit FLOTER p. 118.

(*z*) In cane pulsus redierunt ad 76 & 85 WHYTT *Edimb. Eff. nov.* T. II. p. 299. 300. cum in caveam abdominis opium injectum esset. Non recte vero cani pulsus tribuit 100. Denique, sed debilitate & jam mortenti animali pulsus fuerunt 7. cum in ventriculum opium injectum fuisset p. 281. Haec hoc loco non reflo, qui norim usum modicum opii pulsuum frequentiam augere. Ut que nimere dederim, quando cordis vires vehementius fregit. *M. sur les part sens.* T. IV. *réponse à M. WHYTT.*

(*a*) In rana pulsus inde 9 & 6 & p. 290. in alia 15. 9. & 2. p. 286. & in alia 17. p. 281.

būs, sed in primis in animalibus calidi sanguinis, quibus cētuplo (*b*), quam frigidi crux pīscibus, majorem rationem ad universum corpus habet. Pauci adeo animalibus frigidi sanguinis in eodem tempore pulsus sunt. In rana (*c*) & aquatica cochlea minori (*d*) circa sexaginta numerati sunt, totidem in aquatica cochlea (*e*); in anguilla 30 (*f*), in vipera ad 28 (*g*), in testudine terrestri tredecim (*h*), aut non multo plures. Ex sanguibus cor rarius pulsat (*i*). Contra calidis bestiis minoris molis cor magus, & in eadem magnitudine multo numerosiores pulsus sunt (*k*), hominique raro non ultra sexaginta. Nempe cor, pro vasorum, & reliqui corporis pōrtione grandius, plus sanguinis dato tempore ejicit, & plus, ex eadem pōrtione recipit, non editur, nisi recuperaret. Verum ut sanguinis cor subeuntis copia, ceteris æquilibus positis, ita stimulus in corde, & uti stimulus, ita contractio.

Sed etiam aliae causæ, quæcunque sanguinis cordi remissam copiam augent, ex omnibus pulsus faciunt frequentiores. Has inter motus musculorum est (*l*), deinde calor aeris, qui sanguinem etiam in experimentis movet (*m*), expandit, cordique ex valvularum natura suppeditat. Sic pediluvium (*n*), & balneum (*o*) pulsus accelerat, inque languentibus animalibus calor externus (*p*), quod quidem phænomenon in punto saliente, & incubato pullo (*q*) frequentissime vidi, aliisque ante me clari viri viderunt. Denique major respiratio, & ipsum suspirium, pulsus intendit (*q**).

Quare

(*b*) Conf. L. IV. p. 422.(*c*) Com. W Y T T I. C. p. 281. qui numerus mihi ingens videtur.(*d*) B A K E R employment p. 325.(*e*) IDEM ibid. Nam non supra 8. 12. & 20. facit. BRADLEY philos. account p. 129. & octo, in frigide H A N O W Seelenheiten p. 577.(*f*) Ut mihi videntur.(*g*) B. LANGRISH of muscular motion ad fin. nam Jobannes WOODWARD non supra 17. numeraverat, tunc aqua calida adfunderetur, ita numerus auctus est ad 32 supplement p. 82.(*h*) Aut paulo plures CALDESI p. 66. 240. In aquatica paulo frequentiores recensuit IDEM.(*i*) HARVEI p. 45.(*k*) Ut muri, columbz, aviculis aliis, quos ægre numeraveris.(*l*) n. 17.(*m*) Second Mem. sur le mouv. du sang Exp. 6. 7.(*n*) STAVENSON Essays of a Societ. at Edim. T. V. P. II. p. 871. Nempe a 66 lpsibus iad 58.(*o*) HEXEL betheida portugosa p. 126. 127. Mémoir. de l'Acad. 1752. p. 637. in calore equidem minuo.(*p*) L. IV. p. 437. W Y T T p. 350. B. LANGRISH musc. mot. ad fin. WOODWARD suppl. p. 82.(*q*) Mem. sur la formation du poulet T. II. p. 110.(*q**) Conf. HENSHAW arachalin. p. 75.

Quare, uti febris calorem in humano corpore excitat, ita vicissim calor febrem auget. Inde funestissimæ febres à calidis hypocautis, a velamentorum lectorumque calido operimento. Pulsus in somno frequentiores ad calorem recte refert *Brovne LANGRISH* (r), & ego olim retuli (s).

Cibus sumtus, chylum cordi submittit, pulsusque, non minima ratione, reddit frequentiorem (t).

Iterum omnia obstracula, quæ sanguinis per arterias liberum iter sufflant, cordis motum vehementer augment, quamdiu ejus organi vires valent. Vinculum aortæ injectum miram in corde conatum vehementiam excitat (u), quia sanguinem a venis accipit, neque potest edere, neque se liberare stimulo. Quod vinculum id polypus facit (x). Eadem ratio est eorum obstrucrorum (y), quæ, in febre, inque inflammatione subtiliora, sanguinis per minima iter morantur. Quoties nempe omnia plena sunt, & per arterias humoris vitalis circuitus absque mora expeditur, toties cor facile stimulo se liberat, & integre, ut perfectè vacuum longiori demum tempore denuo eam sanguinis copiam recipiat, quæ ad pulsus excitandum sufficit. Quoties vero per arteriam sanguis cessat exire, neque vires hactenus deficiunt, toties cor stimulum venosi crux retinet diutius, & malignius expedit, atque adeo celerius pulsat & violentius. Hæc est causa pulsus vehementis febrium inflammatoriarum, in quibus lympha ad cœti modum lentescit, neque per minima vasorum sanguis libere circumlit (y*).

Sunt qui hos cordis contra resistentiam objectam insurgentes conatus animæ tribuunt, quæ vires pro resistentia ratione intendat. Eos viros vellem in rana, capite destructo & spinali medulla distracta, aortam vinculo intercipere (y**), aut cor ipsum, cum vasibus ligatum de corde evellere, atque ejus cordis,

(r) *Modern practice* p. 273, a pulsibus 70, ad 80, ab 80 ad 95.

(s) *Comment. in prædict. Boerh.* T. IV. p. 506.

(t) *FLOTTER* p. 83. 84. *ROBINSON* p. 149. *G.v. SWIETEN* T. I. p. 680. Etiam lac a phthisicis epotuni pulsus accelerat.

(u) *L. IV.* p. 490.

(x) *Inde palpitatio BECK de puls. cord.*

(y) *SAUVAGE'S de inflammatis.* p. 278.

(y*) Ita crediderunt celeritatem sanguinis febrilis explicari posse, nou a diminuto vasorum liberorum numero, atque adeo sanguinis per pauciora libera necessario celeriori itinere.

(y**) *L. IV.* p. 470. not. k p. 471. not. t.

vi nervea destituti , animæque subtrahi imperio , motum speculari. Videbunt certe , ut ego vidi , perinde cor contra obstaculum niti , etiam si animæ consilium nullum nunc supereat.

Eadem fere debilitatis (z) est ratio , quæ obstaculi. Quando enim vires corporis universi fræctæ motui vitali perficiendo nunc impares succumbunt , utique cor nunc languidum minus recte se venoso sanguine liberat , hinc pluries ad eum sanguinem ejiciendum contrahit , eum vero , ut debile est , parum promovet. Hinc equæ debilis pulsuum numerus a 40 ad 100 in minuto primo adscendit (a). Hinc moribundis animalibus pulsus cum parvitate celer (b), & fere eundem numerum adtingit , qui in saliente puncto est , & quem intenta anima medici ægerime numerat , circa 140 (c) , in primo minuto.

Alia denique cau a cordis celerius & frequentius contracti latet in stimulo , sive nunc nervi a quacunque causa vehementer sollicitentur , sive sanguinis vis increverit , qua cor in motu ciet . Ergo ab affectibus animi , (d) ira , terrore & pudore , variisque passionibus pulsus acceleratur , ut etiam medici præsentia in tenerioribus feminis arterias frequentius cogat micare (e). Sic vehemens animi in difficultiori labore studium pulsum accelerat , caloremque & sudorem denique movet. Demum nullus fere major dolor (f) esse dicitur absque velociori pulsu , quæ ea spina est , non ignorata HELMONTIO (g). A dolore equæ pulsus a 36 ad 60 & demum ad 100 adscenderunt (h). Et alteri equo , libero pulsus in eodem semper primo minuto fuerunt 40 , continuo vero 65 , cum acrius torquereatur (i).

Ad stimulum calorem refero , qui a frictione oritur. Sed etiam electrici

(z) Robinson *Essays on animal econ.* T. II. p. 381. 383. Pulsus a debilitantibus medicamentis acceleratur SCHWENCKE p. 77. QUESNAY de la saignée ed. nov. p. 68. 69. olim GALENUS.

(a) HALS L. C. p. 1^o.

(b) Formicans FLOYER T. I. p. 312.

(c) FLOYER ibid.

(d) FLOYER p. 91.

(e) Recherches sur le pouls par rapport aux crises p. 65.

(f) A dolore pulsus ad 86. & 100. in minuto primo intenditur FLOYER T. I. p. 224.

(g) Blas humanum n. 28.

(h) HALS L. C. p. 2.

(i) Ibid. p. 12.

trici ignis excitatus torrens , pulsus non infrequenter acceleravit (*k*) , ad decem (*l*) , & duodecim (*m*) , & sedecim demum in minuto primo vices . Alias tamen nihil mutavit (*n*) .

Constantior in excitando celeriori pulsu vis est sanguinis , occulta certe , sed aliqua tamen ratione ita mutata , ut cor vehementius , quam sani hominis sanguis , sollicitet . Ejusmodi pulsus est , qui a pure sanguini commuto nascitur , in febre nempe hectica , qua non a pulmonis foliis vitio , sed perinde excitatur , sive hepar , sive ren , sive artus aliquis ulcere consumatur , uti quidem saepe , etiam in ossium remotorum artuum vitiis vidi .

Aliud exemplum est gangrenosæ febris , que per tristia exempla notissima , a cortice peruviano , ut aliae febres , saepe feliciter superatur . Quoties nempe putriduni liquamen , in cellulosa telam effulsum , venis hauritur uberior , utique pulsus cum debilitate citissimus , cumque tendinum tremore & desipientia levi conjunctus supervenit , a quo ad mortem brevissima via est .

Ejusdem generis ex febribus sunt , que a contagio manifesto acri pestis , variolarum (*o*) , dysenteriæ , accumbentis hominis phthisici (*p*) , carceris vaporibus fætidis pleni , stagni pleni (*q*) fædibus (*q**) , aperti sepulchri (*q***) , adeo frequentes nascuntur . Ejusdem deauro naturæ pulsus est catarior , qui a fermentatis liquoribus , alcoholæ gravibus (*r*) , & a calidis medicamentis nascitur : In cane , aqua laurocerasi pulsus a 78 ad 135 , in equo a 34 auxit ad 103 (*s*) . Sed etiam ab argenti vivi actione , dum saliva fluit , pulsus ad 120 & 130 incitatatur (*t*) .

Denique pulsus magnus una & celer (*u*) veram in sanguinis circuitu celeritatem demonstrat , nam multus sanguis quoque pulsu de corde expellitur , & fre-

I i 3

quentio-

(*k*) Septima , sexta , etiam quinta parte des *Hans de hemiplegia* . Etiam in paralytic Snaebeare princip. of practice T. II. p. 352.

(*l*) Ab 80 ad 90 JALLABERT p. 75. *Bina von elektrischen Wirkungen*

(*m*) A 72 ad 84. des *Hans de hemiplegia* p. 36. A 72 ad 84 STAUBELIN de *pulsu* p. 13.

(*n*) *Mém. de l'Acad. des Scienç*, 1749. p. 59.

(*o*) FLOTER p. 83.

(*p*) CERDAX *diseurs. physicomédic.*

(*q*) PRINGLE of jayl fevers & in *Phil. Transf.* vol. 48. De simili pestilente aere uosocomiorum BELLOST *Chirurg. de l'Hôpital*. p. 67.

(*q**) *Anonym. de febr. intermit.* p. 18.

(*q***) LABAT *opusc. d'Italie* T. IV. p. 93.

(*r*) FLOTER p. 83.

(*s*) B. LANGRISH *experiment.* IV. & V.

(*t*) GRAINGER *de pyrexia.*

(*u*) SAUVAGE *de infl.* p. 227. Frequenter & plenum nominat. Conf ROBINSON prop. 13.

quentiores undæ sunt. Cum parvitate conjuncta frequentia pulsus unice condit austum laborem demonstrat.

S. XV. *Pulsus rari & tardi cause.*

Facile intelligitur, hujus pulsus causas contrarias esse causis pulsus velocis: nempe cor minus irritabile, aut diminutum stimulum, a quo irritatur. Rarus ergo in universum pulsus senis (*x*), aut animalis vetuli, rarus animalis magni (*y*), rarus hominum, quos phlegmaticos vocamus, quibus cor minus irritabile, totaque nervorum universitas furda magis sit ad stimulos (*z*), rarior ab uso papayeris omniumque medicamentorum quæ nervorum tumultum sedant.

Deinde, per eadem, rarum pulsum esse adparet, quando minor copia sanguinis cordi remittiatur. Rarus ergo pulsus est animalibus frigidis (*a*), quibus cor parvum; rarus homini quiescenti, cuius neque mens curis agitat acribus, neque corpus muscularum motu exercetur.

Sed etiam frigus, quod motum in tota natura supprimit, de pulsuum frequentia demit: ad decem in minuto primo vices, ex Cl. viri experimento (*b*). Pauciores ergo pulsus hieme (*c*), animali hibernanti (*d*), homini frigidorem Europam incolenti (*e*). Rarior est etiam, quando a sanguine omnis vitiola acrimonia abest, quæ forte inter causas est, quare infantes & sepe & blandissime dormiant; senes somnum tristes & frustra sepe expectent avidi.

Iterum rarus pulsus est, quando quam minima in universa sanguinis via resistentia cordi oblitus. Nam perfectius cor depletur, adeoque intra brevius tempus tantumdem expellit sanguinis (*f*): ut omnino præter omne

(*x*) RIVIN de palp. cord. FLOYER p. 44. 185. SAUVAGES class. morbor. p. 34. de respir. difficult. p. 5. Recherches sur le pouls p. 5. 15. MARQUET p. 28. ad 30 & 24. quod fere incredibile.

(*y*) p. 249.

(*z*) FLOYER passim.

(*a*) p. 250.

(*b*) FLOYER T. I. L. I. p. 78. &c.

(*c*) RYX p. 270. 304. Rarus pulsus, hiemalis cochlear LISTER Exerc. Anat. II. p. 29.

(*d*) LYONNET I. C. HANOW I. C.

(*e*) LINGUST I. C. SCHWENKE.

(*f*) SAUVAGES de inflammatis p. 203.

experimentum a vasorum obstructione & a nata inde resistentia, & viscido sanguine pulsum retardari **BERLINUS** scripsit (*g*). Minus enim saepe embolum agitare oportet, quo magis expedite aqua de siphone prodit: pluresque non dubie ictus requiruntur, quam primum oportet obstructos, & valide elasticos tubos dilatare. Hinc sanissimo homini pulsus rarus, neque fere vitium in nimia raritate esse potest (*h*). Summum signum febris fideliter declinantis, pulsus est nunc rarius. Memini, qui tot febres continuas exanthematicas, aliasque, passus sim, quot vix quisquam aliis, etiam in vehementissima miliari, & in erysipelacea febre, cum in summo periculo vita mea versata fuisset, omnem me metum abjecisse, cum ad pulsus 180 in duobus minutis illa enormis pulsuum frequentia rediisset; neque unquam spem me fecellisse, quoties ad eam fere mensuram malum defebuerat.

Neque ego unquam aut in febrium intermittentium principio (*i*), aut in lentis (*k*), aut in acutis (*l*) febribus pulsum ad 90 descendisse vidi, cum etiam in intermissionibus tertianæ aliquanto frequentior sit, et si utique debiles & humiles pulsus fuisse viderim. Certe mecum in paroxysmis febrium intermittentium frigore celerem & parvum pulsum reperit **CL. olim BRYAN ROBINSON** (*m*), & nuper **ILL. de HAEN** (*m**), inque ipso paroxysmo pulsus 100 ad 120 **FLORENS** (*n*). Quare pulsus febrium malignarum (*o*) tardos, aliosque ejus generis experimenta aut absque horologio, aut ad hypothesis facta esse crediderim, aut peculiare aliquod pulmonis vitium cum febre conjunctum pulsum retardasse. Sed neque alias epidemicas, & deterioris ingenii febres vidi, in quibus pulsus neque robore suo a naturæ modo dissentit, neque celeritate (*p*).

Quoties

(*g*) **STEHELIN** I. c. p. 13.

(*b*) *De pulsu &c. urin.* p. 72. **SCHELHAMMER** *de pulsu* p. 46.

(*i*) **HELMONT** *blat. human.* n. 28. **B. LANGRISH** *modern practice* p. 216.

(*k*) In febre lenta adeo rarus pulsus, ut duodecim primos numeros inter duos pulsus pronunciare **RUMLER** *obs.* 46.

(*l*) **B. LANGRISH** p. 48.

(*m*) *Essay on animal econ.* T. II. p. 387.

(*m**) *Celer & parvus I. c. T. II.* p. 164. Non recte tardum fecerat **BERGER** *lasc. febr. merito suspect.* n. 29.

(*n*) p. 43.

(*o*) *Recherches sur le pouls* p. 309. Pulsus rariorem fuisse quam in homine fano solet.

(*p*) **P. ALPINUS** *de febribus pestilentibus Alexandriæ graffantibus de medic. egypt.* L. I. c. 14. **RYE** I. c. p. 6. **RUSSELL** *de febribus Alepicis natural. hist. of Aleppo* p. 209. 230. **MASSA** *de febr. pestilent.*

Quoties nempe pulmo quacunque de causa, a polypo, glandulis scirrhosis, spasmo forte nerveo impeditur, neque sanguis expedite a dextro ventriculo in sinistrum venit, neque interim magnus & febrilis conatus sanguinem per pulmones urget, tunc utique pulsus cum vitio rarus erit. Neque enim arteria sanguinem accipiet, neque medici dğitus ejus dilatationem in carpo sentiet, quando ad aortam sanguinis parcius copia venit: non veniet autem, nisi per pulmonem ad sinistras corporis caveas via patebit. Ergo anhelosis pulsus rarus (*q*) ut in amplissimo fene, vehementis in asthmatis paroxysmo, non dudum vidi. Homini, cui sanguis crassiſſimus continuo cogebatur, quamprimum ex vena fluxerat, & in cuius cadavere auriculae sinistre aucta erat cavitas, pulsus, dum vixit, fuerunt a 23 ad 35 (*r*), quo numero nunquam minorem aut vidi, aut usquam legi.

Major & vitiosa una raritas in pulsu est, quae intermissione dicitur, & cujus par omnino causa est, sanguinis nempe etiam parcius in aorta penus, quam in raro pulsu fuit. Ego in asthmaticis, & in peripneumonicis (*s*), & in anhelosis quidem hactenus cum minori periculo pulsus intermitit, ut medelam a vena incisa id malum accipiat (*t*) quod maximum terrorem incutiebat. Ita ab osse diaphragmatis centro pulsus intermittens ortum duxit (*u*): & a polypo, qui magnam arteriam obturaverat (*x*), & a valvulis aortae ostio præpositis (*y*), quae osseam naturam induerant, ut & in aortam parcius sanguis veniret, & in cor ipsum congeretur redire, & a gibbo pulmonis libertatem minuente (*y**). In senio, ab aorta forte dilatata & cartilaginea, pulsus intermitens (*z*).

Deterior causa est, quae a corde debilitato provenit, quod parvum stimulum non percipit. Ita in pessimis febribus, vitalem vim penitus frangentibus, pulsus ita penitus intermitit, ut pene nullus superfit, qualia in

(*q*) *Zecchini confil. medic.* p. 181.

(*r*) *Henckel IV. Samlung* p. 46.

(*s*) Spec, & olimis frequenter vidi. In pleuride *Eph. Nat. Carr. Dec.* I. *cum. 2. obs.* 237.

(*t*) *Conf. BARTROLINI bijt. 42. Cent. IV.*

(*u*) *Journ. des Savans* 1751. M. Sept.

(*x*) *KLAUNIG Noficoni. obs. 4.* Frequenter hanc pulsus intermitentis causam esse *MAUCHART de pulsu crepit.* n. 21.

(*y*) *COWPER philos. transf.* n. 299. *LUDWIG patholog.* p. 135.

(*y**) *LUDWIG ibid.*

(*z*) *Phil. Transf.* n. 405. in homine 130 annorum.

in febre (*a*), inque peste (*b*) exempla exstant, in his hominibus, quos natura morti destinaverat. Ita certe periculosis is pulsus est, ut etiam quando unicus inter quadraginta pulsus deficit, hominem non ultra menses totidem vitalem supereret, Chinenses (*c*) inter firma præfigia receperint; proximam vero mortem instare moneant, quando ex septem pulsibus unus desideratur. Denique mors in animalibus plerumque post pulsum intermittentem longisque intervallis redeuntem (*d*) fere supervenit, ut paulatim auctis intervallis, denique integro in primo minuto unicus pulsus percipiatur. Eo in rerum statu animalis tanta est debilitas, ut cor non nisi ad majorem stimulum contractionem perficere valeat, cum præterea sanguis ad auriculam dextram redire cesset, neque adeo cordis vires eo gradu sollicitentur, qui ad contractionem efficiendam requiritur. Quare tarde, & post multum tempus, tantum denum sanguinis ad cordis dextra atria venit, quantum pro legitimo stimulo sufficit.

Ad debilitatem pertinet, si quid serii est in *Francisci SOLANI* prædictione, qui a pulsu intermitente instantem diarrhaem præfigiri docuit (*e*).

Denique, etiam ante mortem pulsus omnino nullus percipitur, quando vires cordis sanguini ad remotiores aortæ ramos propellendo non sufficiunt, solamque partem magna arteriæ replent, qua cordi proxima continuatur (*f*). Inde ille notissimus pallor, qui paulo ante mortem supervenit, funestumque frigus. Ita in animalibus factum vidi, ita fit in paralyticis (*g*), hemiplegicis (*h*) debilitibusque (*i*) mortalibus, aque eo statu mors proxime distat. Aliqua debilitas pulsum celerem & debilem reddit, maxima omnino suspendit & intercipit. Hæc causa est mortis falso creditæ, ex qua homines subinde excitantur, quæ laus *ASCLEPIADI*, & nuper *Cl. BOYER* (*k*) & eruditissimo gallorum *Camillo FALCONET* (*l*) ac-

(*a*) *FRANK de alleluia* p. 251. Ad quartam horæ partem addit intervallum fuisse. De febre maligna *Aleppica Russæ* p. 209.

(*b*) *STRUTHIUS* p. 302. 303. *MASSA de febrib. pestilent.*

(*c*) Apud *du HALDE* in *Chinez descriptione*. Pulsus cum debilitate & inanitate intermitens periculo plenus, & *Recherches sur le pouls* p. 354.

(*d*) De pullo incubato *Mem. sur la form. du pouls* T. II. p. 110. 111. De aliis animalibus L. IV. p. 424.

(*e*) Ex edit. *NIHELI* conf. p. 56.

(*f*) Conf. p. 240. 241.

(*g*) *RHOD. obf.* 43. Cent. II.

(*h*) *Epb. Nat. Cur. Vol. VII. obf.* 18.

(*i*) *MARQUET* p. 34. per 24 horas.

(*k*) *BRUNIER* T. II. p. 87.

Haller Physiolog. Tom. II.

(l) accidit , d'inde Cl. FOTHERGILL (l*) & Josepho RAULIN (l**). Mortui enim videbantur , quibus arteria solita deficerat Est tamen ut ab'que tanta debilitate , unice occupato aorte olio , aut impervio corde , aut pulmone impedito , pulsus in carpo nullus percipiatur. Ita ab angusto corde frigus perpetuum , pulsusque omnino nullus fuit (m). A phthisi cum thoracis hydrope conjuncta , quatuor integris ante mortem mensibus asphyxia (n) , & ab hydrope solo , in alio exemplo (o). Quadragesimo ante mortem die pulsus infanti defuit , cui pulmo vomicis plenus erat (p). Ab aneurysmate aorte maximo , carneque pleno pene tendinea , pulsus lateris alterius pene nullus (q). In ictericu , cui pulsus fere defecserat , polypus in corde coactusque sanguis erat (r). Cum ventriculus cordis adipe quasi repleretur , asphyxia aliquot dierum ante mortem praecessit (r*). Quoties vero in altero latere pulsus intermittebat (s) , superstos in altero , arteriam ejus loci solam laborare necesse est. Quibus absque morbo utrinque pulsus deficit (t) , vitium in arteriis aliquod osseumque naturam esse crediderim , que diu absque conspicuis functionum naturallium vitiis toleratur.

§. XVI. Pulsuum numerus pro diversa etate.

Cum in omni rerum naturalium historia utile sit measuras definire & numeros , hic in signo adeo gravi , adeo perpetui usus , & primario omnis prognoseos fundamento , utilissimum fuerit accuratius , perque numeros , determinasse , quis sit sano homini pulsus , quis febrenti , ut distantia a valetudine integra , adque eam reditus ad certiore rationem definitur. Facile intelligo , latitudinem aliquam his in rebus esse , neque omnium ejusdem etatis hominum , neque in eodem morbo diversarum personarum eosdem

(l) IDEM p. 72. T. II. ed. nov. cum FALCONETI tr. de febres p. 59.

(l*) Phil. Transf. n. 475. n. XI.

(l**) Malad. vapor. p. 9. Conf. Journal de Med. 1758. nov.

(m) Hist. de l'Acad. Roy. de Scien. 1748. p. 61

(n) BARTHOLIN Cent. II. hist. 7. Simile exemplum est in Hist. de l'Acad. 1753. p. 130.

(o) Cl. vir. Lona & MONROO Alexandri f. on dropfy p. 99.

(p) SPINDLER obs. 29.

(q) MARCOT Mem. de l'Acad. des Scien. 1724.

(r) VALISNER oper. omni. T. III. p. 198.

(r*) WELSCH Epigr. obs. 34. RIO LAN animadoveri. ad C. BAURIN. p. 704.

(s) Recherches sur le peau's p. 318. 319.

(t) MAUCHART I. c. n. 19.

dem pulsuum esse numeros. Sed proprius tamen ad mensuram veri accedit, quicunque numeros exprimit, & terminum certe figit, quem ultiro citroque natura modice discurrat, nunquam tamen longissime evagetur.

Primus, ni fallor, vir ad inveniendum verum natus, KEPLERUS (*u*) pulsuum in dato tempore numerum definire suscepit, nam cardinalis CUSANI pulsuum ad clepsydram enumeratio, nunquam ad ipsum opus perducta fuit. Inde proprio libro Johannes FLOYER (*y*) uberioris pro hominum morborumque varietate pulsuum numeros & rationes descriptis, deinde Vir Cl. Thomas SCHWENKE (*z*), Bryan ROBINSON (*a*) & Cl. RYSE (*b*). Sed etiam ego in proprio corpore, & familiarium meorum carpo, ad horologium secunda minuta indicaturum, numerosissima in numerandis pulsibus experimenta feci (*c*). Nuper Cl. Franciscus de SAUVAGES pendulum cum pulsu carpi isochronum pro pulsilogio proposuit (*d*).

Ut a prima origine animal repetam, puncti salientis pulsus adeo numerosos inveni, ut vocum pronunciatione nequiverim adsequi: quandiu nempe suum animalculo robur, & nativus calor inest. Qui in minuto primo numeravit 134 (*e*) pulsus Cl. FLOYER, mihi potius intra verum substituisse videtur, cum etiam octavo a partu die majorem in homine numerum alias Cl. BRITANNUS recenseat.

Noviter nascenti homini parem 134 pulsuum numerum idem tribuit Cl. FLOYER (*f*), BRYANUS vero, eo, quem excitavi loco, post octo a partu dies, omnino 150 (*g*): quem quidem numerum ego nunquam inire, neque ultra 140 progredi potui.

Uti pulli ovo erupti pulsus continuo vehementer decrescit (*h*), ita hominis in lucem editi: Trimestri puero, in eodem semper minuto primo, pulsus fuerunt 120 (*i*). Quinto anno sextoque pulsus numeravit

K k 2

105

(*u*) *Astronom.* L. III. p. 111.

(*y*) *The physician's pulse-watch.*

(*z*) *In hematology.*

(*a*) *Essay on animal economy.*

(*b*) *In medicina statica britannica*, post ROGERI historiam morborum epidemicorum hibernar., edita Dublini 1734.

(*c*) Aliqua tetigi in *Memoires sur le mouvement du sang* p. 36 seqq.

(*d*) *Theor. pulsus* p. 31.

(*e*) *T. II.* p. 350.

(*f*) *Ibid.*

(*g*) *Essay* p. 134.

(*h*) Ad 60 pulsus FLOYER loc. modo cit.

(*i*) *SAUVAGES Embryolog.* p. 13.

105 & 106 idem, quem saepe laudabo, *Johannes FLOVER* (k).

. Septimo anno pulsus 90, decimo quarto 80 fecit *Franciscus BOSISTER* (l). Anno undecimo, in pueru vigilante inter 90 & 100 pulsus numerat Cl. olim *HAMBERGERUS* (m), & 92 in puella 15 annorum *Johannes FLOVER* (n). Nempe in universum intra pubertatem numerus pulsuum major est.

Adulto homini pauciores, quam pueru, & infanti pulsus sunt, varietatem facit sexus, anni tempus, regio, temperamentum. Eam varietatem inter 60 & 80 crediderim contineri, neque infra sexaginta pulsus facile admirerem, neque, in sano homine, & quiescente, multum ad 80 adderem. Qui scriptores 60 (o) & pauciores, quam 60 pulsus numerantur, in phlegmaticum hominem incidisse videntur, aut rariorem aliquam corporis humani fabricam. Eo refero Ill. virum *Thomam SCHWENKE*, qui viro 45 annorum pro matutini pulsus numero adsignat 55 ad 60 (p): & *Bryan ROBINSON*, qui pulsus matutinos 54 numerat (q), & magis etiam Cl. RYE (r), qui non excedit, etiam matutino tempore, pulsus 45. Sed neque naturae ubertati respondet F.N. MARQUET, qui 80 infanti pulsus, 60 adulto adsignat (s), aut *GUIDOTUS* (t), qui pro summa mensura intra horam 3300 pulsus, in primo adeo minuto 65 ponit, aut *WALEUS* (u), qui 3200 facit; neque *Guilielmi COKBURNE* (x) pulsus in febre 37. 40 & 50 recte numerati esse videntur, facile enim, nisi penduli secunda minuta vibrantis oscillationes sequaris, vulgare ad horologium in numerando erratur. Dudum numerum 60 pulsuum rarum esse *KEPLERUS* monuit (y), deinde *FLOVERUS* (z), qui vix unquam minorem vidit.

Propius

(k) l. c.

(l) In *Stephani HAZES hemostatis* p. 3.

(m) *Physiolog. med.* p. 686.

(n) *Pulse-watch.*

(o) Eo numero, ut faciliori, & secundis minutis æquali solebat *BOERNIA AVVIUS* uti.

(p) l. c. p. 40.

(q) *Of food and discharges* p. 6.

(r) l. c.

(s) p. 21.

(t) In *prolegomenis ad THERAPEUTICUM de urinis* p. 38.

(u) Apud *DRAKONIUM de circul. faung. tibes.* I.

(x) *On sua discesser* p. 53. 161. 181.

(y) l. c.

(z) p. 74-316. T. I. L. I.

Propius ad verum ipse KEPLERUS accessit, qui pulsuum in minuto primo numerum ad 70 (a) aestimavit. Eundem in adulto homine numerum recipit Franciscus BOISSIER (b) & in trigenario alibi, ut sub vergentem etatem seniique principia minuantur. Eundem pro Anglia numerum FLOYERUS adoptat (c), & pro aestivis mensibus Cl. RYE (d). Pulsus suos facit 72 Antonius v. LEEUWENHOECK (e). Pulsus 74 fuerunt ROLFIKIO (f), & a 74 ad 90 aestivo sub sole FLOYERO (g). Olim Thomas MORGAN (h) a 70 ad 80 recensuit, Stephanus HALES in calido juvene 75 (i). Jacobus KAIL (k), Guil. CHESELDEN (l), & J. TABOR (m) octoginta numerant, HAMBERGERUS (n) 84, Vopiscus Fortunatus PLEMP in proprio carpo omnino 86 (o).

Ego quidem ab anno etatis 45 ad quinquagesimum, quo haec ipsa recolo, raro infra 78 numeravi.

Senibus pulsus ratiore esse, quam adultis, jam monuimus (p), & rario eorum, quos natura ad longevitatem (q) preparavit. Etiam hic tamen multum temperamentum potest. In sene, sed phlegmatico, pulsus 50 reperit Guernerus ROLFIK (r). Ad 55 in universum in ea etate aestimat Johannes FLOYERUS (s), ad 60 Franciscus BOISSIER (t). Sed anno etatis 72 non pauciores 65 pulsibus habuit Bryan ROBINSON (u). In centum annorum sene pulsus 30 & 40 fuerunt

K k 3

(a) l. c.

(b) In *bemalatikis* p. 11. & *claff. morbor.* p. 34.(c) PULSEWATCH. p. 44. *medicin. gerocom.* p. 10.

(d) l. c. p. 270.

(e) T. II. oper. p. 195.

(f) *De corde* p. 85.(g) *Gerocom.* p. 111.(h) *Philos. princip.* p. 199.(i) *Hamaflaritki* p. 39.(k) *Anatom. abridgment* p. 138, 139.(l) *Anat. of human body* Ed VI. p. 206..(m) In *Exercit. Med.*(n) *Physiol. med.*(o) *Fundament. med.* p. 115.(p) *Recherches sur le pouls.*

(q) FLOYER I. c. p. 185.

(r) Ad 3010 in hora l. c.

(s) *Pulsewatch.* p. 44. Alibi ad 75 admittit *Gerocom.* p. 112.(t) Ab anno retro quinquagesimo, in *bemalat.* p. 3. *claff. morbor.* p. 34.(u) *Essay on animal economy* p. 134.

runt (*x*) , & 30 , atque 24 , si alteri auctori fides habetur (*y*).

Temperamenti magna ad pulsuum mutandum potestas est , & rectius quidem diceremus , cor aliter & aliter magnum , robustum , irritabile , & temperamenta diversa facere , & alios pulsuum numeros . In amico meæ ætatis , sed phlegmaticie magis temperiei , pulsus reperi 66 ad 68 . Infra 70 in ea hominum classe subsistere FLOVERUS (*z*) auctor est . Atrabilariis , sed rari generis hominibus , idem a 55 ad 60 pulsuum numerum deprimi , IDEM reperit (*a*) . Contra cholericis octoginta pulsus olim KEPLERUS tribuit (*b*) & circa eum numerum FLOVERUS (*c*) : ab 80 vero ad 90 in cholericis , etiam sene , recensuit IDEM Cl. RYE (*d*) . Eadem ex ratione carnivoris animalibus pulsus numerosi . Cani sunt ad 97 . Arieti non supra 65 (*e*) .

Sexui feminino natura irritabilis pulsuum facit frequentiorem , quem ad 80 sagax dudum KEPLERUS aestimavit .

Proceris hominibus III Archiatrorum comes (*f*) pulsuum ratiorem adsignat , tabulamque addit , in qua homini duobus pedibus non longiori pulsus 90 , homini quatuor pedes alto pulsus 80 , homini quinque pedum pulsus 70 , homini sex pedum pulsus 60 tribuit , rurumque procerorum mortalium pulsuum exemplo centum custodum regii corporis confirmat , quos vulgo helvetios vocant . Ego quidem , sepedalis homo , pulsus aliquanto plures numero , inque aliis , & frequentibus amicis proceri habitus , pulsus numerosiores reperi . Helvetia enim gens est ex procerissimis , & inter Helvetios Bernenses cives statura fere imminent . Multa vero sunt , præter statu ram , quæ pulsus frequentiam definiunt : et si in universum majora animalia consentiunt .

§. XVII. *A somno , a vigilia , a pastu , a motu.*

Porro idem homo , uti aut vigilat , aut dormit , aut otia tur , aut corpus exercet , variisque vitæ humanae muneribus fungitur , aut obedit necessitatibus , ita alium & alium pulsuum medico ostendit . Ergo matutino tempore ,

(*x*) SAUVAGESS de respir. diff. il. p. 5.

(*y*) MARQUET p. 18. addit soporosos interisse.

(*z*) p. 44. 316. &c.c..

(*a*) Ibid.

(*b*) l. c.

(*c*) l. c.

(*d*) l. c.

(*e*) HALLES hemastus. p. 27. 33.

(*f*) Tr. du cœur. T. II. p. 214.

pore, quando a salubri somno expergiscimus, & primus ille ab operimentis natus, nimiusque calor diffisiens est, pulsus in dato tempore omnium paucissimi solent esse. Consentunt hic Cl. KYE (g), & Thome SCHWENKE (h) viri Ill. & mea experimenta.

Sed etiam *Bryanus ROBINSON* de pulsuum ad gustationem usque raritate consentit (i), in aliis a nobis diversus, & *SENAKUS* (k).

Paulatim vigilanti, pulsuum numerus crescit, ut sub noctis initium numerosiores sint (l), & octo vel decem in minuto primo pulsus ad censem pulsuum diurnorum addantur. Nam vigilanti homini cibus, & muscularum motus, & animi studium aut affectus pulsus augent, quæ omnia a dormiente homine absunt, cui unice a corde totus sanguinis in circulum motus pendet.

Ex hac vespertini pulsus frequentia (l*) intelligitur, quare in omnibus febribus continuis, lenti perinde & acutis, sub noctem gravior redeat exacerbatio, ut omnino vix unquam in Europa, etiam per biduum febris aliqua vere continuum ita typum servet, ut ne matutinis remissionibus, & incalescentia vespertina interpoletur. Nempe pulsus centum febrem faciunt mediocrem, & tolerabilem: si vero ad eum numerum decem alii acescereint, qui etiam sano in homine per vigiliam nascuntur, erunt nunc 110 pulsus, & intensior febris. Si vero ad gravem 120 pulsuum febrem decem alios addideris, gravissimum certe morbum facies, nam cum 130 pulsibus febris acutissima erit, & ni remittat, ægre tolerari poterit.

Uti vigilie pulsuum numerum augent, ita minuit somnus, dum calorem, & pulsuum adeo aliquam accelerationem a somni efficacia separaveris, quæ certe non somni, sed vestium & plumarum super diurna velamenta injectarum effectus est, cum iisdem enim vestibus dormiens, quæ vigilanti sufficiebant, certo frigebit: aut demum profundioris & morboſi somni pulsuum excluderis, qui cum calore, sed morboſi conjungitur (l**). Ergo dormitanti pulsus tardior (l***). Homini sano decena pulsus in somno decedere

(g) I. c.

(h) I. c. p. 41. Non adeo numerum pulsuum adeo exiguum reperio, ac quidem vir Cl. qui expergienti 55 & 60 pulsus numerat.

(i) I. c. p. 149. Sed valde raro mane facit *IDZM* of food and discharge p. 6.

(k) T. II. p. 215.

(l) SCHWENKE p. 96.

(l*) Octo pulsus hora 10 & 11 noctis noviter accedere SCHWENKE.

(l**) TRALLE斯 de opio p. 150.

(l***) IDZM ibid.

dere HAMBERGERUS (*m*) auctor est, & in morbo, diurno somno pulsus ad sexaginta redierunt, demumque in montano mure, alisque se in hibernacula abdentibus animalibus, pulsus fere evanescit (*n*).

Cibus pulsuū numerum auget, etiam gustatio, sed prandium magis, etiam ad tres quatuorve horas (*o*). Augmentum 4. 5. pulsuū reperit Johannes FLOYER (*p*), & denique 13 in primo horæ minuto (*q*). Cl. SCHWENKE idem incrementum ad 8 & 14 estimat (*r*). Mihi sano non adeo grande, sed convalescenti, & debili decem aut 12 pulsuū accessione fuit. Haec febris a prandio Gerardi v. SWIETEN (*s*). Sed etiam nuperus scriptor, non frequentem unice a pastu pulsum fieri auctor fuit, verum duriorem etiam & angustiorem (*t*).

Facile intelligitur, majus incrementum fore, si cibi copia major adsumpta fuerit (*u*). Deinde a potu fermentato, inter prandium admisso, pulsuū 16 & 20 accessionem FLOVERUS vidit (*x*).

Jejunium, per eadem, pulsum minuit (*y*). Hinc continuo ante prandium pulsus tardior, & debilior, & frigoris facilior sensus (*z*): a pastu incalescimus.

Quando ciborum digestio absoluta est, quarta fere a prandio hora, pulsuū frequentia evanuit, & prior rediit tarditas (*a*).

Repetenda erunt aliqua, quæ de motus muscularis in pulsu augendo efficacia adtulimus, sed accuratius paulo numeros definiemus augmenti. A sola extensione crurum & manuum viginti omnino pulsus in minuto primo, ad priorem numerum accesserunt, in Bryani ROBINSON experimento (*b*). A corporis exercitatione 17 pulsuū incrementum FLOVERUS vidit, & ab ambulatione pulsus a 70 ad 90 & 112 increvisse (*c*), in

puella

(*m*) *Physiolog.* p. 686.

(*n*) *In berigt van de statwyckische staapziekte.*

(*o*) FLOYER p. 84. SCHWENKE T. II. p. 115. ROBINSON *Essay* p. 149.

(*p*) *Pulswatch.* p. 83.

(*q*) Ibid. p. 156.

(*r*) p. 40.

(*s*) *Comment.* T. I. p. 680.

(*t*) *Recherches sur le pouls* p. 453.

(*u*) ROBINSON T. II. p. 419.

(*x*) p. 83.

(*y*) Pulsus ad 61 reducit FLOYER ibid.

(*z*) ROBINSON *Essay* p. 149. SCHWENKE p. 41. *Dictionnaire des morts subites* p. 113.

(*a*) FLOYER p. 83.

(*b*) *Essay* p. 150.

(*c*) p. 86. 87.

puella vero a 75 ad 110 (d). Hinc ambulando incalescimus, & aeris frigus facile superamus. A cursu, saltu, & vehementiori quocunque corporis motu, uti eadem debilitatio, & calor, rubor, sudor, acrimonia humorum non minor nascitur, quam in vehementer febre, ita pulsuum eadem obtinetur frequentia ad 130 & 140 (e) demum in primo minuto pulsus. Contra, equitatio, in qua musculi parum laborant, pulsuum parum auget, neque corpus calefacit (f). Facile vero intelligitur, pulsuum a motu muscularum eo potentius augeri, quo corporis moles gravior, motus celerior, & denique magis insolens fuerit.

Iram dixi, quae motum corporis facere. Ab ea pulsus 108 (g). Sed absque pabulo ignis, redditu animo quiete, etiam absque vestigio descrivet.

§. XVIII. *A cæli varicitate, morbo.*

Æstate (h), & circa æquatorem, pulsus frequentiores sunt, ad 120 usque. In calida parte orientis pulsus in minuto primo vulgo sunt 100 (i). In Jamaicæ insulæ incolis perpetuus sudor regnat, neque nitidissima virgo tangi potest, quin lento glutine manus inviscetur.

Cum cæli calore pulsuum frequentia minuitur, ut pulsus calidioris Hibernæ, qui æstate & ad septembrem usque mensem fuerunt fere 70, nunc octobri mense ad 65 (k), novembri & decembri ad 60 redeant (l). Aer frigidus pulsus decem in minuto primo subtrahit, & cochleæ pulsus adeo paucos (m) facit, ut non supra unicum in octo secundis minutis numeret. A frigore nempe, sanguinis, ut cujuscunque alterius liquoris, motus diminuitur.

In morbis omnibus, qui febrem conjunctam habent, pulsus acceleratur, tum

(d) p. 87.

(e) SCHWENKE p. 32. 41. Ad 150. si fides BRYAN ROBINSON p. 150.

(f) FLOYER p. 87.

(g) FLOYER p. 91.

(h) FLOYER T. L. T. I. RYR L. C. p. 170. 304. De infectis Cl. LYONNET theol. des infidèles p. 134.

(i) LINGUET in diss. Ergo animantium motus est ab aere Paris. 1731. Auctorem experimentum citat CL. BERNIER.

(k) RYR p. 270.

(l) IDEM ibid.

(m) HANOW Selteneit p. 577.

tum a nonnullis doloribus. Nam in colico morbo, etiam absque febre, pulsus fuerunt 100 (*n*), & in doloribus paroxysmorum puluis continuo & plenitudinē crescit, & celeritate. In catarrolo levissima nempe febre, centum pulsus numerat *Johannes FLOVER* (*o*), eunque numerum & in febre intermittente confirmavit (*p*), & in universum pro febris termino habet. In paroxysmo febris intermittentis, in angina, & hectica febre *IDEM* pulsus numerat 120 (*q*). Totidem in febre *BECKETUS* (*r*) & *MURALTUS* (*s*). Ego diebus liberis febris tertianæ, & in proprio corpore, in que aliis, minus irritabilis indolis, reperi pulsus fere 94. Centum pulsus pro lenioris febris termino habeo. In catarrolo febricula ad 108 & 113 adscendit: in febre quotidiana ad 114. in febre continua gravi, quo tempore remittit, 124. in vehementiori exacerbatione, & tamen nondum summa, 134. tantumdem in paroxysmo febris tertianæ, & ad 140 in summa exacerbatione febris erysipelaceæ, qua tamen non funesta fuit. Centum & quinquaginta in febre, satis gravi, eruptoria variolarum, puella in quadrienni numeratos fuisse video (*t*). Euni numerum nunquam reperi, minus etiam pulsus 300, quos febri lethiferae video adsignari (*u*).

Quare observationes meæ, saepè accurate iteratae, magis cum numeris *Bryan ROBINSON* (*x*), quam cum *Jeremie WAINWRIGHT* (*y*), aut *Johannis FLOVER* tabulis convenienter: quorum iste (*z*) quidem negat se supra 120 pulsus unquam observasse, & alibi 130 pulsus pro termino ultinio celeritatis habet: pulsusque demum 140 in moribundis numerat (*a*). Verum ego in tertiana validi juvenis

(*n*) p. 224.

(*o*) p. 224. Centum in principio febris biliosa Clar. *TISSOT* in egregio libro de febre biliosa *Laucaenensis* p. 9. Centum in febre eruptoria variolarum inoculataum *Journ. de Med.* 1757. sept. Nimiris paucos facit pro febris principio *F. N. MARQUET* p. 26. qui primus gradus febris 75, secundo denaria 100 tribuit.

(*p*) p. 37. 42.

(*q*) p. 43. 115. 224.

(*r*) *Offic.* p. 183.

(*s*) *Vademec. anat.* p. 139.

(*t*) *Journ. de Med.* L. c. 1757. sept.

(*u*) *MARQUET* p. 27.

(*x*) L. c. p. 107.

(*y*) *Off. fevers.*

(*z*) p. 72.

(*a*) Hic quidem rectius p. 311.

venis facillime sanabili 134 pulsus numeravi, & aliquot ultra, ut tangens medicus numerum intire nequirit, in me ipso memini fuisse, in gravissima quidem, quæ tamen haud ultra duodecim inde horis subito ad 90 pulsus relapsa est.

Eum numerum fidax remissionis terminum esse reperi, (*a**) Inde ad 80 & ad nativum numerum pulsus redit (*b*). In eruptoria febre jam excitata, uti febris a 110 ad 120. 130. 150 excrevit, ita ad 120. 110. 70. 60. redit, cum deferibusset (*c*).

Etiam animalium pulsus in febre increbescunt, ut in vaccarum iuc a 35 ad 50 (*d*), & a 38 ad 50 (*e*) numerus in primo minuto adscenderit.

Non impossibile videtur, in ejusdem hominis duobus artubus non eadem pulsus esse adfectiones (*f*), ut in parte inflamata, inque artu podagrico (*g*) aliter quam in carpo pulsus se habeat, & in humorum ad caput confluxu (*h*) arteria pedum coarctatae aliter, quam carotides, pulsus exhibeant. In vivis enim animalibus frequentissime vidi (*i*), sanguinem in aliqua corporis regione aut lente fluxisse, aut omnino quietuisse, dum alibi alacriter in circulum pergebat ire.

Pulsuum numerum ad respirationem numerum subtiliter Chinenses medici comparant, de qua ratione alibi dicam satis; facile datus interim **Celsi** (*r*) auctoritati, pulsus a causis variabilem, non solum pro prognostico sufficere, neque unicum tactum rarumve sufficere, ut veras inde cordis vires definiamus, & denique decem (*s*) in minuto primo pulsuum incrementum absque magno aliquo malo supervenire posse.

L 2

§. XIX.

(*a**) p. 255.

(*b*) *Journ. de Med.* I. c.

(*c*) *MARQUET* p. 27. in febre quidem suresta.

(*d*) *COURTIERON* mens. de l'Acad. des Scienc. 1748. p. 238.

(*e*) *SAUVAGES de la maladie des bœufs* p. 10.

(*f*) *Recherches sur le pouls* p. 315. 316. 320. 321. 322. *PECHLIN* obf. 2. I. 5. *HOFMAN med. System.* p. 115. *ALBERTINI* Comm. Acad. Bonon. T. I. p. 387.

(*g*) In pleuride du *BORDEU* p. 320.

(*b*) p. 227.

(*i*) *Second Memoire Exp. 50. &c.*

(*r*) *L. III. c. 6.*

(*s*) *FLOTER* p. 157. *SENAC.* T. II. p. 269. 270. 271. Addit Vir III. a rerorum actione pulsus magis fieri, inque colica pictonum eo modo se habere, ut in apoplexia solent.

§. XIX.

Alia pulsuum discrimina.

Reliqua pulsus discrimina non perinde accuratam mensuram admittunt. Poterat forte ex STRUTHII consilio (*t*), robur pulsus pondere imposito definiri, quod utique a valido cordis impetu majus, quam a minori, elevaretur: non novi tamen, quemquam experimentum fecisse. Ergo, ut paucis summa rerum momenta adtingamus, magnus pulsus erit, in quo arteriae diameter quam maxima redditur. Ejusmodi pulsus potest & a magna unda cordis fieri, & a minori (*u*); a magna equidem, si in arteriam non valde plenam & dilatabilem, a vi robusti cordis, quam plurimus sanguis impellitur: a parva, quando arteria valde plena, qualis in plethorico homine est (*x*), super eam plenitudinem, novam, etiam non maximum undam sanguinis accipit, in quo quidem pulsu diversitas diametri non magna erit, si systolen cum diastole comparaveris. Plenus pulsus a magno vere non differt (*y*), nisi pulsum posteriori loco dictum plenum malis quam parvum vocare. Magnus fere fortis est, cunque arteriam valde elevet, dorsi adeo pulpm majori discrimine cedere cogit.

Magnus adeo pulsus erit, quoties multus in corde sanguis abundat, & cor eum sanguinem valide promovet. Cum tarditate magnus erit, quando libertas arteriae summa, stimuli adest quanu minimum, & tamen vires cordis sufficiunt. Ejusmodi pulsus est in homine athletico (*z*). Cum celeritate magnus est, quando multus sanguis & cordis vehementior nixus, cum ob-

staculo

(*t*) p. 101.

(*u*) Ejusmodi pulsum negat magnum esse III. SCHREIBERUS, quia diameter systoles in diastole non valde augeatur. Elem. medic. p. 373. Sed magnus cum sit, credam nonen tolerari posse.

(*x*) STRUTHERS de *pulsu* p. 9. Parvum equidem vocat *GUILDEHURST COXBURKE of sea shrike's* p. 16. quod diameter parum augeatur: cui eadem responsio convenit.

(*y*) Neque peculiarem faciebat pulsum GALENUS de *vif. puls.* L. III. c. 6. neque G. C. SCHELHAMMER p. 52.

(*z*) SCHWESKE p. 48.

staculo, stimulo, aliave celeritatis causa conjungitur, ut in apoplexia sit (a).

Contrarie causa pulsum parvum faciunt, quem nuperiores aliqui inanem vocant. Parvus autem est, quando arteriae diameter non increscit, parvaque etiam in systole cordis manet: sive sanguinis penus per haemorrhagias (b), & iteratas venae sectiones valde diminuta fuerit, sive ex corde in arterias sanguinis iter malignius patuerit, ut a polypis (c) aortam repletibus, ab ejus arteriæ osseis valvulis, ab aneurysmate super carpum sito (d), a visco pulmones impeditio fit, sive demum præter solitum exigua ejus diameter, aut tota plurimo adipe mersa fuerit. Plerunque tamen pulsus ideo parvus est, quia vires cordis exiguae sunt, ut omnino arteria parum dilatetur. Quare parvus a debili parum (e) differt, nisi quod parvitas ad arteriæ inanitatem magis & exititatem, debilitas ad vires cordis exiguae magis spectet. Parvum una & tardum pulsus esse rarum est, exemplum tamen extat in hysteris (f). Cum celeritate vero parvus frequenter in periculosis febribus reperitur, quando stimulus magnus, aut validum obstaculum, & tamen, etiam cum his canis cor vehementius sollicitantibus, tanta hujus organi est debilitas, ut undam exiguum ejiciat, qua arteria dilatanda non sufficiat (g). Quare in febribus nunquam periculo caret.

Duritatem in pulsu esse aiunt (h), quoties arteria non fluidi adeo corporis sensum, sed solidi potius bacilli ictum pulpæ tangentis digiti imprimit, impetusve arteriæ percutiens distensione major videtur. Ejusmodi pulsus fit, quando arteria rigida, & tensa, & sanguis viscidus & concretioni proximus est, & a corde vehementer urgetur. Duri sensum (i) pulsus. In arteria cubitali cartilaginea (k), pulsus asper fuit, quem durum intercepit. Durus est in pleuride, ob sanguinem vehementer coagulabi-

L 1 3

(a) BAGLIV. PRAX. L. I. p. 111.

(b) SCHELHAMMER p. 44. STERLIN p. 10.

(c) Nov. Ad. Acad. Nat. Cur. vol. I. obs. 2.

(d) p. 141.

(e) Idem discriben ponit G. C. SCHELHAMMER p. 44. 45.

(f) Quibus preterea æqualis est WHYTTONIS. mot. p. 217.

(g) SCHWENKE p. 47.

(h) Hunc pulsionem difficulter olim censor SCHELHAMMERUS rejectit p. 50.

(i) Reborches sur le pouls p. 5. 15. NICOLAI dein phys. flagr. p. 51.

(k) PETRI BAKRENS obser. anat. p. 63. Latera adie. lata cartilaginea, pulsus instans chordæ valvulae VIEGUENSIS du caur p. 107. 108.

gulabilem. Plerumque cum magnitudine durities conjungitur. Cum partitatem tamen durus esse potest (*l*), quando arteria valde solida, vehementer contracta, digitum duriter percutit, & tamen cordi potenter resilit, ut parum dilatetur: ejusmodi pulsus foret, quem arteria ossen representaret, nisi arteriae dum offescunt, una fere dilatarentur. Mollis pulsus a parvo differt, quod arteria plena sit, a duro, quod sanguis a corde debiliter impellatur, arteriamque parum dilatet. In peripneumonia pulsus mollis est, quod plethora febrilis dominetur, & tamen unda a sanguinis a corde sanguistro expulsi, ob pulmonem impeditum exigua sit.

Reliqua pulsuum genera non ab unius pulsus proprietate definiuntur, sed ex aliquo se insequentium pulsuum comparatione. Ita pulsus aequalis ab inaequali diffidet, quod in illo multi ex ordine pulsus aequis se sequuntur intervallis, & perinde magni, fortes, durique sint, aut certe aliorum generum characterem servent eundem. Ita intermittens pulsus differt a continuo, quod hujus intervalla naturalibus propiora, illius nimia sint, sive nunc cum inaequalitate pulsus intermisserit, sive paria, nimis tamen longa habuerit intervalla. Horum pulsuum, qui ad inaequales pertinent paucos, & celebriores, unico verbulo licuerit tetigisse. Pulsus *dicrotus* (*m*) dicitur, in quo duæ arteriae diastola minimo intervallo se insequuntur, deinde longius ad proximum pulsum intervallum intercedit. Ejusmodi pulsus ab aneurysmate vidit *L A N C I S I U S* (*n*), & vulgo credunt, ab obstruendo fieri, contra quod cor repetito ictu insurgat (*o*), ut omnino *C L A R Q U E T* syncopem & mortem putaverit portendere (*p*). Ejusdem vero pulsus significationem esse credit *Franciscus SOLANO* (*q*), haemorrhagiam parum, quæ proxima instet, & hic auctoris sui præstigia ejus interpres non penitus deserit (*r*). Si alienor videtur ab hac prognosi nuperus de pulsibus auctor (*s*) non tamen longe recedit, & mensum pulsus dicrotum facit.

(*l*) *S E N A C* T. II. p. 222.

(*m*) *M A R Q U E T* p. 32.

(*n*) p. 132. edit. 1728.

(*o*) Est emboli bis prementis, ut dilatatio unica arteria a duabus cordis contractionibus obtinetur. *R e c r i b e s sur le pouls* p. 24. Bis vel ter cor in palpitatione falire, donec arteria senuel micet jam *R I O L A N I* est observatio.

(*p*) p. 1. &c.

(*q*) p. 32.

(*r*) Est inclinationis ad haemorrhagiam parum signum p. 64. 65.

(*s*) *R e c r i b e s* &c. p. 47.

facit (*t*) , & disertis verbis , nascalem pulsuni (*u*) , qui per eam sedem evacuationem præfigit , ad dicroti signa delineat . *Coturnifans* pulsus (*x*) a diverso differt , quando ter in uno intervallo pulsus celerrime se consequuntur . *Incidiuus* pulsus est , quando supra prium pulsum secundus robustior insurgit , supra secundum tertius , ut in mari quidem unda violentior priorem supervenire solet . Eum pulsum *Franciscus Solano* definit (*y*) , & cum molitie sudorem (*z*) , cum duritate icterum (*a*) credidit portendere .

Denique nuperimus auctor (*b*) multo plenius novas pulsuum classes , novaque a pulsibus præfigia excogitavit . Criticum ergo primum a non critico sive irritationis pulsū separavit , quod ille obstaculum quidem , sed evacuatione critica & a natura superabile , & continuo superandum , iste frusta futuros naturæ conatus , nervorumque steriles tumultus designet . Criticus ergo in universum pulsus *dilatatus* , mollis , & expansus erit (*c*) oportet enim auctoris voces ex proximo sequi : qui criticus non est , is *concentratus* (*d*) , arctus , frequens est & durior . Deinde pulsus criticus per alia sua signa variarum corporis humani partium obstrunctiones designat , & imminentes ex iis partibus criticas evacuationes præfigit . Si in capite morbus fuerit , & a superioribus corporis partibus evacuatio sperretur , pulsus *superior* (*e*) erit , nempe dicrotus , qui præcipitem reduplicationem , sive unicam diastolen in duas divisam habet . Si in pectore vitium fuerit , & inde sperretur evacuatio , pulsus una mollis erit , & undosus , & æqualis (*f*) : si a gutture aliquanto celerior , & durior , & cephalico propior erit (*g*) . Si a capite crisis sequetur , durior erit una , validior , celerior , vere dicrotus (*h*) . Pulsus *inferior* inæqualia habet intervalla , neque raro intermit-

(*t*) p. 356.

(*u*) p. 46.

(*x*) *BERNER* obf. 4. post l. de aeris efficacia.

(*y*) p. 7.

(*z*) p. 9.

(*a*) p. 8.

(*b*) *Recherches sur le pouls par rapport aux crises* Paris 1756. 12. Audio auctorem esse Cl. virum *Theophilum du BORDEAU*. Ejus placita ivit confirmatum Cl. Mionne & Obser. sur le pouls. Paris 1758.

(*c*) p. 18.

(*d*) p. 199.

(*e*) p. 23. 24.

(*f*) p. 28.

(*g*) p. 39.

(*h*) p. 46. 47.

intermittenti proximus est (*i*), & cum subsultu conjurgitur (*k*). Iterum vomitum indicabit, si una durus, & parum inæqualis fuerit (*l*): evacuationem per intestina, si magis inæqualis, pene intermittens sepe, & subsultibus mictus fuerit (*m*). Pulsus hæmorrhoides præfigiens una dicrotus, durus, frequens, minus inæqualis est (*n*). Verum plura repetere omitto; cum auctor anonymous SOLANI ædificio manifesto suum, sed ornatius & amplius superstruxerit: id autem structuræ genus experimentorum iteratione oporteat aut stare, aut everti, quorum utrumque otium, & opportunitates, & liberum in primis a præjudicata opinione animum polscunt.

SECTIO III. Motus sanguinis per arterias effectus.

§. I. Frictio.

QUÆ sequuntur non unice obscura sunt, sed id præterea habent in gratius, quod omnino ad verum cominus accedi nequeat. Quare quæ pauca, hiulca, vere tamen cognita habeo, brevis propono: hypotheses etiam brevius ex aliis narraturus.

Dum sanguis per magna vasa celeriter incedit, primum est, ut frictio aliqua nascatur. Erit autem ea multiplex.* Nam ad parietes quidem arteriarum globuli impellentur, five arteriaæ flexæ fuerint, five in coni modum ad minorem diametrum contrahantur, utraque enim causa facit, ut non possit non globulorum pars magna in parietes illidi: in priori quidem exemplo *ii* in primis, quos fluentum e directo ad flexionis convexam partem ducit: in altero eæ omnes imaginabiles globulorum series in anulo contentæ, qui differentiæ luminum æqualis est. Demum ipsæ globulorum lineæ, quæ axin tenent, necessario in calcaria in pingunt, quæ inter duorum ramorum divisionem, angulum tenent. Ea illatio quidem, absque impetu in nostris (*o*) experimentis fit, in calidis tamen animalibus, & in arteriis majoribus

non

(*i*) p. 68.

(*k*) Ibid.

(*l*) p. 72.

(*m*) p. 81.

(*n*) p. 182.

(*o*) Conf. Mem. sur le mouvement du sang exp. 69. 70. 81.

non est absque violentia, cum in flexa fede arteriæ fere dilatentur (p). Si vero parietes arteriæ mutantur, æquum est, etiam globulos sanguinis, & quidquid præter eos vitalem humorem componit, inter vim urgentem cordis, & arteriarum vim resistenter repellentem premi (q), ab arteriæ réactione in se ipsos comprimi, etiam magis, quam elæstica corpora, quæ in illisionis fede ex notissimis experimentis fovea excavantur. Quare, si ab arteriæ quidem pariete globulum repellit posueris, ab aliis vero, qui sequuntur, globorum ordinibus insequentes contrariam in sedem urgentur, poterit globulus in minus volumen comprimi, quod *densari* vocant. Ita enim & superficies undique ad centrum urgetur, & quicunque tenuior humor, vacua, inter veros globuli atomos, intervalla replet, is exprimitur, ex quo fit, ut quæ superfunt atomi, in eodem volumine plus habeant materiei. Deinde obtinetur, ut quæ mistæ in uiam moleculam concreverant diversi ingenii particulae, eæ soluto nexus dilcedant. Ita crediderim, in exemplo, oleum cum aqua subactum, quod chylum vocant, post aliquot horas evanescere, cum oleum nativam pelluciditatem recuperet, postquam ab aqua, quasi expressum, secessit. Arteriosi vero parietes a particulis, si quas sanguis alterius a globosa figuræ habet, irritabuntur (r), effodiuntur, aut ea, quacunque ratione mutabuntur, quæ indoli earum particularum conveniet. Sed etiani extensio, quæ cum omni arteriæ diastole conjungitur (s), & flexio in arcum convexiorem (t) arteriæ particulas minimas quassat & dissolvit. Hæc omnia maxima erunt in aortæ prioribus ramis (u), per quos majori celeritate sanguis urgetur, dum major unda anterior potentius resistit. Maxima ergo ea fede in arteria quidem detritio, & ab elementis de sua fede depulsi crebriores foveolæ, & ad dilatationem major erit impulsus. Ea omnia in convexitate flexionum iterum majora erunt, quo sanguis vi projectionis suscitetur, & centrifuga potestate acrius nititur (x). In minores vero moleculas globulos illatos dissolvi (y), nondum equidem vidi (z).

Aliud

(p) L. II. p. 57. §8. L. VI. p. 230.

(q) G. v. SWIETZ T. I. p. 175.

(r) MUSSCHENBROEK Elém. phys. p. 317.

(s) p. 239.

(t) Ibid.

(u) Conf. p. 168. &c. SAUVAGEON de pulsu p. 13.

(x) MARTINEZ de anim. simili. p. 58.

(y) NEIFFELD prius. polon. p. 3. de secret. n. 241. Si nempe ad angulos ramorum & calcaria aliisi fuerint.

(z) Nec CL MILES Phil. Transf. n. 460.

Haller Physiolog. Tom. II.

M m

Aliud frictionis genus est, quod inter ipsas moleculas exercetur, quæ sanguinem constituunt. Etsi enim ex in frigido animale sibi parallelæ rectas lineas sequuntur (*a*), aequum tamen est creditu, non ab experimen-to quidem, sed ex sanx rationis dictamine, moleculas sanguinis varie con-turbari, inter se collidi, sequi de suo deturbate itinere. Nam ex massu-le, quæ ab arteriæ parietibus repercutte (*b*), molliter, sed mutata tamen ea, quam sequuntur linea, ad axin quocunque sub angulo redeunt, ex non possunt non lineas axi parallelas secare, inque eas moleculas illidere, quæ has lineas tenent. Sed etiam contractio arteriæ, quæ globulos ad axin repellit, non potest non secundum lineas, quæ axin ad perpendicularum secant, globulos parietibus primo proximos, denique qui eos interiores contingunt, in eos globulos repellere, qui axin tenent. Con-tra, qui axin tenent lineasve axi viciniores, pressione ea, qua reliquos ordines dimovent, eos utique ad parietes secundum perpendicularum, cogunt illidi. Ita dum iis occurruunt ordinibus, qui a parietibus reperi-cusse redeunt, non potest non globulorum ad contrarias moleculas collitorum conficitio fieri. Iterum, cum aliquanto celerius nova unda insequatur, prior aliquanto lentius fugiat (*c*), & cum unda prior sequentem impellat, poterit quævis unda haberri pro corpore inter potentiam urgenterem, & resistentiam con-presto.

Ita nascitur illa in motu globulorum conturbatio, quam nos alibi re-petemus. Oppositorum vero in sanguine torrentium (*d*) pugnam & col-lisionem experimenta manifesto demonstrant, ut omnino duo contraria san-guinis fluenta contra se nitantur, mutataque a mutua resistentia directio in linea abeant, quæ ad perpendicularum in axia nititur. Rotationem glo-bulorum circa axin a viris minime contemnendæ auctoritatis partim ex theoria, & ad experimenta (*e*) demum propositam, ego quidem nunquam vidi.

Uti vero sanguis per laxatam, perque contractam, arteriam fertur, ita aliae ejus aliæque sunt adfectiones. In diastole sanguinis elementa, in am-pliorem circulum diffusa, a se secundunt mutuo, & a globulis globuli longius distant, & contactus molecularum, adeoque adtractio minuitur, quæ direc-tam

(*a*) *Second Mem. sur le mouv. du sang exp. 63. 64 &c. & p. 235. Cl. R. M. 1 disp. p. 37. 43.*

(*b*) *BAAZICARUVV theor. tumor. f. g. ad 13.*

(*c*) *BARTHOLOM. de MUOR de inſtaurat. med. p. 168.*

(*d*) *HALES p. 108. Premier memoire p. 58.*

(*e*) *VIRUSSENS tr. de liqueurs p. 16. HALES bemaſſus. p. 95.*

tam rationem contingentium se superficierum, inversam vero & multiplicata-
tam distantiarum tenet.

In contractione arteriæ horum contraria fiunt. Cum enim arteria se-
cundum lineas ad axin perpendicularares undique angustior fiat, globuli san-
guinei undique ad axin, inque angustiorem circulum comprimuntur, & ad
alios globulos proprius accidunt. Ita frictio, quam modo dixi, augetur,
& nunc id maxime fit, quod ex theoria Cl. viri fieri (*f*) docuerunt, quæ
particulae in sanguine sphæricæ non sunt, ut sphærica fiant. Potest enim
quævis ejus generis particula haberi pro numerosa vescium compage, qui
in centro magnitudinis convenienter, ad universum vero arteriæ ambitum e-
riguntur undique. Eorum alii longiores sunt, breviores alii: si enim æ-
quales feceris, facies ut radii sphærae sint. Quinque adeo longiores
sunt, eorum extimus finis a centro magnitudinis longius distat, eaque
fede adeo a minori potentia flectitur, & debilior est. Dum adeo ea sedes ab
aliis sphæralis percuditur, poterit flexus is finis, & debilior abrumpi, dete-
ri, donec æqua undique resistentia æqualium vescium superfit, in quibus
nulla ratio supereft, quare alius alio facilius deteratur: sed ea sphæra est.
Ita theoria permittit, nam oculus utique in sanguine nihil videt, quod
sphæricum non sit. Eo modo particulae quidem grandiores in sphæras
abeunt, minora vero ramenta detrita per easdem causas, perinde figuram
undique æque resistentem adquirunt. Ita, dum ex majoribus moleculis sunt
minores, sanguis utique adtenuatur.

Utique vero hæc omnia majora erunt, si cordis impetus major, san-
guinis moleculæ solidiores, arteriæ, ad quas confricantur, duriores fuerint.

§. II. In ramis ut se habeat.

In ramis majoribus omnia fere eodem modo se habent. Celeritas e-
quidem sanguinis minuitur (*g*) atque adeo hactenus frictio minor est.
Sunt tamen aliæ cause, quæ non sinunt multum minui. Luminum enim
in ramis summa major est, quam lumen trunci, cumque ad eum circu-
lum, qui lumen metitur, ejusque similes totius tubi sectiones, frictio san-
guinis fiat, eam frictionem augeri necesse est, aucta superficie, quæ con-
fricatur (*h*).

M m 2

Sed

(*f*) Conf. BAZZICALUVE prop. II. BOERHAAVE Institut. rei Med. II. 220 &c.

(*g*) p. 168 seqq.

(*h*) p. 178. seqq.

Sed etiam perpetuo plures particulae ad internam arteriarum superficiem confribuntur, cum lumina tamorum perpetim decrescant, atque adeo linearum, in quas lumen maximum nascentis rami diviseris, major utique numerus in parietes arteriae incurrat. Quare etiam in arteriarum ramis ea omnia manebunt, quae de trunco diximus, pressio nempe lateralis (*i*), & globulorum ad concavam & tuborum arteriosorum faciem adtritus, eorumdem cum sui similibus conficitur, compressio, densatio. Ne vero facile arteriarum rami, his a causis, rumpantur, cavit C R E A T O R, dum fortiores fecit (*k*), densiores, aque majori demum impetu violabiles, quam quidem trunci sunt. Non ideo aut vigesies sexies (*l*) impetu innitentis sanguinis fortiores esse crediderim, aut a nullo cordis conatu superabiles. Nam in apoplectico homine (*m*), & in alio, qui vomitum medicamento sibi moverat (*n*), arteria coronaria rupta fuit, & in ophthalmica (*o*), aneurysma ex risu natum idoneus omnino testis videntur, & de arteriis cerebri res vulgo nota est, deque variis vasibus, quae a nixu rumpuntur.

§. III. Vis anastomosium.

Deinde anastomoses contemplabimur, quarum aliæ majores sunt, minimæ aliæ. Majorum commune officium est, expedire sanguinis motum, & obstructionis pericula minuere, nam omnino tolli, neque in sanguineis vasibus obstructionem locum habere, id quidem nimium est (*p*), neque cum phænomenis inflammati oculi, & grandescientium manifesto arteriarum conciliatur. Obstrui vasa vocamus, quoties quocunque in vase sanguineo obstatulum sanguinis liberum per sedem obstructam iter moratur. Inde sequitur, ut super sedem obstructam sanguis a corde jugiter submissus congregetur: sive quod idem est, ut arteriæ obstructæ sedes cordi propior dilatetur. Ita in vincta arteria animalis calidi manifestum est (*q*), neque

(*i*) JONES de mot. musc.

(*k*) Enquiry p. 92. 206. &c.

(*l*) HALES p. 155. de arteria. Nam venam fere 400 & majorem pressionem absque ruptione pati docet, quam in recke valetudine patitur p. 159.

(*m*) Eph. Nat. Cur. vol. V. obs. 141.

(*n*) VIXIDIER du bon chyse p. 200.

(*o*) COOPER ad BIDLOO T. V. f. 1.

(*p*) SHREBBERE pratice P. II. p. 41.

(*q*) Second Mémoire Exp. 47. 48. §1. §2. §3. §7. De obstructione LORE of sever p. 247.

neque ea diversitas in diametro arteriæ obstructæ sensus fugit (*r*) , et si plerumque parum crescit, dum perstat insuperata. Eam vim sanguinis cor contra sedem interceptam urget, arteriæque utramque diametrum auget. Sed is ipse conatus in arteriam conicam (*s*), ad ramos decrementem, profundius urget, si quid intus est obstraculi: cum enim id in caveam emineat, lineas transeuntis sanguinis excipit, & cum iis ad minima pellitur (*s**), neque expeditur, siquidem continuo angustior vasculi diameter, obstruenti malle se præbet difficiliorem. Ita sequi videtur, ut vas obstructum rumpatur: sed duæ causæ faciunt, ut rarissime quidem hoc infortunium accidat. Nam primum, cum nulla longe sine ramo arteria producatur, sanguis, quem per truncum cor impellit, in ramum supra obstructionem nascentem copiosius determinatur, neque ea mala in obstruto vase finunt nasci, quæ nascitura videntur. Re vindæ ergo arteriæ rami supra sedem vinculi nati, tument fanguine, eumque reddunt uberiorem, si incideris (*t*). Inde a vinculo aortæ injecto oculi rubore suffusi (*u*), anxieties, a collecto in pulmonem sanguine, & pulsus arteriarum superiorum evidenter (*x*), aliaque collecti in vasa elatiora cruris signa. Inde a femoribus ligatis, & adstricta adeo cruris arteria, continuo pulsus auctus, & doloris & plenitudinis in utero signa, & mensium retentorum effluxus (*y*). A cruris amputatione salacitas (*y**).

Plurimum tamen hic adjuvat vis anastomosum. Sanguis in obstructam arteriam impactus neque potest, per priora, a trunci submissis undis expediti, cum conica natura impedit, neque vere expeditur, cum sanguis desertis obstructis vasibz (*z*) ad libera vascula transeat. Verum pone nunc in obstruta arteria grumum sanguinis cohærente, qualia ex congestis globulis coagula sœpe omnino vidi (*a*): pone eam arteriam continuato ductu in aliam arteriam continuari,

M m 3

quod

(*r*) Cum ratio arteriæ obstructæ sit ad arteriam liberam uti 283 ad 284. SAUVAGE de inflamat. p. 264. Arterias super sedem inflammationis intumescere & ampliores fieri IDEM admittit p. 281.

(*s*) BELLIN Prop. XXVI. In partem obstructam vasorum ranæ liquores magna vi impingere HOFMAN p. 9 10. Sed nihil simile vidi.

(*s**) BOERHAAVE de virib. medicam. p. 78.

(*t*) SALMON de utero p. 27. ex CL. FERRÉI experimento, SCHWENKE p. 16. CHESSELDEN Anat. of Human body Ed. VI. p. 203.

(*u*) G. V. SWITZER Comment T. I. p. 18. SENAC T. II. p. 174.

(*x*) Second Memoire Exp. 52.

(*y*) Essays of Societ. at Edim. nov. T. II. p. 404. 405.

(*y**) BOERHAAVE Prax. Med. T. II. p. 105.

(*a*) Conf. L. II. p. 115. Second. Mem. exp. 93.

(*a*) Second. Mem. Exp. 6. 7. 60. 93. 151. 155.

quod vocant anastomosin. Nitetur ergo per liberam arteriam sanguis , veniet ad sedem obstructam , & coagulo facile viam expediet , cum in latiorem & inanem canalem absque resistentia cedat , & ut aliquid itineris peregerit , singulo quasi passu in latiorem (b) , & faciliorem arteriae sedem redeat , que non invita iniunctum grumulum recipit. Repulso autem ex obstructione grumulos & *Antonius v. LEEUWENHOECK* (c) vidit , & *B E E R H A A V I U S* (d) , & ipse demum vidi , ut alias ab aucta cordis vi coagulum dissiparetur (e) , alias omnino oscillatio , mistum nempe cuim vero sanguinis contrarium iter , verum sanguini motum restitueret (f).

Alia anastomosium utilitas est , destractas aut immeabiles arterias compensare. Arteriae corporis humani vicinæ ubique , nisi paries medius intercesserit , mediocribus ramulis inter se communicant , ut propago superiori loco ex trunco emissa , in redeuntem e contrario ramum arteriae aut ejusdem , aut vicinæ alterius se continuata inmittat (g). Pone nunc arteriam principem sub ramo emissῳ comprimi , destrui , aut aliquin inutilem reddi , averteretur certe a toto reliquo artu arteriosi sanguinis influxus , & periret sideratum , quidquid ultra sedem violatam est , nisi benefica vis anastomosium intercederet. Nempe cum rami arteriosi , super vinculum ex arteria nati , plus sanguinis accipiant , & dilatentur (h) , fit sensim , ut aucti diametro hi rami , nunc pro trunco sint , & vitalis humoris conimeatum ad ulteriorem artum continent , periculumque sphaceli avertant. In brachialisibus arteriis exemplum notissimum est. In trunco nempe humerario , qua parte venæ medianæ subjacet , in venæ sectione , vulgatissima certe , & tameq; difficiili , administratione frequentia aneurysmata fiunt , ut chirurgus incisam arteriam vincire , & denū utrinque lino interceptam excidere cogatur. Ita , cum ulnaris arteria , & radialis , & interossea , sanguinis committantur , pulsus in carpo evanescit , & digitii frigent , & periculum gangrenæ præsentissimum inminet. Plerumque tamen , dum fotu interim aromatico putredo arcetur,

(b) Speculationem habet *ALBIXUS adnotat.* L. II. c. 10

(c) T. II. oper. p. 207.

(d) *Praxios Med.* T. I. p. 298.

(e) Exp. 93. *LEEUWENHOECK* T. III. p. 111. 117. *SENAC tr. du cent* T. I. p. 486.

(f) *Second Mem.* p. 246. n. 1. Exp. 65. 93. p. 229.

(g) L. II. p. 86. In exemplō *MOLINELLIS de aneurysm.* T. I. f. 2. T. II. f. 3.

(h) p. 277.

arcetur, post triduum pulsus in carpum & unu calor (*i*), & vita redit. Nempe per ramiulos arterie profunde ab humeratia (*k*), & ejus quam anastomoticam (*l*) dixi, post vinculum injectum, dilatatos sanguinis nunc tantum ad artus partem vinculo subiectam redit, quantum ad pulsum, vitamque sufficit. Perinde vidi evenire, cum arteriam brachiale ligari præcepissem, neque enim alia supererat via, qua sanguinis de arteria pollicis subinde renascentes jacturas compescerem. Per arcum nempe volarem utrumque (*m*) sanguis, ex ulnari trunko in radiale, post brevem moram redit. Sed etiam, cum brachium pene integre præcissum fuisset, tertio die pulsus redit, inque manu calor (*n*). In canibus carotidem sepe aut alteram, aut utramque vinculo intercepi (*o*), neque quidquam inde mali evenit. Cum tumore carotidem (& externam una jugularem) chirurgus absque detimento sanitatis extirpavit (*p*).

Obiter ista, nam anastomosium aliæ, & quæ magis hujus loci sint, affectiones sunt. Cum nempe duæ arteriæ ramos habeant contrario ductu mutuo in se innissos, potest directio facilius mutari, qua sanguis per minora valcula fertur. Si in arteria superiori, in exemplo, celeritas major fuerit, sanguis deorsum per alteram arteriam agetur, quæ nunc pro vena erit. Si inferioris superius momentum fuerit, sanguis sursum repelletur. Hæc non ex theoria unice quasi conjectura aliqua hauriuntur, sed experimentis utique, & in primis nostris (*q*) confirmantur. Dudum etiam monui (*r*), facilime, ut situs jubebit ratio, per arterias perforantes, sanguinem a dorso manus in volam commeare, aut vicissim ex vola in dorsum tendere. Multa inde vitæ humanæ commoda accidunt: ut sanguis, qui incitato torrente in arteriam aliquam fertur, effugium inveniat, neque ea tota vi eam in arteriam nitatur, quam a corde accepit. Sed etiam ab obstructa sede, utero in exemplo, sanguis spermaticarum arteriarum in hypogastricas avertitur, ne in

uteru *n*

(*i*) Vide fascicul. icon. anat. VI. p. 22. 23. SCHWEINSKI p. 18. 19. HEISTER de arter. crural. vuln. curato n. 40. Coleg. Hanover T. II. p. 800. Conf. Essays of a Society. at Edinb. T. II. p. 284.

(*k*) Fascic. VI. p. 19.

(*l*) Ibid. p. 21.

(*m*) Ibid. p. 28. & 41.

(*n*) Chirurg. arruifung. T. III. I. c.

(*o*) Tunc Cl. viri Rob. EMERIT in tentaminibus, tum ejus laborum socius Cl. PARKER Journ. econ. 1756. januar.

(*p*) SCHWEINSKI p. 20.

(*q*) Exp. 66. 154. 173. Esti enim non in anastomosi sanguis contrarium iter fecutus est, sufficit in eodem canale columnam validiorem eam superasse, quæ debiliori motu ferebatur. In anastomosi venosa hoc phænomenon vidi exp. 132.

(*r*) Premier Mem. p. 58.

uterum gravis nitatur, & quæ alia sunt ejusmodi. Si subtilius rem placet urgere, ratio hic inveniretur, qua celeritas sanguinis in maximis morbis, & inflammationibus ipsis, frangitur.

Iterum ex anastomosis conflictus sanguinis memorabilis sequitur, ut contrarii sibi torrentes (*s*) obnitantur, atque globuli in globulos impingant. Ita quidem solet fieri, ut in ramum aliquem, aut quodcumque ostium in sede conflictus (*t*) patulum, sanguis utriusque columnæ irruat. Non tamen potest fieri, quin & de velocitate sua sanguis amittat, quem effectum dudum tetigi (*u*), & præterea frictio inter globulos rubros evanescatur, quæ est maxima, siquidem non obliquo ducta, sed directo, in globulum globulus incidit.

§. IV. Et retium.

Huc retia redeunt, quæ **BELLINUS** (*x*) ubique in corpore humano, **NATURA** certe plurimis locis fabricavit, nos alias descripsimus (*y*). Nihil enim retia sunt, nisi repetitæ ramorum cujuslibet trunci arteriosi cum vicinorum truncorum ramlulis anastomoses. In his retibus celeritatem minui (*z*), adfrictumque globulorum, eaque omnia, quæ ex confricatione evanescuntur, augeri certum est. Solvi sanguinem volebat **BELLINUS** (*a*), quod hactenus admitti potest, ut omnino a tritu minores, & eminentes molecularum sanguinearum quasi ramos deteri, certum sit, atque adeo & majores moleculæ minores fiant, & multæ novæ ex priorum ramentis decedant. Hæc ratio suadet, experimentum nullum confirmat. Misceri præterea, siquidem humores duarum arteriarum diversi fuerint, utriusque liquoris particulas, tertiumque componi, qui utriusque generis particulas habeat, eadem ratio ostendit.

§. V

(*s*) *Second Mem. Exp. 153. 154. 154². 155. 157. 171. 173. 174. 176. 178. 180. 182. 187. 190.* Et si enim hi torrentes iterum in eodem canale, non in anastomosi duorum canalium vici sunt, nihil tamen intercedit, quo par ramorum posterioris generis ratio sit. In anastomosi venosa vidi *Exp. 132.*

(*x*) *Exp. 154². 155. 171. 178. 190.*

(*y*) *p. 189. 190.*

(*z*) *De ferment. &c gland. Prop. 38.*

(*a*) *L. II. p. 91.*

(*z*) *p. 189. 190.*

(*a*) *I. modo cit. MORGAN princip. p. 187. SAUVAGE'S memoir. de Berlin I. c. p. 55.*

§. V. *In vasculis minimis globulorum mensura nascitur.*

Ab arteriolis unius globuli capacibus conica equidem natura abeat, cum utique cylindricæ sint (*b*), & haec tenus pressio lateralis minuitur (*c*). Verum aliae sunt horum vasculorum affectiones, quæ frictionem immensum augent. Unicum enim globulum utique transmittunt, cum etiam venulæ minimæ unius globuli diametrum admittant (*d*), arteriolas vero venis majores fingere, neque ratio admittat, neque clarorum vivorum consentientia experimenta (*e*). Ergo cum arteriolæ minimæ aut (*f*) paulo globulo rubro majores sint (*g*), aut æquales, & denique minores (*h*) ab aliis Cl. viris habeantur, cum præterea solidiores sint, & duriores, pro diametri portione non potest non quilibet globulus suæ ad arteriolæ parietes toto suo circulo maximo confricari, & frequenter ubique, & in flexionibus maxime, quæ in his vasculis uberrimæ iterantur. In flexione enim etiam aliquanto minor globulus ad parietes undique adteritur. Ita fit, ut flexilis globulorum natura, omnino ambitum suum in circuli figuram tornet, cuius diameter arteriolæ diametro paulo minor est, aut æqualis. Hic adeo modulus (*i*) est, qui globuli rubri magnitudinem definit. Sed ad reliqua de sphærula eminentia tubercula deterenda, is idem, per angusti canalis parcā diametrum malignior transitus, utique potenter confert (*k*).

§ VI. *Et retardationis effetus.*

Porro per vasa minima sanguinis celeritas minima superest, cui tota causis

(*b*) L. II. p. 59.

(*c*) Ut ex vase cylindrico inciso aqua non exeat S T E N F E L D in *pulsu*. p 4.

(*d*) *Second Memoire exp.* 120. 124. 125. 126. 128. 131. 138. 143.

(*e*) BELLIN Propos. XXVI. COWPER ad BIDLOO append. tab. 3. *Phil. Transf.* n. 285. HALLER *Memorati* p. 58. BAKER *microcosme made easy* p. 36. MURYS de *sphærica fibr. musc.* p. 303. MILES *Philos. Transf.* n. 460. &c. Neque mea experimenta differentiunt.

(*f*) *Exp.* 61. 64. 68. nisi & ista vasa venosa fuerint.

(*g*) Duplo SCHREIBER *Almagist.* p. 216.

(*h*) p. 58. 59.

(*i*) SCHREIBER. l. c. p. 246. Conf. LEEUWENHOEK *Exper.* & *contemplat.* T. II. p. 15. 161.

(*k*) Coctionem vocat J. de GORTER particularum sanguinis non inquilinarum formationem in globulos de perspirat. p. 42.

Haller *Physiolog.* Tom. II.

N n

causis continuo portio aliqua decesserit (*l*). Diminuto nunc motu, quo sanguis secundum axim fertur, augetur vis ponderis & adtractionis, quas quidem vires celeritas progressiva non sinebat sanguinem regere (*m*). Sed globuli sanguinei fracti vi cordis amant confluere (*n*), in unguenti tardam speciem, atque adeo summa hic ad concretionem aptitudo nascitur, si præterea memor fueris, lymphæ vim magnam de arterioso sanguine decepisse, que in majores demum venas per lymphatica vasa redditur. Ea enim aquila remota, pene solus in minimis vasculis crux superest, qui omnium humorum humanorum ad coagulum pronissimus vergit, & cujus coagula omnium prima nascuntur, quo tempore nulla reliquorum humorum particula concrevit (*o*). Hæc sanguinis in minimis arteriolis tarditas, & ad coagulationem aptitudo, conjunctæ causæ sunt, cum plerumque, & in morbis acutis (*p*) etiam magis, sanguis in arterias colligatur, neque in venas transire possit. Inde in hydrophobo (*q*) sanguis in arterias omnis repertus est, ut venæ inanæ essent. Summum ergo hac in fede stagnationis & obstructionum periculum est (*r*).

§. VII. *Quomodo ab his cauiss sanguis mutetur.*

Fluiditas nascitur.

Exposuimus, quæ mechanice a motu sanguinis per arterias majores, & minores, sequantur, transeundum est ad mutationes, & effectus, qui ab eodem motu in sanguine obtinentur, & ad dotes, quas sanguini, & universis humoribus, is motus impertit. Optabile quidem foret, ut eos effectus perpetua serie, cum mechanicis motus phænomenis conjugere liceret. Verum

(*l*) *Sect. I. p. 152.*

(*m*) *De pondere Second memoir Exp. 212. 222. De adtractione constat, coagula sanguinis a debilitate demum vi cordis nasci ibid. Exp. 6. 7. 155. &c.*

(*n*) *Loc. modo cit. In fungulos abiit STIMSON p. 114.*

(*o*) *In iisdem, quæ nunc excitavi, experimentis nullum lymphæ coagulum fuit, quod fere unice a vulnere vasis sanguinei nascitur, quando pellucida lymphæ aut extra sua vasa effusa est Exp. 88. 153. 154. 155. 157. 163. 167. 170. 171. 176. 183. 189. aut demum fracta per incisa vasa vi cordis suis in vasis restagnat Exp. 180. 181.*

(*p*) *BOERHAAVE Prax. Med. T. I. p. 98. BEEL'S de febre ex solo pulsu diguoscenda Leid. 1747. In seu decrepito Pb. Trans. ann. 1705.*

(*q*) *Hist. de l'Acad. des Scie. 1699.*

(*r*) *BELLIN Profos. XXVI. BOERHAAVE Prædict. Acad. T. II. n. 252. Primam ibi sanguis flagrat SWAMMERDAM de respir. coroll.*

rum de nonnullis sanguinis dotibus nimia ea spes foret, sufficeritque interim, aliquam partem veri perspexisse. Existimavi, & aliis locis ideni sequat consilium, optime me acturum, si geometrarum rationes secutus, problema pro soluto, & æquationem pro constructa haberem. Id fiet, si dotes sanguinis vivi hominis vasa legitime perfluentis, cum sanguinis in integerissimo cadavere restitis, & sanguinis ex vasis emissi, & sanguinis demum in suis vasis, aut quiescentis, aut debiliter moti natura comparaverim. Eae enim dotes omnes, quæ sunt in vivo motoque sanguine, & quæ in sanguine lento moto minuantur, a sanguine vero quiescente absunt; eæ omnes a motu proculdubio sequuntur, qui solus in his exemplis sanguini aut integer erectus est, aut pars subtrahita. Si quis alienam ab hac causa respirationis considerationem admiscere volat, adque respirationem ea phænomena refere, quibus motus sanguis a quiescente differt, eum quidem unice monebimus, præter solum calorem, omnia reliqua phænomena in animalibus nullo pulmone instructis perinde reperiri, neque adeo a respiratione pendere. Quæ vero pars causa caloris ad pulmonem a claris viris relata est, eam utique oportebit tunc demum expendere, quando respirationis historiam dabimus.

Primum, quod sanguis lentius móitus, aut quiescens, aut effusus, amittit, id quidem est *fluida* natura, qua per vasa ferebatur. Stat enim, uti alias ostensum est, gelatinæ modo, globulique in acervos colliguntur, & in cadavere (s), & in vasculo, in quod de vena missus est (t), & dum aerem de nare sani hominis percurrit, & in tubulo de animale (u) in animal sanguinem transmitte, & in aneurysmatico (x) facco, & in ligatis arteriis (y), & alioquin in animalis debilitati vasis (z). Deinde in cadavere, etiam quando sanguis in thrombos non coit, fluit tamen lutulentus, globulique in sero pigri labuntur (a). Ut omnino ex sanguinis hirundinum conservata fluiditate merito concludamus, non absque motu sanguinem fuisse (b). Contra redditio motu coagula globulo-

N n 2

(s) L. V. p. 16.

(t) ib.

(u) ib.

(x) p. 21. Sedecim sanguinis grumosi libræ in aneurysmatico facco arteriæ popliteæ.

MATTAUX de aneurysm. p. 139. In recessibus arteriæ, qua sanguis non movetur, semper coactus reperitur. Laminæ in aneurysmate cruenta. Observ. of a Society at Lond. vol. I. p. 346.

(y) LANGIS p. 124 ed. 1718.

(z) p. 20.

(a) M ALPIGNIUS de polypis p. 130.

(b) LISTER apud LINNUMUM in acton. Natur. p. 39

rum dissipantur , ut singulæ denuo moleculæ solitariæ fluant (*b**). Ita flocculos in syncope natos credit aborta palpitatio[n]e solvi III. ARCHIATER (*b***), & obstrunctiones vasorum conjunctivæ tunicae ex vinculo ortas palpebrarum nictitatio dissipat (*b****).

Quomodo fluidam liquiditatem sanguinis vita conservet , haec tenus facile intelligitur. Primum enim non dubium videtur , quin coagula ex adtractione fiant , eam adtractionem vero is motus impedit , quo sanguis a corde ad extrema vasa progreditur. Is enim motus globulos a mutuo contactu continuo dimovet , neque vi adtractili tempus dat , quo elementa adunire possit.

Deinde elementa sanguinis vivi hominis certa temperie commissa servantur , in qua sola fluiditatem conservant. Si adipem enim ab aqua separaveris , etiam quando utriusque eadem portio manet , non dubium est , quin ille quidem stet coactus. Si vaporem ab utroque abegeris , multum videtur de sanguinis liquida meabilitate decidere , cum serum abacto vapore (*c*) in gelatinam vertatur , serumque pars magna & fluidior sanguinis sit. Nunc in quiete sanguinis , in cadavere , vapor quidem levis avolat : reliqua elementa secundum pondera sua separantur , serum innatat (*d*) , globuli ima petunt , seque incumbentes & depriment & adtrahunt. Contra , quamdiu vita viget , communis rapidusque sanguinis torrens vaporem , aquam , globulos , adipem , albumen mista servat omnia , neque finit in propiores contactus particulas pingues aut gelatinosas , aut mucosas , venire , sed interposita aqua , & tenui halitu , adtractilium particularum vicinitatem impedit. Violentum flumen cum aquis & arenas & avulsa volvit de montibus ornos , idem , quando in planicie impetum fedavit , proximis in arenis ponderosa queque deserit , ubi primum velocitas aquarum subsederit.

Calor etiam ad fluiditatem facit. Sanguis in calore , quem a digestione vocant , per mensem (*e*) fluidus mansit , parque fluidæ naturæ tenacitas in fugillatione visa est , cum effusum cruentum vitalis calor soveret (*f*). Nempe calor intestinum motum sanguini imprimit , cor progressivum , a neutro finitur quiescere. In principio exacerbata febris intermittentis sanguis latus est , sub finem fluidior (*g*).

An

(*b**) Mem. sur le mouv. du sang. Exp. 151. 155. &c.

(*b***) SWISTEN in BOERH T. I. p. 684.

(*b****) CAMFRAR. de opibzaiu. Venerea.

(*c*) L. V. Sect. III. p. 124.

(*d*) L. V. Sect. II. p. 39. 40.

(*e*) BIRCH T. III. p. 236.

(*f*) CYPRIAN epist. ad MILLINGTONUM p. 55:

(*g*) TABOR p. 274.

An molecularum moles ad' fluiditatem faciat, quæri potest. Non ignoro adtractiones esse ut superficies, has autem in majoribus moleculis augeri, cum globulus ex sex aliis coalitus non dubie minorem superficiem habeat (*h*). Verum non ideo fluidiora sunt, quæ majoribus sunt elementis (*i*), nisi elementa ignis omnium maxima, deinde ætheris elementa majora facere volueris, quam aquæ moleculas terræ.

Num motus intestinus inter particulas sanguinis locum habeat, numque ad fluiditatem omnino necessarius requiratur, hoc loco disputari potest. Plerique recentiorum scriptorum vortices, & turbines, & confusam agitatio nem in fluidis animalibus recipiunt, eumque motum a sanguinis ad curvæ arteria parietes collisionibus repetunt (*k*), aut a communī demum omnibus liquidis intestino particularum motu, quem iterum plerique rei naturalis scriptores ita adoptant, ut ab aqua glacies potissimum hoc motu sublato (*l*) differat. Alii ab aere repetunt (*m*). Nos intima rerum non prospicimus, videmus autem viros universæ naturæ peritissimos ostendisse, particulas fluidorum non *aëlu*, ut vocant, vereve moveri, et si minimo motu dimoveri (*n*) se patiuntur. Deinde in sanguine motum intestinum a Cl. viris non admitti (*o*), etiam ratione addita, quod & progressivo motui obſlitat (*p*), & fermentatio, aut putredo, adeoque intestinus motus, a perpetuo fluxu, etiam impediatur (*q*). Experimenta mea nullum ejusmodi interturbatum motum in frigidis animalibus, admittunt (*r*), cum rubri certe globuli lineas in motu suo teneant, quæ a corde ad vasorum fines rectissime ducent, neque apud LEEUWENHOECKIUM, aut quemquam scriptorum mi-

N n 3

croſco-

(*b*) Conf. p. 151, 168.

(*i*) In tenaciore fluido moleculas, quam in limpidiori maiores esse *Franciscus Lamure de secret.* p. 28.

(*k*) *Bartolomaeus de Moor de instaur. med.* T. II. f. 1. *Boernhaave Inst. rei Med.* n. 210.

(*l*) *Bernoulli hydrodym.* pref. &c.

(*m*) Et de sanguini peculiariter *Jacobus Kessel tentam.* IV. Cl. Bazzicaluwe Prop. IV. *Verheyen* L. II. p. 171. C. Gottl. *Ludwig de terius mus.* Reg. p. 194.

(*m**) *Beetier physique des corps animé.*

(*n*) *Michelotti de apoplexia*, *Verheyen* L. II. *Walther* p. 25. *Berg de natur. hum.* p. 49. *Fantoni Anat.* p. 344. *Musschenbroeck essays de physique* n. 701. *Inst. phys.* n. 763. exemplio sphæra aqua plœna quantum ejus fieri potest, aliisque gravibus argumentis.

(*o*) *Talleres exam. med. terror.* p. 324. *Schreiber Almagist.* p. 273.

(*p*) *Snebbeare* p. 57.

(*q*) n. IX.

(*r*) *Second memoir. sur le mouvem. du sang* p. 235. exp. 63. 64. &c.

croscopicorum certum aliquod interni motus documentum reperio , ut omnino , si in calidi sanguinis animalibus a calore motus intestinus excitatur , ejusmodi sit , quem oculi adsequi non possint. Excitari vero credi potest , cum in motu calor consistat , caloris vero certa , aut axi arteriae parallela directio nulla cogitari possit.

§. VIII. Et calor.

Non ab igne innato , fervore , putredine.

Aequo fere celeriter , ut liquida mobilitas sanguini de vasis effuso , invensis stagnanti decedit , ita *calor*. Friget cadaver , friget in patellam effusus sanguis , friget etiam tardius motus in deliqui animi , in submersis , in animalibus hieme latentibus. Sed gravior est quæstio , num a sanguinis motu calor nascatur , num alia cum motu progressivo utcumque conjuncta causa subsit.

Phænomeni historiam non repeto. Fuse exposui , in animalibus pleno pulmonis usū gaudentibus , caloris supra atmosphæræ aquam congelantis hibernæ frigus gradus 64 in fano sanguine generari (s) : deinde pisces non valde memorabilem calorem (t) , sed tamen ejusmodi producere , ut in gelidis aquis , ultraque frigoris congelantis gradum rigentibus , vivere , sanguinemque fluidum conservare , & denique aliquantum super id frigus tepere possint. Hujus caloris fons queritur & causa.

Et primum ostendere oportet , eum calorem in sanguine sedem suam habere , aque sanguine reliquas corporis animati partes incalescere. Facile id fit , cum artus frigeat , cuius arteria revincta fuit (u) , exemplo brachii cuius principem arteriam ob aneurysmatis (x) curationem chirurgus lino intercipit : id enim tamdiu friget , usque dum restituot sanguinis commenatus pulsus in carpo redux percipiatur. In tibia , cuius arteriae lumen contractum fuit (y) , inque artibus , quorum arteriae ossæ (z) factæ sunt , perpetuum frigus

(s) L. V. p. 35.

(t) L. V. p. 28.

(u) SENAC T. II. p. 242.

(x) p. 29.

(y) PBI. Trans. n. 280.

(z) Ibid.

frigus regnat. Pulsus in manu sinistra nullus, hinc frigus perpetuum (z*). Respiratio frigida, sensus frigoris quasi glaciei cum pulsu nullo (z**). Sæpe in me ipso, cum febrirem, nimis accurate percepit, ut ignei torrentis modo sanguis per brachiorum arterias ad manus meas sub initium exacerbationis progrederetur. Post jacturas sanguinis magnas, cuui sanguis reparatus esset, æger quasi unctionis sensum percepit (a). Cum aucto rubore calor, cum pallore frigus perpetuo fere fœdere conjungitur. Et corporis humani partes majorem calorem possident, quæcunque plus habent sanguinis, ex quo frigent, quæ paucissimum nocte sunt. Oculus cum testibus, carnes cum partibus albis comparatae suunt pro exemplo. Ultimum in cadavere dorsum tepet, eo enim sanguis, suo a pondere, congeritur.

Sequitur ut inquiramus, unde calorem suum sanguis concipiat. Breviser veteres *innatum calorem* cuiuscunq; demum is naturæ esset, in ipsum cor posuerunt, ex cuius efficacia sanguis incalesceret. Inter scripta HIPPOCRATICA libelli sunt (b), qui hanc hypothesin continent. Sed etiam ARETEUS (c) cor arteriæ calorem tradere scriptis, neque GALENUS dissentit, aut de schola medica quisquam. Id tenue utique discrimen in hac opinione superfuit, ut ARISTOTELES (d) dextrum cordis ventriculum calidiori faceret, auctor vero libelli *de corde*, & GALENUS (e), eam laudem sinistro ventriculo tribuerent, cujus carnes hunc innatum calorem præstare & ipse CLAUDIO (f), & alii (g) nuperiores addiderunt. Adeo vero in vivo animale calere, ut æstus ægre a manu ferri possit, COLUMBUS (h) auctor exstat. Unde demum is in corde calor nasceretur, veteres unice securi, querere supersederunt.

Celeriter errores invalescunt, lente imperium deponunt, etiam hæc tenus morborum epidemicorum similes. Priori seculo, quo plurimum in vivis animalibus incidentis laboratum est, hæsit tamen, in tanta opportunitate videndi veri, mentibus fatalis arundo. In septo cordis calorem habitate CONRINGIUS (i) auctor fuit, luculamque vitalem ENTITUS admisit

(z*) *Aut. de Hæn rat. medend.* T. III. p. 146. 147.

(z**) *Journal de Medec.* 1758. M. Nov. WOODWARD ejus p. 321.

(a) *VIRIDEST du bon chyle* p. 26.

(b) L. I. πρι διατος & πρι καρδίας.

(c) *Curat. acut.* L. II. c. 7.

(d) *De part. anib.* L. III. c. 4. *biflor. anim.* L. I. c. 7. argumento dextræ lateris in homine calidioris.

(e) *De ijsu part.* L. VII. c. 9. 21. *de temperament.* L. II. c. 3.

(f) *GALENUS* ibid.

(g) *CARPENSIS ad MUNDINUM* p. CCCLI. b.

(h) *De re anatom.* L. XV. p. 259.

(i) *De calid. inn. t. c. 13.*

admisit (k). **CARTESIUS** (l), cum scholarum hypothesibus minime parceret, tamen *in situ*, & potentissimum calorem retinuit, quem virum tota secta (m), & qui pene nuper ex vita decepsit **Giantherus Chriſtophorus SCHELHAMMER** (n) secuti sunt.

Cum tamen ea ipsa **CARTESII** schola causas rerum curiosius indagaret, repererunt clari viri varia phænomena chemica, in quibus conflictus contrariorum sallium calorem generat: iis subsidiis studiose usi sunt. Primus, nuperæ theorie antiquior auctor, **J. Baptista HELMONTIUS** (o) calorem a fulfure & volatili sanguinis sale in corde conſtitatis deduxit. Elegantius aliquanto **Franciscus SYLVIIUS** (p), cum sua secta (q), etiam illustribus prosectoribus (r) adſentientibus, sanguinem corporis indigenam urinose naturæ propiorem, cum novo, acidoque chylo, & acida lympha, feto cruro effervescente, ita calorem nasci, multo cum plausu docuit. Paulum aliter, in eumdem tamen ſenſum, **Cl. HENSHAW** (s) fermentationem sanguinis vitalem ex chylo & sanguine deduxit. Ex acidis spiritibus, & ſedimento sanguinis alcalino cordis fervorem derivavit **Johannes PASCAL** (t); ex novo sanguine in recessibus cordis calefacto & rareſcente **V. P. PLEMPE** (u); ex prioris crutoris reliquiis **Joachimus TARGIRIUS** (x); ex acida ſalina lienis tintura **J. M. TILING** (y); ex acida materie, quæ in fibrarum cordis loculos deflueret **Petrus CHIRAC** (z); ex bile & lympha **SAVIOLUS** (a); ex acido ſpiritu & lympha alcalina ſimul & fulfurea (b) **Antonius DEIDIER**; paulum aliter **Pompeius SACCHUS** (c), ab

(k) *Apolog. pro circulat. ſang.* p. 104.

(l) *De format. fetu* p. 157. *de homine* p. 5.

(m) *Henr. REXIUS physiolog.* p. 22. *Theodorus CRAAENEN*, *PLIMPE* p. 155.

(n) Diff. VII. In sanguine occultum ignem latere *IDEM physiolog.* nuper [edita] n. CXCIV.

(o) *In ſole tabernaculum* p. 621, 622.

(p) Diff. VIII, n. 63, diff. X, n. 54, &c.

(q) *Cornel. BONTEKOE dierige brysbouling* p. 297. ex acidis particulis cum sale volatili oleoſe conſtituentibus.

(r) *J. SWAMMERDAM de respiratione* p. 8. *Regnum de GRAAER de ſucco pancreatiſco* p. 100, 101. edit. III. uterque de **SYLVII** schola.

(s) *Aerochalinos* p. 97.

(t) *Traité des fermentes* p. 322.

(u) *Fundam. med.* p. 155.

(x) p. 159.

(y) *De vase brevi* p. 554.

(z) Apud III. ejus ſucceſſorem **J. B. SENAC tr. du cœur** p. 442.

(a) *Iucubrat* p. 5. 6.

(b) *De tumorib.*

(c) *De febr. contin. in Iride febrili* p. 16.

ab alcalina natura alimenti, & acido spiritu vitali; ex acidis denique & volatilibus in chylo particulis *GUILIELMUS COWARD* (*d*). Denique neque magna illa mens *NEWTONI* ita ab hypothesium amore pura fuit, quin ex fermentatione humorum spiritus in ipso corde generari conjecterit, quibus id organum in motum cieretur (*e*).

Diu vero etiam magnorum virorum animis fervor intestinus sanguinis hæsit, quem neque *WILLISIUS* (*f*) deseruit, neque *MALPIGHIIUS* (*g*), neque *PECHLINIUS* (*h*), neque *LANCISIUS* (*i*), neque *HELVETIUS* (*k*), neque nuper admodum *Thomas KNIGHTI* (*l*) & *Cl. STEVENSON* (*m*). Sed etiam *STAHLIUS* (*n*) præter motum vitalem principium etiam internum luminosum retinuit, quod calorem ad sanguinis motum diffundat, & *TARGIRUS* (*o*) sanguinem in se ipso fermentationem concipere, exque ea calorem nasci, quem, & vitam una, & spiritum, singulis corporis animati partibus distribuat, eamque fermentationem a primis tetro vitæ primordiis, sub initium seculi scripsit, in quo vivimus.

Cum præterea ad oculorum testimonium contra sanguinis effervescenciam provocaretur, regessit *HOMBERGIUS* (*p*), dari veram effervescenciam, perennemque, quæ oculis conspici nequeat, & ipse ejusmodi fervorem spiritum inter nitri & cantharides experimento confirmavit, non manifestum nisi aer accelererit. Acida vero & urinosa sanguinis elementa inter se mixta configere, atque in ipso adeo cruento effervescere *VIEUSSENIUS* auctor fuit (*q*).

Porro

(*d*) *De fermento volati* p. 82.

(*e*) *BIRCH T. III.* p. 254.

(*f*) Idem animam in sanguine habitare scribit *de anim. brutor.* p. 9. *de accensi. sanguinis* p. 78.

(*g*) *De poyp. sang.* p. 130.

(*h*) *De corde II.* 30.

(*i*) *I. c.* p. 28. puncti salientis exemplo excitato.

(*k*) *Eclairsissement* p. 44. *et en p. 13.*

(*l*) *Ou heat* p. 83.

(*m*) Motum cordis a motu sanguinis intellectu suscitari *Eff. of a Societ. at Elimburg.* *T. V. P. II.* p. 806. Inter causas caloris habet *J. E. HENNSTREIT de calore ns can'a morbi.* *& nov. valet.* p. 45.

(*n*) *De mechanismo motus progressivo sanguinis.* Idem sibi inventam tribuit caloris a motu intellectu sanguinis, ejusque motus a progressivo nati, detectam originem differ. *puls. celer.* *& freq. c. 4.*

(*o*) p. 53. 73. 82.

(*p*) *Mémoir. de l'Acad. des Scien.* 1709. p. 468.

(*q*) *Tr. des liqueurs* p. 63. 123.

Porro, ut probabilem aliquam rationem ejus intestini fervoris invenirent, Cl STEVENSON calorem ab alteratione deduxit (*r*), quam alimenta & humores perpetuam experiuntur. Cromvel MORTIMER (*s*) a fermentatione aerem in sanguine liberari posuit, qui ignem in motum cieat. Cl BAZZICALUVE (*t*) eundem in sanguine fervorem ab igneis particulis derivavit, quae ex ruptis globulis sanguineis exhalant. Proximus Georgius Erhardus HAMBERGER, sive priorem hypothesin ornavit, siue propria cogitata secutus est, calorem sanguinis a resolutione sulfurearum sanguinis particularum repetit, quas particulae urinose aut lixiviosae adgrediantur, experimentum etiam adduxit (*u*), quo avium congesta cadavera incaluerint, uti ex fimi columbini (*x*) acervis, exque foeno (*y*), nata incendia nonnulli scriptores, aliis quidem refragantibus (*z*), orta fuisse reliquerunt. Eum virum alii secuti sunt (*a*) neque valde longe recessit adversarius viri Cl. PERLIZ, qui calorem a motu intestino matrice caloris in sanguine habitantis communicato derivat (*b*), ejusque mentituram fecit magnitudinem motus ætherei intra poros excitati (*c*). Brevis imperi, virtutem vitalem calorem generare docent, ad veterum pene simplicitatem reduces (*d*).

§. IX. Quæ contra has opiniones dici possint.

De cordis primo insito calore nulla nunc dubitatio superest. Primus utiliter monuit Jacobus BACK (*e*), cor in vivo animale reliquis visceribus nihilo potentius calescere. Experimento BACKI adnotationem confirmavit Johannes Alphonfus BORELLUS (*f*), deinde Guilielmus COKE BURNE

(*r*) L.c. p. 835.

(*s*) Phil. Trans. n. 476. n. 20.

(*t*) Theor. sanor. Prop. III. IV.

(*u*) Physiolog. med. p. 24.

(*x*) GALEN. de temperament. L. III. c. 2. CASATUS p. 48. MASCULUS de Pissu. incend. p. 169. Philos. Transact. n. 296. Japonenses non amant columbas, quod earum fumus ignem sponte concipiatur Histoire des Japonais. p. 185.

(*y*) Foenum si permaduerit, in tabulato putiescit, & sepe, cum concaluit, ignem concipit COLUMELLA L. II. c. 19.

(*z*) LEOPOLD in libro economico germ. edito p. 197.

(*a*) NICOLAI von den fiebern. p. 52.

(*b*) Theor. caloris mathemat. p. 3.

(*c*) p. 4.

(*d*) BICKER de natur. hum.

(*e*) De corde p. 185.

(*f*) Mot. animal. L. II. c. 7. propol. 96.

BURNE (g), qui thermometro adhibito viscera abdominis non debilius tepere repererunt, quam cor quidem tepet. Sed etiam ego in tenera fele memini, meeumdem caloris gradum fahrenheitiano thermometro metitum esse, qui 88 gradum non superaret. Unico gradu superat in monedula (g*).

Quæ de sanguinis fervore narrantur, perinde quidem experimento repugnant. Chylum sub oculis meis in aurem dextram illabi, & placidissime cum sanguine misceri ipse vidi, viditque CAROLUS DRELINCOURT, cum præterea chylierum ductum, & venam axillarem ligasset (h). Sed etiam lympha nullum manifestum acorem habet (i), neque in sanguine cordis ipsius alias a muriatico sepor (k) reperitur, ne Cartesianis quidem prosectoribus (l) dissentibus: neque sanguis aut cum lympha, aut cum chylo, aut cum acido latice (m) quoconque confligit, et si cum meracissimis liquoribus servet, qui etiam in aqua incalescunt (n), & cum oleo conflagrant: neque phænomena microscopica ejusmodi conturbatum liquorem ostendunt (o) qualē in effervescentia necesse est supponi, neque bullæ in fano crux erumpunt.

Si vero certum putredinis gradum, aut agentes in oleofas particulas urinosos sales pro caloris causa citaveris, etiam hic plurima obstant, ne in hac opinionem dilabamur. Gratis utique urinose in sanguine moleculæ admittuntur, quæ demum ab igne nascuntur (p). Sed pone dari, non ideo in homine fano oleofas massulas solvunt. Globuli enim sanguinei utique inflammabiles summa cum constantia figuram suam in omnibus animalibus conservant (p*), dum vita superest motuque sanguinis circumfluis, neque adeo aut eroduntur, aut solvuntur unquam, dum calet vivet animal, & globuli in circulum feruntur.

Porro si omnino alcali præsto foret, & oleum sanguinis solveret, nullo argumento constat, alcali, dum oleum diluit, calorem excitare. Deinde in putredine, agnoscimus equidem, magnas massas vegetabilium corporum con-

O o 2

gestas

(g) *Oeconom. anim.* p. 29.

(g*) *W H Y T T physiol.* p. 16.

(h) In canis. id.

(i) p. 122.

(k) p. 72.

(j) BLANCHARD *de circuitat fung. per fibras* p. 19.

(m) p. 75. 76. 77. 78.

(n) p. 79.

(o) p. 164. conf. 274. 285, 286.

(p) p. 96.

(p*) p. 58. 59.

gestas (*q*), pressisque, loco in primis clauso, dum putrescunt, calorem vehementem generare. Verum non ideo haec mutatio ad alienissimam animalium naturam traducenda est. Caro assa cum farina avenacea & saliva calorem e quidem trium graduum excitat (*r*): sed ea fermentatio est, & in acidum tendit. Fermentatio vero & ab urinosa natura aliena est, & demum, quando maxima, calorem 75 graduum generat, multo nostro minorem (*s*). Contra, corpus humanum integrum, artusve gangrenosus, quando putrescit, tunc quidem calere desit, frigusque adtigit circumiecti aeris: quamdiu vero calet idem, nunquam una computrescit.

Iterum, adeo nulla urinosa salis in calore animali producendo potestas est, ut ea animalia frigido sint sanguine, quibus natura manifestissime urinosa est (*t*), ut ranæ, quarum albi acervi ad utrumque spinæ dorsi latus positi cum acore effervescent: cantharides (*u*), quæ totæ cum spiritu nitri fervent. His potius, quam nobis, urinosa salis copia est, quæ oleosus globulos sanguinis adgrediatur, generetque calorem. Non ob partitatem molis frigent, multæ enim aviculæ, rana, bufone, lacerta, crocodilo, minori sunt corpusculo. Contra ea animalia calent, quorum humores longius ab urinosa natura distant (*x*). Neque exemplum noverim humoris, qui, dum perpetuo & celeri motu circumfertur, una putredinem concipiatur. Aquæ motæ dulcedinem servant, per quietem putrefcunt. Humor de vase unice aliud in vas trans fusus, vitium non concipit (*y*). Sed etiam nostri humores, quamdiu moventur, nunquam putrescunt, etiam in acerrimo animalium genere: iidem, quamprimum quieverunt, ut aquæ contabescunt. Non cum putredine ergo, sed cum calore sanguinis, motus indiviso nexu conjungitur. Continuo enim ostendetur, calorem nostrum aucta in circuitu sanguinis celeritate augeri, minui diminuta, auferri sublata, redditæ restitui. Valde vero absorbum videtur, ejusmodi causam calori adsignare, quæ nunquam in corpore humano nascatur, quin calor destruatur, & quæ tunc denum se exferat, quando calor sublatus est.

Levio-

(*q*) BOERHAAVE *Elem chem.* T. II. p. 289.(*r*) PRINGLE p. 400.(*s*) BOERHAAVE I. c. p. 293.(*t*) p. 51. 92.(*u*) p. 82.(*x*) p. 93. 94.(*y*) *Homob. Pisoni ult. antiqu.* p. 61.

Leviorem in vivo sanguine putredinem esse, debile excusationis genus est, minorem nempe, si minor est, effectum edit, & si ne proiecta quidem putredo calorem excitat, quid incerta illa, & nullo ex signo adgnoscenda poterit.

§. X. Num a motu progressivo calor sit?

Argumenta quibus adfirmatur.

Vergente priori seculo magis ad potentiam solidarum partium corporis respectum est, & chemicarum causarum auctoritas aliquantum obsoletum. Primum quidem per experimentorum collectorum numerum adparuit, pene omnem, & forte penitus omnem, in rerum natura calorem attritu nasci (z). Hic totius fere naturae conflensus a clarissimis viris ad sanguinem translatus est. Ergo expenderunt animo Cl. viri (a), sanguinem a corde perenni & veloci motu in aortam projici: confricari ad cordis parietes (b), tum ad arteriarum membranas, aque ictis repelliri, globulorum oriri vorticces, eos & inter se teri (c) & contra suos tubulos, eo potentius, quo vasa minora permeant, donec toto omnino circulo maximo totum lumen arteriole radant. Sed etiam vasorum parietes rapido & alterno motu a maxima latitudine ad minimam redire (d), aque minima in maximam expandi. Eum, de quo sermo est, sanguinem ex natura sua inflammabilem (e) esse,

O o 3

hinc

(z) BOYLE of the great efficacy of languid and unheated local motion, MUSCHER-BROEK Effigie p. 480. - 81. BOERHAAVE Elem. Chym. T. I. p. 176. In ipso ab acre evanuato spatio frictio calorem generat. BOYLE physico-mechanical exper. touching the species of air &c. p. 44. Etiam in acre glandes plumbex ex solo celerrimo motu concuscent. Calido liquefacte pondere glandes LUCAN.

(a) BOERHAAVE Instit. rei Med. II. 220. Georg. MARTINEZ de animal. similib. Prop. II. p. 146. Thomas SCHWENCKE c. 4. Browne LANGRISH medical practice p. 60.

(b) Ab acre quidem ad nistos partem caloris venire, aliam a frictione, cum sanguis a cordis basi ad apicem descendat, & alterno motu ab apice ad basin redeat, ita ad cordis parietes fricitur Phsyque des corps animés p. 46.

(c) BOERHAAVE n. 220.

(d) Ab hac causa, aque solidis partibus corporis animati calorem derivat Jobannes de GORTER de perspirat. c. 8. Fere eadem est sententia Cl. LORRY fil. c. T. II. p. 256.

(e) Vires mutue inter corpora & ignem sunt, ut copia particularum oleofarum MARTINEZ p. 234. Calor ut sulfuris copia PERLITZ theor. calor. p. 4.

hinc calori concipiendo, quam aqua (*f*) , aptiorem (*g*) , etiam ob globosam figuram (*h*) , hinc animalium calores fere esse ut copia crassamenti est (*i*) , hinc aves, canem, bovem calida esse animalia, hominem frigidorem, cuius sanguis tenuior sit (*k*). Nam etiam alii humores animales, de oleorum classe, tritu satis vehementer incalcent (*l*): atque ponderosi liquores a multa agitatione tepent (*m*). Ova in funda rotata coqui lego (*m**). Addunt aliqui, globulos sanguineos elatere pollere (*d*) & alternis vicibus & mutare figuram sphæricam & recuperare (*o*).

Constat, pergit Cl. viri, animalia a motu suo calorem habere, quod neque in ipso sanguine, neque in corde fibi relicto calor ullus superficit, & omnia vel a morte (*p*), vel in animi deliquio profundiori, atque pulsus cessatione, in eum caloris gradum relabantur, qui in atmosphæra obtinet; & qui plerumque triginta fere gradibus fahrenheitiani thermometri infra tempon humano sanguini familiarem est.

Contra animalia in universum, etiam frigida, calorem generant, dum perpetim se agitant, apum exemplo, quæ hiemali tempore sopitæ quidem frigent, collectæ vero, ut ostendimus, per hiberna frigora, in gradu 32 ejusdem thermometri, saepe a nobis citati, calorem nihilo minorem producunt (*q*), quam æstivi soles quidem producunt. Itidem homo, qui ab aeris externi rigore deprehensus, aut aquis submersus, aut pulsu manifesto destitutus

(*f*) *WILLIS de accensione sang.* p. 20. *J. de GORTER* L. c. p. 67. *MORTIMER* L. c. *SCHELHAMMER de febre* p. 91. *STEVENS* p. 821. Hanc objectionem nemmo patronorum fermentationis omisit: ipsa tamen aqua paulum a tritu intepescit *MARTINE* L. c. p. 153. *SEAC* L. c.

(*g*) A globulis rubris calor nascitur *SCHWENKE* p. 52. *HALES* p. 91. *HODGE* *of respirat.* p. 63. *LOSS* *of fevers* p. 10. 12.

(*h*) *SCHREIBER Almagist.* p. 275. *SCHREIBER T.* L p. 243. T. II. p. 10.

(*i*) *SHEBBARKE* L. c. p. 248.

(*k*) *Ibid.* p. 299.

(*l*) Cremor lacidis *MARTINE* L. c. *Cbris. Bernb.* *ALBINUS de iene* p. 13. *SEAC* T. II. p. 241. Farina trita calet *NOLLET cours de phys. expér.* T. IV. p. 245. & lac agitatum *G. v. SWIETEN Comment.* T. II. p. 291.

(*m*) Argentum vivum *SCHWENKE* p. 142.

(*m**) *CARDAN de varicis. rerum* p. 282.

(*n*) *SCHREIBER* L. c.

(*o*) *G. v. SWIETEN* T. II. p. 291. *DOUGLAS of heat* p. 135.

(*p*) Cadaver integrerrimum friget *SCHREIBER Almagist.* p. 273. Exempla sunt equideni, in quibus in cadavere etiam 24 a morte horis calor aliquis superfuit *Eph. Nat. Cur. Dec. II. ann. IV. obs. 22.* cuius phænomeni causam ad imperfectam mortem, vitæque superstitionis reliquias, vel ad aliquem casum referimus, quem adnotationis auctores præterviderunt.

(*q*) p. 29. *REAUMUR* T. V. p. 671. 672.

destitutus, idemque animal per hiemalem soporem frigens calorem suum 9 $\frac{1}{2}$ & 9 $\frac{1}{2}$ graduum recuperat, novosque adeo 62 gradus generat, si cordis motum, atque adeo sanguinis circuitum, absque novo calore, simplici aliqui irritatione restitueris.

Majorem etiam motus, quo vitalis humor per sua vasa progreditur, potestatem aliis ex argumentis demonstrari pergit. Sub rigidissimo enim caelo glacies perpetua, nullo aestivo calore superabilis, terre interiora obstricta, & liquor thermometri non ad 28 (r). & 33 (s) quae maxima frigora esse reputabantur, sed ad 113 (t) & 120 $\frac{1}{2}$ (u) gradus sub FAHR. congelabile frigus descendit, aer autem tanto glaciali gelu magis friget, quanto super humanum calorem aestus ebullientis aquæ adscendit. In eo frigore omnia quidem animalia quieta continuo in statuam congelantur, & sanguis (x) & meracissimus de vino destillans latex in glaciem vertitur (y), & ipsi per aerem oberrantes vapores in spicula vertuntur, ut frigus non sentias, sed videas. In ea tamen incredibili vi frigoris homines, & animalia vivunt & calent, & suos 92. 94. 96. gradus caloris fahrenheitianos conservant: neque enim aut sanguis, aut urina unquam non calet, neque frigus ad interiora pectoris aut abdominis penetrat, dum vita superest; nempe anima'ia 184 ejusmodi gradus sui sanguinis motu generant (z), qualibus ebulliens aqua a congelascente distat. Et hoc frigore majus Belgæ in regione multo magis septentrionibus vicina tolerarunt, qui in Spizberga hiemarunt (a), inque libero aere venando, convehendis lignis, aliisque laboribus fani & alacres vitam sustentarunt. Denique in aquis polaribus, in quibus per summos aestivos calores, tamen immensæ glaciei insulæ superfunt, pisces cetacei, ipsis sub glacialibus campis, sanguinem & fluidum liberumque a coagulo & humano etiam crudiorem conservant; phocæ

(r) Petropoli MATT Jurnal Brit. 1750. Avril. MARTINEZ p. 285. 286.

(s) Tornex MARTINEZ Essays I. c. p. 286.

(t) Kirengz GMELIN flor. flor. pref. p. LX XII.

(u) Jenitez GMELIN I. c.

(x) In glaciem sanguis vertitur gradu 25. aqua gradu 32. MARTINEZ p. 351.

(y) In monte baton la PEYRE RELAT. p. 177. In budjons bay Phil. Transl. n. 465. Tornex REAUMUR Mem. de l'Acad. des Scienc. 1734. p. 255.

(z) Gradus 120 $\frac{1}{2}$ donec ad frigus congelabile redeatur; inde gradus 62 aut 64; donec sanguis 9 $\frac{1}{2}$ & 9 $\frac{1}{2}$ suos gradus recuperaverit.

(a) In LENSCHOTTEZ aliisque belgarum itineribus, qui Spizbergæ hiemarunt. Ille enim soli ex scorbuto perierunt, qui resiles, tenerique, suo in tugurio sedentariam vitam egerunt.

phocæ enim sanguis non paucissimis gradibus humano calidior est (*b*) : & haec quidem animalia fere tanto felicius vivunt, quanto frigidioribus in aquis habitant, sibique inter glaciales insulas, & sub ipsis glaciei campis, desiderata asyla felicunt. Adeo vero certum est, a motu & corporis exercitatione haec frigora superari, ut ipsi barbari, qui in eo gelido aere facile vitales superfunt, dum venantur, quando per viarum errores se vident perituros, quiete sola mortem inevitabilem accelerare norint (*b**).

Addunt illi viri, eo magis suam sententiam probari, quo penitus in ejus firmitatem inquiratur. Ostendisse se, motu sanguinis constituto calorem constitui, nunc ostensuros, aucto motu eum calorem augeri, diminuto diminui, sublato tolli. Ergo, cum calor humanus 94 & 96 fere graduum Fahrenheitianus thermometri sit, augeri eum calorem, quando pulsuum numerus & plenitudo, atque adeo celeritas sanguinis (*c*) augetur. Sive enim ab ira, cupiditate, gaudio, pudore, pulsus increbescat, sive a corporis exercitatione, sive a pastu, sive ab aromatibus, aut a spiritu vini epoto, sive a febre, a quacunque demum causa, quæ pulsuum numerum auxerit, & robur, ab ea etiam calorem in sanguine augeri, donec summum gradum adtingat, qui in hominem cadit, & qui non valde multis gradibus centesimum superat (*d*). Neque, vicissim, unquam calorem intendi, quin una pulsus increbuerit (*e*).

Sed etiam frictionem, irritationis genus, calorem manifesto augere, & inflammationem, in qua rubor & pulsatio sanguinis auctum motum evidenter demonstrat. Una enim ruborem, sanguinisque ad conficitam partem corporis confluxum increscere. Porro eo majorem nasci calorem, quo humores vitales densiores fuerint, adeoque ab eodem inotu per ea vasa major frictio nascitur. Ut globorum numerus crescit, & crassamentum est uberiorius (*f*), eo major caloris gradus obtinet, neque absque rubore calor est, sive sanguinis conciti abundantia. Sed etiam ferri elementum, quod in globulis sanguineis latet, ad calorem producendum aliiquid conferre potest,

(*b*) Phocæ in cute calor est 101 graduum, in abdomen gr. 103. MARTINEZ EJUS
P. 337. Conf. p. 36.

(*b**) Ultiaci ISBRAND ID ESS. HIST. p. 44.

(*c*) p. 36, 166, 167. Calor maximus est cum pulsu constanter pleno SCHWENKE p. 61.

(*d*) p. 36.

(*e*) Calor a pulsus frequentia MARTINEZ de anim. similib. p. 213,

(*f*) p. 294.

test , cum nullum corpus a tritu vehementius incalescat (*g*). Ut pariter densiora vasa (*h*) , ita calor major est , argumento bestiarum , quibus manifesto duriora ossa , membranæ firmiores , vasa solidiora , quam homini sunt , iisdemque calor intensior (*i*). Viti feminis calidiores (*i**) , durius nempe sunt fabrica. Contra pueri minus aliquanto calent (*k*) , quam adulti homines , ut modo natus puer vix calorem conservet , nisi sollicite & copiose vestibus texeris : pueris autem & abundantiam sanguinis esse , & pulsuum magnum numerum confit , sed vasa molliora , sanguinemque magis aquosum.

Porro adeo manifesto a cordis majori motu calorem augeri ajunt , ut eadem semper animalia magis caleant , quibus cor pro reliqui corporis portione majus est , aves adeo , in minima etiam mole (*l*) , & animalia ferocia carnivora (*m*). Iisdem enim animalibus sepius in dato tempore arteriæ micant (*n*) , & momentum impulsus in arterias sanguinis majus est , siquidem a validiori organo impellitur. Hinc animalia , hominesque , macilenterioris corporis , calent magis : hinc magnæ forte bestiæ exiguis non sunt calidiores , cum grandioribus cor pro portione minus sit (*o*) , pulsusque infrequentior (*p*).

Si cum motu sanguinis incitato calor increscit , idem cum diminuto motu minuitur. Multæ cause sunt , quæ pulsus , parvum , aut deminutarum reddunt , nulla , quæ non una frigus faciat. Rarescit a senio , & idem frigus facit , ut etiam levis in numero diminutio (*q*) , jam calorem frangat. Sed pulsus plurima debilitant. Animi affectus non videtur quidquam in humoribus mutare posse , adeo & subito nascuntur , & subito , ablique vestigio relicta , evanescent , adeo etiam manifesto materie parent , quam humotibus

(*g*) L. VI. p. 301.

(*h*) H A L L E S *homoflat* p. 107. P E R L I Z *theor. calor.* p. 4.

(*i*) p. 35. 36.

(*i**) M A R T I N E *animal. simil.* p. 271.

(*k*) S C H W E N K E p. 62. Error est in prælectionibus B O E R H A A V I A N I S Leidz editis , quando duorum graduum caloris prærogativa puerorum sanguini tribuitur p. 37.

(*l*) L. IV. p. 431.

(*m*) Ibid. R O B I N S O N *of food and discharges* p. 101. 102.

(*n*) L. VI. p. 250.

(*o*) L. IV. l. c.

(*p*) L. VI. l. c.

(*q*) Frigent , quibus pulsus ad 90 adve 92 redit S C H W E N K E p. 62. Si in thermometro manu comprehenso ad 90 & 92 gradus liquor sublidet , pulsus aut tardus est , aut rarus S C H R I E B E R *Abmagist.* p. 272.

moribus adsundant. Et tamen animi adfectus & metus inprimis, frigus faciunt (*r*), dum pulsū debilitant. A morte pronunciata frigus (*s*): sed hysteriarum seminarum algor (*t*) notissimus est. Europæi, qui in Curaßao insulam aliquamdiu vixerunt, solent fere debilitari; iis in tanto cœli æstu tres quatuorve gradibus minor calor est, quam Europæis nuper, cum suo rubustiori temperamento, advenis (*u*). Eodem redeunt, quæ absque humorum vitio sunt, pulsū debilitates, quas vocant asphyxias. Eæ constanter frigus inducunt. Asphyxia & perfectum frigus, septem dierum, V ALISNERIO (*x*) dictum est. A lapsu pulsus nullus, frigus universorum artuum (*x**). Eo etiam falsæ illæ mortes hominum pertinent, qui pro examini cadavere ideo habiti sunt, quod una frigerent, neque pulsus arteriæ perciperetur. Amplam segetem collegit CL BRUHIER (*y*), nos pauca de multis decerpemus. Vtola frigida, atque rigens, cum absque pulsu & respiratione esse videretur, suscitata est. Homo submersus, frigidus, rigens, hac tenus sibi reddi potuit, ut altero demum die perierit (*z*). Submersa femina glacie ad similitudinem frigebat, quæ decem post horas cum vita reconciliata est (*a*). A vapore sodinæ carbonariæ exitinctus homo, frigidus, ad vitam revocatus est (*a**). Qui absque pulsu & calore erat, inflando suscitatus fuit (*a***). Virgo aquis mersa, quam spiritus, pulsus & sensus deseruerat, restituta est fomento cinerum (*b*).

Rara hæc videntur, vulgatissimum vero est, in hibernacula aves (*c*), & alia animalia se recipere (*d*), ea omnia sopito motu cordis, pulsū fe-
re

(*r*) SCHWENKE p. 68.

(*s*) ALBERTI *Med. Legal.* T. V. c. 16.

(*t*) BOYLE of cold p. 312. 313.

(*u*) TITTING geneeskoff p. 381.

(*x*) Off. var. in operum T. III p. 278. Confer de synopticis HELMONTIUM in *Blae's bunnar* n. 19.

(*x**) GVARINONI consil. 193. Aliud exemplum WOODWARD easis p. 321.

(*y*) Sur l'incerititude des signes de la mort Paris 1749.

(*z*) p. 204.

(*a*) p. 211.

(*a**) FOTHERGILL phil. trans. n. 475.

(*a***) Journal de Medec. 1758. M. Nov.

(*b*) p. 245. Confer alia exempla p. 160. 275. 314. T. II. p. 86. 317. 323. 300. 302. 324.

(*c*) KLEIN in Acta Societ. Gedan. AMBOSIUS in NERRINGII palingenesia p. 75. Robert Boyle of cold p. 312. CITES opuscul. p. 151. LINN Oeconom. Natur. p. 39. BRUHIER l. c. T. II. p. 126. 127.

(*d*) CITES p. 75. &c.

re evanescente, cum minima vita, absque sensu & calore (*e*), brumam superare, eademque, redditio quacunque de causa cordis motu, rediviva incaescere. Mures montani hieme immoti, & ut marmor frigidi degunt (*e**).

Eo denique pertinent, quæ aut dicta sunt, aut certe de causa frigoris calorisve piscium, dici potuerunt. Quibus piscibus pulmones dati sunt, iis cor ingens (*f*), sanguis plurimus (*g*), calor etiam humano major (*h*). Qui pulmones non habent, iis cor parvum, multo quam avibus (*i*) minus est. Nuper reperi, cor cyprini 9 granorum, cum pondus animalis esset 4920, adeoque cor fuit = $\frac{1}{546}$ totius corporis: cum in homine pondus sit decem fere unciarum, pondus totius corporis librarum 150, five unciarum 2400, adeoque pondus cordis ad pondus totiss corporis uti 1 ad 240. Sed etiam piscibus pulsus multo pauciores, sanguinis copia exigua est, & arteriae aortæ diameter, in eodem pisce cyprino, longo perdeni, non major 7 centesimis unciae, quæ ratio, si omnia reliqua eadem posueris, facit sanguinis portionem in ejusmodi pisce, ad sanguinem in homine, uti 72 ad 171, cubos vero uti 373248 ad 5000211, five uti 1 ad 13. Neque objici potest, cordis majorem in cetaceis piscibus molem, certe media ex parte ad pulmonem pertinere, cui alter ventriculus unice destinatus est (*k*). Nam in pisce procul dubio æqua sanguinis portio ad branchias fertur, qualis in calido quadrupede ad pulmonem, uti adparebit, si arterias branchias subeuntes mensuraveris. Sed etiam si cor quadrupedi unice quadruplum posueris, habebis in quadrupede causam motus quadruplo majorem, cum sanguinis copia pariter 13^{as} uberiori, eaque rationes in se ductæ invicem dabunt calorem in quadrupede 52^{as} majorem, quam duo gradus sunt¹, quos interim in piscibus frigidis, ranisve, aut viperis (*l*), ponimus generari, medio inter iniquos numeros usi. Ita adparebit, ut calor in homine possit 104 graduum esse, dum in pisce graduum est duorum. Nam etiam in humano genere, frigus perpetuum fuit, cum cor justo esset angustius (*m*). Et pedes, eaque corporis partes, quæ a corde longius re-

P p 2

motæ

(*e*) HARVEI &c. vide p. 223.

(*e**) Journ. Oeconom. 1718. Mart.

(*f*) L. IV. p. 431.

(*g*) De phocis MARWENS Spieberg. Reiss.

(*h*) p. 36.

(*i*) L. IV. l. c.

(*k*) p. 408. 409.

(*l*) L. VI. p. 19.

(*m*) Hist. de l'Acad. 1748. p. 61. Pulsus non percipiebatur.

motu minores accipiunt arterias, primæ frigent minusque concalescunt. Si quid calculo deest (*n*), sanguis piscium utique aliquanto aquosior (*o*) minusque ferri momentum, sufficient, ut intelligatur, cur minor in piscibus calor generetur.

Uti a cordis sanguinisque motu diminuto, calor frangitur, ita a sanguinis ipsius diminuta copia, aut densitate, globulorumque portione (*q*), calor pariter debilitatur, sive a venæ incisione (*r*), sive ab haemoptoe (*s*), sive ab inedia (*t*) hæc inminuantur. Sed etiam lente diminuta globulorum ubertas frigus inducit, exemplo leucophlegmatiæ & chloroseos (*u*), in quibus cum pallore frigus dominatur.

Ex his similibusque argumentis deducunt Cl. viri, omnia consentire, ut legem statuere liceat, esisque adeo calorem animalium in ratione directa celeritatum sanguinis circumducti, aut (in Leibniziana hypothesi) in quadrata celeritatis (*x*); & in ratione inversa diametrorum vasorum (*y*). Nam proculdubio frictio cum angustia vasis augetur, & ea altera est ratio, cur minora animalia eodem, quo grandia, gradu calere queant, globali enim æque magni, in minoribus earum bestiolarum vasis, vehementius confricantur. Eadem videtur causa facere, ut pene eadem in diversis corporis humani partibus calor sit temperies: in majoribus enim vasis celeritas major cum minori frictione, in minoribus frictio major cum celeritate minori conjugitur. Artus tamen aliquanto frigidiores sunt (*y**)

S. XI. Quæ contra hanc hypothesin adducantur.

Etsi in hac schola enutritus, etiam non conscius forte, ad placita P R E C E P T I O N E

(*n*) Sanguis nempe viperæ non $13,^{m}$ sed in minori aliqua ratione parcior quam quadrupedi L. V. p. 6.

(*o*) BOYLE Chem. Sept. P. II. de piscibus & viperis.

(*p*) L. V. Sect. II. n. 44. compar. cum fine Sect. III.

(*q*) A globulorum paucitate frigus H A L E S p. 113.

(*r*) Spoliationem vocat F. Q U E S N A I, quod sanguis ruber ex vulnera exundet, inque minoribus vasis tenuiores humores residueant, qui in magna vasa reduces sanguinem tenuorem & aquosum efficiunt.

(*s*) S E X A C T. II. p. 255.

(*t*) Ab inedia sanguis intra biduum quatuor gradibus refrigeratur: M A R T I N S anim. simil. p. 224.

(*u*) S C H W E N K E p. 60.

(*x*) S A U V A G E S de inflammatis. p. 219.

(*y*) In ratione celeritatis & diametri calores æstimat Cl. M A R T I N S de anim. fil. mil. p. 161. 164. Sed nimis manifestum est, frictionem in minoribus majorem esse p. 276.

(*y**) R O B I N S O N p. 207.

TEPTORIS optimi furtim nonnunquam relabor, non tamen dissimulabo utique præcipua, quæ contra hanc caloris theoriam aut dicta sunt (z), aut mihi dici posse videntur. Continuo objiciunt contrariarum scholarum patroni, male calorem a nimis lento, nimisque debili motu repeti, quo sanguis circumagatur, quem nullo modo oporteat cum enormibus illis frictionibus confundere, in quibus vel de ligno per foramen rotato (a), aut de ferro malleis tuo (b), aut de silice a chalybe (c) percusso ignis ipse erumpit. Has enim frictiones esse durissimorum corporum ad alia solidâ corpora adtritorum: hic de humore quæri, qui per levissima vasâ labatur; aquam vero adeo non incalescere frictam, ut etiam in duris corporibus æstum a frictione oriturum contemperet (d). Nullo vero, etiam multo celeriori motu, aquam concalscere. Sanguinem in minuto primo 150, in secundo (e) adeo duos pedes cum dimidio percurrere. Sed torrentis meminit Cl. U L L O A (f), qui intra $29\frac{1}{2}$ minuta secunda 35 hexapedas cursu absolvat, plus adeo septem pedibus in minuto secundo. Violentiorem etiam isto fluvio ruere magnum illud Amazonum flumen, quando per claustra montium Pongo 12 pedes in secundo minuto percurrit (g), aliumque fluvium in eo tempusculo quatuor omnino ejusdem mensuræ orgyas superare (h) & alias in alpibus etiam hoc navigabili flumine multo rapidiores cataractæ superesse. Cl. etiam vir J. Theophilus DESAGULIERS (i) aquam ex 16 pedum altitudine lapsam intra minutum secundum supra 32 pedes percorrere expertus est. Nullius autem momenti cataractæ sunt, quæ 16 pedibus non sunt altiores. Quæ prope templum Lauterbrunn pulcher-

P p 3

rima

(z) Conf. HAMBERGERUM theor. inflamm. p. 27. 28. SHREBBEREARE princ. us
prædictæ p. 59. 60. 61 &c.

(a) Nodyr Saxonum siebat ex duorum duriorum lignorum confrictione LEIBNITZ
injicell. Berolini. T. I. p. 98. De americanis tes notidima est ELLIS eoy. to the budfumby
p. 234. Utuntur Coilotrapali ligno BROWNE natur. hist. of Jamaica p. 111.

(b) Ferrum malleatum incalescit, ut sulfur incendat BOYLE de origin. form. & qualit.
p. 72. NOLLET T. IV. p. 237. & perinde ex lima, debiliori cum motu, exæstuat
BOYLE p. 74.

(c) NOLLET T. IV. p. 220. In conflitu chalybis cum silice nascuntur trium gen-
nerum scintillæ, fragmenta silicis, chalybis nigræ, & chalybs in globulos fusus REA U-
MUR Memoir. 1736. NOLLET cours de physique expériment. T. IV. p. 215. s'GRAVE-
SANDRE p. 2578.

(d) SHREBBEREARE p. 59.

(e) p. 165.

(f) p. 369. edit. German.

(g) Voy. du fleuve des amazones.

(h) Introduction p. 64.

(i) Course of experim. physiol. T. II. p. 422.

rima se precipitat, 800 minimum pedum est, & tamen, cum hac enormi rapiditate, aquæ nivales primum suum de alpibus adlatum frigus conseruant, multoque vulgaribus aquis vehementius rigent. Sed etiam aquam, quam protector in vase animalis impulit, minime tepefcere (*k*) constat.

Ut ad animalia minus accedatur, eorumque humores (*l*), poterant adverfarii objecisse, non omnibus animalibus frigidis sanguinis pulsus infrequentes esse, siquidem rante 68 sunt, numerosiores quam equo, & ad 95 atque 100 (*m*) per irritationem increbunt, que frequenter in homine febrem facit. Neque frigidorum piscium humores lente moveri & debiliter, cum sint in ea classe animalia, quæ celeritate sua etiam velocissimos equos praetervent, constantia immensum superent. Certe legisse me memini, canem piscem, quem¹ socii navales ex accepto vulnere facile aignoscabant, quindecim diebus totidemque noctibus navem secutum esse, que Danicos missarios (*n*) vehebat: cum ea navis quovis nocthemero sexaginta & ultra leucas secundo vento absolveret. Ejus adeo animalis corpus hexapedas fere 120000 intra viginti quatuor horas, inque hora 5000, in minuto secundo vero supra octo pedes percurrebat, triplo & ultra adeo celerius movebatur, quam sanguis per arteriam aortam hominis movetur. Et tamen his animalibus sanguis eodem fere gradu, quo ipsa aqua friget. Dudum præterea observatum est, etiam ad hunc eundem finem, testudinis cor valide pulsare, & robustissimum animal tamen frigere (*o*). Et tamen in piscibus omnia eadem esse, perinde robustas arterias, similes sanguinis adfissiones, & a parietibus repercussiones, & vortices, qui globularum in calidis admittuntur, nulla ratione a frigidis animalibus excludi. Neque arteriarum salientium contractiones & dilatationes calorem videre generare, que mollissimæ sint (*p*) & absque impetu fiant: neque membranas continuo madentes ab ejusmodi motu incalescere.

Sed frustra adduci, piscium sanguinem aut pauciores habere globulos, aut tenerius crassamentum (*q*). Nam manifesto in frigidis sanguinis bestialis globularum numerum tantum esse, quantus cogitari potest (*r*), & sanguinem

(*k*) GORTER de perspir. c. 8.

(*l*) Ne pro priori sententia cum CL. BARTSCH reponatur, aliam ab aqua humorum animalium naturam esse de calor. anim. p. 21.

(*m*) WHYTT I.c. p. 350.

(*n*) In iuriis legi, quorum 84. prodierunt, sed locus excidit.

(*o*) PHIL. TRANF. II. 27.

(*p*) I. 198.

(*q*) LISTERIA de humorib. p. 245.

(*r*) L. V. p. 57. 58.

guinem similia in coagula abire (s), & multo densiorem, rubicundiorumque esse, quam phthisicæ puellæ sanguis est, qui cum sua aquosa indole tamen caleat, et si minus certe globorum continet, & plus aquæ.

Denique caloris gradus omnino non esse in ratione celeritatis sanguinis (t). Sano homini pulsus esse 70 (u) calorem 96 graduum: eundem hominem febricitantem pulsus habere 130, atque adeo non multum infra duplum numerum, plenos etiam magnosque in morbis inflammatoriis, calor tam non facile supra 108 gradus (u*) in eo homine esse, qui a 96 duodecima parte differunt. Celeritas ergo sanguinis sextuplo fere majori ratione aucta est, quam quidem calor.

Iterum, pone calorem balnei esse 100 graduum (x), eum calorem communicabit etiam cadaveri aut homini, quem animus linquit, cum pulsu adeo nullo, frictione sanguinis nulla, neque ulla earum causarum quæ calorem generare dicuntur. Sed in hypothesi, contra quam hoc loco dicetur, ea frictio, motusque sanguinis in circulum acti, producit caloris gradus 64 (y). Pone ergo syncopticum illum hominem in balneo reviviscere, deberet in ejus sanguine calor nasci 164 graduum, nam & priores ab aqua 100 gradus habet, & novam causam, quæ gradus 64 dicitur producere. Nihil autem fit ejusmodi, & calor hominis manebit circa centesimum (z), et si causas ipsi adsignavimus, quas æquum esset producere gradus 160. Idem fit, si loco balnei ardorem cæli ponas (a) etiam majorem quam balnei, graduum 109. aut 120, quales aestus in aere fuisse alibi retulimus. Is idem eo tempore calor erit cadaveris, pescive: sed in homine causa est, quæ etiam sola gradus producit 64, atque adeo calor sanguinis nunc deberet esse

(r) p. 17.

(s) Fætus III. SONREIBERUS, hanc potissimum ob rationem, velocitatem sanguinis non uicinam esse caloris causam *Almag.* p. 277.

(u) p. 261.

(u*) Ad 109 in febre continua de HAEN T. II. p. 158. Ad 19 REAUMURIANOS gradus in febribus intermitentibus ANONYM. de iis febribus p. 36. ad quadranginta *SAUVAGES de inflamm.* p. 238. nempe 112 gradus *FARENH.*

(x) Potest maior esse L. V. p. 33. 34.

(y) Plures ponit possunt, si cogites in fibrlico gelu, sanguinem solo suo motu caloris gradus producere 214. p. 295. CL DOUGLAS trigesies maiorem calorem in pulmone generari debere objicit, quod in eo viscere trigesies celerior sit circulatio, quam in manu quidem p. 28. Sed ea quidem celeritas rejici potest.

(z) p. 36. Imo eo cum caloris gradus 14 graduum REAUMURII sudavit equidem Le MONNIER, ceterum pulsus ipsi non incutitus fuit, ut omnino non videatur vehementer exstans. *Mém. de l'Acad. des Scien.* 1747.

(a) DOUGLAS ou *ibid.* p. 28.

esse 184 graduum. Verum, contra theoriam, homo eo in æstu calore suo ne atmosphærae quidem calorem adtingit, infacte eum, 11 & 28 gradibus manet.

Verum etiam aliis in exemplis summos æstus in homine nasci, quando pulsus pauciores sunt, eosque remittere, cum numero pulsuum majori. Ipse expertus sum, cum 100 pulsibus molestissimum mihi ardorem fuisse, cum 110 vero omnino me commodius habuisse. In frigore intermissione febrium pulsuum numerus potius major est (*b*): inque febribus etiam inflammatoriis (*b**) malignis (*c*), & hecticis, ægrisque (*d*), paucissimum sanguinem habentibus, æstus pene intolerabilis, pene manifesto ab acrimonia potius urinosis sanguinis, quam a vitali illa sanguinis frictione pendet. Denique exemplum extare, in quo nullo cum pulsu in hectico homine, frigus quidem exterius pene marmoreum, sed una calor ad thermometrum 97 graduum fuerit (*e*).

Addidit hisce nuper III. clinicus, omnino ab aliis causis & calorem oriri & frigus. In manu enim paralytica, bono cum pulsu, frigus fuisse (*e**), inque alio, calorem adeo modicum, ut 73 gradus non superaret (*e***). Et vicissim frigus nasci a causis pulsuum omnino non minuentibus, calculo biliaris ductui impacto, cathetere vesicam adtingente, intestino strangulato, rupto abscessu visceris, aut alioquin effuso pure (*e****). Videri adeo alieni præter sanguinem, sanguinifve motum caloris causam superesse.

His similibusque rationibus moti Cl. viri, non a frictione aut sola, aut potissimum calorem nasci sibi persuaserunt, sed in pulmone alii, piscium exemplo, & in aeris efficacia causam ejus caloris quæsiverunt, in principio vitali alii, aut in potredinis fervorisque aliquo irritamento.

• §. XII.

(*b*) p. 265. Conf. etiam de H A E N rot. med. T. II. p. 163: 264: & A N O N. de fibr. interm. p. 26. Ardor in peste cum pulsu vix celeriori R U S S E L natur. bijtor. of Aleppo p. 209. 230, cum sanguine resoluto.

(*b**) Caloris gradus 100. cum summo squalore, & coriacea cruxta Ant. de H A E N. T. III. p. 139.

(*c*) HUXHAM fore fibrosa p. 58. Ad de H A E N T. III. p. 140. cum pulsus tantum 3. 4. vicibus in primo minuto superent.

(*d*) A P I M U S in diss. p. 70. 71. In homine cachectico, spina ventosa laborante, pallido, cum pulsu debili, tamen calor 100 grad. de H A E N T. III. p. 140..

(*e*) De H A E N I. c. p. 11.

(*e**) T. III. p. 141. 142. 149.

(*e***) p. 144.

(*e****) A N O N Y M U S de fibribus internistis p. 281

§. XII. *Hypothesis Roberti Douglass.*

A recepta caloris ex frictione nati hypothesi haec est Vir Cl. (*f*) ut calorem, quem animal supra tempore ambeuntis aeris generat, unice ad eam frictionem rubrorum globulorum limitaret, qui per vasa capillaria sua diametro augustiora transeant, & eadem a medio frigidiori tangentur & ambeuntur. Negat enim Vir Cl. calorem ullum a frictione in vasis humani corporis generari, si eadem & sanguinis temperies fuerit, & ambeuntis aut aeris, aut aquæ (*g*). Excitat eadem, quæ etiam nos recentissimus experimenta (*h*), ex quibus constat, per calorem aeris, aut aquæ, cui inmergitur, nullum novum calorem generari. Eo autem experimento ita utitur, ut frictionem aiat nullam esse, quam primum aeris ambeuntis tempore haec capillaria vasa dilatavit, ut eorum lumen diametro rubrorum globulorum majus sit (*i*).

Alii, nuperiores scriptores (*k*), electricam materiem accusarunt, quæ ex terra, & ambeuntibus corporibus adliiciatur, & a globulis rubris attracta, calorem generet.

§. XIII. *Quid ex nostra sententia hic statui possit.*

Ut ab ultima hypothesi initium faciam, est equidem in sanguine electrica materies, quæ lucida specie & peculiari odore se prodit. Sanguis enim hominis electricam naturam adepti, de vena saliens, in tenebris lucidam pluviam edidit (*l*). Verum hæc eadem materies a frigidis animalibus non absit, neque tamen calorem producit. Vipera, quæ electricum torrentem emittere apta facta est, perinde scintillam emittit, ut inus, cypus sanguis calet. Sed etiam cadaver scintillam perinde edit. Non ergo videtur cum calore electricæ materiæ præsentia aliquo necessario vinculo conjungi.

Deinde in *Robert Douglassi* hypothesi, nova (*m*) utique, multa

(*f*) *Essay concerning the generation of heat in animals* p. 47. 48. 136. &c.

(*g*) p. 19. 19.

(*h*) Hujus libri p. 303.

(*i*) IDEM vir Cl. p. 19. 38.

(*k*) *SHEBBEARE L. C.* p. 50. 51. 91. &c.

(*l*) *DRESCHALS de hemipleg. per electricit. curata.*

(*m*) Nova se neminiisque dicta proferre Vir Cl. p. 130.

multa desiderantur, quorum unicum excitasse sufficiat. In ranis in primis & pis-
cibus ea experimenta facta sunt, per quae constat, vasa minima unicum globulum
transmittere: tum ea, ex quibus creditum est ostendi, unicum istum globulum
suo vasculo minorem esse figuramque mutare, ut transire possit. Hæc adeo
rana DOUGLASSIANAS conditiones accurate explet, quas ad calorem
producendum Cl. vir credit requiri. Sed tamen ea rana, ejusque ad fines
pisciculi frigent. Neque adeo ab angustia minimorum vasorum ejusmodi
frictio sequitur, quæ calorem generet. Sed etiam viscera, quæ aerem non
contingunt, cute semper aliquanto magis calent (*n*).

Quæ contra BOERHAAVIANAM, receptamque de caloris generatione sententiam proferuntur, ea demonstrant, neque penitus accurate tamen, aquam calorem non generaturam, si loco sanguinis per vas humana circumflueret. Neque enim ulla cataracta frictionem eam generat, quæ in vasis nostris numerosissimis, & minutissimis locum habet. Deinde non ideo, si aqua ex frictione incalescere non potest, continuo sequitur sanguinem incalescere non posse, neque potest de alio corpore unquam tuto dici, quod de alio verum est. Piscium a quadrupedibus in cordis arteriarum & sanguinis ad reliquum corpus portione certum discrimen ab objectione oblata non evertitur. Calorem animalem non supra 108 aut 110 gradum a motu sanguinis augeri posse (*o*), dum vita supereat, per experimenta producta evincitur: non tamen ideo ostenditur, a motu calorem non generari. Etiam aqua nullo ab igne super 214 gradum calet, neque ideo verum est, ab igne aquam non incalescere. Deinde in eodem sole aer, aqua, argentum vivum diversos caloris gradus concipiunt, neque adeo eadem causa diversos liquores ad eundem gradum calefacit (*p*). In febris calor sœpe major videtur, qui non vere major est, sed magis intolerabilis (*p**). Siccus æstus calore cum sudore conjuncto semper actior est, forte quod eo in statu calidissimus vapor in cute retinetur, papillæque teneras ingratu cum sensu torret, qui idem vapor in sudore exhalat, inque aquam congestus, easdem papillas temperat, quas squalor, utcunque natus, solet moleste adipicere. In phthisicis e quidem febris adest, neque tamen negamus, sanguinem actiorem, particulis fotum urino-

(*n*) MARTINE Essays p. 338.

(*o*) Quare diei nequit cum 192 pulsibus calorem in homine fore aquæ ebullientis WAINWRIGHTI p. 43. 72.

(*p*) MUSSCHENBROEK Essays p. 483. Aer calet ad 94. argentum vivum ad 126. aqua ad 150.

(*p**) Æstus intolerabilis gradu 100 cum crusta coriacea de HÆHN T. III. p. 144.

urinosis solutoque adipe, calorem majorem cum eodem motu progressivo concipere posse. In febribus intermittentibus sensus molesti frigoris cum vero ad themometrum calore conjungitur, uti dudum vidi, & nunc consentientis mecum III. HAENII testimonium laetus video (q). Exemplum vero, quod IDEM contrarium offert, videtur ostendere, sanguinis folis in interioribus arteriarum truncis motum superfluisse, qui calorem generaret, cum interim ad exterieos ramos nullus nunc sanguis perveniret (r).

Denique non semper frigus esse, quando de frigoris sensu ægri conque runtur, ex viro III. gratus disco, sensumque aliquem nervis ingratum pro frigore haberi, cum quo verus calor constat, legitimum enim calorem adstantes observabant, bono cum pulsu, cum de perpetuo brachii manusque frigore æger quereretur (r*). Cum pulmone purulento frigus per 24 horas marmoreum, cum thermometri gradibus 97. (r**).

Quid pulmo ad generandum calorem conferre possit, alias inquiretur, cum prima fere & multis Cl. viris recepta veri species potius persuadeat, frigidorem aerem magis refrigerare, deque sanguine calorem tollere, qui alibi generetur. Deinde exempla apum (s) ostendunt, animalia absque pulmone, & absque recentis aeris commeatu, calorem suo motu generare posse. Et solemus in æstuoso aere respirationem iterare frequentius, non certe ut incalescamus, neque facile fallit instinctus. Sed alibi haec repetentur. Hactenus certe maxime probabile videtur, utique a motu sanguinem incalefcere, et si nondum constat, quare magis quam aqua, & quare non super certum gradum incalefcere possit.

§. XIV. Motus sanguinis putredinem impedit.

Balsamum sanguinis chemici primo, deinde passim populariter alii medici, eam cauſam dixerunt, quæ intercedit, ne dum vita supereft, sanguis in putredinem ruat, sed blandam suam potius innoxiamque naturam conservet. Ea causa procul dubio motus est, quo sanguis circumducitur, & hactenus non abs re III. STAHLIUS præcipuum finem circuitus sanguinis in eo ponit, ut putredinem, & discessionem elementorum sanguinis,

Q q 2 terraे,

(q) In frigore febris intermittentis calor 98. 100 & 103 graduum 164. T. II. p. 163.

(r) p. 220. In axillis calor 95 graduum cum in carpo esset 73. de HAEN T. III. p. 144.

(r*) de HAEN T. III. p. 149.

(r**) IDEM T. II. p. 11.

(s) p. 29. 30.

terre, aquæ, & olei impedit. Nam in toto humano corpore, & in singulo artu, continuo humores putrefacti, quando motus suppressus est; & evidenter in exemplo, ovum vitali germe animatum blandum manet & inodorum, in eodem tempore, qui omnes humores in detestabilem putridinam vertit, quando vel omnino vis muscula ad ovum non accessit (*t*), aut fetus ante tempus vitam amisit. Prima in cadavere fere sanguinis putredo est, si a facibus alvi recesseris, inque sanguine primum aer vinculis solutus expeditur. Sed etiam vivo in corpore per febres malignas sanguis in vibicibus stagnans putreficit. Idem tamen vitalis humor, qui a quiete corruptitur, a nimio etiam motu ad eamdem putridam indolem vergit (*u*), ut omnino quedam in circuitu mediocritas ad sanguinis integritatem conservandam requiratur.

Si accuratius rationem exquisiveris, qua motus putredinem avertat, duplarem inveniemus. Nam progressivus motus intestino resistit (*x*), neque adeo finit fermentationem obtinere (*y*), neque fere putredinem. Deinde vitalis motus sanguinis, organorumque sani hominis, humores putrefactibiles continuo expedit & abigit (*z*), & quæ ad urinofam acrimoniam accedunt, ea per cutaneam perspirationem, per urinam, cumque alvi facibus expurgat & ejicit.

Sed neque nescia (*a*) nihil ad avertendam corruptionem confert, quæ ad particulas adiposas, urinosæque indolis perpetuam aquam remiscet, neque finit aut ea elementa se expedire, quæ in sales abire apta sunt, aut ea, quæ oleosæ sunt indolis.

S. XV. Et tamen humores ad urinofam naturam disponuntur.

Priorum hæc contraria videri possunt, cum tamen contraria non sint. Sublato motu progressivo sanguinis subita putredo nascitur (*b*), conservato, & aucto lentior, sed certa tamen ad acrimoniam putredinosam dispositio

mutatio

(*t*) REAUMUR de l'art de faire éclore les oiseaux domestiques T. II. p. 44.

(*u*) p. 84. 85.

(*x*) p. 185. SHERRAKE p. 57. Etiam aqua stagnans putreficit, mota ab eo vivio immunis est.

(*y*) BOERHAAVE E'm. Chem. T. II. p. 186.

(*z*) PRINGER I. c. p. 419. Nempe perspiratione suppressa humores animales corruptiuntur.

(*a*) p. 184.

(*b*) n. 34.

sitio in humoribus nostris nascitur. Ostendetur suo loco (*c*) si absque cibo & potu esse mus, celeriter sanguinem dissolvi, sputum, & mucum o-
ris oolidum reddi, acerrimam urinam, fetidum sudorem, vera certe pu-
tredinis initia. In febre etiam aqua admiscetur, tamen horum similia fi-
unt, & aliquando etiam graviora (*d*). Si causam generate acrimoniae pu-
trediae inquisiveris, videtur calor, qualis in humano sanguine perpetuus ha-
bitat (*e*), tritusque (*f*) perpetuus, qui inter solidas fluidasque corporis par-
ticulas, & inter humorum demum elementa exercetur, in hoc effectu
producendo conjungi. Ostendimus enim per experimenta, & a calore *g*,
aut *h* humores nostros ex propria indole acres reddi, & putrescere : &
tritum in particulis animalibus eamdem degenerationem promovere. Quare
quo utraque caula potentior fuerit, eo vehementiora etiam putredinis in-
crementsa sunt, sive calorem nimium astumque venti Samiel repetuisse (*g*)
placuerit, sive febrium, aut mechanici demum tritus (*h*), aut ignis fu-
bitam (*i*) efficiam. Subita enim gangræna a sola manuum ad rudentes
nimis celeri frictione nascitur, acidaque natura ab ejusmodi causis utique
subigitur (*k*). Si mechanicam rationem curiosior repetieris, qua hæc a-
crimonia producitur, nihil adferemus (*l*) nisi communem legem, qua his
ex causis olea acerrima, particulae nondum falsæ vehementer urinose red-
duntur, pigri viscidique humores tenues ; minimumque ad ignem adscen-
furi nunc volatiles, etiam extra corpus animale fiunt.

§. XVI. Globulos facit.

Globuli & ipsi, serius tamen, per putredinem destruuntur & evanescunt (*m*). Quomodo eos vis circumducti sanguinis figuret (*n*), quo-
modo a minorum vasorum luminibus mensuram suam mutuentur (*o*),

Q q 3

non

(*c*) Lege interim *Comm. BoERHAAVE* ad T. I. cap. *de ventric. ad.*

(*d*) p. 85. 86.

(*e*) p. 35. 36.

(*f*) p. 271. seqq.

(*g*) p. 31.

(*h*) p. 293.

(*i*) p. 117.

(*k*) *M A C Q U I R E. Mem. prat.* p. 441. *N U M A N.* ex edit *Z I M M E R M A N.* p.

(*l*) In morbis acutis figuram globosam humoribus nostris familiarem in acutam mu-
tari solimavit *Job. de G O Z T E R. Chirurg. repurg.* p. 18.

(*m*) p. 46. 47.

(*n*) p. 275. Eo modo pilæ marinæ nascuntur *L A N C I S.* I. c. p. 25.

(*o*) *BoERHAAVE* p. 200. num. 8.

non dudum exposuimus. In pulmone (*p*) nihil omnino privilegi video, cur magis, quam alia corporis animalis particula ad globulos parandos aptus sit. Nam & absque pulmone in piscibus, & cum pulmone exiguo in serpentum, ranarum & lacertorum genere, & in pullo aere nondum fruente, neque pulmonem ullius efficaciam habente similimi globuli parantur (*q*). Neque in celeritate sanguinis pulmones permeant quidquam peculiare esse, suo loco ostendemus (*r*), excitato interim experientia nostro, quo nihil simile constitutum (*s*).

Multo demum viæ labore, cordisque & vasorum lenta opera (*t*), globulos parari aliqua suadere videntur, plethora menstrua post 23 demum dies renata: pallor diuturnus, qui sanguinis magnam jacturam quamcunque sequitur, lente certe superabilis. Et tamen aliis argumentis evincitur, paucorum dierum, & unici, opus esse. In pullo incubato intra 50 horas rubedo adparet (*u*), globulis utique rubris facta, qui in pellucido, & albo fetu adeo nuper nati sunt. In ranis exsanguibus unicus bonus pastus rubedinem in arteriis venisque restituit.

§. XVII. *Rubor unde nascatur. Hypotheses variae.*

In fano homine sanguis letissime rubet, idem in cadavere, & in venis, & in arteriis obscuro colore tingitur. A quiete rubor perit, etiam dum animal vitale supereft. Sanguis in cellulosa telam effusus nigricat primo, deinde, ut in cadavere, in tenue flavumque liquamen abit. In globulis rubor certo residet, sed quomodo in eas sphærulas introducatur, id quidem oportet ostendere.

A figura globosa non pendet. Nam & in lacte globuli sunt, sed albi, & in adipe pellucidi. Deinde per experimenta III. ELLERI ostenditur, & conservata figura globulorum colorem perire, & contra mutata figura ruborem manere. Et primo globuli a sale ammoniaco (*x*) longi &

plani

(*p*) Repete L. VIII.

(*q*) p. 55. seqq.

(*r*) L. VIII. de respiratione.

(*s*) Second Mem. sur le mouv. du sang Exp. 102.

(*t*) QUETENAI Oeon. Anim. T. II. p. 41.

(*u*) Inter 24 horas, si fidum esset experimentum Antonii MATTHIASIENS de la form. du poulet p. 53. Sed in nostris, et si non ubique rubor dominatur, tamen cum 50 hora puncto salienti utique adeat Mem. sur la form. du poulet T. II. p. 206.

(*x*) Mem. de l'Acad. de Berlin T. VII. p. 14.

plani redundunt, & tamen sanguis in pulchre rubentem gelatinant vertit. Contra spiritus acidi sanguinem terreo (y) ingratissimo colore tingunt, & tamen globulos non destruant (z).

Sed neque a densitate rubor nascitur, et si cum denso sanguine conjugitur. Solent ita docere (a), ut minores massulae in unam majorem coactae ruborem induant. Eam opinionem credo ex coagulis (b) natam esse, quæ omnino a multiplicatis globulorum seriebus rubedinem saturatorem concipiunt. Nam cæterum et si superficies sphæræ majoris minor est, non ideo aut color variatur aut densitas: neque aureus globulus majoris voluminis densior est aureo globulo minori, cum utriusque idem sit pondus specificum (c): neque globuli sanguinei ex minoribus aliis compinguntur (d). Poterunt demum minores globuli densiores esse deletis, qui inter eos erant poris (e). Lucis particulæ subtilissimæ sunt, eademque densissimæ.

Iterum, si velis alio modo densitatem sumere, ut ad crassitatem superficie refringentis pertineat, sitque ruber globulus venosus (f), in exemplo, crassus $\frac{1}{1000}$. autem globulus ad $\frac{1}{10000}$ aut si id malis, fac ruborem fieri a crassitate duobus ex foliolis sanguineis composita, quorum singulum album est & $\frac{1}{100000}$ crassum (g), ut omnino rubor densitatis effectus sit, tunc utique ad physica theorematum redditur, ad quæ neque anatome pertinet, neque etiam audacior physiologia. Et in priori quidem hypothesi majus inter arteriosum & venosum sanguinem discrimen sumitur, quam quidem natura admittit (h). Deinde densissima quidem corpora aurum, mercurius, plumbum non valde raro rubrum colorem induunt (i), quando in calces rediguntur; non ideo hæc ad globulos nostros possent traduci, paulum aqua graviore, & quibus plurimi liquores densiores sunt, neque ideo non pellucidi, argumento vitreorum globulorum, olei vitrioli &c.

(y) p. 77.

(z) ELLER ibid. p. 16.

(a) CONF. BOERRA. n. 220.

(b) p. 20.

(c) PUJATI de Morb. Naron. p. 107.

(d) p. 66. seqq.

(e) MICHELOTTE litt. p. 41. 49. NOLLET T. I. p. 123. &c.

(f) SAUVAGE de l'inflammation. p. 244.

(g) EBERHARD physiol. p. 70.

(h) p. 10. 11. 12.

(i) NEWTON optik. p. 205;

&c. Denique intersperso aere, quem flatu adigimus, rariori adeo redditia massa, tamen rubor augetur (*k*).

Ne i^l quidem verum est, a majori propinquitate ruborum globulorum ruborem pendere. In sanguine enim a solutione salis (*l*), aut a fixo (*m*) alcali, ave sale Epsomensi (*n*) pulcherrime rubente, globuli vere semoti ab illi. viro visi sunt, s^epeque & stipatos globulos flavos vidi, & solitarios pulchre rubere (*o*).

Denique a densitate omnino, quae ex cohaesione pendet, globuli non rubescunt. Corium enim pleuriticum rubra placenta multo tenacius, tamen album est (*p*).

Sed neque in pulmone rubor oritur, quæcumque deum ejus proxima causa fuerit. Nam piscibus, ranisque sanguis nihilo minus eleganter rubet quam homini, pullo incubato (*q*) etiam letius, qui mediis in aquis natat (*r*). Et infectorum succi dantur omni sanguine pulchrius rubri.

Si a respiratione rubor non est, non erit ab *aereo nitro*, quæ præterito in primis seculo celebris hypothesis fuit (*s*) & hactenus superest, ut certe ab aere ruborem Cl. viri derivent, et si nitrum non nominant (*t*). Duobus experimentis tota hæc theoria nictitur. Sanguinis quidem, qui ab admisto nitro fluidum ruborem induit (*u*): deinde crux in patellam recepti, cuius facies obversa aeri floridius rubet, dum ea, quæ fundum va- fisi contingit, & ab aere distat, obscurior sit, & pene ad atrox inclinat. Id experimentum in asini sanguine ARISTOTELES (*x*) fecit, deinde plurimi nuperorum repetunt (*y*). Etiam lien in cadavere fuscus, in superficie

(*k*) Conf. MICHELOTTUM in epist. ad FONTEN.

(*l*) ELLERI l. c. p. 17.

(*m*) Ibid.

(*n*) p. 15.

(*o*) p. 56. 57.

(*p*) MICHELOTTI epist. ad Fontenell. p. XV.

(*q*) HARVEI de generat. anim. p. 49. Mem. sur la form. du poulet T. II. p. 37.

(*r*) Hæc pertinent ad BOERHAAVE Inst. Med. n. 200. Abr. KAAUW BOERHAAVE de perspirat. n. 464.

(*s*) LOWER l. c. c. 3. MAYOW Tr. II. de respir. Malachias THRUSTON in diatrib. de respir.

(*t*) A. KAAUW l. c. n. 455. HELVETIUS delairissens.

(*u*) p. 73. 74.

(*x*) Hist. anim. L. III. c. 10.

(*y*) LOWER p. 183. edit. belg. R. BOYER de occult. aeris qualitat. FRANCIS SATTE apparat. ad hist. sangu. p. 216. 12. Phil. Transf. n. 27. HELVETIUS l. c. p. 153. Mem. de l'Acad. des Scienc. 1718. p. 233. MICHELOTTI Epist. p. XLIX. SCHWINNE p. 115. 116.

cie aeris exposita rebescit (z). Multis modis utraque hypothesis evertitur.

Primum nullum in sanguine, neque in reliqua natura nitrum est, & abutuntur utique Cl. viri acore illo universae atmosphaerae indigena, qui nondum nitrum (a) est, & cum terra vitriolica in vitriolum, cum terra inflammabili in nitrum (b), cum alia ad lixiviosam natum tendente terra in salem marinum abit. Id acidum purum quidem vix innotuit, & quando meracum habetur, sanguinem potius tetro aliquo colore inficit (c). Minime vero philosophi est, corpori cuicunque dotes tribuere, quæ sunt alterius. Sed de nitro aeris alias accuratius dicetur.

Deinde, eti si utique globuli solitarii non pallent, in fano certe animale, (d), verum est tamen, congestos rubedine esse intensiori (e), uti omnes utique aliquo colore tincti liquores suum calorem eo magis saturatum possident, quo plures laminæ coloratæ sibi incumbunt. Ita fit, ut supremi globuli, qui tenuem haec tenus simplicemque laminam efficiunt, coco nativo splendeant, inferiora autem ejusdem sanguinis strata eo profundiori sint purpura, quo plura sibi incubuerunt (f). Omnino uti vinum rubrum, cuius singulæ guttulæ pallent, dum idem in scyphos majores congestum nigricat.

Dudum ergo ostensum est, in sanguinea placenta nigram faciem, quæ patellæ fundum contigit, inverso coagulo sanguinis supremam nunc factam late rubere (g), atroxemque, & tristem colorem ad eam laninam nunc descendere (h), quæ pulchre rubebat. Nunc enim simplex est laxatarum sphærularum lamina, quæ haec tenus plurimis, & sibi incumbentibus globulis concorporebatur: ultimi vero innumerabilium laninarum fit, eaque ab omnibus reliquis testa, quæ olim supra fuit.

Ideo fit, ut in lata, & parum profunda pelvi (i) sanguis totus ru-

(z) VERRYST de respi. p. 51. LAMBERTUS obser. Anat. p. 29.

(a) SLARE Phil. Transf. n. 104. HENKELI fil. saturn. p. 248.

(b) HENKEL ibid. NEUMANN &c.

(c) p. 77.

(d) p. 57.

(e) Aut. v. LEEUWENHOECK, qui aliam rationem subesse negavit Phil. Transf. n. 106. Addit. BOERHAAVE Influs. ret. Acad. n. 221. SCHWEINKE, MICHELOTTI opib. p. XIX. & alii.

(f) BOYLE p. 171. PAPA, SANDRIS, MICHELOTTI p. XX. BOYLE bish. Gang. p. 10. 12.

(g) MUSSCHENEROECK de aere p. 10. A. de HEYDE obij. 87. MALLEPIGE. postib. p. 19. 41. PAPA de humor. c. 1. p. BOYLE circul. Anat. p. 170. BOYLE p. 12.

(h) SCHWEINKE p. 117. MALLEPIGE. I. C. BOHN I. C. SANDRI p. 104.

(i) FR. BAYLE problem. V. HELVETIUS I. C.

beat; in profundo & angusto vase omnino, ut de vino diximus, nigreret.
 Inde fit etiam, ut sanguis in aquam emissus, laxatis globulis, qui solebant in placenta congeri, pulchriorem purpuram induat (*k*). Hinc flatu, tritu, aere inter massulas cruroris interposito, femotis adeo globulis sanguis coccineus redditur (*l*). Inde in ipso moribundo animale, aut mortuo demum, inflato pulmone aut pulmonali vena, diductis vasis, & aere inter venulas intersperso, rubor excitatur floridus (*m*), uti vasa rubra per cutem pellucientia roseum colorem efficiunt. Inde sanguis venosus nigrior (*n*) adparet, quod multum de aqua sua & lympha amiserit.

Iterum ea, quæ sub crusta pleuritica sanguinea placenta latet, & nusquam aerem contingit, tamen superiorum superficiem pulchrius rubentem habet (*o*). Is etiam sanguis, qui de vena in clausum testumque vasculum salit (*p*), potius rubicundior eo est, qui atri exponitur. Denique in ipso spatio inani (*q*), grumi sanguinis facies superior florido colore est, tristi quæ imum fundum contingit, & vicissim eadem, nunc suprema, absque aeris usu latum colorem recuperat. Omitto idoneos testes, quibus ostenderem, inversæ placentæ superficiem aeri obtensam, non semper latam rubedinem recuperare (*r*).

Non negarem, globulos imos a supremis compressos figuram mutare, & cum ea colorem floridiorem deponere, cum experimenta producantur, in quibus pars placentæ cruris superior solidior, ima mollior esse dicitur (*s*). Verum facilitas, qua inversæ placentæ facies superior ruborem recuperat, non videtur admittere, ut globulorum figura mutata fuerit.

Alias de ruboris origine hypotheses chemica (*t*) experimenta suppeditarunt. Videbant lac cum lixivioso sale coctum rubere (*u*), similemque colorem

(*k*) PUJATI L. c. p. 90.

(*l*) BENNET theatr. tabidor. p. 9. BIRCK T. II. p. 274. MICHELOTTI & HELVETIUS *hist. de l'Acad.* 1718. p. 26. HALS *bemalatik* p. 105.

(*m*) FERREIN in dijñ. BOHN *de influxu aeris* p. 438.

(*n*) MICHELOTTI epist. p. XXVIII. conf. de sanguine hepatis SENAC T. II. p. 50.

(*o*) Ant. de HAEN *ratio medend.* p. 110.

(*p*) PUJATI p. 86. de HAEN p. 10. Addit ruborem tertio die ad medium penetrare.

(*q*) C. AUG. a BERGEN *disputation* p. 6. REGA apud SCHWENKE p. 216.

(*r*) De HAEN p. 111. PUJATI p. 87.

(*s*) HELVETIUS *Memoir. de l'Acad. des Scienc.* 1718. p. 233. SCHWENKE. Negat inam partem semper molliorem esse MICHELOTTI p. XIX.

(*t*) KESSEL *de chemia ad corpus humanum applicata* KRUGER *physiolog* II. 92.

(*u*) ROB. BOYLE *apparat. ad inflor. sang.* p. 73. LOESCHER *Antropolog.* experim.

colorē ex oleo, aut sulphure per lixiviosos sales dissoluto nasci (*x*) aut ex vini spiritu, super ejusmodi sales adfuso (*y*): aut ex salibus urinosis volatilibus cum sulphureis spiritibus digestis (*z*), aut ex inflammabili elemento adtenuato (*a*). Videbant pallido & cachectico sanguini serum per spiritum cornu cervi adfusum ruborem restitui (*b*). Ejusmodi ergo aliquam causam ruboris esse, & in alcalini principii cum sulphureo coniunctione latere fere persuadebantur Cl. virti, non memores, diversissimas similis phænomeni causas esse posse, & fere ejus vitii complices, quo ex singularibus phænomenis nimis late patentia corollaria deducuntur. Nam etiam ex acidis principiis rubor nascitur. In vegetibili regno ita plerumque cum rubro colore acor conjungitur, ut semper conjungi Cl. LINNÆUS pro lege posuerit. Acidis fructibus solum adfulgens folis jubar ruborem impertit. Coccus americanus ab acidissimis spiritibus solutus ruborem suum elegantius impertit, qui ab urinosis salibus in purpuram deprimitur. Serum & lac cum acidis spiritibus evidentius, quam cum sale fixo lixivio rubet (*c*). Non ideo quisquam acido sanguinis elemento ruborem tribuerit. Denique repetimus, neque lixiviosum (*d*) in sale sanguinem esse, neque crux oleum ab eo spiritu solvi.

Unico verbo tangimus nuperi scriptoris, ex pictorum officina (*e*) prudeuntis, hypothelin. In centro globuli rubri album punctum esse auctor est, quod per multum serum translucens rubrum adpareat. Nobis quidem argenteum ejusmodi jubar (*f*) non semel in solitariis globulis visum est, ut naturam ab eo pictore visam esse non negemus. Verum non minus certum est, medium globulum adeo non album esse, ut in ea majori crassitie rubor intensior habet (*g*).

R r 2

§. XVIII.

ment. p. 10. BOERHAAVE *Elem. chem.* T. II. prop. 91. ARBUTHNOT L. c. p. 77. DOORSCHOOTEN *de lache* p. 19. KNIGHT *Vindict.* p. 62. KESSEL L. c. pro simplici eventu experimenti.

(*x*) HOFMAN *Med. systemat.* T. I. p. 95. KESSEL L. c.

(*y*) KESSEL L. c.

(*z*) VANDER BAECKE *de principiis* p. 64. Tinctura cochinelle aut roccella ab alcalina urina exaltatur RUTTY *synops.* p. 405.

(*a*) LOREY *de aliment.* p. 64.

(*b*) FLOYER *extraordinary state of humours* p. 51.

(*c*) PETIT *Epist.* II. p. 36.

(*d*) p. 96. &c.

(*e*) GAUTIER *essai de physique* T. I. P. III. p. 409. 410.

(*f*) Second *Mémoire. Sur le mouv. du sang* Exp. 14.

(*g*) Ibid. Exp. 19.

§. XVIII. *Aliæ de causa ruboris conjecturæ.*

Cum priora omnia non satis firma videantur, tentandum est, ut aliqua magis probabilia proferantur. Primum ergo memoria repetemus, a vi valida cordis ruborem nasci (*h*), eumque in sanguine minui, inquit flavorem relabi, quoties in homine aut incubato pullo (*i*) aut in rana (*k*), vis cordis fracti languet. Sed etiam effusum extra vasa cruentem, ex rubore in pristinum flavorem redire. Contra flavam lympham facile aut admoto igne (*l*), aut vini spiritu (*m*), aut lixivioso aliquo sale, aut ab aliqua non satis nota causa (*n*) rubescere. Denique sanguinem non dubie ex flavo vitello nasci, primævum sanguinis colorem flavum esse, qui per varios rubiginosæ coloris gradus in ruborem confirmetur (*o*). Videtur adeo nos proprius ad verum accessus, si flavi coloris cause detegantur, quæ erunt faciliiores sint.

Ergo calcinata sanguinis terra flava (*p*), crocoque martis adfinis, eademque ipsi vitro encrustico (*q*), flavum colorem impertit, qualem idem & a ferro fossili accipit. Porro ferrum coctis argillis, adfinique cancerorum thoraci, & gemmis (*r*) denique ruborem dat. Nunc hujus ferri copia in solis fere rubris globulis reperitur (*s*), paucior procul dubio in animali debili, cui sanguis flaret, copiosior in robusto, cui intense rubet (*t*). Iterum ferri elementum (*t**) chloroticis flavisque puellis ruborem legitimum, solitamque genis purpuram restituit (*u*). Non ergo improbabile videtur

(*b*) p. 295. seqq.

(*i*) p. 56. 13.

(*k*) ib.

(*l*) De lymphæ ductus thoracici *DUVERNOI* de *fusidion microcosmi*. diff. 7.

(*m*) *DUVERNOI* *Comment. Acad. Petrop.* T. I. p. 269.

(*n*) Rubra lymphæ frequens est *PETER* adf. 13. *BSCHELIN* obf. 50. L. I. p. 245. *Sylvius* de *Boz* diff. VIII. n. 7. *DUVERNOI* I. c. *Gelatina* in *cellulofani* tenui effusa frequentissime rubet, quo argumento confirmior, non unice a sanguine adnotatum lymphæ ruborem esse.

(*o*) p. 11.

(*p*) p. 119.

(*q*) p. 120.

(*r*) *HILL* *Mater. Med.* p. 7.

(*s*) p. 120.

(*t*) Siquidem globulorum plus est. p. 48. 57.

(*t**) Inistique exemplum habet *WEPSTER* in diff. de med. chalyb. pallide virginitis & aquoso habitu languentis, cui ferrum colorem & vigorem restituit.

(*u*) *WILLIS* de *febre* p. 108.

videtur, eam terram cum oleosa parte sanguinis subactam, multa vi cordis (x) vividique in circulum motus subactam, mistamque, ruboris causam esse, et si nondum utique explicare suscepero, quo mechanismo id elementum in lamellis rubrum potissimum colorem reflecentes preparetur.

§. XIX. Densitas.

Etiam hæc sanguinis affectio cum vita, cumque vigore vitæ nascitur; & a morte aliquamdiu persistat. Sed demum & ipsa deletur, cuni sanguis in flavam aquaræ resolutus dispereat (y). Primumque omnium a visciditate densitatem separare oportet, cuius diversissime causæ sint. Densa fluida sunt, quibus sub eodem volumine multum est mala, adeoque ponderis: viscidæ, quorum particulae ægre a mutuo contactu dimoventur. Cum densitate summa fluiditas perfectissima conjungi potest, in argenti vivi exemplo: comque raritate visciditas, ut in oleo: interque sanguinis elementa, globuli quidem rubri densissimi sunt, sed iidem ad motum obeundum aptissimi. Deinde non oportet coagulum cum densitate confundere: illud enim a globulis vitiis unitis & confluentibus fere nascitur, densitas autem ex globulorum rubrorum aucta copia, adque reliqua sanguinis elementa portione. Coagulum quietis partus est, densitas a motu nascitur.

Vera densitas in sanguine vel totius massæ est, vel globulorum, vel utriusque. Quæcumque sit, cum rubore semper conjungitur; quo letius enim sanguis rubet, eo major globulorum ad serum circumfluum portio est, & pariter eo firmior cujusque globuli compages. Qui vero sanguis absque densibili placenta carnium loturam refert, is una debiliter rubet.

Densitas totius massæ est in globulorum numero, adque serum portione. Cum enim, quam serum, ponderosiores sint, eo major etiam sub eodem volume sanguinis massa erit, quo major totius sanguinis portio globulis constat. Quo major contra serì est portio, eo minus in eo sanguine est ponderis, ruboris, calorisque (z).

Iterum globulos ipsos valde probabile est, alias solidiores esse, mol-

R r 3

liores

(x) Hinc puerperæ palliditez per corporis exercitium, usumque aromatum & idoneorum remediorum, legitimum ruborem recuperant, aque vi nausturinorum medicamentum aliæ cachecticæ feminæ parem in colore suo emendationem expertæ sunt. SCHWENCKE p. 94. MIZO de plant. nausturin. p. 42.

(y) p. 44. seqq.

(z) SCHWENCKE p. 38. 171. 172.

liores alias, quod jam *Antonii v. LEEUWENHOECK* aut inventum fuit (a), aut experimentum. Inde vero aut tenerius, molliusque coagulum erit, aut densius, robustiusque. In tenera virgine, in hominibus pulmonem debilem nasci, in animale multo usu aquae laurocerafi quasi venenato (b) ejusmodi delicatum sanguinis coagulum est, rubrum tamen, & lætissimi coloris sed minus cohærens, fluidoque humoris proprius.

Denique poterit utraque sanguinis densitas conjungi, nempe & densi globuli esse possunt, & multi: potest etiam utriusque dotis contrarium obtinere. Ita in aucta utraque densitate & major placente ad serum erit portio, & placenta ipsa firmior solidiorque, inde & totus sanguis in eodem volumine plus habebit ponderis, & placenta seorsim (c). Contra in debilitate chlorotica & seri major portio est, & qui superfluit globuli in mollius, minusque densum coagulum abeunt, quod aliquando præ levitate fero innatavit (d).

Densitas utraque unde nascatur, est ut inquiramus. In pulmone sanguinem sanguinari, magni viri conjectura fuit (e), quod sanguinem in eos viscere majorem tritum pati crederet: quod in venam angustiorem sanguis de pulmone redux conponatur: quod a destructo pulmone, aut inutili, sanguinis phthisica tenuitas nalcatur (f): quod piscium minorem, & minus densam placentam esse persuaderetur: quod sanguis pulmonis efficaciam passus in vena hujus visceris magis (g) undique sibi similis, & florido rubore sit; quod per pulmonem celerius sanguis circumeat, eodemque tempore omnis totius animalis sanguis circulum obeat, quo per totum corporis anibutum circumfertur.

Adfinis haec tenus alia theoria est, quæ sanguinem a frigore suscepti per respirationem aeris in pulmone addensari ponit, plurimosque, ab ipso retro *CARTESIO* (h) autores habet.

Contra utramque hypothesin interim observamus, in ranis, aliisque animalibus pulmone ipso destitutis, & globulos esse, & densabilem sanguinem (i). Deinde omnia ulceræ perinde sanguinem dissololvere,

neque

(a) *LEEUWENHOECK* philos. transatl. n. 117.

(b) *H. LANGRISH* physical exper. upon brutes.

(c) *SCRIVENER* p. 38.

(d) IDEM p. 172.

(e) *BOERHAAVE* Instit. rei med. n. 200. 202.

(f) n. 204. 261. Prælett. T. II. p. 223. 487.

(g) n. 204.

(h) *De format. fet.* p. 201.

(i) p. 58. &c.

neque quidquam in pulmonum ulceribus peculiare esse. Demum sanguinem a multo majori frigore minime addensari (*k*) , quam quidem vulgo experimur : quæ vero de sanguine venæ pulmonalis prærogativa dicuntur, ea experimentis repugnare.

Alio ergo videtur recurrentum. Massæ quidem sanguineæ densatio obtinetur, quoties plurimi globuli parantur. Oportet adeo eorum materiem, adipem, ferrum, copiose præsto esse : multamque vim circumeuntis sanguinis eam materiam, ut diximus (*l*), in globulos figurare. Oportet eas vires vitæ esse, & viscerum imprimis præparationi chyli præfectorum, ut materies globulis parandis apta omnis elaboretur neque, per diarrhoeas crudaque alvi excrementa disperdatur. Aquæ copia minuitur bona & uberiori perspiratione, sudore, expedito per omnia excernicula sanguinis commeatu, viribus iis, quæ non finant crudas manere particulas, ex quibus globuli parari possint.

Singulæ sanguinis massulæ ut densentur, fere diximus. Si recipere licet, lactis globulos albos (*m*), grandes, & laxos esse, poterunt utique ii globuli pressi, multaque vi per angusta minimorum vasculorum colla acti, aqua, & leviori, aut peregrina materie liberari, ea vero elementa, quæ globulorum propriam naturam constituant, in propiores contactus urgeri, ut pori minuantur, leviorisque materiei portio decrescat, densiorque perficit. Ita lactis, chylive pondus specificum augebitur (*n*) ut sero primo, deinde crux aequaliter fiat. Neque dubium est, globosam figuram facere, ut ponderosioris materiei in dato volumine plus sit, quam ulla in alia figura esse potest.

Etsi nunc naturæ arcanae fabricas utique minime penitus perspicimus, tamen indubitatum est, muscularum diligentem usum, corporisque multam exercitationem in homine, inque ipsis animalibus adipis & aquæ portionem minuere, globulorum vero copiam angere, sanguinemque rubrum reddere densumque : febrem denique (*o*), quæ & ipsa auctus cordis labor est, pene subito coaguli duritatem augere, & aquæ portionem minuere, inque vivi hominis aneurysmate sanguinem eodem ordine densari eo magis, quo cordis vires potentiores experitur, ut intima arteriæ mollia coagula teneant,

(*k*) L. VIII. *de respiratione*.

(*l*) p. 309 310.

(*m*) Conf. p. 52.

(*n*) Lac ad serum est uti 567 & 568. ad 569. TABOR mercis. p. 64.

(*o*) p. 43. 44.

teneant, laminæ parietes vestiant facci, lubricæ intus, extus duros (o*), quæ ipsa maximo argomento est, veras nos addensationis causas proposuisse. Nihil enim febris ad densandum sanguinem conferre potest, præter motum cordis auctum, & aquæ diminutam portionem. Deinde contraria horum, sanguinem laxum, aquosum, tenuem generare, otium nempe, somnum, refrigerantia medicamina, & quæcunque cordis irritationem, pulsuumque robur & numerum minuunt. Adparebit utriusque obpositæ causæ efficacia, si debilis virginis aqueum sanguinem & decolorem, cum robusti agricolæ densabili cruore comparaveris. Cæterum, perinde ut fluiditas, ita densitas quamdam in motu sanguinis mediocritatem postulat. Quies sanguinem quidem cogit, sed laxe. Motus mediocris fluiditatem reddit, major addensat, iterum major resolvit.

Seri sanguinis dentatio ab iisdem causis pendet, & a febre etiam magis, quam grunni densitas (p), subito augetur. Incertum est unice, num seri elementa globorum aliave figura fint.

s. XX. Elementorum separatio.

Etsi ornatius hæc humorum tenuiorum a sanguine secessio repetetur, paucis tamen verbis oportet hic monere, de sanguine arterioso dedecere plurima, quæ in principio venarum desiderantur, ut omnino, eo certo loco (q), sanguis venosus arterioso crassior sit. Quæ enim de sanguine decedunt, ea pleraque sanguine tenuiora sunt (r) & fluidiora. Eigo de sanguine decedit adeps (s), lympha (t), vapor exhalabilis varius (u), hæc ubique, deinde suo quoque loco peculiaris aliquis humor (x), saliva, urina, vapor perspirans, sudor, sebum, nervus succus, aut dearticulationum unguentum, & alia id genus. In venulas ergo nascentes crux quidem omnis transfit, nempe globuli rubri: deinde liquor tenuis, in quo iuglo-

(o*) *Obs. of a Society at Lond. T. I. p. 346.* Simplex concusso etiam effusum ex vasis sanguinem addensat.

(p) p. 126. - 27.

(q) *Fizz's de liene p. 112.*

(r) Hinc sanguinem in minimis vasculi diffuniri & depravari scriptit E. HOADY *in respiration p. 61.*

(s) L. I. p. 36.

(t) L. II. p. 108 seqq.

(u) p. 102. ad 108.

(x) p. 58. ad 101.

globuli moventur. Non ideo universus venosus sanguis arterioso crassior erit. Nam paulo post, quam ex arteriis venulae ortae sunt, remiscetur in eas adeps (*y*), vapor exhalans cellularum (*z*), vapor cavearum grandiorum (*a*), lympha (*b*) forte de valvulis vasculis, humor de aere in cutem, in pulmonem resumitus, humor de cibis resorbus, alii forte ninus noti liquores, ut denuo incertum sit, num omnino sanguis majorum venarum arterioso crassior sit, tenuiorve.

§. XXI. Visciditas.

Tardioris motus aliquæ procul dubio adfectiones sunt, uti celerioris fluenti. Tardiorem autem aliquanto sanguinis arteriosi motum in minimis esse, æquum est creditu (*c*). Quomodo inde adtractio particularum sanguinis augeatur (*d*), non repetimus, unice tacturi, humores in arteriarum finibus ad visciditatem disponi, adtractio ne eorum elementorum, quæ motus progressivus divellebat. Sed eam visciditatem demum plena quiete perfici, & humoris tenuioris resorbitione, quo amissio reliqua portio crassior superret. Plerique vero humores humani aliquanto aqua viscidiores sunt, etiam urina (*e*) & saliva (*f*).

S E C T I O I V.

Motus sanguinis per venas reducis.

§. I. *Motus sanguinis per venas progressivus.*

Similis fere venosi sanguinis contemplatio erit ejus, qua arteriosi crux consideravimus, neque natura majoris arterias, quam venas fecit,

(*y*) L. I. p. 40. (*z*) L. II. p. 151. (*a*) p. 151.

(*b*) Addend. ad T. I. p. 518.

(*c*) L. V. p. 192.

(*d*) L. V. Sect. III. n. 6.

(*e*) SAUVAGES ad HALE'S *Elementa*. p. 43. Vis adhaerens urinæ ad aquam quadruplica est.

(*f*) Octupla ad aquam ibid.

fecit, et si nuperi medici illarum phænomena fere unice, harum vix obiter exposuerunt, haec tenus veterum mori penitus contrarii, qui venarum historiam arteriose prætulerant. Est autem in venis, perinde ut in arteriis, motus, quo sanguis a minimis & nascentibus venulis ad cor revehitur; quem *progressivum* vocant, est sua in venis lateralis pressio, sunt utriusque sui effectus. Brevioribus tamen verbis licebit hanc partem motus sanguinis describere, quod plurius in venis & arteriis aut similia, aut perfecte opposita sint, neque repetitione indigent.

§. II Motus sanguinis in minimis venulis.

Uti arteriosi sanguinis motus a corde incipit, ita venosi historiam a radiculis venosis ordimur. Ex, quam arteriosae, notiores sunt, & oculo armato facile, tutoque considerari possunt. Quas ego vidi, ex in mesenterio rete faciebant, olim jam notum (*g*), acutangulum, venularum varie interplexarum, quarum principia ex arteriis continuata, eo quidem loco, nunquam vidi, sed in caudis piscium accuratus & ego conspexi (*h*), & clari, quos excitavi, viri (*i*). Ex venulae adeo tenues sunt, ut membrana evanescant, globulique in corollæ precatæ speciem emineant (*k*). Has venulas *minimas* merito voco, quibus minores dari repugnet. Unius (*l*) enim globuli capaces, si paulo angustiores forent, eum globulum, adeoque rubrum sanguinem, penitus excluderent. In iis nunc venis sanguinei globuli celeriter fugiunt, anfractusque vasculorum expedite superant (*m*), et si non contingunt, inanique spatio separari videntur (*n*).

Celeritas plerumque eadem fere adparet, quæ in majoribus venarum truncis (*o*), aliquanto minor quam in arteriis (*p*), ut tamen hæc minora vasa frequen-

(*g*) A. de Huyde l. c. p. 8.

(*h*) L. III. p. 240. *Second Memoir sur le mouvement du sang* Exp. 59. 62. 63. 68.

(*i*) L. III. p. 237 seqq.

(*k*) Exp. 124.

(*l*) *Second Memoir*. l. c. & exp. 119. 120. 121. 125. 126. 127. 128. 131. 132. 133. 134.

- (*m*) l. c. Exp. 119. 120. 122. 124. 125. 126. 127. 128. 132. 133. 143. 144.

(*n*) Exp. 122. 124. 127. 128. 131. 142.

(*o*) Exp. 119. 121. Aliquanto minor Exp. 121. & *Prem. Memo.* p. 81. Aliquanto celerior Exp. 133.

(*p*) Exp. 115. 117. 118. 121. 125. 128. 134. 136. *Aequa celeritate* Exp. 115. 120. 121. 124.

frequentius prima quiescant (*q*), & dissipatis globulis evanescant (*r*). Non desunt tamen experimenta, in quibus diuturnior minimorum vasculorum quam grandium, motus fuit (*s*), & aliquanto celerior. Sed casui hanc prærogativam tribuerim: uti certo ad casum ea pertinet, qua nonnunquam venosi sanguinis celeritas arteriosam superat (*t*), & quæ bono seni, *Antonio v. LEEUWENHOECK* olim imposuit, ut sanguinem venosum arterioso perinde celerius fluere scriperit (*u*), ut nonnunquam constantius fluit (*x*).

§. III. In venis plurium globulorum.

Aliquæ plurium globulorum venæ ex ipsis arteriis oriuntur (*y*), & *LEEUWENHOECKIO* (*z*), & aliis claris viris (*a*). Aliæ nascentur ex confluxu (*b*) venularum unius globuli, quæ venam duorum globulorum, inde plurium constituant. Ex minimis venulis sanguis in istas confluit (*c*), & ex istis in venas majores (*d*), quarum adeo grande lumen est, ut plures ordines globulorum eas perfluant, quam quidem numerare facile sit. In his nunc venis globuli, frigidis certe in animalibus, secundum lineas inter se (*e*) & axi parallelas feruntur, aliquanto, quam in arteriis (*f*) lentius: priusque certe plerumque fluere cessant (*g*).

Velocitas globulorum secundum axis fluentium aliquanto major est (*h*). In calcaria (*i*), & in flexiones venarum (*k*), globuli inpingunt, sed mol-

S s 2

liter

(*q*) Exp. 128. 132.

(*r*) Exp. 126.

(*s*) Exp. 122. 125. 126.

(*t*) Exp. 126.

(*u*) *Phil. Transf.* n. 319. Veloce in *continuat. arcuæ natur.* p. 131. &c.

(*x*) Exp. 125.

(*y*) *I. III.* p. 24c.

(*z*) *Ibid.* p. 237.

(*a*) *Ibid.* p. 238.

(*b*) *Second. Memoire* Exp. 134.

(*c*) Exp. 143.

(*d*) Exp. 127. 137. 139. 145.

(*e*) *Conf. prem. Memoir.* p. 86. *MALPIGII* postb. p. 92.

(*f*) Vide n. 2.

(*g*) Exp. 116. 119. 122.

(*h*) Exp. 134. Sit habet *MALPIGII* postb. p. 92. & *Petrus v. MUSSCHEN-*

BRÖSECK *Essay de phys.* p. 392.

(*i*) Exp. 131.

(*k*) Exp. 126.

liter : inter se invicem collidi non vidi, neque valde ad parietes fricari (1). Ita ad truncos maximos tendunt, quorum nullæ peculiares sunt adfectiones, & quorum phænomena dudum exposui (m).

§. IV. Motus venosi acceleratio.

Uti perpetuo aliquid motui sanguinis arteriosi decedit, ita venosi redditus continuo acceleratur. Multæ vero hujus accelerationis cause sunt, a quibus oportet eas separare, quæ non veræ, ex aliqua hypothesi additæ fuerunt.

Prima, quam removemus, cor est. Etsi enim longe maximam partem omnis motus animalis a corde unice repeto (n), neque venosum sanguinem alia a causa credo potentius moveri (o), non tamen credo, a contracto corde in suo motu accelerari. Credidit se vidisse Antonius v. LEEUWENHORCK (p) & III. nuper experimentorum physicorum auctor Stephanus Hales (q). Verum ego (r), tot in experimentis, nihil unquam vel in minoribus venis, vel in majoribus simile vidi, & Cl. virocorum testimonia ad vitiosas turbations motus sanguinis refero, qui post lentum, nullumve motum, restitutis animalculi viribus, recuperato impetu in circulum nonnunquam agitur (s). Verum ejusmodi phænomena rariora sunt, neque ad unumquemque pulsuum redeunt, neque inter legitimas motus causas numerari debent.

Sed neque venarum vis contractilis multum potest, etiam si multum ipsis tribuerunt clari viri (t), qui ligatas etiam venas depleri, neque adeo ab arteriosi motus succellione per venas sanguinem moveri, scriperunt. Etsi enim non penitus nulla est venarum vis contractilis, quam in derivatione demonstrabimus haec tenus veram, ut vene utique elatere, fibræ animali

(1) Exp. 125.

(m) L. III. Sect. I. tot.

(n) L. IV. p. 428. seqq.

(o) p. 477. Adde valde complexum experimentum. In deliquio nempe animi, sive cordis quiete, sanguis etiam de vena incisa fluere definit G. WATTS de reculsione p. 21.

(p) Philos. Transact. n. 319. v. UFFENBACH reisen T. III. p. 310.

(q) Hemastatiki p. 59.

(r) Second Mémoire Exp. 121. 130. 132. tum Ant. de HEYDE exp. 6. George ADAMS l. c. p. 45. J. ABB. BORELLUS de motu anima. L. II. prop. 31. Cl. DELIUS fränk anim. T. I. p. 21.

(s) Premier Mémoire p. 48. Second Mem. exp. 175.

(t) MATOURIX du mouvement des solides & des fluides p. 54, conf. L. II. p. 126.

(u) L. II. p. 114.

mali etiam non musculosæ innato, sua distentione resistant, sanguinisque pressionem coercent, lentum tamen & a musculosarum fibrarum efficacia multum diversum incrementum velocitatis est, quod inde sperari possit. Nam & absque conspicuis musculosis fibris (*u*) venas esse ostendimus, & absque irritabili natura (*x*), inque vivorum animalium incisionibus, neque venas ~~contrahi~~ (*y*) vidimus, neque incisis venis vulnera dilatari (*z*), quæ tamen dissecatarum fibrarum retractio etiam a debili vi contrarii exspectari posset.

Non penitus negavero, aliquando fieri posse, ut sanguis per venas eo celerius redeat, quod in spatiū inane fere rapiatur (*a*). Deinde sanguinem in auriculam dextram, tanquam in vacuum castellum approparet, ne id quidem videtur absque specie veri dici. Quando enim auricula nunc maxime inanita se remisit, non dubium est, quin facilius in auriculam inanem, quam in plenam, proximæ venæ cavæ suum sanguinem effundant. Sæpe tamen vidi, revinctis venis, atque adeo hac in auriculam deplectione impedita, sanguinem venosum tamen ad cor redire (*b*).

S. V. Accelerationis sanguinis in venis causæ veræ.

A venarum figura conica.

Præcipua procul dubio est, quæ eadem in arteriis sanguinem potentissime retardat (*c*), venarum nempe sanguinis in vas continuo augustinus fluxus. Cum enim venæ perinde (*d*) ea lege fabricentur, quæ lumina conjuncta ramorum trunci lumine majora fecit, & cum ea lex perinde ad minora vasa continuetur, adparet systema venosum pro cono haberi posse, cuius amplissimum labrum in omnium extremarum venarum corporis animalis universitate, angustissimus exitus in venis cavis est. Nunc per eadem hydraulica (*e*) principia, cum multi ramorum globuli unicum in trun-

S 3

co

(*x*) Second Mem. sur les part. sens. & irrit. p. 176. Etsi enim a venenis acidis contractuntur, ea tamen experimenta ad animati corporis phænomena male transferuntur.

(*y*) Second Mem. sur le mouv. du sang Exp. 120. 132. 136. 225.

(*z*) Exp. 180. & possunt hoc referri experimenta 156. & 192, etsi non disertis venis addidi, rimam non fruisse auctor.

(*a*) RUDIGER de regreſſu sa-guini per venas mechanico.

(*b*) Second Mem. Exp. 110. 111. 112. &c.

(*c*) Scđt. I. p. 176.

(*d*) L. II. p. 123.

(*e*) BERNOULLI hydrodynamic. p. 112.

co globulum urgeant, tanto major in trunco velocitas nascetur, reliquis iisdem manentibus, quanto majus ramorum lumen, majorve in globulis ramorum numerus est, cum lumine, numeroque globulorum trunci comparatus. Ita in hydraulicis notum est, contracto fluminis alveo celeritatem augeri (*f*), dum vires moventes sufficient. Neque in corpore animato experimenta dissentient (*g*) quæ in ordinato naturæ more sanguinem celerius in trunco, quam in ramis, moveri ostendunt, inque trunci parte angusta celerius, quam in latiori (*h*). Ejusmodi vero hanc accelerationem esse æquum est creditu, ut in primis venis minimis unius globuli fanguis aliquanto lenius, quam in proxime majori trunculo fluat, in majoribus iterum truncis major velocitas sit, quam quidem in venis mediocribus (*i*).

§. V I. Causæ auxiliares.

Musculi.

Hæc procul dubio potissima causa est, quæ venosi sanguinis motum ita adjuvat, ut absque ea minimis potissimum in vasis integer continuari nequeat, & videtur omnino Creatoris sapientia ita fines rerum contemporasse, ut corporis exercitatio tamquam auxiliaris cordis potentia addita sit, qua destitutum cor solum suo muncie ægrius fungatur. Sola quies animalium hibernantium sanguinis motum ita frangit, ut neque cordis pulsus sensibus nostris se offerat (*k*), neque calorem porro producat (*l*).

Hinc in hominibus sellulariis, litteratisque viris & regnorum rectoribus frequens hypochondriacus morbus (*m*), neque raræ haemorrhoides (*n*), cum fanguis in vena portarum stagnet. Hinc ab exercitationis defectu cedemata, & hydrops. Inde nimia obesitas hominum residuum (*p*), & animali-

(*f*) GRAVEZANDER *ELEM. physic. mathem.* p. 485. J. de GORTER *de perspir.* c. 8.

(*g*) *Second. Memoire Exp. 125.. conf. MORGAN mecbau. princip. p. 72. Prop. 6. BUTLER de veneſed. p. 11. SCHWENKE p. 29.*

(*b*) *Obj. 126.*

(*i*) SENAC T. II. p. 174. *conf. phenomenon in phil. transf.* n. 460.

(*k*) *Conf. L. IV. p. 437. HALLE Geschicht der sbieren p. 86. de mele HAM vxi apud BIRCH T. IV. p. 537.*

(*l*) *L. VI. p. 298. 299.*

(*m*) *Praedil. in Boerb. Inst. T. III. p. 497.*

(*n*) *Ib'd. p. 547. STAHL von der guldinen oder p. 110.*

(*p*) *Praedil. in Boerb. Inst. T. III. p. 498. & hujus operis L. I. p. 39.*

malium ; quæ corpus suum exercere prohibentur. Hæc vitia omnia ad impedimentum sanguinis venosi motum pertinent. Fuit, cui ne ex vena quidem sanguis fluebat, nisi corpus exercuisset (*q*). A solo motu brachii sanguinis saltus altior profiluit (*r*).

Non unica ratione motus muscularorum sanguinis venosi redditum promovet. Primam exposuimus (*s*), qua venaæ medios inter musculos posicæ, a tumortibus muscularis manifesto comprimuntur & inaniuntur. Ita, dum trunci majores celerius deplentur, sequitur ex minoribus ramis proximus sanguis, & expedita in spatia succedit, ex ea fere ratione, quæ in derivatione locum habet. Per easdem causas, depletis ex corporis exercitatione venis rubris, vapor & adeps ex minutioribus vasis & cellulis in venas inanitas resumitur, ut hydropticæ aquæ post purgantium medicamentorum actionem in rubras venas redeunt. Certum enim est, etiam per experimenta (*t*), sanguinem vasorum majorum nimis plenorum sanguini ex minutis radiculis redituro resistere, cumque repellere.

Aliud, nihilo inertius exercitati corporis commodum est, quod cor ad contractionem vehementius, & potentius sollicitetur. Quando enim musculi turgentes venas comprimunt, plus utique sanguinis in dato tempore ad venam cavam venit, plus adeo est stimuli, qui cor dextrum sollicitet, frequentius ergo & majori vi idem contrahitur, plusque sanguinis in pulmones submittit. Nam post magnos corporis motus & in homine, & in animalibus, sanguis in venam cavam & dextram auriculam congestus reperitur (*u*). Inde animal moribundum, cum frigida adspersum se concuteret, ad vitam rediit (*x*).

Cum venis majoribus etiam cor majus est (*y*), cum parvis parvum. Sed cor majus est animalibus ferocibus (*z*), & athleticis (*a*), domesticis (*b*) & debilibus minus, ut alias exposui.

Si

(*q*) *Epb. Nat. Cœr. Dec.* II. ann. 2. obs. 154.

(*r*) *DIONIS cours d'opér.* p. 459.

(*s*) *L.* III. p. 205. seqq.

(*t*) *Second Mem. sur le mouv. du sang Exp.* 137. 145.

(*u*) *SENAC T.* II. p. 277.

(*x*) *KAUW impet. fac.* n. 455.

(*y*) *SCHWEINKE* p. 22.

(*a*) *ROBINSON of food and discharges* p. 101. rot. 104. etiam eadem ratione addita.

(*a*) p. 117. 118. 119.

(*b*) *Feli domesticæ quam feræ minus de Buffon's *bistoir: naturelle* T. II. p. 29.*
Huc referrem venarum brachii, quæ evanuerant, per excitatam naturam electricam restitutionem, & auctum artus ambitum *DESHAIS de Hemipleg.*

Si vero ex aucto sanguinis in venas cavas confluxu , plus cruentis , in dato tempore , in pulmonem venit , sumemus interim ex iis , quæ alibi reclusi demonstrabuntur (c) , ad copiam sanguinis pulmonibus innissi respirationis etiam frequentiam , atque ipsam pulmonis in quavis respiratione dilatationem augeri . Ipsam anhelationem hominum , qui corpus exercent , interim excitasse sufficerit , nihil enim ea est , præter vehementiorem inspirationem , & celeriorem . Sed inspiratio vehementior expirationem sibi respondentem utique poscit , nisi velis pulmonem sanguine plenum disrumpi . Celerior ergo etiam ex comppresso pectori sanguinis ad cor sinistrum refluxus erit (d) , celerius idem contrahetur (e) & celerius sanguinis penus in aortam , adeoque in totum corpus animatum reddit . Non potest dissimulari , nimis exercitati corporis motum hactenus circuitum sanguinis , iterque venosi sanguinis turbare , quod refluxum sanguinis excite , quem ornatus oportebit demonstrare , quod parum nota res sit , & in controversiam venerit (f) .

§. VII. *Derivationis effectus.*

Inter potentissimas causas esse , quæ sanguinis venosi motum expedient , jam ad arteriarum historiam docui (g) . In venis autem potius evidenter est efficacia . Incredibile est , quanta rapiditate sanguis venosus se in incisa venæ vulnus (h) , aut , si cor resecueris , in præcisos venæ cavæ (i) fines conjiciat . Hujus derivationis tanta vis est , ut contra ponderis resistentiam (k) , contra legitimum iter (l) , sanguis undique ab omnibus venis , in locum laxatum quoconque sub angulo (m) apertis , aut per alias ramos cum eo consentientibus , se in vulnus conjiciat , maximoque cum impetu de rima venæ effluat . Ea nova celeritas nascitur , five sanguis legitimo motu hactenus ad cor redierit (n) , ut unice a vi derivationis acceleretur , five laudius

(c) L. VIII.

(d) L. IV. p. 470. 471.

(e) Ibid. p. 472.

(f) Vide p. 310. seqq.

(g) p. 214. seqq.

(h) Second Mémoire p. 300.

(i) Ibid. Exp. 120.

(k) p. 301. Exp. 192.

(l) Ibid. Exp. 150. 151. 152. 153. 154. 154^o. 155. &c. *Acta de Heide de Sang. miij. p. 2.*

(m) Exp. 167. 177.

(n) Exp. 153. 163. 166. 180.

guldius & præter naturæ legem nunc fluxerit (*o*) , sive denique jam amissio motu (*p*) quieverit : nascitur denique etiam corde evulso (*q*) , aut præcis ligatisve magnis arteriarum truncis (*r*) , quando in toto corpore animalis nulla porro potentia supereft , quæ sanguinem emoveat. Ex ea celeritate & coagula dissipantur (*s*) , & in arterias venæ incisæ socias (*t*) sanguis etiam ab iis arteriis aversus (*u*) violentius convertitur. Etsi nunc ea derivationis vis a medica potius manu , quam a naturæ consilio fere nascitur , non tamen ignoranda fuit , cum plurima animati corporis phænomena ex ea lege unice explicitur. Huc enim pertinet omnis humorum confluxus ad eas partes , de quibus resistentiam subtraximus , pediluviorum , emollientium cataplasmatum.

Huc subite sanguinis conversiones ad abdomen , de quo incombens aquarum pondus chirurgica acus renovit. Huc animi deliquia , ex qua-cunque majori evacuatione nata , ad cuius sedem sanguinis de ipso corde refugit. Etiam ideo hanc de effectu incisæ venæ paginam addidi , quod tota hæc res in plurimis , in gallia maxime libris agitata , etiam a clarissimis viris ad examen revocata fuerit (*x*). Haec tamen per experimenta nostra certum videtur (*y*) , utique ad sedem vulneris vicinarum venarum sanguinem , nova cum celeritate (*z*) confluere , & arterias ad eundem artum sanguinem ducentes nova cum velocitate (*a*) sanguinem abducere , atque adeo ab aliis remotioribus venis & arteriis sanguinem ad sedem vulneris abduci , quod *revelli* vocant , nisi valvulae impiderint (*b*) , & denique in tota venarum & sanguinis universitate languidum aut suppressum motum renasci (*c*). Non ideo oportet difficeri , & continuo , postquam vena deligata fuerit , hanc

(*o*) Exp. 162. *Ant. de Heyde* l. c.

(*p*) Exp. 154^o. 155. 159. 160. 161. 167. 170. 177. 178. *Remus* p. 62.

(*q*) Exp. 149. 150.

(*r*) Exp. 168. 169. 191. 192. 193.

(*s*) l. c. p. 301. Exp. 151. 155.

(*t*) Exp. 163. 164. 171. 178. 179. 181. 182. 183. 184. 186. 187. 189. 191. 193.

(*u*) Exp. 163. 171. 178. 182. 183. 184. 186. 187. 189. 191. 193.

(*x*) *Premier Mémoire sur le mouvement du sang* Sect. V.

(*y*) *Ibid. & Second. Mémoire* p. 100 seqq.

(*z*) p. 300. Idem ut in tubis inanimatis fiat , lege apud *Halesham* l. d. p. 229.

(*a*) p. 201. 302.

(*b*) p. 301. &c.

(*c*) l. 300. seqq.

hanc venæ sectionis efficaciam cessare, & derivationem denique pariter atque revulsionem non oportere ad nimis distantia vasa extendi (*c**), quæ utique parum, ab ea quidem causa, patiuntur.

Alii incisæ venæ effectus non sunt hujus loci, rubrorum nempe globulorum diminuta abundantia, atque adeo aquæ & tenuiorum humorum aucta in massa sanguinis portio (*d*): deinde diminuta resistentia, quæ vasis minoribus se evacuatoris opponit (*e*), hinc major circuitus libertas. Si ad cordis vires retuleris, invenies a venæ sectione & augeri posse & minui. Stimulus quidem subtrahitur, ut celeriter, ex magno vase inciso (*f*), & minutuorū cordis celeritas, & demum suppressum: qui in primis magna & Galenica sanguinis missionis effectus est (*g*), & deliquium animi vocatur. Contra si cordis vires in plethora promovendo humorum ponderi impares fuerint, eadem sanguinis missio subtrahita resistentia (*h*) potest æquilibrium, & expeditam adeo circulationem restituere, et si celeritatem cordis minuit, cum obstatu subtrahat: ab omni enim obstaculo cordis motus acceleratur, qui a stimuli præsentia continuatur (*i*). Hic autem fere minoris missionis sanguinis effectus est (*k*).

§. VIII. Causæ motum sanguinis venosi mutantes.

Respiratio.

Hic causas exponere oportet, quæ motum sanguinis venosi partim adjuvant, partim morantur, neque adeo inter auxiliares causas recte referuntur, neque inter eas, quæ sanguinis venosi motum retardant. Earum causarum illustrior, forte & efficacior, est respiratio. Adjuvare videtur sanguinis circuitum, quod per HOOKII experimentum, aliaque (*l*) in eundem sensum instituta, utique sanguis in pulmonem inflatum facilius subeat, facilius

(*c**) OEDER in propria dif. SENAC *Ess. de phys.* p. 429. ed. 1731.

(*d*) L. V. p. 142. 143. Non ignorata BELLINO *de sangu. miss. prop. V. QUESNAE de la sang* et p. 45.

(*e*) Second Mém. p. 264.

(*f*) *Mém. sur la form. des poulets* T. II. p. 118.

(*g*) HEUFERMAN operat T. III. p. 266. laudat perinde ejusmodi sanguinis missiones, quæ duas aut tres libras subtrahant.

(*h*) OERTINGER *s'lect. avon.* T. II. p. 204. 205.

(*i*) L. IV. p. 410. 491.

(*k*) OERTINGER I. c.

(*l*) *Mém. sur la nat. sens. & irritable Exp.* 476. 478. 482. 492.

facilius etiam circulum per pulmonem absolvat, celeriusque in finistrum ventriculum redeat. Ita siue, & in vivis animalibus, inflato pulmone vidi, & in mortuo pulmone, quem minister inflabat, dum interim per siphonem liquorem tenuem, colore tamen aliquo saturato tintum, in venam cavam impellebam. Is enim liquor longe facilissime per pulmonem, vehementer distentum, & in finistrum ventriculum, & in asperam arteriam transit. Hactenus adeo inspiratio pulmonem aperit sanguini, & expedit, absque ea futurum immeabilem. Sed ea contemplatio alium locum inveniet. Nupe riorem hic oportet respirationis efficaciam detegere, quæ pulsus venosum, sed cum respiratione connexum, producit.

Prodiit anno 1750 J. Danielis SCHLICHTING libellus (*m*), quo cerebri alternum motum contra BOERHAAVIUM, & contra So phistas, vir Cl. experimento defendebat. Admiratus Clari viri confidentiam, quam non poteram cum indubitate duræ membranæ cerebri ad cranium adhaesione conciliate, per experimenta me dubio solvere sum conatus. Ea annis 1751, 1752 & 1753. institui, anni vero 1752 mense Aprili in conventu societatis regiae pælegi (*n*), & circa ejus anni initia cum amicis gallis in litteris meis (*o*) communicavi. Eadem experimenta anno 1753 a Cl. WALSDORFIO mense Martio (*p*), & eodem tempore in Tomo II. Commentariorum Gottingenium edita fuerint, atque in Acad. Suecicæ Commentariis suecice recusa (*p**), inter Commentarios autem Academiacæ Parisinæ ad annum demum 1753 recensâ sunt (*q*).

Minute hæc recolo, quia sere sub eadem tempora Cl. Franciscus LAMURE similia hactenus experimenta fecit, quæ ex viri Cl. verbis anni 1751 vernis membris incepta (*r*), deinde interrupta, annoque 1752 repetita (*s*), ejus anni mense angusto, ad Academiam R. Scient. Gallicam missa sunt, quo tempore & ill. vir. Ren. Antonius FERCHAUD de REAUMUR mea experim enta dudum accepérat (*t*), & dudum a Cl. de SAUVAGES commun i-

T t 2 cata

(*m*) Inter Mémoires des Savans étrangers présentés à l'Academie T. I.

(*n*) Inter cuius commentarios exstat T. II.

(*o*) Ad D. de SAUVAGES die 10. Dec. 1751. ad D. de REAUMUR die 26. Jan. 1752.

(*p*) Diss. qna experimenta circa motum cerebri, cerebelli, dura matris & venarum in vivis animalibus instituta Goetting. 1752.

(*p**) Svenska Wetenskaps Acad. handlingar 1753. Trimestr. I. & II.

(*q*) Histoire V. 136.

(*r*) Februar 1751. tria experimenta.

(*s*) Ad meussem Maii 1752 reliqua.

(*t*) Missa 26 Januar. 1752, ad quæ respondit 9 aug. 1752.

cata habuerat *Franciscus Lamure*. Cum anni tamen 1749 commentariis ea experimenta prodierunt anno 1753 aestivis mensibus , ut necesse mihi videretur (*u*) , plagii suspicionem declinare , cum ostenderem & nihil de Cl. viri experimentis me rescivisse , & mea ipsi cognita fuisse (*x*) , & priora mea publicata fuisse. Non æqua certe epistola (*y*) vir Cl. non se tuitus est , neque enim erat necesse , quem nemo accusaverat , & studiosissime conviceram , non accusari ; sed in me nunquam à me intentatam accusationem retorserit , nihil tota in re meum esse , præter expositionem (*z*) , aliena experimenta , alienam phænomeni explicationem. Iniquissime omnino , tot post meas vivorum animalium , eo jam tempore editas incisiones , pro alienorum experimentorum notario me habet . & etiam iniquius me accusaret vir acris , quod mea pericula dudum , & prius ipsi innotuerant , quam ederet quidquam. Deinde adparebit continuo , etiam si diversa utrius sit interpretatio , & meani tamen verae esse , & *LAMURIANAM* , quam minime ignoravi ; multo vero numerosiora experimenta me fecisse , multo plures causas (*a*) motus venosi me detexisse , inque aliis quam Vir Cl. ve. is (*b*) multa vidisse , ut a natura fiunt , quæ Cl. vir non recte vidit (*c*).

Præcipuis tamen in rerum capitibus utique consentimus , eademque phænomena vidimus : quæ unice sèpius repetiti , plura vidi , edidi prior.

§. IX. *Pulsus venosus qui a respiratione fit.*

Ergo si vivo animali , non nimis debilitato , cranium aperueris , aut trepano aut unco , duramque membranam detexeris , & digito a cranio depre-

(*u*) Ideo necesse visum , quia Cl. *LAMURII* libellus commentariis anni 1749 adjectus poterat videlicet dudum ante mea , ann. 1752 dem in edita , scriptus missusque fuisse. Aequis utique lector præcixum a *LAMURIO* mensuris augulti etiam diem 1752 legere poterat , sed multi judices sedent , qui etiam amant caulam inventare , cur con-

demunt.

(*x*) Per epistolam Cl. de *SAUVAGES* datam *I Mart.* 1752.

(*y*) *Lettre à M. d'Aumont &c.* Lyon 1756. 8.

(*z*) p. 9. 13. 14. 27.

(*a*) Addidi nempe actionem diaphragmatis , & auriculæ dextræ.

(*b*) Non vidit in vena brachii Vir Cl.

(*c*) Palum sanguinis cerebri male adfirmat vir Cl. p. 542. Non recte etiam jugulares venas animali sopire scribit , si ligentur p. 543. 544. Neque spatiū inter duas meninges est , & vix respirationis in cerebrum effectus demonstrari potest , nisi duram matrem a cranio depresso sit : vide momentem etiam *CALDANUM* p. 291.

depresseris (*d*) ; videbis ad siugulas inspirationes subcidere cerebrum (*e*) , aut solum (*f*) , aut cum suis involucris (*g*) , & cerebellum (*h*) , sive a crano removere , & deorsum quasi resorbtum recipere . Vicissim in exspiratione idem cerebrum surgere (*i*) , crano se admovere , digitum inpositum repellere (*k*) ,

Deinde , per experimenta mea , si pectus (*l*) , aut abdomen (*m*) ; aut collum (*n*) , aut brachia (*o*) animalis aperueris , venas grandiores cibam superiorem , inferiorem , jugulares , subclavias (*p*) , brachiales , mammariamve (*q*) nudaveris , videbis perinde , dum animal inspirat , sanguinem undique ad cor redire , venisque , quas nominavi , a corde recedere , etiam ad aliquot lineas , depleri , pallescere , explanari , exsangues fieri . In exspiratione vero , quae proxima sequitur , easdem venas sanguine a corde rejecto turgere , ceruleas , cylindricasque fieri .

Magni ergo trunci venosi capitis , colli , pectoris , abdominis , brachii (*r*) ejusmodi motu agitantur , in vivis animalibus , ut per exspirationem sanguine aut retento , aut a corde refflu turgescant , per inspirationem remitto ad cor sanguine eadem depleantur : hinc per inspirationem , recedente de cerebri magnis vasis sanguine , cerebrum subcidet , idemque eo sanguine per exspirationem retento , & reduce intumescit & mole crescit (*r**) . In vchemen-

T 3 tiori

(*d*) Alioquin non adparet Scutellating L. c. p. 116. Second memoire sur les parties sensibles & irritable exp. 73. 74. 80. 81. 83. 87. 88. 89. WALSDORF exp. 6. 7. 9. 10. 11. 13. 16. 17.

(*e*) L. c. Exp. 71. 74. 75. 79. 80. 82. 85. 87. 88. 89. 92. 101. WALSDORF exp. 1. 2. 5. 6. 10. 17. CALDAN p. 283. TOSSETTI Let. II. obs. 2. 3. LAMURE p. 552.

(*f*) Exp. 73. 80. 82. 82. 95. WALSDORF exp. 5. 6. 7. 8. 9. 12. 13. 14. 15 SPROEGEL exp. 51.

(*g*) Exp. 73. 74. 75. 79. 80. 82. 85. 87. 88. 89. 92. CALDAN L. c. WALSDORF p. 2. 3. 4.

(*h*) Exp. 93. obscurius , melius WALSDORF exp. 4. 5. & Francis LAMURE p. 555.

(*i*) Exp. 73. &c. CALDAN L. c. TOSSETTI L. c. LAMURE L. c.

(*k*) Exp. 73. 75.

(*l*) Exp. 101. 109. 111. WALSDORF exp. 13.

(*m*) Exp. 97. 98. 99. 101. 104. WALSDORF exp. 5. p. 51. exp. 6. p. 52. & p. 54. LAMURE p. 553.

(*n*) Exp. 100. 101. 105. 107. 108. 111. 116. WALSDORF exp. 8. p. 12. 12. 13. LAMURE p. 553. SPROEGEL exp. 53.

(*o*) Exp. 91. 101. 105. 110. 116. EMETT L. II. p. 15. WALSDORF &c.

(*p*) Exp. 116. 117.

(*q*) Ibid.

(*r*) Addit Iliacas LAMURE p. 555. In iis nou vidi.

(*r**) Mém. sur les part. sensibl. T. IV. Exp. 5.

tiori respiratione omnia evidentius adparent (*s*). Hec phænomena in debili (*t*) animale, aut p̄orū habente sanguinis, aliaſt ob causas, quas (*u*) casus obponit, inque minoribus demum artuum venis (*u**) non semper equidem conspicua, fatis tamen numerosis in experimentis (*x*) a me Clarisque viris LAMURE (*y*) & WALSDORFIO (*z*), & Ill. BOISSIER (*a*) & CALDANO (*b*), & TOSSETTO, & Roberto EMETT, & Cl. van GEUNS (*b**) & SCHWARZIO (*b***) vila sunt, & ab aliis Cl. viris adoptata (*b****), ut dubii de eorum veritate & constantia nihil possit supereſſe. Neque enim hominem moror (*c*), qui horum contraria, & venas per inspirationem turgentes vidisse voluit, aut alios, qui cerebri motum pulsationi arteriarum, rei diversissimæ synchro-num fecerunt (*d*).

§. X. Causæ phænomenorum.

Non unica nunc hujus phænomeni causa est. Prima quidem, quæ olim SANTORINO (*e*), absque tamen experimento, eadem etiam mihi, se obtulit, & nuper Ill. Francisco BOISSIER (*f*) ad idem phænomenon interpretandum adhibita fuit. Nempe per inspirationem via in pulmonem facilior aperitur (*g*), nascitur ergo derivatio (*h*), & sanguis venosus undique ad eam fedem confluit, a qua resistentia ablata est: confluit ergo per inspirationem sanguis auricularum & cordis in pulmonem, sanguis venarum cavarum in auriculam, sanguis venarum proximarum in venas ca-vas, deplentur ergo venæ remotores, cerebri, brachii, abdominis, & inanituntur.

Contra

(*s*) Exp. 8. WALSDORF 16.

(*t*) Exp. 74. 82. WALSDORF exp. 21. 13.

(*u*) Exp. 76. 77. 78. 81. 83. 84. 85. 86. 91. pro cerebro, deinde exp. 96.

(*u**) Exp. 102. 103. 104. 105.

(*x*) Mea sunt 35.

(*y*) LAMURIANA in universum 13.

(*z*) WALSDORFIANA, si a meis separaveris, non facile numero, sed nou-panca sunt.

(*a*) *Puisas theoria* p. 45. & *de respirat. difficulti*.

(*b*) *Mem. sur les part. sens.* T. IV. p. 69.

(*b**) Alternam venæ jugularis contractionem vidit quæ sanguinem ad cor pelleat de cito p. 16.

(*b***) *De somitu* n. 17.

(*b****) Cl. ANDREÆ *de irritabil.* p. 20.

(*c*) RADNICKZY in *diff. Plaie* 1756 elata Sect. III. obs. I.

(*d*) *Epiſt.* II. p. 32.

(*e*) In *obs. anat.* p. 147.

(*f*) *De respir. difficulti* p. 2. 3.

(*g*) *Praed. Boerb.* T. II p. 173. 176. *Kanuw perfir.* n. 160.

(*h*) p. 214. seqq.

Contra in exspiratione sanguis in pulmones conpresso difficultius recipitur, difficultius adeo cor dextrum se deplet, stagnat sanguis in venis cavis, in vena jugulari, in cerebro demum toto, atque adeo sinus cerebri, & venae jugulares intumescunt, quod a minimis vasculis sanguinem accipere pergent, emittere nequeant.

Ad hanc causam altera accedit, quam non monitus per experimenta cognovi (*i*), ornatius vero ad phænomenon interpretandum adhibuit *Franciscus Lamure* (*k*). In exspiratione nempe in primis thorax contractatur, comprimuntur pulmones, auriculae, venæ cavæ, fit refluxus sanguinis in venas cerebri, ex ergo in exspiratione turgent, cerebrumque una totum. Hinc prello, ut ego preferram, thorace (*l*), elisaque vena cava (*m*) perinde cerebrum elevatur.

Dudum, si placeret malignum esse, *J. Adrianus Slovogt* (*n*) in tussi cerebri sinus intumescere vidit, emetica (*o*) vero medicamenta, quæ exspirationem violentam carent, sanguinem in caput determinare alii Cl. viri Verum omnino uberior hæc, cum experimentis conjunxit *Franciscus Lamure*, & etiam mea experimenta (*p*) non sinunt dubitare, quin veram phænomeni causam aperuerit. Videntur hæc amplius a Cl. de Bordes *diduci*, ut etiam pulsum arteria brachio refluxum cum inspiratione, undamque quasi expulsam cum tussi sive exspiratione, conjungi narrat (*q*).

Facile intelligitur, quonam hic sermo tendat, exspirationem ne npe haec tenus reditui sanguinis venosi resistere, & inter causas retardationis numerari posse. Non tamen oportet immemores nos esse, vehementes exspirations necessario a magnis inspirationibus praecedi, eas sanguinis in pulmonem iter accelerare, atque adeo id detrimentum, quod ab exspiratione sanguinis venosi motus patitur, haec tenus ab inspiratione compensari: eo magis, cum exspiratione pulmones evacuet, atque adeo novæ sanguinis undæ aditum in id viscus faciliorem aperiat. Deinde in primis mente debere retineri, hæc omnia in vivo sanoque homine non tanta esse posse, cum venarum valvulae refluxum passim impedian, & in vehemente demum exspiratione

(*i*) Secund mem. sur les part. sens. & irrit. Exp. 78.

(*k*) p. 547. 558. 559. 561. &c.

(*l*) p. 548.

(*m*) p. 551. 552.

(*n*) In diss. de dura matre.

(*o*) G. v. SWIETEN Comment. T. III, p. 266.

(*p*) Secund mem. Exp. 116. 117.

(*q*) Du poiss. p. 324.

ratione obtinere, etiam experimenta demonstrent (*r*). Subsidentiam cerebri omnino duræ membranæ vehemens adhæsio non permittit, quare nec in experimentis adparet, nisi eam adhesionem violente solveris (*s*).

Contra neque dissimulasse oportet, etiam inspirationem vehementem sanguinis venosi iter morari. Certum est inspirationis temperamentum, quo sanguinem in pulmonem adlicit; si ultra protenditur, neque exspiratio succedit, neque pulmo depletur, neque sanguis ergo in pulmone eadem facilitate recipitur, cuius repletæ arteriæ non depleantur. Stat ergo sanguis ante pulmonem, repletur auricula dextra, vena cava, jugularis, venarum demum universitas. Sufflatur rubore facies, & rubescit, & frontis venæ turgent, totumque corpus undique tumet. Periculosis hinc nixus est, & venas in cerebro, & alibi in corpore passim rupisse visus. Hæc interim decerpnius, quæ alias ornatius enarrare præstet, & opus sit.

Alia causa est refluxus sanguinis venosi in septi transversi contractione. Is musculus inspirationis præcipuum organum est, & in ea actione contractitur, venamque cavam utique stringit, etiæ tendinibus undique intercepta, minus valide premitur, quamquidem a carnibus eam tangentibus premetur (*t*). Sed constringitur tamen & inanitur, & contra renes deducitur & explanatur. Mechanice hæc fiunt, neque cum pulmonis statu quidquam commune habent: & olim ab aliis Cl. viris observata sunt (*u*).

§. XI. *Venæ cavæ contracção & refluxus inde natus.*

Cum hoc in primis pulmonis statu, alia causa refluxus venosi conjungitur, quam dudum excitavimus (*x*), & ad vivorum animalium incisiones frequenter adnotavimus. Nempe, quando animal moribundum, aperto pectore, pulmonem compressum habet & inmeabilem, & tamen suo porro robore irritabilis auricula pergit micare, tunc fit, ut ex auricula, in pulmone dextro corde obstaculum reperiente, sanguis in venam cavam (*y*) utramque,

(*r*) Second mem. sur les part. sens. & irritables exp. 113. 114. 115. Mémoire sur la respiration exp. 53. 56. 57. 59. 60. 61. 62.

(*s*) SCHWARTZ de vomitu, in collect. meaurum disp. Anat. T. I.

(*t*) Second Mémoires p. 113. 114. 115.

(*u*) SCHWARZ de vomiti.

(*x*) L. IV. p. 401. LAMURE p. 557.

(*y*) Second Mem. sur les part. sens. & irrit. exp. 118. 119. 120. 121. 122. 124. 125. 126. 127. 128.

utramque, earumque etiam ramos (z), longe repellatur & vehementer, & sub ipsum hepatis. Similis in venis pulmonalibus refluxus à me observatus alibi describitur (a). Sed etiam hoc vitium a legitimo hominis statu alienum esse videtur.

§. XII. *Anastomosum effeclus.*

Etiam hoc naturæ præsidium partim sanguinis per venas motum adjuvat, & partim celeritatem ejus frangit. Adjuvant equideus, & potentius quam in arteriis. In venis enim sere ubique rami, quibus etiam duarum linearum diameter est, truncos vicinos uniunt (b), cum in arteriis haec anastomoses & rariores sint, & plerumque minorum ramorum.

Si præterea insignissimam facilitatem expenderis, qua in omnibus nostris experimentis sanguis directionem fluenti mutat, adque aliam & aliam sedem tendit, uti quæque expeditior est, & minorem moto sanguini resistentiam obvertit, etiam ob hanc rationem, ab anastomosibus venosum sanguinem magis, quam arteriosum regi consenties.

Denique cum sanguis venosus a ponderis multo magis dirigatur (c), quam quidem arteriosus humor, iterum liquebit, magis varium & imutabile ejus per venas fluentis sanguinis per anastomoses iter esse.

Pone nempe quocunque loco, faciliorem sanguinis venosi motum, sive a vulnere, sive a depleto abdomine venam cayani liberante, sive ab inflato pulmone, sive a situ depresso & inclinato faciei, sive a balneo, sive ab alia quacunque causa demum ea facilitas nata fuerit. Eo ergo non per truncum folium venosum eo ducentem, sed ab omnibus aliis vicinis venis, cum eo trunco communicantibus, sanguis confluet, etiam contra nativum venosi crux iter, eaque pars corporis venosum sanguinem uberrimum, brevissimo eo tempore recipiet.

Pone contra difficultius aliquo loco iter esse sanguinis venosi, sive a coagulo, sive a compressione, sive ab obstruzione visceralis, sive a situ altiori, sive a strigore ei parti adplicato, sive a quacunque alia causa ea difficultas orta fuerit, per inversam prioris propositionis, & per nostra experimenta, fugiet (d) eam par-

(z) Exp. 118. 128.

(a) L. IV. p. 410.

(b) L. H. p. 134.

(c) Second Mem. sur le mouvement du sang p. 339.

(d) Ibid. Exp. 111. 123. 135. 182.

partem sanguis venosus, inque vicinas venas, per quanicunque-anastomosis, exitum inveniet, donec sedes obstructa manebit. Ita vidi (*e*), cum vena cava abdominalis medulla polyposa infarciretur, sanguinem venosum de inferiori corporis parte omnem per minutam venulam, ex iliaca in spermaticam communicantem, viam invenisse, ut ea spermatica non valde infra legitimum cavæ venæ diametrum lata esset. Ita altera vena jugulari ligata, aut otraeque, jugulares exteriores sanguinem ad cor revehunt, neque caput tumet oculive (*f*). Cum nunc eæ facilitates, & difficultates mille modis allæ esse possint aliaeque, intelligitur, venosum sanguinem certum iter non tenere, sed alio & alio tendere, quacunque viam inveniet expeditiorem. Prono homini languis de cerebri sinibus in faciem exiliet, supino sanguis in cerebrum de jugulari vena regurgitabit, feminæ gravidæ sanguis in venis infra iliacarum divisionem morabitur, uterique trunco distendet, inspiranti in collo colligetur & in capite, hisque causis remotis horum fient contraria.

Ab his causis hactenus sanguinis venosi circuitus adjuvabitur, quod multis etiam venis magnis obstrictis & conpressis, absque magno incommodo vivatur, & jugulari interna canis utraque ligata, & resecta, absque ullo symptomate canis, & in vetusto exemplo (*g*) supervixerit, & in nostro (*h*). Hinc etiam sit, ut paucim vena ligata, vinculum inter (*i*) & radiculas suas, minime intumescat, neque cor inter & linum inaniatur, quod per communicantes venas sanguis alio feratur. Inde sit etiam, ut cute refrigerata sanguis facilime in vasa profunda se recipiat, periculumque devit coagulationis, & que alia ex facili hac sanguinis in novas vias avocatione levantur.

Hactenus tamen circuitui sanguinis, & velocitati venosi cruoris anastomosis obsunt (*k*), quod contraria sanguinis fluenta sibi obsistant, & se morentur, vicissimque suam sibi celeritatem destruant (*l*), usque dum torrens alter, superato altero solus obtineat (*m*). Potest autem aliquamdiu sanguis librari (*n*), & oscillatione alterna ita moveri, ut nihil promoveatur. Iisdem

(*e*) *Opuscul. patholog.* obs. 19.

(*f*) *Nuck* *descrips. duli aquosor.* p. 14.

(*g*) *Birch T. IV.* p. 309. conf. p. 305.

(*h*) *Second Mem. sur le mouv. du sang.* Exp. 113. 114.

(*i*) Obs. 111. &c.

(*k*) Ut in arteriis p. 276.

(*l*) Vnde venorum torrentium pugna. Exp. 137.

(*m*) Exp. 65. 93. 95. 123. 129.

(*n*) Exp. 131. 137. 191. 229. 236. in ramo anastomotico, conf. A. de Heyde obs. 85.

dem proculdubio anastomosibus (*o*), licet non solis, sanguinis venosi in motu mira inconstantia debetur, quæ utique redditum in cor mire moratur.

§. XIII. Quæ causæ sanguinem venosum retardant.

Friccio.

Harum causarum aliquæ a venis absunt, arteriis fere proprie. Huc pli-
cas numero, quæ multo in venis, quam in arteriis infrequentiores sunt,
etiam quando a profectoris manu seb̄o supra naturalem mediocritatem di-
stentæ fuerunt.

Friccio etiam minor est, tum quod celeritate minore sanguis venosus
feratur (*p*), tum quod ampliores pro sanguinis portione sint, quam arte-
riæ, atque adeo multo plures globuli medium per lumen incedant, paucio-
res parietes radant (*q*). Eaque differentia non exigua est, cum venæ
sodalibus arteriis plus duplo ampliores esse soleant (*r*). Solent etiam
pro causis minoris frictionis adducere, tum quod sanguis venosus præce-
dens sanguinem sequentem non moretur, ut qui celerius sequente fera-
tur (*s*): tum quod vena quælibet perpetuo eundo amplior reddatur, co-
niisque sit similis, cuius basis in corde est, unde iterum fieri persuadentur,
ut sanguis venosus continuo minorem in parietes impressionem faciat, quo
cordi propior est, proque eadem portione plures globuli inoffensi per li-
berum lumen fluant (*t*). Inde credunt fieri, ut nullæ in venis obstruc-
tiones nascantur. Utramque causam minoris frictionis accuratius oportet
examinare.

Sanguinem venosum anteriorem sequenti resistere manifestum est, tum
quod continuum per venas fluentum sibi continuetur, & manifesto ante-
cedentes columnæ a sequentibus trudantur: tum quod ad incisa vene vul-
nus sanguis accelerato motu feratur, unice proculdubio, in venis non con-
trafibilibus, aque morte aut resesto animalis corde, quia anterior unda
vulnerique proxima in sedem, de qua resistentia sublata est, exit, locuni-

V. v. 2.

que

(*o*) Exp. 125. 137.

(*p*) p. 180.

(*q*) p. 179.

(*r*) L. II. p. 133.

(*s*) BOERHAAVE ad n. 212, 160, 161.

(*t*) MUSSCHENBROEK *essays de physique* p. 392. *Institut. physiq.* p. 126. Ob eam
causam pulium a venis abesse olim Guillelmus Coss de *secret.* p. 107.

que facit undis insequentibus, quarum pressio tanto majorem effectum edit, quanto minorem resistentiam invenit. Sed etiam oculorum testimonio de resistentia constat, quam sanguis truncorum ramorum sanguini opponit (*u*).

Porro, uti arteriae non vere conice convergunt (*x*), ita neque venae vere conice divergunt. Non tota venarum universitas, cum ea, ad venas cavas comparata, non vertex, sed basis coni sit (*y*). Non duæ venæ comparatae cum suo trunco, in quem conveniunt, nam etiam illæ duæ venæ suo trunco potius ampliores sunt (*z*). Non unica vena, absque ramis considerata. Venæ enim longe absque manifesto ramorum augmento productæ, & ipsæ cylindricæ sunt, & quælibet vena inter duos ramos æque ampla est, tuncque deum amplior redditur, quando a novo ramo aucta est. Verum tunc res redit ad lumen trunci minus lumine ramorum.

Si non vera causa est, neque effectus veri erunt. Venas obstrui certum est, certum est intumescere, & enormiter quidem se ipsis maiores reddi, multo, quam in arteriis evidentius. Obstructas vidi aliquoties coacto sanguine, qui in polyposas fibrillas coiverat (*a*). Vedit BONTIUS (*b*) & repetit BLANCARDUS (*b**), cavam venam materie adiposa plenam, & duplo ampliorem, quam oportebat. Vidi uteri venas omnes obstructas, pene solidas, coacto duroque sanguine plenas.

Sed vulgatissimum est, venas supra modum dilatari, argumento hactenus obstructas esse, ut acceptum sanguinem nequeant emittere. Intumescunt in utero gravido, in spermaticis (*c*) vasis per farcocalem & varicocalem, in hydrocorum abdomine (*d*), in scirrhis viscerum (hæc eviderter), in phlegmone denique, magis quam arteriæ (*e*), & a spasmis (*f*) in morbis chronicis in universum (*g*). In tumoribus cum periodica fangi-

(*u*) *Second. Mem. Exp.* 137, 145.

(*x*) L. II. p. 56.

(*y*) p. 123.

(*z*) ib.

(*a*) *Opercul. patbol. obs.* 19, 20.

(*b*) *Medic. Ind.*

(*b**) *Obiturg.* p. 431.

(*c*) In gravida obs. of a Societ. at Edim. p. 413, 414.

(*d*) SALZMANN mir. abscessi biflor. PEYRE de ovar. hydro.

(*e*) FRANCISCUS de SAUVAGE de pus p. 27, theor. tumor. p. 14.

(*f*) QUERSNAZ des fevres p. 211. MATANZ de aeuoyfim. p. 110, quorum uterque spasmus accusat.

(*g*) Sanguinem in venis congregant BOERHAAVE *Prax. Med.* T. I. p. 98.

sanguinis effusione venæ tumidissimæ (g*). In febre tertiana intermittente vena portarum turgidissima (g**). Collari adstricto conjunctiva rubet (g***). In pleuritide rami venæ sine pari varicosi (g****). Eo major vero hujus phænomeni vis est pro demonstranda propositione nostra, quo magis his obstructionibus venarumque tumoris anastomosæ resistunt.

§ XIV. *Aliæ cause.*

Ergo de celeritate in minimis venulis superficie demit aliquid frictio, quæ non penitus ad parietes venosos nulla est : demit resistentia sanguinis anterioris, demit etiam pondus. Ostendi per manifestissima experimenta (h), in venis sanguinem adeo potenter a sua gravitate regi, ut penitus cesseret ad cor redire, inverso que fluente versus suas radiculas relabatur, quam primum ita animal disponitur, ut cor superiori loco, radiculae nascentium venarum imæ sint. Id si verum est, facile intelligitur, plurimum de celeritate redeuntium venarum fere in toto corpore decadere : quamdiu quidem homo sedet, in vena cava inferiori, vena sine pari, venis humeralibus & brachialibus, venis intestinorum crassorum, & fere tenuium, venis hepatis bene multis, venis partium pelvi contentarum, venis pulmonis bene multis : quando stat, etiam in tibiae venis ; quando decumbit, in venis dorsti, quarum delecto motu gangræna nascitur. Ut omnino non mirum sit, absque motus muscularum auxiliatrice potentia facilissime hominibus diutius stantibus in cruribus varices nasci, pedesque tumere (i), & abdomen sanguine repleri, & haemorrhoides intumescere (k).

Solæ fere venæ capitales pondere in homine adjuvantur, non ita in animalibus, eaque certe opportunitate indigent, ut cerebrum superflue congettato arterioso sanguine obrutum, nullo fere muscularum auxilio adjutæ, expeditè depleteant. Nemo ignorat, quam intolerabilis situs supinus sit, cui vel paulo plus sanguinis in vasis ejusve motus celerior est. Nempe eo in situ sanguis arteriosus, ponderis resistentia sublata, celerius in cerebrum irruit, & venosus sanguis, sublata auxiliatrice gravitatis vi, tardius redit.

Vv 3

Tot

(g*) ANONYM. de febr. intermit. p. 51.

(g**) IDEM p. 119.

(g***) CAMERARI ophtalm. vener.

(g****) LANCIS. de ca vena p. 8c.

(h) Second Mem. sur le mouv. du sang exp. 104. 105. 108. 112. 118. 122. Conf. L. III. p. 207.

(i) In typographis.

(k) Hæc etiam in fœdentibus.

Tot autem a causis cum sanguinis venosi velocitas mutetur, & cum ea causa adeo subito nascantur atque evanescant, pondus potissimum, musculos motus & respiratio, cum porro eadem cause in sanguinem arteriosum (*l*) multo minus in imperium habeant, non mirum videri debet, velocitatem venosi crux, multo quam arteriosi incertiores esse, & modo lente per venas sanguinem fluere (*m*), quando cause tardantes operantur, modo celeriter, quando accelerantes cause prevalent.

S. XV. Mensura celeritatis qua sanguis per venas reddit.

Celeriter sanguinem in magnis venis moveri, vel venæ in fano homine incisio demonstrat, de qua, etiam mediocri, pene arterioso saltu sanguis salit (*n*). Maxima vi sanguinem ex vena umbilicali proflire vidit, qui ex placenta redibat Cl. DENYS (*n**). Sed mensuram celeritatis aliqui absolute ut vocant, tentarunt definire, ut iter metirentur, quod sanguis in vena intra datum tempus absolvit. Alii unice rationem celeritatis in venis ad sodalium arteriarum velocitatem queriverunt. Facile vero intelligitur, haec tenus posse arterias venasque socias vocari, & earum celeritates comparari, quod perinde in minimis venuulis minimisque arteriolis ea celeritas minima, in mediocribus ranis utriusque generis & ipsa mediocris, in maximis truncis iterum maxima sit. In arteriis enim, uti a corde recedunt, ita velocitates minui (*o*), in venis, uti ad cor propius accedunt, ita augeri vidiimus (*p*). Quando vero absoluta velocitas queritur, utique addendus est venæ truncus, in quo experimentum captum est, cum inventa in brachio celeritas neque de vena cava vera sit, neque de vena in digito nascente.

Ergo in absolutam quidem celeritatem inquisitus Jolannes TABOR venam valvulosam brachii digito compressit, iterumque laxavit, ita vidit a valvula ad valvulam, pollicis spatium intra pulsus tempusculum a sanguine venoso percurri (*q*), nimis certe parvis calculis usus. Etsi enim vix certa satis

(*l*) De ponderie p. 201. de musculis p. 218.

(*m*) QUESNAT acum anim p. 233. ed. vet. & ed. nov. T. III. p. 415. 416.

(*n*) LINDEN Schol. med. P. 579.

(*n**) Vredemeester p. 273..

(*o*) p. 192.

(*p*) p. 324.

(*q*) Exerc. Med. p. 114.

satis ejusmodi tempuscula definiuntur, multo tamen majus spatium in brachio absolvı vidi, dum vocem duarum syllabarum pronuntiabam.

Eamdem fere celeritatem in venam cavam transtulit *Jacobus JURIN*, ejusque sanguinis momentum comparavit duodecim libris, infra secundum minutum per unciam rotis (r). Idem, in pulmone minus momentum fecit, ut celeritas eadem, pondus motum quadruplo minus foret. Ex his quidem mensuris celeritas sanguinis venosi, ad mediocrem sanguinis arteriosi celeritatem, fere subtripla fieret (s).

Longe alias mensuras alii proposuerunt. Fuerunt Cl. viri (t), qui arteriosi sanguinis momentum tamquam vivum motum, ex celeritatis quadrato in massam ducto ærimarunt, venosi, tamquam a mortua pressione acti, ex velocitate simplici, in eamdem massam ducta. Verum, si nutritusque motus causa in corde (u) est, non poterit alia in venosa, quam in arteriosa celeritate definita mensura adhiberi.

Deinde *Jacobi KILL* calculos omittimus, enormiter in privilegiis arteriosi sanguinis liberalis viri: quem si sequeremur, sanguis in venarum capillarium ad portas pertinentiibus ramulis 14613^{es} (x) lentius quam in arteria mesenterica fluere, & intra minutum primum vix supra lineam decimalem, inque hora non supra sex pollices percurreret, etiam si celeritatem arteriae mesentericæ aorte velocitati parem faceres. Idem tamen vir Cl. in arteria venaque sœcia effluxus reperit esse uti 15 & 6, & valde probabilem certe rationem inventit (y).

Cl. Collega noster *Stephanus HALES* ex saltu sanguinis de carotide sursum pulsi, cum saltu de vena jugulari comparato, utramque velocitatem metiri maluit, reperitque, cum ex carotide saltus foret pedum quinque & unciarum totidem, in vena sodali tredecuplo fere minorem, & quinque fere unciarum cum dimidia fuisse (z). Verum saltus quidem de vena plurimum a laxitate ejus usus minitur, quod sanguini magis cedit, & celeritatis portionem in dilatationem suam consumit, cum arteriæ firmitas columnam sanguineam contineat. Non dubium est, quin de metallica cylindro aqua altius, quam de membranacea prosliat.

Mili

(r) *Dissert.* p. 48.

(s) Si mensuram p. 344. dictam recipimus.

(t) KRUGER *physiologie* n. 112. seqq. NICOLAUM Puffingue.

(u) p. 324.

(x) *De Secretione* p. 93.

(y) *De vi cordis* p. 53. JURIN diss. p. 45.

(z) *Hæmaglat.* p. 27. 55.

Mihi quidem res multo simplicior videtur. In sodalibus arteriarum venis sanguinem in ea fere ratione lentius fluere reperi, quæ inversa est lumenum, paulo minor nempe quam subdupla (*a*). In venis cavis cordi immisis non dubium est, quin ea ratio legitima sit. Neque enim, ut ad simpliciora unius ventriculi corda calculum referamus, quidquam aorta educere potest, quod a venis cavis non accepit. Si ergo per eas venas sanguis lentius fluit, debet is lento accurate per venarum majus lumen compensari, & si ratio lento major foret, quam inversa lumini ratio, minorem certe copiam aorta acciperet, & cum ea differentia singulis pulsibus repeteretur, intra breve tempus sicca foret. Quare ut celeritatem in nascente aorta, cum celeritate in venis cavis comparemus, sufficit comparasse lumina. Si ea ratio est 11 ad 9 aut 10677 ad 91027 (*b*), celeritas venosi sanguinis ad arteriosum erit uti 81 ad 121. Si rationes sunt 2 ad 1 ut apud TABORUM (*c*), motus per eam venam accurate duplo lento erit, quam per aortam. Si rationes luminum sunt uti 3476 & 8177, quæ ex WINTRINGHAMIANIS mensuris sequitur (*d*), celeritas aortæ erit fere ut 82, venæ cavæ ut 35, minor ergo quam subdupla. Si ex mensuris Cl. BOISSIER (*e*) aorta luminum conjunctorum uniusque cavæ subtripla est, celeritas inversa cavarum venarum & ipsa subtripla erit. Si ex meis mensuris conjuncta venarum cavarum lumina ad aortam sunt uti 5030 a ad 1600, iterum celeritas in vena cava aliquanto major quam subdupla erit. Diametros enim reperi in vena cava superiori 37. in inferiori 57. in aorta ad cor 40. cent. poll. Si, ut in alio exemplo vidi, conjuncta lumina venarum ad aortæ lumen fuerint uti 24 ad 9. tunc velocitas venosa ad arteriosam erit usi 9 ad 24. Supra eam mensuram differentia non multum evagari potest, cum præterea venæ a cera longe magis super nativum modulum distendantur quam arteriæ, easque in vita minores esse probabile fiat.

Omnino ergo non pensitatis rebus nuper Cl. viro excidit, sanguini ad cor redeunti vix decimam partem momenti superesse, quod in aortam exiit, & novem decimas ejus momenti in transitu per cor & pulmones acquiri

(*a*) Second Mem. sur le mouv. du sang exp. 244. comp. cum 128.

(*b*) SANTORINI obf. anat. c. 8. u. 3. reformatis numeris, qui vitio laborant.

(*c*) p. 106.

(*d*) L c. Exp. 33. in bruto animale: sed venam cavam superiorem nimis grandem facit, & aorta maiorem, quæ minus sit.

(*e*) Physiolog. p. 75.

acquiri (*f*). Num momentum utriusque sanguinis perfecte idem est, cum tanto plus in cava sit sanguinis, quanto minor celeritas est.

§. XVI. Quo tempore sanguis circulum majorem absolvat.

Continuo postquam sanguinis major circuitus ex corde in ultimas arterias, ex iis per venas in cor inventus fuit, multum est disputatum, quo tempore univerfus sanguis eum circulum absolvat. Plerique prioris seculi auctores simplicissima methodo sunt usi. Aestimauit massam sanguinem, tot libris; deinde undam sanguinis uno pulsu de corde expressi ad drachmas appenderunt, pulsus in hora numerarunt, invenerunt tot uncias intra horam ex corde exire, esse vero in tota vasorum universitate non supra eas libras, quas ab initio posuerunt, toties ergo in hora eas libras omnes per cor circumire debuisse, ut esset, unde id organum tot drachmas & uncias in ea hora expelleret: in ea ergo parte horae copiam sanguinis aequali toti sanguineæ masse, per cor, universumque corpus circumvisse.

Primus ergo HARVEIUS, cujus et re erat ostendisse, non absque redeunte ex arteriis sanguine cor eam penum accepturum fuisse, quam in aortam expendit, tamen ut magnorum virorum is unus fuit modestissimus, ejusmodi calculum instituit, qui longe minus sibi faveret, quam res ipsa favet. Posuit adeo pulsus in hora 2000, qui sint 4500. Sanguinis vero drachmas tres in aortam projici IDEM posuit, cum duæ unciae projiciantur & ultra. Inde coufecit, unicam tamen intra horam plus sanguinis per cor circumire, quam in totius corporis vasis reperiatur (*g*), nempe libras fere 50. In posthumis schedis IDEM bis in hora circuitum absolvi reliquit. IDEM veriores numeros minime ignoravit, et si maluit minus propitiis uti (*h*).

Inde Johannes WALRUS pro una sanguinis de corde expulsi unicum scrupulum sumvit, de industria parcior, pulsusque iterum bis mille (*i*).

Vopiscus Fortunatus PLEMIUS, jam confirmata vi veri, pulsus fecit 5376, undam sanguinis tamen ad decem grana iniquius restrinxit, massam

(*f*) WRYTT physiol. eff. p. 34.

(*g*) De motu cordis diss. I. p. 88.

(*h*) Apud BIRCH T. IV. p. 535.

(*i*) Apud T. BARTHOLINIUM in anatomæ posteriori editione Exercit. I. p. 773.

dere, alias longiori intervallo distare, atque adeo per illas quidem circumtum sanguinis minori tempore absolutum iri, per alias remotiores tardius (x). Similia & KEILII morita sunt (y), & SCHELHAMMERI, & BOERHAAVII (z), & SCHREIBERI (a), & STEBELINI (b). Nuper etiam Cl. de SAUVAGES conjectura non improbabili reperit, per viscera in dato tempore plus sanguinis trajici, laxioreisque viam, per musculos difficulterem & iter tardius, cum aqua parum ex arteriis in venas iis quidem in partibus transire persuaderetur (c).

Ego quidem utique, cum ceram fere ubique in corpore humano facile circulum obire reperirem, difficultius tamen vidi iter suum relegere in glandulis, in membranis, facilius in renibus, venae portarum systemate, pulmonibus, cerebro, facile certe etiam in artibus. Deinde, cum vivorum animalium phænomena specularer, certo vidi, sanguinem aliis in partibus animalis quiescere (d), aut lente labi, aut inverso & nature contrario ordine moveri, dum in aliis ejusdem mesenterii sedibus, aut aliis ejusdem sedis vasculis libere, & legitime circuitum obibat. Frigora certarum partium, dum aliae calent, pallorque febrilis (e), & inflammations, atque pulsationes singularium artuum, similem in hominis vasis inæqualitatem demonstrant.

Porro oportebit de hac questione removere peculiares certorum humorum circuitus, adipis, vaporis cellularum minimarum, medullæ, bilis, exhalationum variarum, qui quidem humores omnes de sanguine veniunt inque sanguinem, sed diversissimis periodis redeunt. Deinde ponendum est sanguinem omnem, qui de corde exit, in cor eadem copia redire, neque usquam elabi. Sed neque in singularum corporis particularum celeritates proprias descendit, neque cordis, aut pectoris, aut capitis velocior circuitus, a pedum lentiori circuitu separari potest.

His ergo quasi nodis sepositis, & questione ad simplicitatem revocata, haec tenus responderi potest. Positis ergo sanguinis libris triginta, numeratis pulsibus 4500, unda quæ de corde sinistro exit, ad quinque semuncias

X x 2

æstimata,

(x) In VESALIE epitome p. 25.

(y) Anat. Alrigment p. 140.

(z) Inst. rei med. n. 479. & T. II. p. 306.

(a) In ahmag.

(b) De puls. p. 17.

(c) Membr. de l'Acad. de Berlin 1755. p. 49.

(d) De arteriis Second mouvement exp. 62. 65. 68. 69. 71. 72. 73. 81. 82. 90. 91.
de venis exp. 119. 122. 123. 125. 128. 129. 132. 137.

(e) SCHREIBER Ibid.

estimata, exibunt de corde intra horam drachmæ 90,000. Sed in homine sunt drachmæ sanguinis 3840, erunt adeo intra horam pleni circuitus $\frac{50000}{3840}$ sive 23 & $\frac{1640}{3840}$: & unicus sanguinis de corde sinistro in cor dextrum circuitus abiolveretur intra minus quam tria minuta prima. Inde porro sequitur, satis magnam tamen in minioris vasis moram esse. Nam si celeritatem a corde acceptam sanguis servaret, & intra minutum primum solos 260 pollices sive pedes 21 percurreret, qui modestus *Francisci BOISSIER* (f) calculus est, adaptaret bis vel ter in minuto sanguinem de corde per caput, aut pedes in cor redditum.

S. XVII. *Motus venosus perturbatus.*

In arteriarum contemplatione ostendimus, quam facile & saepè, in vivo animale, ex debilitate, aut ob vim derivationis, aut aliis ex causis arteriarum motus perturbetur. Multo incertior venarum motus est, qui a pluribus causis (g), & ab omnibus potentius mutetur (h). In venis adeo frequens, & facile cum vita & sanitate reconciliabilis sanguinis est retardatio (i), & plena demum quies (k), aut vicissim nova acceleratio (l). Sed neque rara est inversio motus, ut sanguis venosus, ad fedem minus resistenter, aut ad inferiorem sui vasis regionem, aut omnino a debilitate contrario ductu fluat, quam quidem a natura fluere jubetur, quæ est motus inversio (m), & ipsa cum restituto motu ad cor reconciliabilis (n). Sic ab obstaculo quoconque ductu refugit (o). Iterum vulgatissimum est, sanguinem in venis contrariis motibus librari (p) atque alternō

(f) *Mém. de Berlin.* 1755.

(g) p. 342.

(h) *Conf. n. 6.* 7. 8. 14.

(i) *Second Mém. sur le mouv. du sang.* Exp. 129. 133. 138. 139.

(k) *Ibid.* exp. 136. 137. 139. 122. 124. 125. 129. 131. 134^o 135. 139. 160. 161.

170. 173. 177. 178. 183. 191. 204. 233.

(l) Exp. 118. 155. 159. 160. 191. &c.

(m) *Ibid.* Exp. 117. 129. 141. 150. 151. 152. 153. 154. 154^o 155. 156. 157.

158. 152. 164. 166. 167. 169. 171. 174. 177. 178. 180. 183. 184. 188. 190. 191. 193.

198. 204. 205. 206. 208. 210. 211. 218. 220. 223. 224. 226. 229. 230. 231. 232.

234. *L'EUWENBERGCK anal.* & *contempl.* p. 108.

(n) *Ibid.* Exp. 119. 154^o 155. 156. 166. 174. 177. 189. 185. 209. 216. 229.

(o) *Ibid.* Exp. 123. 135. 182. 199. 213. 234.

(p) Exp. 117. 123. 124. 134. 137. 142. 143. 146. 154. 192. 218. 211. 212. 223.

224. 225. 226. 227. 229. 233. 234.

terno itinere ad cor , aut ad partes extremas ferri , & in venarum syste-
mate composito demum motu , partim legitimum iter tenere , partim legitimo
contrarium (q). Cum oscillatione pugna contratarum columnarum
non raro conjungitur (r). Etiam hoc non rarum est , post hanc oscil-
lationem motum naturalem restitui (s) , quando pugna præcessit , ex qua
columna sequens naturale sanguinis iter superior exit.

Quæ in animalculis frigidi sanguinis vidi , eorum aliqua manifesto etiam
in homine locum habent , cum nihil in natura ejusmodi animalium sit , quod
ea phænomena a calidis animalibus avertat. De retardatione dubium non vide-
tur , quam in venis mesentericis animalis manifesto videoas , cui abdomen aper-
tum est. Quies videtur in submersis , suffocatique locum habuisse , & quoties
neque pulsus superest , neque respiratio (t). Relapsum sanguinis venosi
in minima videtur demonstrare pudor , ruborque generum , quem arteriæ
vix tantum efficerent : distensio venarum minimarum intestinalium in he-
patis , aut venæ ad portas obstructione , haemorrhoidum inprimitis fluxus ,
quo nihil manifestius est , indeque natum obstrukturorum abdominis viscerum
levamen ; tum venæ incisæ subitus effectus in suffocatis & suspensis , quibus
sanguis in auricula dextra , vena cava superiori , vena jugulari , collectus
per vulnus abducitur. Relapsu posito sequi videtur oscillatio , quam primum .
nempe , in exemplo sanguis , de haemorrhoides venis in legitimum iter
redit , atque hepatis viam repetit. In omni etiam anastomosi , quoties aliam
a priori directionem sanguis adoptat (u) oscillationem præcessisse proba-
bile est.

Obstructionem , ut pathologici potius argumenti , omitto , laudaremque
plurimum ejus viri laborem , qui confirmare susciperet , quanta venarum in
obstructione , & inflammatione pars sit , quos ego morbos multo facilius
crederem explicari posse , si omnino non in arteriis , multo rarius obstructis ,
sed in venis causa mali quereretur (u*).

X x 3

§. XVIII.

(q) Exp. 137.

(r) Exp. 125. 134. 137. 141. 142. Conf. p. 90. 91. & Ant. v. LIEUWENHOECK
contin. arcuato. motor. p. 116. MALTIGHE posthum. p. 92. HALS bennatus in my-
tulo.

(s) Exp. 129. 142.

(t) Fulius L. VIII. haec dicentur.

(u) p. 337. 338.

(u*) Huc QUESTNAI "de la saignée" ed. nup. p. 557.

§. XVIII. *Sanguinis venosi a morte motus.*

Paucis hunc absque corde sanguinis motum tetigisse sufficiat, qui eodem modo in venis (*x*) se habet, atque in arteriis, & absque ulla cordis impellente vi, in meis experimentis ad 36 (*y*) usque minuta prima superfluit, quando longissime. Ejus motus causae sunt pondus (*z*), frigus constringens (*a*), vis derivationis (*b*), aer de cruro expeditus (*c*), vis demum non satis hactenus cogniti, quam ex probabili rationum consensu ad attractionem massarum (*d*) coacti sanguinis retuli. Eum motum vidi naturale iter secutum (*e*) esse, aut contrarium fuisse legitimi (*f*), aut demum ad oscillationem pertinuisse (*g*).

S E C T I O V.

Pressio lateralis sanguinis venosi.§. I. *Argumenta quibus rejicitur.*

MUlti nuperorum aut nullam pressionem in venis lateralem admiserunt, alii exiguum. Nullam admisit vir Ill. Petrus v. MUSSCHENBROECK (*h*), ob eamque rem nullam in venis medicamentorum actionem

(*x*) Exp. 195, 196, 204, 205, 206, 207, 209, 210, 215, 218, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 232, 233, 234, 235.

(*y*) Exp. 146, conf. 222, 225, 226, 229.

(*z*) Exp. 206, 216, 218, 222, 224.

(*a*) L. IV. p. 495. SWAMMERDAM de respir. p. 106.

(*b*) Exp. 198, 204, 205, 206, 207, 210, 216, 218, 210, 221, 225, 226, 228, 229, 231, 232, 234.

(*c*) Conf. p. 222, 223.

(*d*) Exp. 216, 217, 224, 225, 227, 228, 229, tum exp. 197, 215, 218, 222, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234.

(*e*) Exp. 196, 198, 205, 210, 217, 218, 220, 223, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 232, 233, 234, 235. In cadavere sanguis per venas in vasa majora movetur PECHLIN de purgant. p. 484.

(*f*) Exp. 204, 205, 210, 217, 218, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 229, 232, 234.

(*g*) Exp. 146, 221, 223, 225, 226, 229, 234.

(*b*) Elem. de physic. p. 326. J. G. BERGER de matov. brach. p. 71. R. JACKSON de vena fell. p. 9.

nem adgnovit, cum parietes neque contingent, neque adeo irritent. Exiguam, minoremque, quam arteriarum, non rejectit Fr. BOISSIER (*i*), obque ejus parvitatem etiam parietes debitiores esse observavit (*k*). Ratios nem procul dubio Cl. viri in dilatata continuo venæ diametro quæsiverunt (*l*).

S. II. Confirmatur.

Sed facile demonstratur, in venis omnino pressionem lateralem nihilo obscuriorum esse, quam in arteriis, perindeque debilioribus membranis venosis adaptatam, ut arteriosa illa ad robustos arteriarum canales. Si quidem columnæ sanguinis venosi continuo in angustiorem canalem fllicantur (*m*), atque adeo plures globulorum ordines in parietes nituntur, & præterea uti motus progressivus minor, ita lateralis pressio major est (*n*). Sed etiam dilatationes venarum ligatarum, quam arteriarum evidenteriores sunt (*o*), ut in vena jugulari aliisque sappilliæ vidi, eæ vero dilatationes pressionem lateralem metiuntur. Constantes etiam venarum tumores frequentiores reperiuntur (*p*), & ruptiones a parvis causis minime rarae sunt (*q*). Demum in venæ sectione, celeritas nova, qua sanguis per vulnus erumpit, manifesto eam pressionem demonstrat. Non enim nova aliqua causa per vulnus nascitur, quæ sanguinem in eam sedem urgeat, & unice sanguinis circumeuntis celeritati additur pressionis parietum venosorum integer & plenus nunc effectus, quem dudum in sedem, nuper incisam, tunc vero integrum, exercebat, sed quem sanguinis resistentia non sinebat adparere. Verum si venosi parietes contra sanguinem premebant, certum est sanguinem contra ipsos pressisse: nisi enim pressisset, parietes canalem ea ipsa sua vi arctassent. Eum vero effectum esse, & celeritatem sanguinis per vulnus a pressione vasorum integrorum augeri, & mea experimenta evincunt, & aliorum clarorum virorum (*r*), neque hic possum cum illustribus viris sentire, qui nondum

(*i*) Mem. de l'Acad. de Berlin T. XI. p. 50.

(*k*) p. 53.

(*l*) Hinc in vasis æque lati, ut radii, pressionem lateralem locum habere, admittit Cl. BOISSIER L. C. p. 50. Verum ostendimus p. 340. omnes venas esse ejusmodi. Ductus thoracicus, cylindricus, intumescit MONROO, de hydrope p. 17. 18. &c. & ureter obstruetus HENRIGI de abscess. mesent.

(*m*) p. 325.

(*n*) p. 233. JONES de mot. myœkul.

(*o*) L. II. p. 128.

(*p*) Ibid. & p. 340.

(*q*) p. 129.

(*r*) Ant. de HEYDE p. 2. 4. HALLES p. 165. SAUVAGES de Pinflammat. n. 15.

dum factis experimentis , sanguinem , per vulnus venosum accelerati (s) ita non admiserunt , ut vinculo opus esset , quo efflueret (t).

Si objecceris me contra propria dictata loqui , qui venas musculosis fibris destitutas , visque adeo irritabilis expertes esse dixerim (u) , accusationem ni fallor non ægre diluero. Contractio est , quæ fibris animalibus communis , extensiō suæ resistit , seque in minimam longitudinem restituere conatur. Eam vim venena , aut scalpellæ non excitant (x) , neque nervi aut augent aut minuant , eadem , etiam cellulofæ telæ propria , ex qua venæ formantur , etiam in cadaveris venis & arteriis potius potentior residet , hactenus unice efficax , ut dilatatione tubi renitur , quæ absque fibrarum venam constituentium aucta longitudine esse nequæat. Derivationem cæterum , & olim (y) , & nuper (z) , a contractione vasorum minus oculis manifesta deduximus.

Cæterum hanc pressionem in vasis minimis minorem esse , in truncis vero venosis perpetuo crescere , uti majores & cordi propiores sunt , facile intelligitur , cum venæ eundo arcentur. Circa cor vero & maximam esse oportuit , & cum pari flexibilitate conjunctam , ut venæ quam latissimæ reddi possent , quia in variis ritu stadiis sanguis ea fede ante cor & pulmones necessario retinetur , ut in omni nixu , in cursu , laboreque intenso. Hinc in animalibus amphibiosis , quæ dia absque respiratione sunt , venæ amplissimæ (a). Ut vero arteriosi sanguinis impetus , quam venosi major est , ita resistentia venosarum membranarum minor est , quam arteriosorum velamentorum. Inde , cum lanceola per venam in arteria brachii penetrante sanguini arterioso via in venam aperiretur , mirifice ea hoc loco dilatata fuit (b).

S. III. Cur venæ pulsū deſtituantur.

Si in venis , perinde ut in arteriis , sanguis in parietes premit , queri potest ,

(s) MORIſſON *lettres sur le choix des saignées* L. V. *Essays de physique* ed. 1735. p. 522. HAMBERGER *de venæ ſcī. II. 43.*

(t) Ibid.

(u) *Prém. Mem. sur les part. irrit. & ſinſ. p. 53.*

(x) L. II. p. 126.

(y) *Second Mem. &c. p. 338.*

(z) *Supra Sect. I. n. 39.*

(a) SCHELHAMMER in *phoca apud VALENTINUM.*

(b) *Obſ. of a Societ. at Lond. T. I. p. 340.*

poteſt, cur venæ non perinde alterno pulſu agitentur, perque ſuas vices aut dilatatae micent, aut contractæ ſe subducant. Neque enim verus pulſus eſt, quem deſcripſimus (*c*), neque venarum cavarum (*d*), & pulmonalium motus (*e*), aut alia pauca ea exempla (*f*) huc trahi poſſunt, in quibus taris non nullis mortalibus venæ falierunt. Innumerabilibus enim experimentis conſtat, grandes etiam venas, nudas, & ſuo tumore etiam integrum per cu- tem conſpicuas, immutabili diametro in vivo homine vivoque animale perſiſtere.

A figura conica divergente pulſatio non impeditur (*g*), cum & venæ in truncos confluenteſ potius anguſtiores fiant, & ſanguis ex arteria in ve- nam fluens utique pulſationem moveat (*h*), & in varicibus venisque li- gatis pulſus nullus naſcatur, ubi oportuit maximum eſſe, cum finis ejus- modi venarum non anguſtior ſolum, ſed cœcū fit.

Conſtat omnium primo, ideo non micare venas, quod ad eas cordis viſ acceleratrica non perveniat, quæ in arterias alterne plus ſanguinis im- pellit. Nam etiam illa ſanguinis alterna propulſio, quam in arteriis cordis con- tractio prodiſit, ea a venis undique abeſt (*i*).

Supererit, ut cauſa inveniatur, ob quam alterna cordis con-tractio non perinde alterne ſanguineni venoſum vehementius incitet, cum tamen utique a corde motus ſanguinis venoſi naſcatur. Varia varii obtulerunt.

Primus III vir *Franciscus Boiſſier* & olim (*k*), & ſuſius (*l*) nuper, ſolutionem dedit problematiſ, fere ejusmodi. Sanguinem nempe ait in ultimis jam arterioliſ moveri velocitate uniformi, cum in truncis pulſantibus alterne novus ſanguis præcedentem urgeat, & alterne remittat ur- gere. Nempe in arteriis velocitatē a corde acceptam perpetuo decrēſcere eundo, ut diaſtole ſemper minor fiat, minorque ſit diſferentia, qua ſan- guinis unda ſequens antecedentis velocitatē ſuperat.

Contra viſ contractilis in arteriis velocitatē generat tempore fyſtoles, quæ

(*c*) p. 332. ſeqq.

(*d*) L. IV. p. 399.

(*e*) Ibid. p. 410.

(*f*) p. 346.

(*g*) Inde impediſti G. Colli de ſecret. p. 107. Refutatur ab III. SENACOL C. T. II. p. 201. 202.

(*b*) R. JACKSON I. c. p. 6. J. Daniel SCHLECHTING memoir. prifentis p. 121.

(*i*) p. 324.

(*k*) De pulſu p. 25. 26.

(*l*) In Nov. Eph. Nat. Cœr. Vol. I. obſ. 36.

Haller Phyſiolog. Tom. II.

quæ perpetuo crescit, cum a majori serie arteriarum generetur. Quare, cum velocitas in systole generata perpetuo increbat, celeritas vero a corde impressa perpetuo minuatur, differentia ergo utriusque perpetuo decrebat, necesse est aliquod punctum esse, in quo hæc differentia evanescat, & celeritas ab arterie contractione nata æque magna sit, ac celeritas a corde impressa. Id si factum fuerit, sanguis movebitur celeritate æque magna in systole arteriæ, quando cor a motu remittit, & in diastole, quando cor contrahitur, nempe sanguis celeritate uniformi movebitur, & pulsus nullus erit. Id sit in ultima arteriola, atque adeo etiam in vena sanguis uniformi velocitate, & absque pulsu, movebitur.

Unico vero argumento impeditur, ne hanc problematis solutionem adoptemus. Nempe etiam in iis animalibus venæ absque pulsu sunt, & absque acceleratione, in quibus pleræque arteriæ vi contractili carent, (*m*) neque adeo in systole sua celeritatem aliquam generant, quæ velocitati a corde acceptæ sensim æquiparari possit. Si ergo venosi pulsus absentia etiam absque vi contractili arteriosa nasci potest, aliam causam habere necesse est.

Deinde alia experimenta ostendunt, solam longitudinem canalis, in quem alterne liquor expellitur, & magnam distantiam ab inpellente embolo, problemati satisfacere, ut differentia celeritatis undæ subsequentis, qua celeritatem undæ præcedentis superat, paulatim diminuatur, & denique evanescat, licet in eo canale nulla contractilis vis, aut novæ velocitatis causa fuerit. Intestino inflato H A R V E I U S pulsus phænomena imitatus fuerat (*n*): in vaccæ etiam prælongo, sed mortuo, neque irritabili intestino J ohannes F洛YER rem expertus est, cum alterne embolum agitaret, & vicissim ab agitando remitteret, atque adeo cordis sanguinem in arterias impellantis alternam actionem imitaretur; prima nempe intestini volumina, emboloque proxima, uiri alterne liquorem recipiebant, ita alterne intumuerunt, & subsederunt vicissim (*o*). Contra ad majorem ab inpellente embolo distantiam (*p*), denique eodem & continuo fluxu aqua effluxit, etiam si alterne prolecto embolum agitabat, & temperabat ab agitando.

Alio

(*m*) p. 210.

(*n*) Exerc. III. p. 246.

(*o*) Physicianus pulsowatch p. 25. 26. K A A U W impet. facient. p. 183.

(*p*) K A A U W l. c.

Alio experimentum repertum est (*q*), liquorem, qui alterno impulsu in minimos poros spongiososque anfractus impellebatur, ita penitus alterni motus ac quietis differentiam anisisse, ut continua stillis de spongia elabetur. Cum vero in corpore animato periculum imitaretur **VIR CT.** & liquor in arteriam mesentericam alterno impetu impelleret, desineretque impellere, perinde de vena mesenterica aquæ *continuum fluentum* reedit.

Hæc experimenta meditatus reperi, pulsationem utique pendere a vicinia, & a magnitudine, atque robore cordis, hinc in homine febriente, cui cordis vires morbus intendit, pulsationem in consuetis quidem sedibus vehementer, & deum aliquam etiam iis locis percipi, in quibus sano homini arteriæ non saliunt (*r*). Deinde homini sano, cui cor grande sit pro corporis portione, pulsationem evidentem ad arterias usque continuare, quæ fere sextæ partis linea diametrum habeant (*s*). Contra in rana, cui cor multo pro corporis portione minus est, inque pisce, pulsationem in truncis etiam majoribus brachii, cruris, mesenterii evanescere (*t*), eoque proprius ad cordis viciniam terminari, quo animal debiliter fuerit (*u*).

Hæc, quando cum experimentis FLOVERI & PLEMPII confero, nullum mihi dubium relinquunt, quin simplicissima ratione pulsatio evanescat, quam primum velocitatis in unda consequente super undæ præcedentis velocitatem excessus evanuit. Sufficit autem ad destruendam hanc differentiam, ut undæ cordi proximæ plurimum de sua velocitate amittant, undæ vero remotiores minus. Verum id ita se habere ostendimus, cum in minimis fetibus omnino figura ab arteriis conica absit, atque adeo illapsus in arterias minuatur (∞), in minimis porro vasculis reticulata natura tantum fere lumen ramorum faciat, quantum est lumen trunci (y), cum celeritas in minimis minor, atque adeo frictio minor sit, quam in magnis (z), cum venarum vicinia, laxiorque natura sanguinis in arteriis minimis transitum expeditat (a). Ex hoc principio res tota constituitur. Si enim undam a

Y v. 3 corde

(q) P L E M P. *fundament. medicin.* p. 160, le C L Y T E C an pulsationis desitatu ab aqua-
bileitate sanguinis. Paris 1741.

(r.) p. 219 seq. A suspirio ad extremos unguis pulsus percivitur HERSHAW acrochyl. p. 22.

(7) p. 210, 1

(1) p. 211.
(1) p. 212.

(1) p. 216.

(x) L. H. D. 50

(n) D-223

(g) p. 197.

(3) pet 180

(a) Ex vi d

corde ad digitum decem in regiones diviseris, in proxima cordi regione, primaque, multo celerior erit unda proximepræcedente, quæ resistentias varias detrimentumque passa est. Sed differentia undæ secundæ, a corde remotioris, qua undæ antecedentis velocitatem superat, jam minor est, quam differentia primæ, minor iterum differentia tertiae undæ quartæque, inque perpetua progressione minor nonæ supra decimam, donec ea diversitas evanescat. Evanescit autem eo citius, quo prima unda minorem celeritatem accepit, & evanescit eo integrus, quo plures æque longæ undæ fuerint, quæ cor inter & extremum vasculum intercedunt, nempe quo arteria longior est.

S. IV. *Vitiosus venarum pulsus.*

Dixi in ratis quibusdam casibus venas alterne micavisse, ut arteriæ solent. Plerique casus fuerunt obstaculi (*b*) alicujus circa cor positi, & iter sanguinis venosi morantis. Cor amplissimum, & tenuë, & in utraque arteria prælongus polypus, fibrosus erat: huic æstro venæ brachii, & colli, eodem cum corde tempore micabant (*c*). Cor magnum & aneurysma dextri ventriculi, cum palpitatione, & asthmate, causa fuit pulsationis Jugularium (*d*). Valvulae mitrales in hydroperico pene clausæ, cor amplum, venæ in collo pulsare visæ (*e*). A polypo perpetua & ex ordine sibi succedens venarum jugularium pulsatio (*f*). Pulsatio valida super umbilicum, carpi pulsui synchrona, cum vena cava descendens adiposâ membrana & medullæ simili infarciretur (*g*). Adde paulo obscurius exemplum, pulsantium in febre petechiali venarum, ut earum subsultus arteriarum similes essent (*h*).

Hos pulsus meditatus eo adducor, ut ad venæ cavæ, maligne in cor obstratum se deplentis, vitium pulsationis venosæ causam referam. Ab ea causa sanguis refluus (*i*), proximos trunco, & potissimum jugulares inflavit. WEITBRECHT historiam, si in toto corpore venæ salierunt, ego qui dem omnino non intelligo.

Sinuum venosorum cerebri pulsum, omitto, qui nullus sit.

SEG

(*b*) SCHREIBER *almagest.* p. 290.

(*c*) HOMBERG *Memoir. de l'Acad.* 1704. p. 218.

(*d*) LANGIS. I. c. p. 136. 141. ed. prior. Rom. 1718.¹

(*e*) MONROO *de hydrope* p. 13.

(*f*) MORAND *Memoir. de l'Acad.* 1732. p. 432. 433.

(*g*) BONT *Medic. Indor.* BLANCKARD *Cbir.* p. 432.

(*h*) WEITBRECHT *bijl. febr. petechiant.* quam in I tomo collectionis meæ scudi feci.

(*i*) L. IV. p. 402.

S E C T I O V I .

*Motus venosi effectus.**§. I. Quæ venosus motus cum arterioso communia habet.*

Brevissimum etiam hic esse licebit. Pleraque enim in venis eadem fiunt, quæ in arteriis, celerque in truncis motus eadem, quæ velox in arteriis motus, sed mitius, lentior idem in ramis eadem potentius efficit, quæ in arteriis lentior motus fecit. Sed etiam anastomosum venosarum eadem, quæ arteriosarum utilitas est, parumque venosa retia ab arteriosis differunt. Quare & conflicatio globulorum, & generatio caloris, & densitatis, & alcalinæ acrimoniae, & ruboris hic, quam in arteriis, minoris esse videntur, cum in universum venosi sanguinis motus, quam arteriosi minus celer sit (*k*). Globulorum (*l*) modulum venæ minimæ perinde præstant, quæ & ipsæ unius globuli capaces sint; par etiam est a putredine præservatio. Adtractio globulorum & visciditatis productio hic etiam majores esse videntur, cum motus in minimis venulis lentior sit: unum demum est, in quo venæ arteriarum contrarium effectum operantur.

§. II. Mictio.

Arteriæ diversæ indolis particulas separant, quæ conjunctæ sanguinis massam constituebant. Eas in diversi generis vascula distribuunt. Venæ contra ea elementa conjungunt, quæ eamdem massam remittæ reparant. Sanguini ergo arterioso lympham reddunt (*m*), & adipem (*n*) & vapores exhalantes minorum cellularum (*o*), & magnarum cavearum aquas (*p*), & de receptaculis resorbtos humores varios ex vesicula fellea (*q*), semi-

Y y 3 nali

(*k*) p. 344.(*l*) p. 309, 310. nisi quod molliores minus sanguinem mutant.(*m*) T. I. addend.(*n*) L. I. p. 40.(*o*) L. I. p. 151, 155.(*p*) L. I. p. 152. seqq.(*q*) In sequentibus eadem oportebit demonstrare.

nali utraque, ex ventriculo, ex intestinis, ex urinæ receptaculo, & potissimum resumtum ex digestoris officinis succum albilem, in quo futurorum humorum humanorum elementa continentur. Ut in aorta ergo, ita in venis cavis, diversi humores omnes continentur, plenaque quasi sanguinis penus est: in minimis nascentibusque venis crux, cum paucis tenuioribus aqualis supereft, cui ex ordine hi humores rediuntur, qui de arteriis secesserunt. Ita fit, ut in corde omnia genera liquorum iterato convenient, quæ in diversas animati corporis provincias debent distribui.



LIBER

L I B E R V I I .
S E C R E T I O .

S E C T I O . I .

Humores.

§. L

Secretionis minus equidem latino nomine intelligitur ea corporis animati functio, qua, de communi sanguinis massa, alii, & a sanguine diversi, & a se ipsis varii, humores ea lege parantur, ut in qualibet ejus corporis particula idem constanter humor generetur. Multa in physiologicis obscura sunt, obscurius hac ipsa functione nihil. Omnia enim in minimis viscerum glandularumque quasi elementis aguntur, quorum fabrica neque sensuum auxilio, neque rationis meditantis acuminis accessa est. Sed neque experimentis valde locus est, quibus naturam imitantes deprehendamus: aut certe nondum quidquam hac quidem via tentatum fuit. Inde, cum hiatum aliquem in systemate homines ægerrime admittant, factum est, ut hypothesis ædificaverit, quæ anatomæ fabricare recusat. Sed ego hypotheses quidem hactenus non excludo, quin placere possint aliis, quæ mihi parum improbabilia videntur: deinde quod sensiva sepe veri, aut certe ad experimenta facienda præludentes scintillæ, ex hypothesibus utiliter emicuerint. Firmi quidem promitto parum, in id maxime intentus, ne pro veris laudem, quæ unice probabilia sunt; lectori non longe dux futurus, ut tamen in errorem non abducam.

Ordiñem eum video ut utiliter sequi, quo humorum primum classes & variam indolem dotesque diversas recensem: deinde organa, in quibus eorum humorum quisque de sanguine separatus fecerit. Ita fore speravi, ut aliquanto propius ad eam causam accederem, quæ facit, ut de sanguine definitus humor secedat, neque alias. Si enim in particula definitæ fabricæ & unice, & semper, idem suas per dotes pariter definitus humor nascitur,

tur, valde quidem mihi probabile videtur, in ea fabrica veram causam peculiaris indolis esse, quæ in eo humore est, qui ea in parte separatur. Propius utique ad verum accederem, si rectius, & plene, ea fabrica innovisset, nunc tantum citra scopum subsistere necesse est, quantum a cognitione fabricæ distamus.

§. I L Clases humorum

Nimis parca mihi videtur divisio, quam prior *Archibaldus PICTARNE* (*a*) proposuit, irde recepit Vir olim *Cl. Petrus Antonius MICHELOTTUS* (*b*). Sufficere putarunt hi quidem cel. viri, si crassos humores a tenuibus separarent. Paulo contractior contra mihi olim divisio placuit, quam quidem claro in naturæ historia auctori *Johanni Godschalk WALLERIO* (*c*), & sanguinem quidem omitto, de quo dictum sit: sed spirituosos etiam humores nimis ignoratos, nunc quidem prætereo. Superfunt, quæ olim (*d*) proposui, aliū vero clari viri adoptarunt, genera humorum quatuor: *aquosorum*, *mucosorum*, *gelatinosorum*, *oleosorum*. Hoc ordine eos humores enarro, quo ipsos natura evidenter producit. Aqua enim de terra sorbta, in mucum primo perficitur, five in foliis, five in stipite, five in semine hunc naturæ laborem requisiveris. Ex muco aliquanto major maturitas gelatinam, perfecta demum, in semine oleosam farinam parat (*d**). Eo itinere tritici farina ex aqua sensimque spissiori muco nascitur. Sincerioribus his humoribus alias compositos mistosque addemus.

§. III. Humores aquæ.

His humoribus commune est, aquæ habere ad reliqua elementa rationem quam maximam, hinc expeditissime fluere, neque trahere fila. Ab igne eadem tota, fere minimo terreæ momento superstite, dissipantur, neque ab alcoholè vini, aut a meracissimis de metallico etiam fale stillantibus acidi-

(*a*) *De circulat. sanguin. per vas. min. n. 29.*

(*b*) *De separat. humorum c. 2.*

(*c*) *Hydrolog. p. 79.*

(*d*) *Comit. ad Præc. Boët. T. II. p. 41r.*

(*d**) *Stefani HALSI in vegetable statiki est observatio.*

dis liquoribus coguntur. Admistas utique & ipsi terreas glebulas habent, & salis, & denique olei : Sed neque a fontium aqua ejusmodi firmiora elementa absunt. Eorum humorum in homine magna portio est. Aliqui de corpore amandantur inutiles, quos excrementa vocant, urina nempe, cuius in homine sano quidem natura nunquam spissabilis est, deinde perspirabilis a SANCTORIO (e) appensa materies, deque pulmone exhalans (f) anima. Nam sudoris indoles misti generis est, cum ex oleo subcutaneo, ex sebo sepe glanduloso, & ex tenuiori aquula vasorum perspirantium componatur.

Sed etiam inter inquilinos humores, quos ad suos usus in corpore animalis natura reservat, sunt quibus praeter aquam parum omnino alterius indolis inest. Eo salivam refero, veriorem illam, aqne muco longe diversam, tum similem salivæ pancreaticum huniorem, & lacrimum denique, quæ rarissim in occasionibus profundatur, perpetuo cæterum nares de oculis demissa irroret. Sed etiam in oculo purissima & pellucidissima aquula, & inter cornea membranam lentisque crystallinæ anteriorem faciem effunditur, & in fibrarum intervalla, quibus hæc ipsa lens conponitur, & in vitrei humoris cellulas, eademque cornea membrana laminas inebrat. Neque specie caret veri, etiam alios, sed sensibus inaccessos, ejusmodi diaphanos latices plerumque per corpus animale latere : neque absque magna auctoritate forem, si nerveum illum celeberrimum succum hoc referrem.

§. IV. *Mucosi humores.*

Aliquantum ab aqua recente *mucus* differt, & ipsa aqua, quando stando vitium contrahit, viscidam una, mucique similiorem, naturam induit, inque vegetabilium vasorum plerumque muci dotes imitatur. Ab aqua *mucus* hactenus distat, quod minus fluidus se trahat, filaque ducat, & ad solida corpora fortiter adhaerescat. Cæterum cum aqua facile miscetur (g), inque ea promte diluitur, & pariter odore caret saporeque, & demum colore, nisi cœrulei quiddam plerumque subesset. Pariter etiam neque igne, neque ulla gillatitiorum liquorum etiam acidissimorum, violentia cogitur, neque in albumen

(e) Perspirabilis vapor frigido vitro suscepitus in aquam modice fassam cogitur Fo-
RENAVE de fabric. glandul. p. 5. 6. Præfl. T. III. p. 540.

(f) IDEM ibid.

(g) Memoir. de l'Acad. de Chirurg. T. I. p. 105.

bumen abit. A putredine adeo aliena (*h*) muci natura est, ut integro anno conservatus absque factore (*i*) manserit. Pondus est quod aquæ, aut aliquanto minus (*k*). Solidi elementi quam aqua plus habet, certe in nonnullis exemplis, ut siccatus, postquam aquam exhalantem amisit (*l*), in crustas asperas, fragilesque abeat, nam de omnibus muci generibus, deque urethrae muco & intestinorum, experimentum non habeo. In omni muco globulos oleo familiares olim *GORNUS* (*m*) videntur.

Aquam cum oleo miscet, certe ex plantis sumta mucilago, quod natusque naturæ particeps sit (*n*). Nam in plantis universis, & in olivis ipsis in oleum abit. Virides viscidum mucum dant, matura oleum (*o*).

Chemica experimenta in muco facta rara extant. In calida induratur (*p*), inque igne in carbonis speciem amburitur (*q*): sed etiam lens crystallina, aliaeque aqueo succo ebria corporis particulæ, perinde ab igne mutantur.

Liquor de vino destillans, qui passim ignis phænomena imitatur, etiam mucum aliquantum cogit (*r*), five purus fuerit, five ars modice fucato spiritui essentiae nomen imposuerit. Qui vero de nitro, fale, alumine, vitriolo, acidi latices vehementiori igne eliciuntur, adeo meraci, ut vaporem in aerem conspicuum diffundant, pituitam adeo non cogunt, ut foliis visi sint (*s*). A vitriolo tamen cupreo cogi dicuntur (*s**), & ab alumine (*s***). Lixiviosi sales mediique pituitam non solvunt (*t*).

Adhibito igne, absque emitto odore, in carbonem insipidum, & insulsum

(*b*) *SENAc* tr. da can. T. II. p. 101. *QUESNAT* I. c.

(*c*) *Comment. Acad. Scient. Petropol.* v. XIV. p. 209.

(*k*) *SENAc* I. c. ob admittum puto aerem, graviorem enim esse convenit, qui plus terre continet.

(*l*) *SENAc* I. c. *BOKKEHAAVE* de fabric. gland. p. 10. *QUESNAT* atom. anim. T. II. p. 347.

(*m*) *Diff. de pituita* n. 38.

(*n*) *Obſ. of a Soc. at Lond.* T. I. ad fin.

(*o*) *LEMERY* tr. des animens T. I. p. 308.

(*p*) *SENAc* I. c.

(*q*) *IDEM* ibid. p. 102.

(*r*) *Andreas RUDIGER*, vel *Christianus Adamus GORNUS*; quem titulus auctorem vocat, in *diff. de pituita* Lipsie ann. 1718. edita, & in *Tomo VII. collectionis meæ recusa* c. I. n. 18.

(*s*) *IDEM* I. c. n. 7. 11.

(*s**) *RUTTY* *Synops.* p. 262. 263. etiam in aqua minerali cuprea p. 291. de sputo enim, aut muco faecium intelligo, etiæ *Vir Cl.* salivam nominat. Martium vitriolum salivam non cogit p. 239. aqua vitriolica minus *IDEM* p. 268.

(*s***) *RUTTY* p. 217.

(*t*) *GORN* n. 17. Etiam cogunt *RUTTY* p. 406.

sum abit (*u*). Clavis in vasis igni expositus (*x*) mucus recens aquæ partem maximam edit, ut omnino decima octava pars non aquæ sit. Olei habet centesimam quadragesimam partem (*x**), a quo, procul dubio, naturam viscidam habet. Salis volatilis sicci (*x***) inest nonagesima sexta pars, & tantumdem oleosi liquoris, qui salem dissolutum continet, & spiritus audit. Demum salis lixiviosi, in igne persistentis, particula est millesima quadringentesima quarta. Adeo parvus aut olei cum habeat, aut salis, adparet, quare neque lingue papillas emoveat, neque narium. Ea ipsa nota præter alias, etiam a lympha differt (*y*). Terræ aliquid inest (*y**). Adservatus, post integrum annum, haec tenus mutatur, ut acerrimum oleum, & salem volatilem fundat, de aspera arteria sumitus (*z*).

Etsi non ubique eademi natura niuci est, hoc tamen pertinet lubricus humor (*a*), quo tota aeris, ciborum, urinæque via late obungitur, in naribus, palato, lingue facie postrema, fauibus, bronchio, pulmone, œsophago, ventriculo, ductibus biliaris, intestinis, vesica urinaria, urethra utriusque sexus, utero, vagina muliebri. Eorum linimentorum siccissimum est, quod nares obsidet, inde sensim, ut ad interiora corporis receditur, ita fluidior generatur: pariterque a crustacea natura alienior in iis partibus reperitur, quæ lotium aut semen transmittunt.

Lubricus in primis piscium cutem obsidet (*b*), nam in homine unguen cutaneum alterius indolis est. Ad niuci naturam etiam succus funiculi umbilicalis accedit, & verior pars feminis, quæ a teste advenit, nisi quod ea quidem odoratis & volatileibus particulis abundat. Perinde tamen seorsum glutinis simile fila trahit, aque acido latice solvitur (*c*), a lixivioso sale potius cogitur (*d*). Anno 30 A. C. N. a SANHEDRIN facto exper-

Z z 2

perimento

(*u*) SENAC L. c.(*x*) BARCHUSEN post acroamata Exp. 7. Multum PINELLI de podagra p. 215.(*x**) Parcissimum PINELLI.(*x***) In scotobuticis habet ejus salis momentum sed minus PINELLI.(*y*) Ex sanguine & succis lymphaticis, secedente parte falina, fit mucus QUASSIAE, continu. T. II. p. 9.(*y**) PINELLI.(*z*) Comon. Acad. Petrop. L. c.(*a*) Conf. BOERHAAVE L. c. p. 9. seqq. ut tamen admistum passim sebum subcutaneum separas.(*b*) De eo unguine dicetur L. XII. Vide interim Comment. ad Boerb. præhd. T. III. p. 547.(*c*) GORN L. c. n. 26. MONROO de semine Et testib. p. 57.(*d*) GORN L. c. MONROO ibid. Piscium semen leutianum MONROO ibid. Idem a spiritu vini non cogitur, certe de cadavere, deque seminalibus vesiculis funatum,

rimento constitut, semen ab albumine hactenus differre, quod ad ignem dif-
fiuat, albumen cogatur (*d**). Ad mucum denique etiam referri po-
test, quod adhæreat, & in aquam facile se diffundat, nigrum illud pig-
menti genus, quo aversa uwei anuli facies in multis animalibus obducitur.

Utilitas manifesta muci lubricique humoris est, teneros, & acriter sen-
tientes nervulos tueri: quos siccii aeris vis, aut vehementior frictio;
aut asperi falsique humoris transitus ingratissimo sensu adficeret, nisi bene-
ficia muci vis intercederet. Qui urethrae mucum acri aliquo humore inje-
cto abraserunt, ii nimis experiuntur, quam intolerabile absque muco ip-
sius urinæ iter sit, quam ipsam sani homines absque incommodo emitunt.
Sed etiam in acutis morbis, aut acriori catharrho, per narres penitus sic-
cas, ingratissimus transeuntis aeris sensus est, neque blandius aut per e-
luta salibus purgantibus intestina, nudatamve muco vesicam, aut fæces al-
vi transeunt, aut lotium. Aspera arteria etiam cum muco ne aquam qui-
dem tolerat.

s. V. Et gelatinosi.

Horum quidem humorum naturam dudum exposuimus, quando lym-
pham descripsimus (*e*) sanguinisque serum. Omnibus ea communis natura
est, ut igne admoto, aut fervida adsusa, aut liquore, qui de vino stillat,
meraciore, aut acore demuni minerali, in floccos, grumos, geluque demum
cogantur. Idem humores, dum infra 148 gradum fahrenheitianum ca-
lent, fluidi sunt, minusque quam mucus se trahunt, neque multum aque
ipso hactenus meabili sua natura cedunt, eamdemque adservati, ad putre-
dinis initia foti, ita augent, ut nulla porro admisti liquoris acidii,
aut vinosi vi cogi se patientur (*f*). Plerisque blandus aut lenissime saltus
sapor est. Siccati in crustas abeunt gummicas (*g*), ut plus, quam mu-
cus, partium terrearum, plus etiam olei continere videantur.

Ad hanc classem pertinet ergo sanguinis serum, & lympha vasculorum val-
vuloforum (*h*), & ovi albumen (*i*), & humor qui pullum in ovo circumfluit,
&

(*d**) GUNZBURGER medic. Talmud. p. 22.

(*e*) L. V. Sect. III.

(*f*) p. 132. MALPIGH. de pull. incub. p. 12. de adultiori albumine.

(*g*) Albumen imprimis ovi BELLIN de motu cord. p. 27, 28. Pars acri proxima non concrevit, & ex portio quotidie augetur.

(*h*) p. 139.

(*i*) p. 130.

& amnii humani liquor, muci quidem similior, sed tamen coagulabilis, quando satis recens deprehenditur (*k*). Eadem natura est exhalantis laticis, qui, in vivo vegetoque animale, humidi vaporis specie, in caveas ventriculorum cerebri (*l*), pectoris (*m*), pericardii (*n*), & abdominis destillat, quem partim exposuimus, & partim suis locis uberior exponeamus. Huc etiam ovulorum Graafianorum liquor pertinet, & liquor glandularum renalium à meraciore vini spiritu coagulabilis, &, si purus haberit posset, propior futurus exhalanti liquor succus ventriculi (*o*), & intestinorum proprius (*p*). Sed etiam in minores cavernulas cellulosi textus halitus exit (*q*), qui collectus, etiam sponte, in gelatinam rubram consistit, qualis etiam in hydatidibus humor est. Huc denique crediderim referri, et si experimenta non habeo, viscidum illud gluten, quod **BELLINUS** (*r*), priorque **MALPIGHIUS** (*s*) in nervis medullaque spinali reperit.

Mixti etiam generis est, & alio magisque conspicuo modo ex oleo & glandulari humore conponitur (*u*) *unguen HAVERSIANUM*, quod late in caveis articularibus totius animati corporis, & in tendinum etiam vaginis (*x*) reperitur: differt tamen a lympha, quod sponte viscidissimum sit (*y*): non ideo mucosum, cum ab alcoholе adfuso in fila coeat, quod & ipse vidi, & olim *Josephus Guichard DUVERNEY* (*z*). Sed idem humor ad ignem coagulatur, etiam vitiose collectus (*a*): & cum minerali acore in albumen abit, porro insolubile, candidumque (*b*). A lixiviosis salibus solvi lego (*c*). Si in aliis periculis totum exhalavit,

Z z 3

tenuem-

(*k*) Nostris etiam in experimentis, in fila flocculosque abiit, ut lympha folet.

(*l*) Amnii liquor cogitur, non allantoidis *BARRATIUS de seru sang.* p. 137. *BELLINUS de mostu cord.* p. 34. edit. Pistoriens.

(*m*) L. II. p. 154. 155. & L. VIII. Sect. II.

(*n*) L. IV. p. 283. 284.

(*o*) *COLLINS System. Anat.* p. 323.

(*p*) *PSCHELIN de purgantib.* p. 511. *BRUNNEXXER de duodenis* p. 54.

(*q*) L. L. p. 21. 26.

(*r*) *Lemmunt. qua ad nervos pertinent.*

(*s*) *Posthum.* p. 39.

(*t*) *CLOPTON HAVERS* *ostholog. nov. discoursus* IV. p. 189. 208. 209.

(*u*) *SCHLICHTING* *Epb. Nat. cur.* vol. VIII. obs. 27.

(*v*) *Traité sur les maladies des os* T. II p. 350.

(*w*) *In hydrope articuli genu* *SCHLICHTING* L. c. *Cogi DUVERNEY* p. 339.

(*b*) *CLOPTON HAVERS* L. c. p. 217. 218. *DUVERNEY* L. c. *TEICHMAYER* *Patholog.* p. 284. *Acad. Scient. Bonon.* *Comment.* T. I. p. 148 *DALE-INGRAM* *of the gout* p. 46.

(*c*) *DUVERNEY* L. c. *TACCONUS* L. c. Sed in *Comment.* Bonon. cogi scriptit.

tenuemque crustam reliquam fecit. (*d*), id quidem violentiae conceptæ putredinis tribuero. Hic idem est mucosus & lubricus circa nervos humor ARISTOTELI dictus (*e*), cui nervi audiunt, que nobis ligamenta sunt. In tibis dearticulatione idem CAROLO STEPHANO (*f*) dictus est, & PETRO PAW (*g*), qui monuit, genu immobile factum esse, cum a chirurgo emissus humor perisset, qui pro pure habuerat.

Oleum admixtum habet, & ex ossium cavae per cartilagines penetrabile (*h*), & evidenter aliud, ex pinguis glebis, que in dearticulationibus, pariter ut glandulae reperiuntur (*i*), & in genu potissimum. Fluida autem, dum vivimus, & calemus, & meabilis pinguitudinis natura est (*k*). Sed neque adeo longe a lymphatica classe oportebit removisse, nam magis atque magis discimus, lymphatica valvulosa vascula humores in tecum cellulosam effusos, adeoque oleum resumere (*l*).

S. VI. *Humores oleosi.*

Quarta tribus eorum humorum est, qui perfecti & maturi, aque aliquæ superflua aquæ portione liberati, ad ignem flemmam concipiunt: aut certe nautum ejusmodi materiei continent, que ad ignem incendatur, & deflagret. Maturos aio, quod omnes ejusmodi humores, ne oleo quidem excepto, in prima origine sua (*m*) plurima aquæ copia constent, neque haec tenus aut inflammantur, aut plenam pinguitudinis indelem imitantur, mucique potius aut gelatinæ similes sint, uti de plantarum pinguitudine monui. Ad hanc adeo inflammabilium liquorum classem princeps adeps pertinet, & medulla ossium, quibus plurimum pinguis naturæ inest, & aquæ minus. Sed eos liquores descripsimus (*n*). Deinde hoc referri debet sebaceum unguen variæ generis, cutaneum, album, oleosum & lubricum

(*d*) HAVERS p. 263. MONROE *of the bones* p. 57. Ed. ult. DUVERNEY *tr. des maladies des os* p. 358. PITSCHER *de axoniga articulor.* p. 27.

(*e*) Hist. Animal. L. III. c. 4.

(*f*) *De diffid. part. corp. hum.* L. I. c. 22. 25.

(*g*) *Primit. Anatom.* p. 175.

(*h*) L. L p. 48.

(*i*) Habet etiam WALTHERUS in *tr. de artic.* & *lig. ped.*

(*k*) L. I. p. 28.

(*l*) L. II. p. 167. Hac porro per ea confirmantur, que ex MASKILLII III. viri epistola, & Alexandri MONROE in addendis retulimus.

(*m*) L. I. p. p. 26. 26.

(*n*) L. I. Sect. IV.

cum dunt recens est, sponte in crassioris axungiae, albi lutii, siccarumque demum non raro lemorum naturam abiturum (o). Etsi enim de oculorum, cutisque sebo, & præputii, nympharumque oido linimento experimenta non habeo, certum est tamen, cognatae naturæ cerumen (p) siccatum deflagrare, deinde zibethicum odoramentum flammatum concipere (q), & castoreum (r), quod pilorum perinde specie de suis folliculis exprefsum prodit.

Deinde non longissime a cerumine bilis distat, cujus quidem multa pars aquæ est, ut tamen & abacta aqua sapa bilis (s), inflammetur, & calculi (t) vesicæ felleæ, ex spissata bile nati. Huc porro sanguinis crux (u), huc ipsum lac pertinet, efü mista in lacte natura est. Nam alias experimenta mea enarrabo, quibus non intra glandulam ductus mammae lactiferos substituisse, constituit, sed in circumpositum utique adipem propagari, ut perinde oleum resumant, ac lymphatica vasa solent. Deinde de lacti notissima pars butyracæ vere oleosa inest. Lactis autem in homine non unus locus est, speciesve eadem. Nam præter lac mammarium utriusque sexus, simillimus albissimusque humor in utero reperitur, tenerrisque in virgunculis, etiam nondum natis, caveam tenerimi visceris replet. Sed etiam in thymo serosum lac, & in prostatis reperitur, lymphæ haec tenus ad fine utrumque, quod in eo fila ex adfuso vini meraco spiritu nascantur.

Obiter huic classi materiem electricam subjecero, quæ & ignæ naturæ particeps sit, & plurima in corporibus flammatum alentibus habitet, & de animalibus odora exeat, atque adeo in oleo habitet, cui demum foli odor insit, isque in primis odor, quem flamula electrica spargit.

S. VII. Humores miscellanei.

Eorum humorum, quos haec tenus recensui, multi huc potius pertinent, cum sincerum, unicunque elementum in eorum nullo sit. Deinde eorum multi

(o) De sebo auriculæ, umbilici, nasi, partium pudendarum hæc vera sunt BOERNHAUER de fabric. glandul. p. g. II. II.

(p) BOERNHAUER l. c. p. g.

(q) Mem. de l'Acad. Roy. des Sciences 1728. p. 409.

(r) Mem. pour servir à l'hist. des anim. T. III. P. I. p. 144.

(s) Conf. PRÆLECTR. BOERN. T. I. p. 441. & Cl. SARRAZIN in Mem. de l'Acad.

(t) Opuscul. patholog. obs. 33.

multi evidenter ex non uno humore constant, prius suo peculiari loco secreto, quos serius natura miscuit, postquam puros generavit. Ita semen masculinum ex odore testium muco, & lacte prostatico componitur. Ita in sudore oleum subcutaneum, sebumque follicularum, cum aqua perspirabili miscetur. Sed etiam lacruma & aquana & sebum; unguen articulare, ut nuper monui, oleum & lympham; lac mammarum glandulosam lympham, & adipem subcutaneum; sputum salivam mucumque continent, & in chylo denum plerique corporis animalis humores committi habentur, aquei, mucosi, lymphatici, oleosi. Ne tamen subtiles simus, cuique humoris a praecipuo suo elemento nomen classicum imposuisse sufficerit.

In aliis animalibus alterius generis suis in vasis humores dantur, quorum nihil in homine satis simile reperitur. Eo referto argenteum liquorem vasorum anguille aliorumque piscium; atramentum sepiae; venenum apis.

S. VIII. Hi humores in sanguine pene perfecti continentur.

Quos hactenus enarravimus humores, eos aut perfectos, aut parvæ omnino indigentes mutationis, in sanguine reperimus (*x*), hactenus a singulari partium singularium humoribus diversos, quod nimia aquæ copia dilutæ molecule tum denum se possint comprehendere, inque purum eum humorem coire, quando ab ea nimia aqua liberatæ sunt (*y*). Aqua, mucosus viscor (*z*), lymphæ coagulabilis, adeps verus (*a*), chylus lactis simillimus (*b*), sanguini insunt. Oleum (*c*), salisque urinosi elementum (*d*), que bilis naturam constituant, in communis humorum massa abundant. Si nondum perfectum in sanguine semen (*e*) est, ineft tamen & mucus, & fetidum illud volatile odoramentum, quo animalium non castratorum caro, & universum corpus inficitur (*e**).

S. IX.

(*x*) L. V. p. 107.

(*x*) Conf. etiam similia obseruantes J. CL. Adriani HELLVITIUM mem. anim. p. 156. BURCHART de secret. FLURANT splanchnol. p. 314. HOOKS &c.

(*y*) J. de GOKTER de secret. anim. I. n. 20. 35. II. n. 43. &c.

(*z*) L. V. p. 133. 134.

(*a*) L. I. p. 38.

(*b*) L. V. p. 14. 15.

(*c*) In sanguine apparuisse & MALPIGNUS auctor est, de omento p. 255. & R. W. SCHIUS Alders. II. p. 28.

(*d*) L. V. p. 72. &c.

(*e*) KETZ abridgement p. 65. SCHWENKE I. c. p. 73.

(*e**) HUNAUDE des vapeurs p. 289. 290. &c.

S. IX. Fere quilibet humor per quocunque colum separari potest.

Sed etiam hec adnotatio magna parte laboris non levat, nimiumque mysterii metum dissipat, qua consistat, fere omnes humores humanos adeo jam sua cum definita indole perfectos per sanguinem circumire, ut suo proprio colo minime egeant, perque alienissimas saepe glandulas, aut maxime varia viscera de sanguine secesserint, & nihil a se ipsis diversi visi sint, dummodo aut proprius cuique excretorius ductus obstrutus sit, aut aliquin is humor in sanguine abundaverit. Ergo non adeo, ut passim creditur, necessaria cujuslibet coli peculiaris fabrica est, ut humor ei colo proprius non aliter nasci possit. Notissimum est dudum, aliam excretionem ab alia compensari (*f*). Præstat ire per singula, cum hoc ipsum, ab ipsa natura suppeditatum, experimentum maximi momenti sit.

Inter humores aquosos observavit **HIPPONCRATES**, perspirabilem materiam ad alvum converti, & vicissim, quando pronunciavat (*g*), siccam alvum iis esse, quibus cutis molles est. Nempe vulgatissimum quidem est, cute a frigore percussa, exutis vestibus, pene oculi istu citius urinæ ad exitum adfectantis stimulum percipi, lotumque exire. Nunquam manus lavabat **Michael le VAYER**, quin micturaret. In hysteris & hypochondriacis hominibus, frequentissimum est, siccata cum cute, frigidaque, nimium, & vires frangentem urinæ effluxum conjungi. Ad nares repercussa perspiratio notissimam stillam hibernam facit (*g**).

Sed etiam alvum repressa perspiratione moveri (*g***) constat, sive a metu constituta fuerit, sive a primo autumnali frigore, sive frido pavimento pedes intuleris (*h*), quo remedio ad liberandam alvum dudum cessantem vix aliud potentius est (*h**). Aliquanto rarius, non ignotum tamen etiam veteribus auxilium est, quo hydrops sanatur, dum universa cutis pice accurate obducitur, ut repercussa perspiratio in diuresin convertatur (*i*).

Sed etiam ad salivæ vias humor perspirabilis migrat, quando pedum refrigerium (*k*), aliave causa sudorem (*l*) suppressit, aut aliquin copior

(*f*) **ROBINSON** *Essay on animal economy* p. 417. 438. **RUSSELL** *con. natur.*

(*g*) **Epidem.** L. VI Perspirationis & sudoris cæteræ excretiones vicariz. **BOUVARD** *in shif. a. 1737. ed.* Diarrœa minuit perspirationem **ROBINSON** *dijcharg.* p. 80.

(*g**) **KAAUW** *p. r. p. n.* 28.

(*g***) In Barbados ex repercussa transpiratione hydrops **HUGONET** *bijl. nat.* p. 35.

(*h*) **INNES** *de Ilio* p. 35.

(*h**) **STEVENS** *Essays of Edinb.* T. V. p. 895.

(*i*) **REAUMUR** *mem. pour servir à l'histoire des insectes* T. II. p. 54.

(*k*) **BREWER** *Sandwich* 1715 p. 727.

(*l*) **BUNINGER** *l. l.* *o. 16. 10.*

Haller Physiolog. Tom. II.

osior sputi effluxus , materiem perspirabilem avertit (m).

Vicissim , ut ad intestina perspirabile id aberrat , quod per cutem exhalavit , ita in cutem transit , quod per intestina exsudabat . Sudor enim motus , corporisque vehemens exercitatio diarrhoeas supprimit (n). Sed etiam urinam alvum fluxam minuit (o). Eadem diabeten exceptit (p). In cholera biduo urina subpressa fuit (q).

Porro saliva , cuius flumen argentum vivum præcipitat , aut ad intestina convertitur (r) , aut per fætidas urinas descendit (s). Quam vero salivationem salutare naturæ consilium in secunda febre variolarum expedit ; eam salubriter tumor faeciei munuumque aquosus supplet , exkalatio nempe in cellulofam telam.

Celebriores sunt magisque variae urinæ aberrations , quæ unicum existunt nocta , facilius supprimatur. Vix ullus humor est , cuius viam lotium , suo ab itinere aversum , non adfectasse visum sit , adeo suis dotibus conspicuum , ut non sincerius ab urethra profluoat. Et primo ligatis ureteribus , saliva viscida copia profluit (t) , arteriisque renalibus revinctis vomitus urinosus (u) succedit , in cane utrinque.

Deinde , quando per morbum quemicunque urinæ secretio & exitus impediuntur , exit urina per alvum , sudorem , mammas , salivam , & cellulofam telam. Puer , qui intra 17 dies urinam non reddiderat , perpetua interim diarrhoea fuit (x). In ischuria vera per alvum urina decessit , quæ odore suo & tenuitate se proderet (y). In eodem morbo lotium per alvum felicem exitum reperit (z). Cum duodecimo die suppressæ urinæ jam gravis lethargus ingrueret , urina multa per alvum cum levamine egesta est (a). Et alioquin diarrhoea minuit lotii copiam (a*).

Eadem ,

(m) Salivatione precedente alvus dura , urina pauca , secretiones omnes pariores succedunt *Grainger de physalism.* p. 17.

(n) *Conf. Robinson L.C.*

(o) *Ibidem ibid.*

(p) *Binnixius Centur. V. obs. 70.*

(q) *La Mettrie obs. de medec. prat. p. 5.*

(r) *Tulpi. L. III. bifi. 21. &c.*

(s) *Eph. Nat. Chr. vol. VIII. obs. 8. La Mettrie opus. prat. p. 24. J. D. SCHUTTINGA apud. Menephius critic. p. 246.*

(t) *Nuck defens. dudi. aqueos. p. 10.*

(u) *HELVET. mons. ann. p. 156.*

(x) *Philoj. Trans. n. 137.*

(y) *Peculiar obs. XI. L. I.*

(z) *RHODIUS obs. 90. Cent. II. Conf. etiam 84.*

(a) *GEORNEVELT de tuto causbaridum risis p. 171. 172.*

(a*) *Robinson discharg. p. 30.*

Eadem, quæ per alvum, urinæ via etiam ad ventriculum dicit. Celebris olim Chirurgus LANFRANCUS ipse, cum calculo laboraret, lotium vomuit (b). LAWERIA illa, olim per suum morbum notissima, aliquoties urinam vomitu reddidit (c). Aquosus in ischuria vomitus (d). In femina, cui vulnus naturam clauserat, lotium per os regurgitavit (e). Die decimo suppressa urina suo conspicuo sapore per os egesta est (f). Clausa urethra vomitus aquosus urinæ similis successit (g).

Cum urina suas per vias non posset effluere, salivæ loco fætidissima urina redditæ est, faulto quidem eventu (h). Sputa & mictus alterne se excepserunt, & diabetes demum sputum destruxit (i).

In naribus urina se convertit, raro in exemplo, cum in paralyssi vesica officio non fungeretur: arenosæ enim glebulæ naribus adhæserunt (k).

In cerebri ventriculis, post symptomata affecti encephali, aqua urinæ factore viciose reperta est (l).

Per mammas, lotium virgo reddidit, quæ absque natura alvive officiata, pubertatis tamen tempus adtigerat (m).

In cellulose telæ cavernulas lotium decepsit in exemplo, in quo œdema urinofum ischuria supervenit (n).

Frequenter per sudoris vias aversus a sua sede obsecens liquor exilit. Transpiratio fætida in urinæ suppressione (o). Sudor flavus, cum aquoso vomitu conjunctus in eodem malo, ARETÆO jam dictus est (p). Cum urina a calculo suppressa esset, sudor urinosus (q). Per cutis poros ab axillis ad inguina urina prodiit (r). Quæ undecim septimanis lotium nullum reddidit, ei per totam cutem capitis suppressus humor exsudavit, eaque

A a a 2

deumini

(b) In chirurg. p. 223. b collect. Venet.

(c) Steffmund. KOENIG lithogenes humanæ spec. p. 25.

(d) AXETRUS de caus. &c figur. acut. L. II. c. 10.

(e) Theobaldus FITZTECH ad HORSTIUM hys. med. p. 508.

(f) VALISNERI observ. rar. in oper. omni. T. III. p. 318.

(g) SCHURIG Gyneolog. n. 145. Alia ejusdem sensu exempla passim reperias auct. THUMMIG Erklärung. P. III. C STALTART vander WIEL Center. l. obf. 51. MARANGONI in Hist. de l'Acad. R. des Sciences 1715. obf. 3.

(h) WALLER. in act. Societ. Lit Uppsal. 1737.

(i) CAMERARI de mali period.

(k) Eph. Nat. Cur. vol VII. obf. 105.

(l) Praedl. Boerbaao. T. III. p. 215.

(m) Journ. de Medecine 1748. M. febr.

(n) RAULIN obf. de medec. p. 333. 200.

(o) IDEM iijid.

(p) l. c.

(q) SALMUTH L. II. obf. 82. BOERBAAVS L. C. p. 316.

(r) Eph. Nat. Cur. Dec. II. ann. 10. obf. 73.

deum ejēctis calculis convaluit (s). Femina, quæ totis 20 mensibus utinam non reddidit, obīcōno odore & indolum totumque cubiculum replevit (t).

Omnino monere oportet, hanc, adeo varias per vias, expulsam urinam ejusmodi fuisse, quæ cum sanguine nondum in renibus secreta circunivit. In ejusmodi enim malis, paucissima & crassissima urina in vesica urinaria reperitur, de qua si aquulam resorberi ponas, non tamen ejusmodi copia resorberi fateberis, quæ ad diarrhoeam & ad salivationem sufficeret. Sed etiam corruptis cum renibus & obstructis, ut in exemplis ostendimus, ureteribus, cum nihil ad vesicam veniret, tamen urinosa natura alieno loco apparuit. Cum renum fabrica destruēta esset, urina tamen per superstites papillas sanæ similis deceſſit (u).

In mucosa classe similes humorum conversiones fiunt. Muci enim loco aqua pura frequentissime aut per nares in coryza, aut per pulmones in convulsiva tussi excernitur. Vicissim, si mucosæ organa majori aliquo stimulo sollicitaveris, pro muco eadem lympham flavam, etiam languinolentiam excernet, ut in urethra vidi, quæ acrior aliquo liquore injecto irritabatur, & in narium calidiori catharro. Sed etiam intestinorum mucus in alvi fluxu aquosus prodit.

Ex classe coagulabili alias ostendimus (x), nullum alicujus in animali corpore liquoris colum esse, quod sanguinem aliquando non transmiserit, etiam per integra organa, facile ad legitimam munus redditura. Lymphæ per cutis poros pro perspirabili sanctoriano in ambustis, in vesicis ab acri veneno excitatis excernitur; eadem in locum lactis uterini, post partum succedit per plures dies & effluit, & in cellulas adiposas (y), medullæque (z) cavernulas; & per pulmones, vaporis vias secuta exscreatur, & quæ alia hujus generis frequenter alias repetentur.

Ex oleosa classe ostendimus, in cellulosam subcutaneam telam pro adipite aquam effundi (a): & vicissim oleum per aquosos mucosos intestinorum villos egestum (b) per alvum descendere, aut vaporis modo exhalare.

(s) S. L. M. D. tom. urin. p. 148.

(t) ZEVIANI del flato ipocbondriaco p. 157.

(u) TABARRAN obs. p. 15. ed. sec.

(x) L. II. p. 118. L. L p. 37. &c.

(y) L. I. p. 44.

(z) In rachitide.

(a) L. L p. 44.

(b) p. 43.

exhalare (*c*) , aut cum lotio egeri (*d*). Pus , de olei genere ; certa per exempla de pulmone resorbtum per urinæ vias exiit (*e*). Per refecta vascula cutanea , in vulneribus primis diebus tenue serum destillat , deinde sexto d.e. , & qui sequuntur , crudus & dissolutus adeps , & denique pus (*f*). Bilis , vulgatissimo experimento , quoties ab intestinis avertitur , in oculos (*g*) , in urinam , in salivam (*h*) denique transit. Lac de mammis reper-
cussum , per diabeten alias exit (*i*) , frequenter per albam diarrhoeam (*k*) , aliquando per vasa salivalia (*k**) : alias vaporis locum tenuit , in-
que abdominis caveam (*l*) suas per dotes notum , exhalavit , & intestina
oblinivit. Sed etiam per femoris pustulas (*m*) , perque vulvæ labia verè
lactis specie exfudavit. Lac lochiale (*n*) , suo cremore conspicuum , per
alvum effluxit. Vitiosum denique laxi uteri lac , quod albi fluoris nomine
venit , & per pulmones tassis (*o*) specie , & per pedis sudorem (*p*) ita
evacuatum est ut alterne veriori succo locum redderet. Magis paradoxa
omito , ut calculosæ materiei a renibus ad dentes revolutionem (*q*) &
a curata podagra faccum aortæ adhaerentem , quem tophacea materies re-
plebat.

Quando haec exempla repetemus , constabit , non ejusdem unice clas-
sis diversos humores sua inter se colla commutare , sed etiam per muci or-
gana aquam , per muci , aquæ & adipis colla lympham & sanguinem , per
aque , muci , & lymphæ vias adipem , bilem , sanguinemque secerni , at-
que adeo omnino , nullum in animato corpore separatorium orgaum esse ,
quod non omnium classium humores suis cum dotibus secernere queat.

Liceat artis conatus cum naturæ moliminiibus conjunxisse. Etiam ana-
A a a 3 to m i c i

(*c*) p. 43.

(*d*) *Prædict. Boerb.* T. III. p. 219. *Oleum amygdalarum per urinam redditum Ma-*
uerel Off sur le pouls p. 61.

(*e*) *VREUSSENS obser. d'anat. & de prædicta* p. 321.

(*f*) *BAGÉE de amputat.* p. 405.

(*g*) *LANGIS. dif. Epist. III. de secret.*

(*h*) *Saliva icterici crocea Ill. VASCARENCKI medic. ration.* p. 241.

(*i*) *C. STALPART vander WIEL Centur.* II. obf. 38.

(*k*) *J. M. HOFMANN disquisit. Anat. patol.* p. 161. *SMEILLIE midwifry* p. 410.

(*k**) *Ex DOLARIO.*

(*l*) *Mémoir. de l'Acad. Roy. des Scienc.* 1746. p. 162.

(*m*) *Journ. des Savans* 1684.

(*n*) *Jul. UFRAT obf. de prædicta* n. 28.

(*o*) *P-odrom. All. Med' bairiens'* ad fin.

(*p*) *Eph. Nat. Cur.* vol. 8. obf. 38.

(*q*) *BROUZE Educas. medic. des enfant* T. I. p. 180.

tomici manus facile obtinet, ut oleum, adepsque calidus per omnia aqua destinata colla, & per gelatinosum vaporis, & muco denum apta vascula exeat: nam in cellulosa tela, renales tubulos, lymphaticarum glandularum interiorum fabricant, lacteaque vasa oleum terebinthinae expedite transit. Vicissim gluten de pisco fusco coctum, quod gelatinosum indolis est, in vias adipis, urinæ, mæci, etiam faciliter exit. De aqua non dubium est, quin per omnia, omnium humorum colla, absque labore viam sibi aperiat. Sed etiam argentum vitrum penetrabili vi sua pecus aquæ humoris vascula, perque vulnuscula exigua a phenigmine excitata effundit (*r*). Ita, ut utilem observationem repetam, in plantis per eadom vascula aqua primo, deinde gelatinosus mucus, porro lac aut terebinthina fluit. Iterum adparet, nullam adeo ineluctabilem necessitatem esse, quæ ad suum unice colum suum humorem revinciat.

SECTIO II.

*Organorum secretionis, sive colorum fabrica.**S. I. Aquosus humor secernitur per vascula arteriis continuata.*

Quibus in colis, & qua cum fabrica, quisque humor de sanguine secedat, est ut inquiramus. Aquosus ergo humores, quorunq; simplicior natura est, non uno modo separantur. Multis omnino corporis animati locis vascula simplicissima, uninora tomen, tubris arteriis continuata, ejusmodi aquam de sanguine destinatam ad sedem ducunt. Ita perpirabile illud, tum **S A C T Q R L A N U M**, tum de pulmone halans alterum, certe de arteriis rubris, facili & continua via exit. Nam aqua colore aliquo tincta (*s*), aut gluten piscium, aut oleum etiam terebinthinae, tenebris corpusculi arteriis injectum, in meis periculis, inque nonnullis felicioribus exemplis, ipsum foliis sedem (*t*) perpetuis guttulis de cute fudat, de qua epidermidem tepida in aqua removimus, quo exemplo non aliud naturam magis minus imitatur. In pulmone perinde, aquam cæruleo

(*r*) *Purpur. 1755. Suppl.*

(*s*) *Comment. ac Præl. Boerh. T. III. p. 540.*

(*t*) *Ibid. ex RUTICELLI experimento & ALBINI.*

ruleo colore tinctam, perque cavam venam in praecipiūm ejus visceris arteriam impulsam, cum plurima spuma de aspera arteria rediisse, sepe vidi (u). Sed etiam in rene colla arteriis continua aquam, aerem, serum, in papillarum poros pelvique ureteris ducunt (x). Aqueum humorem de arteriis porinde exhalare, olei terebinthinae (y) aliquorū pīgnentorum, & vivi argenti iter persuadet, quod anatomica manu impulsū, aut omnino vivo in homine a consuetis nature viribus eo deduc-
tum, in ejus humoris, quem vocant, cameram deploit. Ita etiam lacrumae de toto oculo, & interiore palpebrarum facie trahant, iter aqua injecta exprimit, quae de his, quas nominavi partibus plurima exsudat (a). Neque aut vitrei corporis, aut crystalline lenti, purissimus humor, aut cornēe membranæ aquula alla via, aut per glandularum ambages, de arteriis sua ad loca decedit.

S. II. Per glandulas. Earum fabrica.

Diversum aliis in corporis regionibus naturae artificium est. Plurimi enim humores aquosi per vivi hominis glandulas utique percolantur, sicut
exemplo, lacrumæ glandulose, pancreatici succi.

Eae glandulae, que aquam transmittunt, proprium genus constituant. Laxas glandulas, in quas vasa sanguinea se inmittant, MARINUS (b) di-
xit, ut a densis aliis glandulis, ad vasorum divisionem positis, distinguere-
ret. Paulo propius GALENUS (c) a glandulis vasorum divisioni subje-
ctis, aliud genus secrevit, quod pituitosum aliquid generaret, & exempla in larynge dedit, in fauces, inque mesenterio. Demum Franciscus Syl-
vius de lo Boe (d) a congregatis, lymphatico humoris destinatis glandulis,
has ex acinis quasi in glomerem conjunctis compositas glandulas separavit, dixitque conglomeratas, & id quidem nomen retinuerunt.

Ergo ejus quidem generis glandulae paullim congregatarum, quas descri-
psumus

(a) In eod. opere T. III. p. 208. 209.

(x) Ibid. T. III. p. 212. 213. conf. hujus operis L. I. p. 99.

(y) T. IV. p. 178.

(z) WOOLHOUSE in collectione opusculorum de cataracta Fransfurensi p. 52.

(a) Prost. T. IV. p. 96.

(b) Apud. G. a. z. non modo, sive in L. II.

(c) Ibid. & in libro mensurali L. XIV.

(d) Disput. med. V. Quae de ciliis pulvinis & fibulis. Examen. s. E. de glossoptis artic. 40.
9. de glandulis & mucul. p. 32. Regulus de Glandulis de genitibus p. 40.

plumus (*e*), magnitudinem superant, non eadem aut simplices, aut fibi continuæ, sed ex lobulis compositæ, quos laxior cellulosa tela revincit, & per quorum intervalla vasa sanguinea nervique repunt. Eos lobos aqua per arterias injecta ita laxat, ut facilius videoas iterato ex minoribus lobulis constare, inter quos minora vascula intercedunt, donec repetita divisione, ad minimos, oculo tamen conspicuos, acinos perventum sit, firmiores perpetuo, uti minores sunt, quia eorum particulae breviori cellulosa tela distinguuntur, firmiusque ab ea revinciuntur, quam quidem cum majoribus lobulis coherent. Cæterum in universum rotundi, pallidi fere acini sunt, & absque rectarum fibrarum confortio, qua nota a carne manifesto distinguuntur. Si eos acinos lente vitrea, deinde acrius augente convexiori sphærula contemplatus fueris, reperies, a lineolis cellulosis iterum in minores acinos dividi, quos brevior semper cellulosis textus conjungit, neque finem invenies divisionis, albidaque semper natura supererit, quam cellulose & vasculosæ lineæ interstingunt. Ea cellulosa tela, inter minimos acinos brevis (*f*) & densa, inter majores sensim laxior & longior, multaque subinde pinguitudine, demum in extrema facie glandulæ longiores, rectioresque in fibras stipatur, non absque splendore, quæ lobulos colligunt, dilapsuros ab invicem, si eas fibras resecueris. In parotide & glandula maxillari evidentissime fraudi fuerunt Cl. viris, ut glandulis capsulas (*g*) & musculosas demum vaginas tribuerent. Nihil enim quidquam ulla harum glandularum musculosi habuit. Ut vero varia cellulose telæ ad acinos ratio, longitudo & laxitas est, ita aliae glandulæ aut laxiores sunt, aut firmiores vicissim: firmissima mammae glandula, & parotis, mollis thyreoidæ glandula, thymus molissimus. Lobulorum etiam magnitudo alia est in aliis, minima in renalibus capsulis, magna in mamma, inque maxillari salivæ dicata glandula. Lobulorum ita obscurum vestigium est in prostata, ut conglomeratis vix accensere possit.

Firmitas sensim aucta cellulose telæ facit, ut, perinde uti conglobatae, ita conglomeratae aliquæ, & princeps thymus, cum adultiori ætate diminuantur, pueris in universum, minoribusque animalibus maximæ.

Arteriae non paucæ conglomerati generis glandulas adeunt, densiores,

(*e*) L. II. Sect. III.

(*f*) Eam brevem telam *gluten* dixit *LOSSIUS*, quod extus *vasa* adhæreat, sitque pars gelatinæ sanguinis, de glandul. D. 9. 13. 31. Pio vasculis minorum generum describit *LOSSIUS* de salivis. p. 16. Fibras vocabat *GAEWIUS* *Cosmolog. Sacr.* p. 20.

(*g*) *WALTERUS* de lingua *brownana* p. 6.

res (*h*), quam ad carnes ire solent, uti in universum arteriæ secretoris organis destitue firmitate superant, tum majores, tum pariter minimæ (*i*), & ipsa demum cum suis ramis portarum vena (*k*), quæ bili separandæ destinatur. In universum etiam arteriæ colis humorum majores (*l*) dñe sunt: at glandulas tamē conglomeratas ubique multi potius, quam magni tranculi veniunt, ut ad salivales glandulas, pancreas, thymum, capsulas renales. Thyeoidea glandula & multas arterias habet & supra fidem, in primis in puer, magnas (*m*). Numerosissimi ceterum arteriarum surculi lobulos & acinos distinguunt, ut petiolorum similes eorum quasi racemos suspensos tercent, quando in tepida nexus lobulorum emollitus fuit. Venas vicissim, quam aibi & pauciores, & laxiores, & grandiores (*n*) secretoria organa acceperunt.

De nervis ita tenendum est, ut per plusculas glandulas multi, magnique transeant, per salivale in primis genus & lacrumale. Inde forte factum fuerit, ut plerique physiologi (*o*) & multos & grandes glandularum nervos esse scripserint. Verum levi omnino studio percipiet, quicunque verum unice sectatur, eos grandes nervos non morari in his glandulis, sed ad alias partes abire, ut in salivalibus omnibus, & in lacrimali glandula certum exemplum est. In ipsa glandularum carne parum manet nervorum, & sunt quæ paucos & exiguos habeant, ut thyeoidea glandula, sunt quæ nullos, certe scalpello persequendos, ut thymus, cui non dixero nullos esse, sed ea mole esse negavero, quæ aut cultello facile persequi permittat, aut ullo modo cum nervis muscularorum cutisve comparari possit. Universæ glandulæ experiendi minime irritabiles videntur (*p*), neque vehementer aut morbos sentiunt, aut illatas a prosectori injurias (*q*).

§. II.

(*b*) WINTREBINGHAM experimental. inquiry p. 210.

(*i*) p. 212.

(*k*) p. 210.

(*l*) Majores in glandulis esse LISTER de humorib. c 20.

(*m*) Fascicul. Anat. Ars. thy. sup. not. d Arteria thyeoidea inferior subclaviam & vertebralem in puer æquit aut superat. Sed etiam glandula, cui prospicit, in puer per magna est. L. IX. Sect. I.

(*n*) p. 212.

(*o*) GUIL. COLE p. 158. BOERHAAVE Præd. Acad. T. VII p. 59c. Theophilius de BORDU rechrebet sur les glandes p. 352. Franciscus LAMURE p. 23. qui triplu plures ad parotidem, quam ad renem ire, addit p. 24. Carolus MALOUIN des corps solides & fluides p. 63.

(*p*) In Mémoir. sur les part. sensibl. Se irrit. p. 59. Experimenta nulla recenti, sed tacta a scalpello & irritate non constringuntur, & nunc video Cl. ANDREÆ omniaco per experimenta sua naturam irritabilem glandulis negare de irritabilit. p. 16.

(*q*) Ibid. p. 19.

Haller Physiolog. Tom. II.

B b b

§. III. *Ductus glandulæ excretorius.*

Pleraque glandulæ conglomeratae generis ductum excretorium emitunt, aliquæ etiam plusculos, ut lacrimalis glandula, & sublingualis. Si aliquæ sunt, quæ conspicuo ejusmodi ductu destituantur, non oportet desperare, quin aliquando detegatur, ut quidem in thyreoidea glandula plurimum laboratum est. *Ductus excretorius* canalis genus est, venæ hastenus æmulum, cujus radiculæ minimæ, neque nudo oculo conspicuæ, ex acinis perinde minutissimæ exeunt, rivorumque similes, qui in fluvium confluent, in majorem alveum se inmittunt, qui porro cum sui similibus conjunctus, sensim, secundum consuetam omnium vasorum legem, in majores trunculos uniuntur, suis ramis conjunctis minores, donec receptis omnibus, quos omnes totius glandulæ acini emittebant, ramulis, præcipiuus nunc canalis cylindricus fere de glandula sua excitat, humoremque suum demum aperto osculo, constricto plerumque, & aliquantum reliquo ductu angustiori, in ampliorem aliquam caveam emitat, ut in oris internam faciem, aut intestini, aut demum omnino de corporis cutisque superficie eliminet, ut in lacrimalibus, boum certe, oviumque ductibus, & per rupera experimenta, etiam humanis.

His ductibus membrana ex cellulosa stipata tela data est, quæ tenacem firmitatem, ut vena habet, non perinde tamen in omnibus dilatationi resistit. Exterius cellulosa tela, siue pulchre vasculosa, circumponitur, vere membranæ innata. Interior ductus excretorii membrana cum velamento ejus caveæ continuatur, in quam quisque ductus suum humorum effundit, palpebræ neimpe internam membranulam, intestinive, aut oris. Dux adeo possunt in quoque ductu tunicae cogitari, et si non norma arte anatomica duas separatas fuisse.

In his porro excretoriis ductibus aliis a sanguine liquor continetur. Eum quin ab arteriis habeant, non dubium est: non tamen adeo facile est, experimento conjunctionem arteriolarum minimarum cum nascentibus ductibus demonstrare. Quæ VIEUSSENS vidit (r), ego quidem ad cellulosam unice fabricam pertinere persuadeor. Neque enim quisquam, ultima convexissimæ lenti potentia adjutus, ex minima arteriola alterius generis canalem nasci vidit, ut alias monui (s), qui

(r) VIEUSSENS de strucl. vise, p. 60. des Figures p. 129 &c.

(s) L. II. p. 98.

qui vere cavus foret, & tenuius liquidum contineret. Quare fere ad injectiones anatomicas, morbosque oportet configisse, ut alias monui. Injecti quidem liquores in glandulis conglomeratis difficulter ex arteriis in ductum excretorium transeunt, & si tenuiores fuerint, facile in cellulosa telam se diffundunt, aliqua tamen exempla felicia excitavi (t).

§. IV. *Fabrica ultima acinorum, an glandulosa.*

Hucusque quidem experimento progressum est. Sed multum supererat, quod physiologi inviti ignorantia, fabrica nempe hujus acini, qui ultimum oculi conspicuum elementum glandule constituit. Duæ fere ſēcē fuerunt, quæ eorum acinorum ultima ie perfexisse putarunt, & contraria docuerunt. Prior quidem *MALPIGHIIUS* ab anno retro 1665. qui de *ſtruclura viſcerum exercitationes* edidit, Europæ fere toti persuasit, acinorum eam fabricam esse, quæ folliculi five glandulae simplicis muciparæ, qualem paulo post describemus, rotundi nempe utriculi, per arteriolas minimas liquorem accipientis, quem in ductum excretorium amandet. Varia sunt, quibus hæc ivit persuasum argumenta.

§. V. *Comparatio cum viſceribus.*

Et primum cum viſceribus glandulas comparabat, ut hepā, ren, testis, magna conglomerati generis glandula effet, quæ perinde & acinis constaret, suumque humorem per ductum secretorium amandaret, simillima ratione ex minimis radiculis in truncum confluentem, qui perinde in aliquam fere caveam secretum humorem effunderet. Sed etiam arteriæ viſcerum secretiorum pro portione multo majores sunt (u), eadem robustiores (x), & rectiores (y). Ex his arteriis impulsi humores per ductus excretorios facile continuoque transeunt, in rene expeditissime, in hepatē difficultius, sed transeunt tamen (z). Neque acinosa fabrica a viſceribus abest, in aliis quidem animalibus manifestior. In renibus humani fetus (a), & plurimorum animalium, de oviparo genere, piscibusque, lobuli cellulose te-

B b b 2

la

(t) Ibid. p. 99.

(u) Conf. etiam *SAUVAGE'S Mem. de l'Acad. de Berl.* 1715. p. 43.

(x) *PETSCHEI* L. c. n. 32. *WINTREBHAM* L. c. p. 210.

(y) *PETSCHEI* L. c.

(z) Conf. L. II. p. 99.

(a) *HARVEY de generat. animal. Exercit.* 55. p. 186.

la vinculo in majorem massam colliguntur : quales in lacerto majori vidi, alii in delphino (*b*), testudine, urso etiam, erinaceo, lutra.

Porro in hepate, acinos idem vidit subrotundos, qui celluloſo ambi-
tu hexagono (*c*), aut multangulo cinguntur; in fetu humano (*d*), tal-
pa (*e*), sciuro (*f*), erinaceo (*g*), sue (*h*), bove (*i*), fele (*k*),
piscibus (*l*), lacertis (*m*), cochleis (*n*): iisque porro acini, perinde ut
in conglomeratis glandulis, racemorum modo minores in acinos resol-
vuntur.

In teste humano lobuli evidenter, cellulosa tela laxa collecti, manife-
sto in ovalem, glandulae similem molem conjunguntur. Sed etiam in ce-
rebri cortice subrotundos lobulos (*o*), atramenti superfuli lineis circum-
scriptos, inque oleo fervente in solidiores acinos se collecturos, magni viri
dixerunt. Hec certe, facile oculis se subiectura, similitudo fecit, ut olim
ARETEUS (*p*) renum fabricam glandulosam fecerit, similemque de
mammis hepaticisque natura sententiam tulerit (*q*).

Si istos lobulos acinosque microscopii ope speculatus fueris, corpuscu-
la erunt cohaerentia, fere subrotunda, quæ lineis cellulosis ambeuntur, at-
que adeo, ut in glandulis, acini, ex acinis compositi in lobulos coales-
cunt.

Objectionem prius placet occupare, quæ contra MALPIGHIANUM
ratiocinium adferri potest, & omnino a me ipso adlata est (*r*). Acini
nempe, quibus variis in animalibus viscera conponi MALPIGHIUS scrip-
tit, paſſim nimis grandes sunt, neque ad elementa eorum viscerum, sed
ad

(*b*) Conf. Comm. ad Praedict. Boerb. T. III. p. 216. cum not. *f.* gg. *bb.* *ii.*

(*c*) MALPIGHIAN. de hepate c. 2. p. 61. in homine & fele, WINSLOW Exposit.
anatom. T. IV. n. 285. 286. 287.

(*d*) MALPIGHIAN. ibid. c. 3. p. 63.

(*e*) IDEM in poſthumis p. 30.

(*f*) IDEM de hepate p. 60.

(*g*) IDEM poſthum. p. 30.

(*h*) De gland. conglobat. p. 6.

(*i*) MALPIGHIAN. de hep. p. 60.

(*k*) Ibid. p. 60. 61. -

(*l*) IDEM ibid. p. 59. conf. Comm. ad Praedict. Boerb. T. III. p. 134.

(*m*) IDEM p. 59.

(*n*) IDEM p. 58.

(*o*) Conf. Comm. ad Praedict. Boerb. T. II. n. 264.

(*p*) Conf. Et sign. acti L. II. c. 9.

(*q*) Idem de caue. Et sign. diutur. L. II. c. 3.

(*r*) PRIM. Iun. physiolog. n. 193.

ad grandes, exque minoribus acinis compositos lobos pertinent. Vere quidem; neque tamen diffimulo, præter eos nimios colliculos minutos etiam, ægre oculis conspicuos, neque glandulis simplicibus majores acinos apud **MALPIGHIUM**, aliosque claros viros, **BERTINUM** (s) etiam, **FERRERIUM** (t), & ipsum denique contrariæ fæctæ auctorem **RUVSCHIUM** descriptos reperiri, & in renibus (u), liene (x), hepateque (y) exigua, rotunda, definitæ magnitudinis, neque facile mutabilia corpuscula adaptare, in qua vascula minima se inmittunt, & ex quibus, si ulla claris viris (z) fides est, etiam ductus excretorii prodeunt, ut verarum glandularum undique similia sint. Ea demum analogia eo perfectior erit, si quidem viscera, multis in animalculis, non ex solidis adeo acinis, sed omnino ex cavis oblongis folliculis componuntur, qualis de pancreate quidem, & hepate, non paucarum bestiarum **MALPIGHII** observatio extat, de pancreate (a) nempe xiphiae, afelli, bombycis, de hepate (b) cancri, talpæ Imperati, de testibus plurimorum infectorum.

§. VI. Comparatio cum glandulis ex simplicibus compositis.

Postquam adeo viscerum cum glandulis analogiam stabiliverat, quæstivit porro illi hujus opinionis auctor, que demum cujusque acini interior fabrica esset. Offerebat se continuo summa cum glandulis simplicissimis similitudo: que perinde sepe, cellulosa, laxaque tela conjuguntur. Ejus generis glandulas **Jeremias LOSSIUS** congregatas dixit (c), adeo con-

B b b 3

glo-

(s) *Mémoir de l'Acad. des Scienc.* 1744.

(t) *Ibid.* 1749.

(u) **BERTIN** I. c. p. 498. & olim **MALPIGHIUS** de gland. conglobat. p. 6. de rebus c. 3. postib. p. 34. **WINSLOW** I. c. n. 410. **RUVSCHE** de fabrica glandular. p. 75. *Tbſ. Anat.* II. aff. 6. n. 1. *Tbſ. I.* aff. 2. n. 2. *Tbſ. III.* n. 41. **MORGAGN** advers. *Anat.* III. p. 71. Alba granula vocat **FERRERI** I. c.

(x) Intem hic verbis utitur IDEM, atque ornata, & fusa hos acinos describit. Habet olim **MALPIGHIUS** de liene c. 5. p. 111. postib. p. 42. **PEYER** offerv. *Anat.* 12. **Stephanus LORENZINI** de torpiline p. 35. edit. Angl. **Fridericus RUVSCHE** apud **BOERHAAVE** de fabrica gland. I. c. **Pozzi** in *commerc. epistol.* p. 61. cont. alios autores citatos in *Comm. ad Præd. Boerb.* T. III. p. 46. 47.

(y) **RUVSCHE** I. c. n. 78. *Centur. offerv. med. chir.* n. 51. *Mus. varior.* repofit. 4. n. 15. **MALPIGHII** de hepate p. 61. de gland. conglobat. p. 6. **BIANCHI** *bif.* hepatis. p. 1160. **WEPPFER** dub. *Anat.* p. 98. **BIERWIRTH** de fabr. hepatis. p. 70. Amulo ex vase indicio comperto comparat **FERRERI** I. c. p. 497. 498.

(z) De lenis acini's **BERTIN** I. c. p. 98. 99.

(a) De gland. conglobat. p. 6.

(b) *Ibid.*

(c) I. c. n. 35.

glomeratis similes, ut ægre te contineas, ne utriusque generis eamdem nat-
turam esse pronuncias, & perinde istas conglomeratas pro acinorum rac-
mis habeas, qui singuli ejusdem naturæ sint, quæ est in folliculis simplicibus.
Sæpe comparavi glandulas, quæ cartilaginibus arytenoideis trident, &
inter conglomeratas a magnis viris (*d*) recensentur. Si in viciniā nunc
oculos dimiseris, videbis sensim laxari acinorum vinculum, ut demum so-
litariæ sint, quales plurimæ per internam laryngis membranam sparguntur (*e*),
veræ, ut videtur, muciparo de genere, cavæ glandulæ. Ita clar olim vir (*f*)
conglomeratae glandulae nomine simplicium follicularum agmen intellexit,
quæ plurimæ latera postremumque linguae dorsum circumstant. Aliud in
tonillis exemplum est: in iis enim glandulis & cellulose telæ ope con-
junctas glandulas simplices (*f**) reperias, & præterea commune velamentum
in unum glomerem eos quasi acinos conjungit, quales glandulas **LOSSIUS**
conglutinatas vocabat (*g*). Neque aliud argumentum pro **MALPIGHIA-**
X opinione & cavea acinorum credam dici posse, quod plus speciei ha-
beat.

•

§. VII. Cavea acinorum per morbos confirmatur.

Denum **MALPIGHIUS** olim (*h*), deindeque clari viri sententiam
defenderunt, *Hermannus BoERHAAVE* (*i*), *J. Eapista MORGAG-
NIUS* (*k*) & *Petrus NANNIUS* (*l*), morborum in primis effectu ad
confirmandum cavam acinorum elementarium naturam usi sunt. Nempe nul-
lum viscus est, quod non visum sit, neque infrequenter, aut totum, aut
certe ex parte aliqua, in rotundos, grandes, cavoisque folliculos manife-
sto conversum fuisse. In ejusmodi vitioso utriculo sua undique continua
membrana fuit, suis picta vasculis: fuit cavernula vario humore plena,
fuit, si fides nonnullis hypotheseos descensoribus, suus ductus excretorius
(*m*)

(*d*) *MORGAGN. advers. anat.* I. T. II.

(*e*) *Conf.* L. IX. Scđt. I.

(*f*) *VATER de nov. ducl. salte.* Ring. p. 21. 22. T. I. L. 2. s. 3.

(*f**) *SLEVOGT de gurgul.* n. 14.

(*g*) *I. C. H.* 30. 31.

(*h*) *De gland. conglobat.* p. 6. *posthum.* p. 34. &c.

(*i*) *De fabric. gland.* p. 38. *Ego.*

(*k*) *Post VALSALVÆ Epist. anat.* III.

(*l*) *Comment. Acad. Scient. Botan.* T. I. p. 326. &c.

(m). Videbatur adeo dubium nullum superesse, quin ejusmodi in viscere acini, collecta, per obstructionem aliquam, materie paulatim repleti, turbidique, & super legitimam magnitudinem distenti, demum ex invisibili parvitate in molem oculis conspicuum increverint.

In his nunc folliculis nonnunquam nihil sicut, nisi ipse inquinatus cunctus visceris humor, ut omnino sola moles vitiosa esset. Ejusmodi de renis acini, deque hepate observations extant, ut morbos acini urina (*n*) pleni essent, aut bile (*o*). Aequus haec moneo, cum acris ingenii vir J. B. MORGAGNUS (*p*) ex hac humoris indigenae conditione ostendi persuadeatur, ejusmodi folliculos minime in cellulosâ tela nasci. Alias utique alienus a legitimo humor eos folliculos replet, scirrhosi generis, durus & albus, in hepate (*q*), rene (*r*). Est ubi calculosi quid & lapidei continuerunt, non in rene solo (*s*), sed in hepate (*t*) pariter, & liene (*u*).

Verum ea in primis degeneratione in suos usus utebantur Cl. viri, quæ facit, ut acini viscerum lymphâ distendantur, quod vitium *hydatides* vocant, vesicas nempe membranaceas, liquido plerumque coagulabili plenas. Accurate VALSALVA (*x*) kepar describit, ex folliculis compositum, quorum membrana etiam duplex esset & triplex (*y*), aliisque carneæ fibræ inessent

(m) De rene in primis apud MALLPIGHUM *de gland. conglob.* p. 6. & *Alexium LITTRÉ* in *mem. de l'Acad. Roy. des Scien.* 1705. p. 145. nimis certe felicem naturæ speculatorem, qui in quoque acino suam arteriam, venam, nervulum, ductumque uriniferum distinxerit.

(n) MALLPIGH in epist. ad JAC. SPOON p. 25, in *posthum.* p. 35. *de gland. conglobat.* p. 6. VALSALVA Epist. Anat. a MORGAGN. edit. III. n. 8. p. 8. LITTRÉ l. c. & a. 1702. hist. 2. 1702. hist. 4. MORGAGN. *Advers. Anat.* III. p. 69.

(o) MALLPIGH l. c. & in *posthum.* p. 30. POZZIUS l. c. p. 70. MALORT hist. de l'Acad. Roy. des Scien. 1727. obs. 3. Piriformes folliculos aut fellez vesiculae similes habet PETRUS NANNIUS p. 328. flavum in folliculis ichorem Brown Phl. *Transf.* n. 178. glandulas hepatis unice magnas MERY hist. de l'Acad des Scien. 1706. n. 9.

(p) Epist. cit. n. 14.

(q) LANGÉ in *Zod. med. Gall.* T. II. M. Jul. obs. 12. Josephus GIBSON, qui sphærica tubercula vocat *Essays of a Societ. at Edim.* T. II. p. 343. I. Jacobus PATER obs. *Anat.* VI. p. 17. J. Philippus BURGGRAV. *Com. Lit. Noric.* 1734. hebd. 30. STAHL *de aseite*, qui in hydropticis hepar quasi ex albidi lentibus componi scribit.

(r) ZOD. MED. GALL. T. II. p. 105. RUTYSON *Catal. Mus.* p. 120.

(s) MALLPIGH ad *SPOON* l. c.

(t) Idem ibid. REGEMONTER apud F. GLISSONIUM *de bilate* p. 96. STEPHEN STEAT. *aorta* p. 50.

(u) MALLPIGH *posthum.* p. 42. DOUGLAS Phl. *Transf.* n. 349. MERY hist. de l'Acad. des Scien. 1702. obs. 2.

(x) Epist. III. n. 7. 8. 9. 10. p. 8. 9. 10. 11.

(y) Le CAT Phl. *Transf.* n. 460. BREHM *de hydatid.*

inessint, alii ex minoribus vesiculis componerentur: eos vera intus billos reperit, porosque in exteriori superficie numerosos, & tubulos esse juncodi, quales sunt in avium ventriculis membranaceis. Ejusmodi vero hepatis ex hydatidibus compotui exempla numerosa (z) extant, tum renis (a) etiam; & vesiculo'um corticem cerebri II. testis (b) descriptis.

In aliis etiam aut visceribus, aut glandulis, vitiosos acinos scriptores medici viderunt, candicantes in liene globulos junior PLEYERUS (c). & prægrandes etiam Johannes MERY (d): stabiles in pancreate cavernulas NANNIUS (e), & in mamma erinacei vesiculos, noster olim præceptor J. Georgius DUVERNOY (f).

Eo magis vero ex his morbolis tumoribus veram viscerum conglomerataremque glandularum fabricam innoscere, Cl. viri sibi persuaserunt (g), quod in veris, & indubitate cavea instructis glandulis simplicibus, sebaceis & subcutaneis, utique simillimi: t. mores adiposi, scirrhosi, aq[ue]i passim nascantur, quo ies. eorum proprius succus vitioso stagnavit. Sed etiam ovariorum mulibirum nativæ vesiculae sapissime in vitiosas hydatides intumescunt. Similes tempe eventus similibus de causis nasci, putant pro lege haberi posse.

His fere rationibus sententia MALPIGHIANA ita constituta fuit, ut pene totus orbis medicus eam pro demonstrata recipere, interque axiomata poneretur, omnem humorum separationem per glandulas fieri (h) & absque folliculo secretionem peragi non posse: omnes ergo glandulas conglobatas, viscera secretoria omnia, veros minimorum cavorumque follicularum glomeris esse. Neque farentes valde judices experti sunt Antonius

(z) J. Dem PANAROLUS in *Litrologism. Preter. V. obs. 15. Franciscus GLESSON de hepate p. 82. 50 Oium RUDNER dicit. hepatis aquos. c. 4. p. 291. in messi aurea. M. MALPIGHII ad SPONIUM p. 25. Fried. RUYSEN Centur. obs. n. 65. Thes. I. aff. 5. n. 12. Thes. VIII n. 10. Advers. Anat. III. Antonius PACCHIONUS diff. phys. anim. de duvam n. ed. 1721. p. 253. Autores ZODIACI GALLICII T. I. p. 101. T. V. p. 241. Joachim COURTIAL *Journ. des Savans* 1688. n. 24. J. Georgius DUVERNOY Comm. A. d. Petr. T. I. p. 380. qui vesicularum novem milia numeravit. C. G. STEPHENSON de fleatoe aort. in sue.*

(a) J. C. PLEYER Exerc. anat. n. 32. 35. Paulus Gottl. WERLNER Comm. Lit. Noric. 1732. folio. eo. P. A. BOEHMPEL fisi. II. pref. p. VI.

(b) J. J. WEPFER de app'ix. hist. 14 Ejb. Nat. Cur Dec. I. ann. III. obs. 129.

(c) Obs. Anat. 7. p. 22.

(d) Hist. de l'Acad. Roy. des Scien. 1702. n. 2.

(e) Comm. Boenou. I. c. p. 416.

(f) Comm. Acad. Petrop. T. XIV. p. 220. seqq.

(g) BOERNHAUER de fabric. gland. p. 13. 14. 15.

(h) PETRUS parv. 1. & in *Mercyologia. Petrus NAXIUS L. C.*

tonius NUCK (*i*) ; cum glandularum folliculos impugnaret ; & Raymundus VIEUSSENS, cum ductus excretorios ex vase primi ordinis, aut secundi, absque medio aliquo utriculo duderet (*k*).

§. VIII. Contraria sententia Ruychii.

RUYCHIO hanc sententiam tribuimus, et si antiquiores auctores habet. Per RUYCHIANA enim potissimum artificia auctoritatem & sectatores invenit. Nempe viscera omnia, & glandulae pariter conglomeratae, secundum haec placita vasculis constant, & cellulosa tela, absque interpositis, ductus inter excretorios & arterias, folliculis. Viscera primus EDMUNDUS KING (*l*) meritis undique vasis constare scripsit, ante RUYCHIUM (*m*), anno omnino 1666. De glandulis eadem sententia fuit Nehemias GREW (*n*) viri in plantarum inque animalium anatomie multa experti, et si ad eum quidem virum fama inventorum RUYCHIANORUM pervenisse potuit. Verum, quando haec scripsit, valde jam senex erat GREWIUS, dumque glandulas ex vasis conponi docuit fibrisque, plus aliquantum cellulose telae tribuit, quam quidem RUYCHIUS. Ex vasculis & vesiculis totuna corpus humanum componebat Josephus DUVERNEY (*n**). Sed RUYCHIUS, et si neque ingenii velocitate valde eminuit, neque ad fiduciam legendi, aut eruditione, frequentissima tamen cadaverum confuetudine, & opportunitate ad consulendam naturam, & dissectionibus pene per totos octoginta annos continuatis, & artifice etiam manu, plerosque mortales superavit, coequo majorem auctoritatem sibi comparavit, quod ab hypothesi alienior, parum ultra ea doceret, quae viderat.

Junior equidem, cum toto fere seculo suo, in visceribus acinos glandulosos admisit, ut in hepatē (*o*), rene (*p*), liene (*q*), aliisque corporis

(*i*) In adenologia.

(*k*) Tr. des liqueurs p. 129. &c.

(*l*) Philos. Transact. n. 52.

(*m*) Multis poti hanc aram annis RUYCHIUS glandulas viscerum admisit.

(*n*) Cosmolog. Sacra p. 20.

(*n**) Mem. avant. 1699. p. 281.

(*o*) Cestur. chs. med. chir. n. 51. Musæ rario. Repotor. 4. n. 25.

(*p*) Thes. II. sif. n. 1. Thes. III. n. 41. quo quidem loco & paucas glandulas admittit, & in brutorum animalium.

¶ (*q*) Centur. chs. I. c. quo tamen loco non videtur de verieribus lienis elementis scripsiſſe. Add. Fabric. gland. p. 75.

poris humani partibus. Inde, cum magis atque magis videret, & membranas, albissimas quamdiu ars absuit, post artificiosam repletionem innumerabilibus vasibus percurri, & viscerum maximam utique partem sebacea materiae repleri, a maceratione vero in aqua simplici in vascula resolvi, paullatim sententiam mutavit, & ab anno fere 1696 (r) eo animum flexit, ut doceret, & viscera, & conglomeratas glandulas (s), & simplicium denum plerasque (t), totas undique folis ex vasibus componi, paucisque per corpus humanum cryptas admitteret (u), in quibus vera glandulae fabrica superesset. Princeps argumentum erat ejusmodi. Ex hydrostaticis constat, liquorem ex parvo canale in amplum receptaculum demissum, in eo receptaculo maxime retardari, hinc fracta vi progressionis, aucta pressione laterali (x), id receptaculum distendere. Concors inde cum hac contemplatione experimentum confirmat, ceram sebumve, per vascula arteriosa aliave in caveam quamcunque in pulsa, amissa celeritate sua, minuta foramina, in id receptaculum patula, ægerrime subire, sed distentis receptaculi parietibus, amissa filii specie, in nodulum maculatum abire (y). Sed in visceribus, injecta in arteriam præcipuam materies sebosa, replet minimas arteriolas, transitque in ductus excretorios, eosque infercit, continuo filo, nullo nodulo inter arteriolam, & excretorium ductum interposito. Nunc, si sebum inter arteriolam minimam, ductumque excretorium nusquam in nodulum intumescit, sequitur, nusquam etiam receptaculum inter finem arteriolæ, ductulique excretorii originem interponi, adeoque neque glandulosam fabricam eo loco esse, & minimæ arteriolæ minimum excretorium ductum continuari.

Continuati ex arteriis in ductus excretorios itineris exempla jam recensuimus; in rene facillima (z) res est: in hepate succedit (a), quando vena cava revincta in portarum venam tenuior liquor inmittitur: in glandulis conglomerati (b) generis denum, et si rarius, succedit tamen.

§. VIII.

(r) In *Epiſt. problem. IIII.* qua acinos **MALPIGII** rejicit, ratione addita, quod proprio velamento restituantur.

(s) *Epiſt. anat. XV.* p. 7. de mammis.

(t) De glandulis nasalibus *Theſ. VI.* n. 3. de glandulis ventriculi *Ibid.* n. 33. de intestinalibus, eodem loco.

(u) Conf. hujus ſect. n. 18.

(x) *Alvers. enat. II.* n. 3. de *fabric. gland.* 52. 54. *Theſ. X.* n. 37.

(y) De glandulis intestinalibus **PETERIANIS** **BOERHAAVES** *de fabric. gland.* p. 37.

(z) *L. II.* p. 99.

(a) *Ibid.*

(b) *Ibid.*

§. VIII. *Objec^{tio} occupatur.*

Sentiebat vim argumenti perspicax **MALPIGHIANUS** theoræ patr^{is}, **Hermannus BOERHAAVE** (*c*). Ut eam vim frangeret, vere equidem haec tenus monuit, in cortice cerebri, aliisque visceribus **RUYSCHIANA** manu repletis, quod *præparare* vocant, multum propriæ carnis cujusque visceris desiderari, ut partem corticis cerebri, partem hepatis, lienisve **RUYSCHIUS** ostendat, plurimam autem ejusdem corticis, ejusdem hepatis lienisve materiem, quam sebum coloratum non replevit, neque a vi putredinis & aquæ macerantis tuerit, in ipsa aqua sensim destrui, inque muci speciem conservam ad fundum phialarum descendere, aut a seduli artificis manu omnino sordium cum opprobrio nomine abjici. Recte **BOERHAAVIUS**, si unice monet, nondum per penitissimas repletiones ostendi, sola in visceribus vasa esse, totumve viscus constare vasculis, quæ cera repleverit. Eadem monent **Bernardus Siegfried ALBINUS** (*d*), & **Antonius FERREIN** (*e*), & res ipsa monet. Verum si ideo contendit magnus noster **PRAECEPTOR**, glandulas fuisse folliculosve, quod de viscere inter **RUYSCHIANAS** manus periit, tunc equidem non possumus vim argumenti probare. Compresos equidem inter repletas arterias folliculos interire aiebat Vir III. Verum si interiussent, non posset sebum de arteria in ductum excretorium transisse. Pone arteriolam inter ductumve esse folliculum, pone eum folliculum a quacunque causa elidi, interceptus erit ex arteriola in ductum commeatus, & nulla via supereft, per quam sebum in eum ductum veniat. Id argumentum sufficere crediderim : addebat autem **RUYSCIUS** (*f*), nulla se in replendis visceribus violentia uti, aliamque nascituram rerum faciem, si vi nimia uteretur, inde enim inflammationis speciem apparituram : quam nos interpretamur de exsudatione sebi colore tincti, quod ex arteriolis, in cellulosa cavernulam viam sibi aperuit.

Ccc 2

§. IX.

(c) *De fabric. gland.* p. 36. 37.

(d) Non omnia vasa esse, sed suam peculiarem cuique parti substantiam adnotat. L. III. p. 11.

(e) Nempe neque acinos suos viscerum carnem confidere, neque alba in liene rebusque grana, neque rubra puncta, nimis dispersa, ad viscerum naturam confluendam sufficere. *Mem. de l'Acad. des Scien.* 1749. p. 495. 496.

(f) *Ibid.* p. 73.

§. X. *Nova& sententiae progressus.*

Ab his initis progressus RUY SCHIUS, suscepit denique demonstrare, etiam eos acinos, quos pro sua opinione MALPIGHIIUS produxerat, omnino & ipsos, totaque adeo viscera, totaque glandulas, meritis constare vasculis. Potuerat jam tunc testium exemplum proponere, & proposuit aliquando (g). Glandularum enim similis caro tamen manifesto ex conspicuis vasculis unice compositur, quam primum argentum vivum in testis naturam felicius impulsum fuit. Replicata ea, demum multiplice confectione lobulos efficiunt, quos cellulosa tela interposita conjungit, & qui toti vera, communi, membrana collecti testem, glandulae in primis congregantur similem, componunt.

Sed etiam hepatis, lienis renumque acinos ad gressus accurate repletos in aqua maceravit, & comperit (h), communi quidem velamento destitui (i), quod totam glandulam carnem comprehendat, & ad veræ glandulæ simplicis effientiam utique pertineat: cum contra viscerum acini sollicita evolutione in vascula discedant, quorum cellulosis filis collectorum glomer id sit, quod acinum MALPIGHIIUS dixit. Inter ea granula, pulpososque (k) vasculorum fines, quos in pomis pirisque reperit vir solertissimus, sumnum similitudinem ajebat esse, cum tamen in pomorum certe pulpa nulla de glandulosa fabrica suspicio locum habeat. Sed etiam absque maceratione boni senis iudicia hepatis acinos explicuit, quos eisdem ad fines ramulorum venæ portarum cavaeque inferioris venæ ad modum anserini pedis expansos VIEUSSENIUS (l) reduxit. Adeo hoc spectaculum evidens fuit, ut BOERHAAVIUS (m), summus contrarie sectæ patronus, pro sua ingenuitate fateretur, nihil se videre in hepatis acinis, præter vascula. Ita porto ALBINUS acinos ad vasorum congeriem revocavit, qui ultimo fine

(g) *Theſaur.* VI. n. 71. *Theſ.* VIII. n. 34.

(h) *Epiſt.* anat. II. p. 6. 7. quo loco addit, ad hunc usque diem acinos sibi glandularum aliqua specie impofuile i tum *Theſ. anat.* I. *eff.* r. n. 2. *eff.* 2. n. 7. *eff.* 3. n. 10. 12. *Theſ.* II. *eff.* 3. n. 12. *Theſ.* III. n. 3. 33. 41. 72. *Theſ.* VI. n. 81. *Theſ.* VII. n. 4. 11. *tab.* I. f. 1. *Theſ.* VIII. n. 34. *Theſ.* IX. n. 59. *Theſ.* X. n. 77. 84. 86. 88. 90. 94. 149. *Theſ.* Max. n. 101. Hæc de hepate, liene, rene, & cerebri cortice dicta sunt. Addit totam episcolam de glandularum fabrica & imprimis p. 69. 70. 74. 75. 76.

(i) BIERWIRTH *de hepat. structur.* f. 1. ex hepate.

(k) *Theſ.* IX. n. 59. *Theſ.* max. *Tab.* I. *Advers. anat.* *Dic.* III. n. 29.

(l) *Obſ.* d'annis. *Ep. de medec. pratiqu.* p. 139.

(m) *De fabrie gland.* p. 71. 72.

fine se incurvati fere comprehendenter, ut solent Rosæ Hierichuntinæ rami. (n). In glandulis conglomeratis dissolvendis non memini, quemquam experimentum fecisse.

§. XI. Respondetur ad argumentum a morbosis glandulis repetitum.

Cum **MALPIGHIUS**, ejusque viri celeberrimus advocatus **BOERHAAVIUS**, ad morbosam fabricam passim provocarent, multa ad argumentum inde repetitum jani **RUVSCHIUS** respondit, primumque, etiam absque primæva, & a natura creata glandulosa fabrica folliculos tumidos varia materie plenos nasci. Ita grandines (o) rotunda sunt concrementa, continua membrana clausa, que materiem puris similem continent; sed grandines manifesto in spatiolis subcutaneis cellulosis oriuntur, & inde glandularum etiam suspicio adest. Isdemque in cavernulis etiam steatomata, & aquosi demum tumores (p) frequentissime reperiuntur: quoties non in glandula certe, sed in cellulosa cavernula (q) retenta materies stagnando congesta est. In omento, quod pariter ad pingues telas pertinet, periude numerosæ glandulæ minimæ, scirrhosa duritate, visæ sunt (r).

Prater cellulose demum telæ vulgo notum imperium, similes etiam tumores in aliis corporis humani partibus enati recensentur, in quibus ne adversarii quidem folliculum querunt, ut in cornea oculi tunica (s), in optico nervo (t), tympani membrana (u), artibus (x), pulmone (y). Et ipse quidem in pueri pulmone, rotundas, alba materie plenas, quasi grandines vidi (z).

Porro, quoniam Cl. adversarii (a) nativum in vitiosa dilatata receptaculo

Ccc 3

(n) **FRANKEN** de hepat. p. 18. Alibi, & nos olim, & nuper, discipulos docuit, acimos esse fere venas, quae viti spiritus contrinxisset **LEISLER** de secret. p. 10.

(o) **SALVATOR ALBERTI** de glandinib. p. 42.

(p) Qualem ipse Ill. **BOERHAAVIUS** descripsit de fabrie. glandul. p. 19.

(q) **RUVSCHIUS** de fabrie. gland. p. 49. 77.

(r) **BURCHART** de gland. scirrhos.

(s) **RUVSCHIUS** de fabr. gland. p. 97. in Staphylomate.

(t) Ibid.

(u) **IDE** in tb-farr. anat. IV. n. 14.

(x) Huc advenitizie illæ in femore & brachio glandulæ **THOMAS WARTON** ade-
mograph. p. 173.

(y) **MAUCHART** de appellations glandulae, **BURCHART** de glandul. scirrhos.

(z) **OPUSCULUM** patholog. obs. 15. Conf. L. lIX.

(a) p. 183.

cula humorem nobis opponunt, non omittere oportet, nihil omnino intercedere, siquidem sanguis in cellulosa spatiola siccissime exsudat; quin perinde in obstruто jecinore bilis, alioquin penetrabilis, aut ipsa exhalat, aut certe humorem cellulosis cavernulis contentum suo colore vitiet, quo adeo frequenter & intestina pingat, & peritonaeum.

S. XII. Et ab hydatidibus.

Hydatides, quibus rotunda, suisque limitibus circumscripta figura est; propriumque velamentum aquam comprehendit, plerumque in cellulosis cavernulis (*b*) nascuntur, in quas humor effusus stagnavit. Nihil hoc vitio frequentius est circa renem, in circumjecto adipe, circa uterum, tubaque & ovaria (*c*). Sed etiam in cordis superficie ejusmodi vesicæ effluerunt (*d*), & sub extimo intestinorum velamento (*e*), & in omento (*f*), in exteriori ambitu membranæ costas succingentis (*g*), inque pulmone (*h*). In ovium pelvi, pariter in cellulosa tela frequens vitium est, grandesque bullæ, non absque animalis inde contabescientis detimento, passim generantur. Hic est ARETÆI hydrops alias (*i*), in quo vesicæ parvæ & frequentes, humore plenæ. Manifesto etiam vidi, in morbo, quem pro magico plebs habebat, de ulcere femoris plurimas subinde hydatides exiisse, de quibus dubium non esset, in vicino celluloso textu natas esse. Simile exemplum Parisini Academicici recensuerunt (*k*). Ita ex ulcere sub costis quingentæ hydatides (*l*) effluxerunt, & ex abscessu vis hydatidum, pariter, ut quidem videtur, de femore manavit (*m*). Ita in inguine hydatides rese-

(*b*) BENDENS *Ercolauer Sammlungen* 1723. M. Januar. GRASHUYS Epib. Nat. Cor. Vol. VII. obs. 120. p. 416. & post tradit. de colica pilorum.

(*c*) Opuscul. pathol. obs. 41. RUYSEN. advers. Anat. I. n. 2. &c.

(*d*) FANTON. obs. 12.

(*e*) INGRAESIAS de tumor. p. 229.

(*f*) HARDER apud. obs. 13. TYSON apud. transf. n. 193. HIPPOLYTUS Boscus de fasciis. Anat. p. 17. Nempe vesiculas aqua plenas per ulcus prodigiis, per quod omentum portio clappa erat. Conf. etiam BIUMI canalesti p. 260.

(*g*) COLLINS System. Anat. p. 193. GASPARI offer. p. IV. Hydatides diaphragmati adhuc BIRCH T. IV. p. 377.

(*h*) MALOTUS hisp. de l'Acad. 1723.

(*i*) Caus. diuturn. L. II. c. 1.

(*k*) Mém. de l'Acad. avans 1699 T. II. p. 212.

(*l*) Phib. Transf. n. 293.

(*m*) CABROL obs. 27.

resedisse leguntur (*n*) , & sub trapezio musculo vastissimam (*o*) bullam, quæ 36 alias folliculos sua caverna comprehendenteret. Ita urinaria vesica, renes, uterus, ventriculus, intestina, cor, pericardium, in cadavere undique pendulis cystidibus aqua flava plenis effluerunt (*p*). In alio corpore, cum subinde per paracentesin ova quasi piscium prodirent, millenæ hydatides, cum utero, hepate, mesenterio, totum per abdomen connexæ, post mortem apparuerunt, cum nempe in universum tractum cellulosum aqua se diffusisset (*q*). Ita in cellulosa tela septi transversi (*r*) hydatides sacco membranaceo comprehensæ visæ, aliæque plurimæ de sacco super hepar posito (*s*) per infictum vulnus exierunt. Sexaginta hydatides in tumore a posteriori cranii sede ad scapulam descendente fuerunt (*t*), cum reliqua pars, crassiori adipi plena, ad steatoma, & atheroma pertinet. Hinc cum aqua in hepatis hydatidibus sebum commixtum fuit (*u*), inquilina cellulosa membranæ materies. Inde etiam intelligitur, quare frequenter adeo & duæ (*x*) in hydatide membranæ, & hydatides legantur, quæ alias sua in cavae continuarent (*y*). Nam vel duas laminas stagnans aqua sibi circumposita, vel unica prægrandis bulla, mire intumescens, super alias minores se superfudit.

Prima hæc hydatidum species est, superest & altera. Nam etiam sanguinea vasa in hydatides degenerant (*z*). Ipse vidi, inque thesauris academicis conservavi (*a*), vesicularum placentam, cujus bullæ aqua plena cum angustioribus pedunculis ramosisque alternæ continuarentur, ut omnino mani-

(*n*) RIDLEY obser. præd. 32.

(*o*) BIDLOO de hydatid. T. I. f. 2.

(*p*) Mauz. CORDEUS in hippocrat. mulieb. p. 31. & simile fere exemplum habet Vo'cherus COITER obser. anat. p. 113.

(*q*) BREHM de hydatid.

(*r*) POHL de hydatid.

(*s*) Journ. des Savans 1712. M. Oct. Per vulnus etiam lateris hydatides prolierunt in historia, quæ extlat apud CL. BIRCH T. III. p. 321.

(*t*) Phil. Transact. n. 308.

(*u*) STERZEL de steatomat. aort. p. 50.

(*x*) BREHM de hydat. POHL hydrop. sacca &c.

(*y*) CABROL L. C. WESZPREMI obser. prope vesicam. KELL quantit. sang. p. 25.

(*z*) RUTSCH in advers. anat. I. n. 2. &c.

(*a*) Opuscul. anat. obf. 40. similes observationes pañim extant. Habet RUYSHIUS thes. anat. VI. Tab. t. f. 3. 4. 5. 6. quibus totus progreñus degeneratioñis expotitur. Tab. X. n. 63. 64. 65. Advers. anat. I. n. 2. II. p. 24. 32. obser. anat. Chir. n. 33. MORGEN. Advers. anat. III. n. 14. VALISNERII florula d'una vesicula BREGUS us foris p. 110.

manifestum esset, vasa fuisse, quæ in hydatides degenerassent. Idem vitium, minus equidem frequens, in majoribus hepatis vasis olim RUYSCHIUS vidit (c).

Liceat paucissimas aliquas de origine hydatidum opiniones excitare, quas nos quidem res ipsa vetuit recipere. Dudum (d), iterumque nuper (e), a lymphaticis vasis degenerantibus hydatides nasci scriptum est, ut inter duo valvularum conjugatarum juga inclusa lympha sensim vasculi parietes extorsum urgeret, donec rotundæ bullæ faciem induerent: ad quam sententiam hactenus Godofredus BIDLOO (f) accessit, ut hydatides perinde etiam a lympha, sive a nutritio huniore in arteriarum venarumque intervalla effuso, nasci admitteret (g). Addidit Richardus MEAD (h), eruditissimus olim medicus, se aquis innatantes funiculos vidisse, ex tenuibus & pene concatenatis limpidis vasculis factos, corruptarum lymphaticarum venarum reliquias. Verum in universum multo latius patet hydatidum sedes, quam quidem lymphaticorum vasorum, & multis in sedibus corporis humani hydatides repertæ sunt, in quibus nulla industria lymphatica vasa reperit, vel cerebri exemplo (i), & uterinae placentæ. Quod MEADUS vidit, omenti degenerantis vitium fuisse videtur.

Hypothesin Cl. viri dimittimus, qui hydatides pro vermium opere habuit (k).

§. XIII. Argumenta ex theoria repetita.

Alia supersunt, quæ pro causa RUYSCIANA dicuntur, & nihilominus pondus habent, etiamfi ab experimento, & anatomica administratione non perinde minus repetuntur. Et primo, facile ostenditur, absque follicu-

(c) *Thef.* I. aff. n. 12. *Thef.* VI. n. 11. *Thef.* VIII. aff. 2. n. 10.

(d) Thomas WHARTON in *admonograph.* p. 49. Thom. BARTHOLIN *Hist.* 67. Centur. II. COURTAUL in *Journal des Savans* 1688. n. 24. J. KILL de quantitate sanguinis p. 26. Godofred. BIDLOO Exerc. II. de hydatid. T. I. f. 2. t. 4.

(e) Saïs. MORAND vir doctissimus *hist.* de l'Acad. des Sciences 1723. p. 23. seqq. *Mémoir.* p. 158. seqq.

(f) *Ibid.* p. 14.

(g) Liquor omnino coagulabilis est *Phil. Transf.* n. 460.

(h) *Mosq. med.* p. 124.

(i) In hemisphærio cerebri dextro, inferiori loco, cystis vesicæ similis *Journal de Med.* 1756. M. febr. Plexus choroides hydatidibus nullus (frequens utique spectaculum) RUYSCHE *Epist. Anat.* XII. p. 21.

(k) TYSON l. c.

folliculis arteriolas inter & excretorios canales positis, utique humores a sanguine separari posse. Ipsa enim res docet (*l*), ex arteriolis minimis, in villos exhalantes ventriculi, & intestinorum, in poros vaporiferos cutis, peritonaei, pericardii, pleuræ, & in tenues oculi vias, aquam purissimam vehentes, aquam etiam & gluten, anatomico siphone impulsu, facilissime exire, alios, crassiores, liquores minus facile, tamen etiam sequi. In his autem colis nullo microscopio aliquid globosum, aut cavi, aut folliculo simile conspicitur. Haec tenus adeo ostensum est, absque folliculis secretionem esse posse.

Deinde aquosos humores non solum absque folliculis parari posse, sed cum folliculis omnino non posse generari, quin propriam aquæ naturam & limpiditatem amittant, continuo ostendemus. Ex **MALPIGHIANA** sententia arterioæ in folliculos suum liquorum deponunt. Pone eum folliculum sesqui lineaæ diametrum habere, quales utique cryptæ linguae dorsum circumstant. Pone arteriam minimam rubram diametri esse, quæ vulgo globulo adsignatur, five $\frac{1}{7} \text{ mm}$ (*m*) pollicis: pone arteriolam, quæ solam aquam transmittit, rubrosque globulos excludit, dimidio tantum rubro vasculo angustiorem, five diametro unius $\frac{1}{7} \text{ mm}$ pollicis. Erunt adeo diametri arteriolæ secretoriarum, folliculique recipientis inter se, uti $\frac{1}{4}$ & $\frac{1}{7} \text{ mm}$ pollicis, five uti 485 & 1. Verum ex notissima, saepaque a nobis repetita (*n*) lege, velocitas liquoris ex angusto tubo in amplum folliculum effusi est in folliculo ad velocitatem, qua per tubum arctioreum fluxit, tamen lumen tubi ad lumen folliculi. Erit ergo celeritas liquoris in folliculum depositi, ad celeritatem, qua per vasculum minimum movebatur, uti 1 ad 235225. Pone in eo vasculo eamdem superesse celeritatem, quæ est in minima arteriola rubra: sit ea celeritas ejusmodi, ut vigecuplo lentius, quam per cor sanguis per ejusmodi arteriolam (*o*) feratur. Describat autem ex corde exeuns sanguis in minuto primo pedes 150 (*p*), describet in minimo vasculo pedes $\frac{7}{2}$ five lineaes 1080: in folliculo vero $\frac{1080}{235225}$, five $\frac{7}{2}$ lineaæ partem, atque adeo tribus egebit horis & dimidia, ut unam lineam percurrat. Nempe in folliculo humor aquosus ita retardabitur, ut ejus motus pro nullo haberi possit.

(*l*) L. II. p. 102. seqq.

(*m*) L. V. p. 55.

(*n*) L. VI. p. 176.

(*o*) Eod. L. p. 194.

(*p*) L. II. p. 449.

sit. Neque a calculis res ipsa differt : nam in iis partibus corporis , quorum humores vere per folliculos generantur, lentissimus motus est, mucusque ex naribus nunquam sponte effluit, haeretque in organis suis , dum per emunctionis vim aut sternutationis ejiciatur.

Verum humorum humanorum plerorumque ea natura est, ut celeritate aliqua egeant, qua ad usus necessarios parentur, & omnino per experimenta velociter moveantur. Non ergo poterunt per colum parari, cuius natura velocitatem omnem destruit. Non ergo poterit aut urina per folliculos percolari, aut perspirabile subcutaneum, aut animalis ille nervorum spiritus.

Imo vero nullus humor non mucosus, neque lentus, per folliculos generari poterit. Ea enim communis, & inseparabilis, omnium humorum humanorum natura est, ut retenti & immoti spissescant, exemplo bilis, muci, feminis, adipis, ceruminis, lactis: adsunt enim undique per receptacula sorbentes venulæ, quæ de humore stagnante sibi bibunt, quidquid tenuioris aquæ continent. Quare fluidos humores per folliculos percolari, rei ipsi, & Naturæ sapientiae repugnat.

S. XIV. Causa RUY SCHIANA vincit.

Cum rationes & istas, & alias, pro RUY SCHIO passim Cl. viri adferrent, ipseque causam suam pulcherrimorum, manu sua preparatorum, cadaverum ostensione confirmaret, sensim factum est, ut ejus causa prævaleret. Viscera nempe secrezioni destinata, eorumque imprimis acinos, glandulasque conglomeratas, meris conponi vasculis, cellulose telæ ope conjunctis, eo cum vinculi robore, ut consistat acinus, aque sui similibus, Iaxioribus filis sibi adnexis, totus & integer deduci possit. In quolibet præterea acino, vasorumve glomere, ex eadem sententia, ductus excretorius est, pluresve ductuli, qui de arteriola minima, tamquam ramulus minor, & sanguini impervius, decedere videtur, quæ fabrica in rene certo reperitur, in aliis quidem colis magna cuu veri specie ex conjectura admittitur. Secretio adeo a vulgari sanguinis circuitu hactenus differt, quod in isto quidem arteriola minima, cylindrica, in venam sibi æqualem, aut ampliorem continuetur, quæ sanguinem recipere apta sit, in humorum vero separatione ductus excretorius, rubro vasculo arterioso minor, tamquam ramus

ramus ex eo vasculo prodeat. Inter primos novæ sententiae auctores *Jeremias Lossius* fuit (*r*), qui ab anno 1681 glandulas pro valorum glomeribus habuit, quos glutinosæ particulae connecterent. In renibus & earum glandulis eamdem, ab anno retro 1680 *J. Conradus Peyer* (*s*) sententiam docuit, deque glandulis in universum *Bernardus Albinus* (*t*), & discipulus *Ruy Schii*, vir eloquio valentis & ingenio *J. Godofredus de Berger* (*u*). In Gallia, propria per experimenta, vasculosam viscerum glandularumque fabricam *Raymundus Vieusseux* (*x*) adstruere adnus est, quem *J. Cl. Adrianus Helvetius* (*y*) secutus est, & alii. Angli inter primos *MALPIGHIANAS* glandulas rejecerunt (*z*), eorumque principes (*a*) glandulam ita definiverunt, ut ab arteria minima complicata non differret. Neque folliculos *Petrus Antonius Melchior Lotti* (*b*), neque nostro ævo fere aliter docetur (*c*). Ipse demum candidissimus olim *Boerhaavia*, ultimis vitæ sue annis eo animum inclinavit, ut in amici opinionem transiret, uti ex *Feldmanniano* (*d*) codice, & cerebri exemplo adparet.

§. XV. *Aliqua addidit Ferrenius.*

Nuper demum eamdem vasculosam viscerum fabricam suis ornavit experimentis.

D d d 2

rimen-

(*r*) *Diff. cit. n. 92.*

(*s*) *Exerc. anaſ. p. 297.*

(*t*) *De poris corp. hum. n. IX. &c.*

(*u*) *De natur. humeri. p. 128.*

(*x*) *Tr. des liqueurs p. 129. 358. &c.*

(*y*) *Öconomie animale p. 64. 129. &c.*

(*z*) *Martini Listeri de humorib. c. 22.*

(*a*) *Archibaldus Particularis de circulis. per minim. n. 29. Jacobus Kell de secretis animi. p. 82. 85. edit. Augl. T. II. f. 3. Georgius Cheyne phis. principi. of relig. p. 215. Theory of acut. and rem. diseases p. 65. Jeremias Wazewski tu animal secret. Prop. XI. (et ea vero arteria unde que duobus excretoriis emisso pingit) Ios. Morland. Phis. Principi. Transact. n. 183. glandulam tempe vocat glomerem arteriarum venanimumque filis collectarum, quæ ex communis venarum membrana oriuntur: Thom. Morgan phis. Principi. p. 166. qui tamen communis huic glomeri velamentum circumponit: Theophilus Lobe national method. curing seers p. 27. Ita quidem Vir Cl. simplicem glandulam ita describit, ut vasculum sit ex rubra arteriola ortum, serpentinum, ex quo via lymphatica vndeque oriunda partem humoris tenuioris resorbent, absque folliculis. Idem conglomeratum glandulam systema facit glandularum simplicium ibid. p. 28.*

(*b*) *De separat. humor. p. 130.*

(*c*) *Laurentius Heister. Jeremias Netter de secret. p. 38. qui Lobes placita retinet.*

(*d*) *Conf. nostræ editionis Praedictiorum Acad. T. II. p. 498.*

rimentis Vir Cl. *Antonius Ferrein* (*e*). Viscera nempe ex filis albis & aliquantum pellucidis constare, quæ a vasis Ruychiana arte repletis diversa sint, & post penitissimam vasculorum minimorum infarctionem alba manent, interque repleta vasa media contrahantur, inque siccato viscere evanescant, ut id, quod de viscere reliquum fit, totum nunc vasis rubris constare videatur (*f*), postquam alba ea *substantia* deleta est, ex qua viscus vere constabat. In cortice renum, & hepate infantili, alba ea natura, secundum Ill. viri experimenta, plena est tuberculorum, sive rotundarum (*g*), oblongarum, numerosissimarum particularum, quarum mille-næ in unico acino spatii habeant satis. Accuratissima denique indagine in humano rene & hepate facta, eas particulas anulos videri, albos, veraque reflexa vasa esse, sed a rubris vasis diversa, quibus renis, qui dicitur, cortex (*h*) componatur. Negat *ID E M* Vir Cel. aliis exemplis vasculosam viscerum fabricam haec tenus constitisse, præter testem, uueamque oculi membranam, & sollicite cavit, ne ea, quam describit fabrica, pro ea habeatur, quam *Ruy schius* aut replevit, aut descripsit. Adparet adeo, si omnino ea confirmantur, quæ Vir Ill. proponit, vasculosam quidem semper viscerum fabricam esse, cæterum ea vacula, quibus viscera constant, nimis subtilia esse, & angusta, neque liquoribus accessa, quæ incisorum manu injiciuntur.

Profundius aliquanto, sed conjectura, fabricam coli secretorii indagare susceperebat, Celebertimus senex J. B. N I G U S W I N S L O W. Inter prima (*i*) nempe sui ingenii monumenta hypothesin reliquit, quæ ad modulum fere intestinorum humorum secretionem reduceret, villosa nempe arteriosos in ductum excretorium undique descendere, patulisque osculis in ejus ductus caveam suum humorem dimittere. Aliquantum firmitatis huic conjecturæ ex ductu biliferorum interiori faciei accedit, quæ utique reticulata, & villosa alicujus tunicae haec tenus similiis est, & in hepate, & in folliculo felleo, & in ductu, qui ex folliculo nascitur. Sed etiam feminis receptacula simili reticulo interius exasperantur, tum alli sinus nonnulli, & mucosi folliculi variorum animalium (*k*). Dudum *MALPIGHIA* similem

de

(*e*) *Mém. de l'Acad. Roy. des Scienc.* 1749. p. 493.

(*f*) *ID E M* ibid.

(*g*) p. 497.

(*b*) p. 497. 498.

(*i*) *Mém. de l'Acad. Roy. des Scienc.* 1711. p. 316.

(*k*) Vide n. 20.

de folliculis simplicibus conjecturam protulerat (*l*) , neque WINSLOWI opinio Cl. Viris displicuit (*m*) , neque recedit eorum auctorum consilium , qui cum intestinorum fabrica glandulæ structuram comparaverunt , ut intestinum glandulam primariam , aliarumque exemplar vocarent (*n*).

Verum , si omnino dicendum est , quod res est , plerique utique ductus excretorii , etiam in minimis suis radiculis , undique leves sunt , in renum potissimum exemplo , inque salivosis ductibus & pancreatico toto , qui continuo naturam reticulatam deponit , postquam a choledoco discessit. In eodem porro rene ab arteriolis rubris in ductus uriniferos via oculo teste continuatur , & denique villosa fabrica cum natura aquosi & celeriter moti liquoris minus convenit , cum iterum (*o*) liquor de minimo quoque osculo exhalantis flocci in amplum canalem excretorium elapsus , tantum de sua celeritate amittat , quantum lumen habet lumine ejus canalis arctius.

VIEUSSENII (*p*) subtiliorem ductuum divisionem omittimus , qui tres ductuum excretoriorum species fecit , quorum alii ex arteriis nati venis inferentur , adiposi nempe , lymphatico arteriosi , & lymphatico venosi : alii ex lymphatico arteriosis prodirent , ut pancreaticus : alii ex secunda classe nascerentur , ut nerveæ fistulae. Nempe manifesto Vir Ill. vas minorum or-dinum imitatus fuisse videtur.

Sed etiam Cl. J. Daniel KUNTSCHE (*q*) qui ex G. Erhardi HAMBERGERI discipulis fuit , extremum vas secernens internam superficiem vasorum secratorii ambire finxit , ut in ileo intestino , inque duodeno sit.

§ XVI. Muci' cola.

I. Vascula exhalantia

Non eodem modo viscidi succi de sanguine separantur. Ex glandulis
D d d 3 conglo-

(*l*) *De gland. conglobat.*

(*m*) VERDIER in abregé d'anat. HELVETIUS accor. anim. p. 139. de hepatे quidem. Neque recedit Georgius CHARTIERE , qui villum in glandula admittit , quæ secundum Cl. virum , complicata arteria est , *diseases of body and mind* p. 25.

(*n*) PAYER gland. intest. J. God. de BERGEM de natur. duoni. p. 97. *Chartier theory* p. 67. Th. MORGAN physiolog. principi. p. 172. BERGIER in propria disputatio Parisi. a. 1741. proposita.

(*o*) p. 323.

(*p*) *Ty. des liqueurs* p. 129, 130.

(*q*) *De fistula, in genere* n. 36.

conglomeratis nusquam equidem mucus percolatur, nisi mucus est, quem glandulae Cowperianae (r) generant, sed ejus quidem suci indoles parum nota est.

Frequentius absque folliculis glandulosis mucus paratur, quibus certe in exemplis constitutum Naturae folliculos strucentis manifesto innotescit. Nempe quoties per ipsos extremos vasorum exhalantium fines, absque interpositis folliculis, mucosus liquor ad destinata loca excernitur, toties etiam is idem liquor in magnam aliquam caveam effunditur, in qua celeritate amissa stagnet, resorbentium venarum actionem experiatur, & spissescat, aut ab aere ipso addensetur, postquam pars maxime diffinibilis ab aura abrepta est. Ita in testibus mera per vascula semen separatur, quod de muci classe est: idem autem per immensas epididymidis ambages agre emergit, & in ampliori ductu deferente, ejusque cellulis vesicularum similibus, retinetur, inque eorum animalium vesiculis, quæ ejusmodi receptaculum nausta sunt. Ita uterus, & vagina (s), & urinaria vesica plurimum mucum, certis in primis temporibus generant, neque tamen conspicuas glandulas ostendunt. Sed in ipsa quasi muci metropoli, narium nempe cavea, multi recessus sunt, & sinus ipsi pituitarii, in quibus muci quidem vis magna reservatur, neque tamen glandulae ulce apparent. Constat inde, moram esse, quam natura in glandulis simplicibus fabricandis quæsivit, neque ultra ejusmodi glandulas requiri, si alioquin cause, moram facientes, præsto sunt.

Niger ille mucus aversæ faciei uvere pariter ex vasculis exhaleare videtur.

S. XVII. *Glandula simplex.*

Multis tamen utique locis mucus proprium in receptaculum ab arteriis deponitur, in quo collectus restagnet, usque dum ad destinatam sedem suas per causas feratur. Diversa ejusmodi receptaculi figura est & fabrica, rotunda pleraque sunt, longa alia, ductum alia excretorium conspicuum habent, non perinde alia, & aliquorum resecta cryptæ membrana patet, estque pro excretorio canali. Demum & simplices glandulae ejus generantur, & compositæ. De omnibus oportet ex ordine dicere.

Glandula simplicissima est, quæ radicibus linguae adsidet. Figura rotunda est, ut tamen & ellipsoes similes reperiuntur, & circuli. Velamentum ipsum

(r) Vide interim *Comm. ad Præl. Boerb.* T. V. P. I. p. 387. seqq.

(s) Monente hic. *VIEUXSENKO tr. des liquiturs* p. 385.

sis tenuerit, duplex tamen, cum & epidermide confert, & veriori oris membrana. Hanc membranam rubra vascula percurrent: tumet autem, & hemisphaerii fere convexitatem imitatur. Altera pars glandulae ab ipsa lingue carne perficitur, cui crypta insidet, rubra eadem, & perinde vasculis rubris abunde piñta, & pulposa, & tuberculosa. Inter utramque glandulae partem cavea intercipitur, que in oris cavernam per membranæ, in summa hemisphaerii parte satis ampliter resectæ, deliquum patet, eademque via propriis temporibus mucum effundit, quem continebat (t).

Dubium non videtur, in ejusmodi glandulis vascula exhalantia linguæ in caveam folliculi liquorem suum deponere, qui porro presso velamento, elisa cavea effluat. Aqua certe in arterias impulsa ejusmodi secretionem non difficulter imitatur, nonnunquam & sebum (u).

§. XVIII. *Glandula membranacea.*

Aliis locis pars membranacea folliculi major est, & portio carneæ partis, cui folliculus insidet, aut minor, aut denique nulla, ut tota tunc crypta continua, præter ostiolum excretorium, membrana perficiatur, quam simpicitem glandulam potissimum **MALPIGHIUS** descripsit (x), **RUY SCHIUS** cryptam (y) dixit, **BOERHAAVIUS** uberior expoluit(z). Circularis etiam carum glandularum sœpe figura est, ovata alias (a). Solent in cellulosa tela disponi, tegique eodem pulpo velamento, quod majorem caveam vestit, cui ipsi illinendæ mucus folliculi destinatur. Cryptæ involucrum in faucibus & aspera arteria firmum, per intestina tenerius est. Glandulae similes etiam in plantis reperiuntur (b). Villum tamen, quem in ejusmodi glandulae cavam superficiem conspicuum produci & **MALPIGHIUS** (c) scripsit, & ex eo auctore **BOERHAAVIUS** repeti,

ego

(t) Ejusmodi glandulas **MORGAGNUS** depinxit *Advers. Anat.* I. T. I. f. 1, k & descripsit Epist. Anat. III. n. 13. Iconem etiam dedi in diff. inaugurali *de dulci fabrili Coschrivianiano*, que in collectione mea rervsa est T. I. & II. Similern glandularum **PATELLARUM** descriptionem dedit III. **KAUVW** perfir. tipp. n. 153.

(u) **BOERHAAVE** de fabr. gland. p. 37. **KAUVW** l. c. de intellinorum glandulis,

(x) *De gland. conglob.* p. 2. ed. 4to.

(y) *De fabr. gland.* p. 49. 57.

(z) Ibid. p. 3.

(a) **MORGAG.** epist. IX. n. 21.

(b) In receptaculo plantæ *Euse Mem. de l'Acad. des Science.* 1751. T. 22.

(c) p. 10. 31.

ego quidem in folliculis humanis non reperio , nisi tubercula carnis linguae eo traxisse velis , membrana enim tota levis est. In animalibus , inque sinuum classe villus locum habet.

Eiusmodi cryptæ plerumque proprium ductum excretorium noctæ sunt. Cavus , cylindricus , multo , quam glandulæ area , angustior tubulus est , quem & velamentum glandulæ , & epidermis sui communis receptaculi investit. Is canaliculus ex cavea suæ glandulæ , per ejus communis receptaculi involucrum penetrat , inque superficie cava receptaculi aperitur , five os fuerit , five fauces , five aspera arteria , five intestinorum cavea. Preffa crypta , per ostiolum excretorium guttula humoris effunditur , eo osculo major. Huc referto glandulas buccales , labiales , epiglottideas , pharyngeas , œophageas : palati mollis demum , partis posterioris imæ convallis narium , asperæ arteriæ , œophagi , ventriculi , intestinorum solitarias glandulas. Nam de vesicæ urinariæ , & vesiculæ felleæ folliculis , & agminibus intestinorum (e) glandulosis nouidum pronunciaverim (f).

Est ubi glandula manifesta sit , ductus vero excretorius obscurus , mucus tamen intus manifestus , quales in cervice muliebris uteri cæci folliculi sedent. Neque ova , quæ Graafiana vocantur , recedunt , nisi quod liquori coagulabili , potius quam mucoso , replentur.

Contraria exempla sunt , in quibus ductus excretorius manifestus , glandula obscura est , ut in poris septi narium (g) , & secundum basin septi , aliisque narium mucosis foraminibus (h) , in larynge poro (i) , rectoque intestino (k).

§. XIX. Glandulæ ex simplicibus compositæ.

Non uno modo simplices cryptæ in majores glandulas coalescunt. Ali quando unice vicinæ , celluloſo vinculo laxe conjunctæ , suum tamen quæque ostiolum excretorium sibi proprium habent , ut in expansione illa mucosa postremæ & inferioris linguae partis , inque iis laryngis glandulis , quas

M o n -

(e) PEYERI flaresq. II. p. 35.

(f) Spinius dixit RUYSCHEUS thes. Anat. VI. n. 8. 33. & super LIBERKUN-
MIUS. Sed eam item suo loco attingerem malo.

(g) Comment. Boerb. T. IV. p. 49. 50.

(h) RUYSCHEUS thes. VII. p. 41. & 63. Comm. Boerb. ibid.

(i) MORGAGNI aduers. Anat. I. Tab. II. f. 2.

(k) RUYSCHEUS ejusd. Anat. XI. thes. VII. n. 66. T. 1. f. 4.

MORGAGNUS (*l*) Vir ill. arytenoideas vocat. Hæ LOSSII (*m*) Congregatæ sunt.

Alias vicini, perinde numerosi folliculi, & præterea communi velamento obvoluti, in aliquem ejus recessum, multis cryptis perinde patentem, mucum suum deponunt, tonsillarum exemplo. Hæ LOSSIO conglutinatæ audiunt.

Denique alias simplex folliculus suum quidem quisque excretorium duftum habet, il vero ductus ex multis vicinis folliculis in unicum communem canalem excretorium convenient, quas glandulas recte dixeris ex simplicibus compositas (*n*), & sibi ostendi RUVSCUUS petebat (*o*): ex etiam sunt, quæ conglomeratae glandulae similes, opinionem potuerunt facere, etiam eas glandulas ex simplicibus folliculis conponi. Exemplum ex Cl. GALEACII experimento (*p*), in nonnullis intestinaorum compositis folliculis: aliud in ducto cæco linguæ, aliud in narium septo (*q*), aliud ex sinuum classe, continuo dicentur.

§. XX. Sinus mucosi.

Nempe *sinus* vocamus cylindricas, mucosas fistulas, membranaceo velamento factas, quod a suo communi receptaculo habent, cui mucus inmittunt, & ex qua cavea, ipsi sensim in telam cellulofasam exterius circumscriptam oblique producuntur. Resecto quasi osculo in viam urinariam, aëream, cibariam aperiuntur. Rotundos folliculos in hujusmodi sinus patentes non reperi, & in urethra quidem humana interna facies undique levissima est.

Horum sinuum, perinde ut cryptarum, alii simplices sunt, in naribus secundum septi basin, urethra virili, & muliebri, in sinu valvularum superiorum pudendi feminini, in parte ostii vaginæ inferiori, in ventriculo ciconiae (*r*).

Alii

(*l*) Advers. I. T. II. f. 6. b. i. k. L

(*m*) Loss. in cit. diff. n. 35. Citat glandulas œsophagi, ventriculi, intestinorum.

(*n*) BOERHAAVE L. c. p. 25. MALPIGHIUS L. c. p. 3. ad voces proxima succeedunt, & ex genere sebaceo tab. 16. f. 10.

(*o*) De fabric. gland. p. 63.

(*p*) Comment. Bonon. T. I. p. 470. T. I. f. 3. i. i. t.

(*q*) Comm. Boerb. T. IV. p. 50.

(*r*) WASSER epib. nat. cur. deg. l. ann. II. obs. 251.

Alii ex multis sinus, ad arboris modum in unam majorem lacunam per ejus latera immisiti, coalescunt. Ejusmodi sinus compositos etiam urethra virilis habet (*s*), eoque referti possunt ductus mucosi recti intestini, qui in valvularum rectarum intervalla aperiantur. Huc etiam tubuli ramosi ventriculi fibrini pertinent (*t*). Analogia inter hoc villorum genus est, & cæca receptacula mucosa piscium, quæ ventriculos numerosa ambire solent (*u*). Villis intus hirsuti sunt & ipsi in avibus fibrisque, homini perinde leves.

S. XXI. Humorum gelatinosorum organa secretoria. Vascula exhalantia.

Etiam pro hac humorum classe natura non unius generis colo utitur. Plerisque nempe locis utique ex arteriis, absque folliculorum ambagibus nascuntur, aut glandularum, qui etiam ex reseptis arteriis in vulnere sponte plorent.

Porro idem gelatinosus humor ex arteriis rubris in vasa lymphatica expedit transit, oleumque, quod ex terebinthina stillat, rubro colore tintum, inque arterias abdominales impulsum (*x*), non multo labore in hepatis lymphatica vasa, inque lactea, & ductum demum thoracicum agitur, continuos certe per canales, inque cellulosa tela manusurunt, si in eam se diffudisset. Sed neque glandulas ullas hic arterias inter, & lymphatica vascula interponi, absentia nodulorum ostendit (*y*).

Iterum idem gelatinosus humor in omnes & parvas, & magnas corporis humani caveas & celeriter effunditur (*z*), & pari velocitate, qua per arterias exit, etiam per venulas resorbetur. Ipsum piscium gluten, per easdem vias, in cerebri, pectoris, pericardii, peritonæi, omenti caveas, minoreisque in toto corpore cavernulas facilissime exit, nullo iterum nodulo interposito, qui inter arterolas porumque exhalantem intersit, humorumque retineat, atque ab ea mora grandescat. Proxime a sanguine in fetu ejusmodi humor abesse monuimus, qui totus undique rubeat.

S. XXI.

(*s*) *MORGAGN. advers. Anat.* T. 4. f. 4. D. D.

(*t*) I. c. Et illi vero, & cœcumque tubuli intus villosi sunt.

(*u*) *RÉDI de animal. intr. anim.* T. 4. f. 1. 2.

(*x*) Confer etiam *Petri TARIX problema anatomicon* a. 1742 editum, inque nostra *dissertationem anatomiarum collectione*, ejusque *supplemento* recusum.

(*y*) I. II. p. 109.

(*z*) I. II. p. 99.

§. XXII. *Glandulæ. I. Conglomeratæ.*

Non ideo omnes omnino humores, qui ab igne, aut a stillatitio vini liquore coguntur, ea in coli simplicitate nascuntur. Nam in renalibus quidem conglomeratis glandulis succus rubescens & coagulabilis separatur: deinde in omnibus dearticulationibus corporis humani viscidissimum albumen est, cuius dotes exposuimus (*a*), & a quibus omnino ad gelatinosorum humorum classem revocatur. Ejus non una, sed tamen etiam glandulosa origo est. Utique enim persuaderet, in articulationum caveas vaporē de arteriis exhalare (*b*), cum nulla in corpore humano cavea sit, in quam ejusmodi vapor non exeat.

Conglomeratae primum glandulae, in majoribus & in minimis etiam de-
articulationibus reperiuntur, cum etiam inter commissas sibi laryngis carti-
lagines lacinia (*c*) ejusmodi se interponat. Ex numerosis eae acinis (*d*)
componuntur, crassiorique basi in aliquo ossium recessu sedent (*e*), quo
defenduntur, ne in motu ejus articuli vehementius contritæ lœdantur (*f*).
Alter limes, versus cœvam articulationis conversus, in tenuem aciem
gracilescit (*g*), quæ crenato fine fuita, muco tamen plerumque adipe
comprehensa, qui idem eas glandulas amat ambire, ut nuper Cl. viri
omnino totas glandulas aut pro adipe habuerint (*h*), aut de ea quæstione
ampliate ma'ucrunt (*i*). Sunt tamen in his glandulis firmi, rubrique aut
flavi acini, quos cavos esse, ex conjectura doceas (*k*), neque tamen aut
nudo oculo, aut vitris convexis adjuto, ostendas (*l*). Velamento obdu-
cuntur celluloto, quod cum perichondrio continuatur. Sed neque cylin-
dricos ductus, muco articulari plenos vidi, qui in tenui fimbriæ acie ape-
riantr, et si celebres anatomici sibi visos describant (*m*). Poros alii ha-

Ecc 2

(a) p. 365.

(b) Etiam ill. Monros: conjectura est of bones ed. ult. p. 48.

(c) Монаги, advers. I, p. 15, advers. II, p. 53.

(d) WINSLOW *traité des os sains*, n. 48. BERTIN *ostéolog.* T. I, p. 471.

(f) HATERS p. 154.

(f) IDEM ibid. Всегда p. 174-182.

(g) HAWKES p. 194.

(b) LIBTAUD *essays* *matériel*, p. 21.

(i) *Recherches sur les glandes* p. 337-338.

(4) Vesiculas sibi visas describit Cl. H A V E R S p. 191. Arinos forte vidit, suo albumine turgidos.

(1) Vide quæ contra eos folliculos *Morganus* nonnūt *adversat*. II. p. 55.

bent (*n*) & ipsos mihi ignotos (*o*). Haec carunculae vasculis numerosissimis pinguntur (*p*) arteriosis venosisque; quorum trunculos paucim descriptos dedi (*q*). Nervos anatome non ostendit. Habent utique, si vere dolent (*r*). Sed in doloribus articulorum veram sedem tormenti nondum fatis definitam habemus. Tota massa mollis est (*s*), etsi acini firmiusculi sunt. Tenuorem esse gelatinam, quam istae conglomeratae glandulae parant, Ill. auctor est, Abrahamus KAANUW (*t*).

Has glandulas veteres, excusabili certe errore, cum adipem confuderunt, eoque nomine descriptis Carolus STEPHANUS (*u*), non indoctus iconum RIVERIANARUM interpres. Sed etiam alia apud antiquitatem harum particularum vestigia, pro sua plurima eruditio, J. B. MORGANUS (*x*) detexit. Cum vero fusi, & per singulos articulos a Cl. viro Clapton HAVERS (*x*) descripta sint, solent ejus viri nomine, tamquam sui inventoris, cluere; ipse tamen Guilielmum COWPER (*z*), notissimum incisorem, in partem laudis adoptat.

§. XXIII. Sigillatum recensentur.

Liceat, ut in congregatis glandulis, ire per lingulas. Primum fere innotuerunt, eademque grandissimæ sunt, que inferioribus in corporis articulationibus ponuntur. Maxima ergo glandula sedet in deliquio acetabuli pelvis, quod ad recipiendum os femoris ex tribus ossibus coalescit, & in ea parte, a qua cartilaginea crusta abest (*a*): eam multus adeps ambit. Alia parva, plana, crenata, in sovea capitii femoris est, penitus ab ista diversa,

(*n*) BERTIN I. c.

(*o*) DUVERNEY *malad. des os* T. II. p. 353.

(*p*) RUYSEN advers. III. n. 3.

(*q*) In acetabulo femoris, genu &c. *Fisiol. Icon. Anatom.* IV. Arteriolam habet BERTR. T. IV. p. 43.

(*r*) MONROE *of the bones* p. 51. edit. nov. De glandula acetabuli femoris affirmat.

(*s*) HAVERS p. 191. CL. BERTIN T. IV. p. 63. WINSLOW n. 69. CAZELLES *osteograph.* nov. c. VI. BERTIN p. 173.

(*t*) *De periop.* n. 870.

(*u*) *De diffid. corp. hum.* L. I. c. 22. 24.

(*x*) *Advers. Anat.* II. anatomar. 22. p. 52.

(*y*) In *osteoologie discourse* IV.

(*z*) p. 187. edit. 1691.

(*a*) Conf. HAVERS p. 190. 196. COWPER *append. ad Bibl.* T. 32 f. 2. 3. PITCHEL *de anningia articul.* n. 17. BERTIN T. IV. p. 32.

diversa, & præterea ocellulosa pinguis tela, vesiculis acinorum similibus plena, cingit insertionem ligamenti teretis (*a**).

Patellam, quæ cum imo femore committitur multæ, glandulæ ambeunt; quas plurimus adeps obvolvit. Eas pro unica glandulosa massa J. BENIGNUS WINSLOW (*b*) numerat, pro tribus Clopton HAVERS (*c*), qui posteriorem, superiorem & inferiorem recenset. Duas reperio, anteriorem & posteriorem, discrptam utramque, inter tendineos lacertos insertiones patellæ. Denique retro patellam globosus adeps, sive bursula glandulosi habitus, inter patellam & ligamentum extensorium ponitur.

In ipso poplite, inter femoris condylos, alia glandula insidet ligamento decussato anteriori (*d*), duæque aliae in ea sede, qua ligamenta decussata se proprius respiciunt (*e*), in angulo inter ligamentum transversum fibulam tibiamque imam conjungens. & faciem articularem malleoli externi. In tibiæ conjunctione cum fibula insignis glandula in lateris externi imæ tibiæ depresso facie (*f*) ponitur. Altera minor est, in fovea minori fibulae, pone externum malleolum (*g*).

In facie inferiori tali una utrinque glandula, insignis utraque longitudinis jacet (*h*), alia in cavitate inter facieculam articularem majorem & tibiam: alia ad finem posteriorum tali.

Parvæ etiam in articulis ossium metatarpi, & digitorum (*h**) reperiuntur.

Non perinde aut grandes, aut vulgo nota sunt, quæ ad superiorem partem corporis humani pertinent. Et primo glandula ex minoribus granulis composita, limbo menisci cartilaginei, condyllo maxillæ inferioris imposita, adnascit (*i*), & alia, quæ in posteriori parte cavitatis glenoideæ temporum a Cl. PITSCHELIO describitur (*k*).

Qua occiput adtingit epistropheus, suam utrinque glandulam oppositam habet (*l*).

Eee 3

Vertebrae

(*a**) BERTIN T. IV. p. 15.

(*b*) I. c. n. 186, 187.

(*c*) p. 198. cum icono. Conf. PITSCHEL n. 15. DUVERNEY L. c. T. III. p. 164.

(*d*) WINSLOW L. c. PITSCHEL n. 15.

(*e*) PITSCHEL L. c. WINSLOW n. 183. 189. DUVERNEY.

(*f*) PITSCHEL n. 16. cum icono. BERTIN T. IV. p. 86.

(*g*) PITSCHEL L. c. BERTIN T. IV. p. 86.

(*h*) PITSCHEL n. 17.

(*h**) BERTIN T. III. p. 481. 482.

(*i*) COWPER append. f. 8. t. MORGAGNI l. c.

(*k*) PITSCHEL n. 5.

(*l*) HAVERS p. 195.

Vertebræ cuilibet, in utraque fossa, quæ costam recipit, sua est glandula, inferiori tamen in foveæ parte major (*m*).

In scapula majuscula glandula ad insertionem tendinis bicipitis anterius supercilio ejus acetabuli inminet (*n*): altera trans eum tendinem non longissime distat (*o*). Articulus humeri nullam habet.

In humeri cum cubito dearticulatione alia magna glandula ponitur, in posteriori facie trochlearum humeri, super olecranum, coacta pinguedine cincta, cum paucis acinis, (*p*), in anteriori alia (*q*) quam ita recentet Cl. PITSCHEL, ut duas faciat (*r*). Alia in humero est, sed super trochleam radiale, hæc minor a bicipitis tendine velamentum nacta. Alia in exigua tuberculi radii foyeola fedet (*s*); in ulna alia (*t*), qua radio se adaptat, & alia iterum in ea parte, qua processus coronoideus ab olecrano distinguitur (*u*).

Ad ulnæ cum radio commissuram glandula posterior, eademque major, ab ulnæ processu stili simili, ad parem in radio processum educitur (*x*). Duæ aliae anteriores ad latus interius, & posterius ulnæ adponuntur (*y*). Ab intervallo facieculæ articulatoriæ ossis navicularis & semilunaris, ad intervallum duarum dimidiarum facierum levium radii, & ligamentum, quod huic incumbit, lacinia vasculosa & glandulosa extenditur. Reliquas inter minores glandulas articulares recentibimus.

Sunt etiam minores aliquæ, non in articulationum adeo caveis, sed aliis in ossium foveis repositæ, qualis quidem in eo ossis recessu est, quem major trochanter protegit (*z*).

§. XXIII. *Glandulæ minores.*

Minus alterum genus glandularum articulationibus præpositorum est, cuius minuti acini non perinde sibi vicini sunt, neque in alium majorem acervum congeruntur, et si non ideo continuo pronuntiare licet, de simpli-
cium

(*m*) HAVERS ibid. PLATNER Chirurg. p. 1133.

(*n*) HAVERS, PITSCHEL n. 8. Conf. BEXTIN T. III. p. 300.

(*o*) HAVERS p. 196. BEXTIN T. III. p. 474. WINSLOW n. 357.

(*q*) HAVERS ibid.

(*r*) I. C. p. 10.

(*s*) BEXTIN I. C. p. 475.

(*t*) PITSCHEL I. C.

(*u*) IDEM ibid.

(*x*) IDEM n. 11.

(*y*) IDEM ibid.

(*z*) BEXTIN T. I. p. 178.

cium glandularum genere esse (*a*). Earum humorem crassiores esse, Cl. KAUVIUS monuit (*b*).

Horum acinorum duplex in primis sedes est: plurimi in omnibus capsulis articulos continentibus ponuntur, & intervalla fibrarum capsulam efficientium tenent (*c*), disgregati, & quæ inter se magnitudinis (*d*), non earum glandularum dissimiles, quæ in dura membrana cerebri, per fibrarum perinde intervalla sedent. Hæ capsularum rimæ non patent, & membranulis propriis clauduntur, ne utilis humor elabatur (*e*). Hujusmodi glandulas III. MAGNUS in ea capsula descripsit, quo genuum articulatio continetur.

Aliæ glandulæ minores paucim (g) reperiuntur ad eonfinia ligamentosi vementi, quod capsulam articulationis vocare solent, qua de cartilaginis sui ossis fine fecedit. Eiusmodi acini sunt in claviculae cum sterno commissura (*h*): in dearticulatione humeri cum scapula (*i*): in conjunctione humeri cum cubito (*k*): cum radio (*k**), circa collum radii (*k***): ad cubiti cum carpo articulationem (*l*), & radii cum carpo (*l**) in tota facie interna capsulæ articulationis, quæ ad radium respicit, in ossium carpi & invicem & cum metacarpo (*m*) conjunctione: in commissuris articulorum digitorum (*n*): costarum cum sterno (*n**), eatumdem cum vertebrais (*o*): in condylorum femoris inferiori fine (*p*): in ambitu cartilaginis patellæ (*p**): in capite tibie circa adhæsiones ligamentorum decussatorum anteriores & posteriores

(*a*) Etiam in grandioribus RUTSCHIUS glandulosam fabricam negavit Advers. III. n. 4.

(*b*) De perspirat. n. 571.

(*c*) BERTIN T. I. p. 176. GORTER Chir. p. 57.

(*d*) HAVERS p. 190.

(*e*) BERTIN I. C. p. 185.

(*f*) I. C. p. 53.

(*g*) BERTIN p. 175. WINSLOW n. 357. &c.

(*h*) PITTSHELL n. 8.

(*i*) IDEM n. 9.

(*k*) IDEM n. 10. BERTIN T. III. p. 413.

(*k**) ib.

(*k***) I. D. ib.

(*l*) IDEM n. 11. BERTIN T. III. p. 475. 476.

(*l**) BERTIN III. p. 473.

(*m*) PITTSHELL n. 18. BERTIN ibid. p. 477. 478. DUVERNEY I. C. p. 354.

(*n*) PITTSHELL n. 13. BERTIN ibid. p. 481.

(*n**) Col de VILLEARS cours de Chirurg. p. 91. de primis sex costis.

(*o*) BERTIN T. III. p. 129.

(*p*) BERTIN T. IV. p. 63. DIONISIUS contra ANAT. p. 116.

(*p**) BERTIN p. 70. 71.

res (*q*) : in fibulae cartilaginea faciecula (*r*) : in tibiae & fibulae epiphysi inferiori (*s*) : in depressionibus lateralibus ossium tarsi , metatarsi , digitorum pedis , non incrustatis cartilagine (*s**) : in vaginis tendinum , qui manum pedemque (*t*) , & utriusque digitos flectunt : in corporis cujusque vertebrarum fovea (*u*) : in anteriori & posteriori arcus vertebrarum sede concava (*v*) : in ligamentoso aliquo sulco , per quem mobilis tendo transeat (*y*) . Aliæ exteriore articulationum viciniam circumstant (*z*) , ut tamen subinde liquorem suum in ejus caveam effundere possint (*a*) , minime ex , & a pinguitudine ægrius separabiles (*b*) . Eas vero ignoro , quæ a Cl. viris circa membranam communem muscularum (*b**) descriptæ fuerunt .

Viscidum albumen cum omnes fecerant , non dubium est quoties in vita inertiiori compressio legitima deficit , vitiouse eas intumescere (*c*) .

Prater glandulas multus verusque in articulationibus utique adeps est (*h*) . Ex eo adeo , & ex medulla ossium , exque perspirabili liquido , & glanduloso muco , unguen articulare componitur .

§. XXV. Vix quibus humores oleosi de sanguine separantur.

Etiam hoc liquorum humanorum genus diversis in colis generatur . Ut a dilutioribus initium faciam , lac quidem mammarum partim in glandula conglomerata separatur , partim ir cellulosa tela (*e*) , quæ suum humorem exhalando recipit . Lac uterinum & vaginale exhalat , absque glandulosâ fabrica .

(*q*) BERTINI L c. p. 70. MORGAGN. *Advers.* II. p. 53. DUVERNEY L c. Ad interoris imprimit ligamenti insertionem .

(*r*) BERTIN L c.

(*s*) Idem ibid. p. 85. 86. In tali articulo KNOBLE luxat. art. sup. p. 10.

(*s**) BERTIN T. IV. p. 165.

(*t*) DUVERNEY p. 355. MORGAGN. *Advers.* II. p. 18.

(*v*) DUVERNEY *Journal des Sciences* 1699. n. 22.

(*x*) COWPER ad BIDLOUM , MORGAGNI L c. p. 63.

(*y*) HAVERS p. 200. GOTTER *Chirurg.* L c.

(*z*) BERTIN T. L p. 177.

(*a*) IDEM p. 179.

(*b*) Conf. Idem ibid.

(*b**) ANGELOCRATOR de glandibat. RUSSEL *anatom. anim.* p. 9. Vocat colgomeratus.

(*c*) DUVERNEY p. 357. REIMARUS in egregia disput *de tumoribus ligament.* p. 29.

(*d*) De pede WALTHER *de ligam. artic. ped.* p. 324. edit. nostrar.

(*e*) Ut ex loculis experimentis conitat , quæ alibi melius legentur .

fabrica. Lac prostaticum in glandula singularis generis gignitur, cellulosae telæ stricte & addensatæ simili, aciniisque conspicuis destituta, ut sint Cl. viri (*f*), qui omnino negent glandulam esse, succumque prostaticum manant ab invisibilibus acinis repetere, qui in ea celluloitate lateant. Lac glandularum lymphaticarum ex arteriis in cellulosum habitum videtur exhalare (*g*). Lac thymi in glandula conglomeratarum simili sed molli, in cellulosas pariter cavernulas exsudat.

Bilis, quæ aliquanto spissior est, in viscere generatur, cūjus acini ex vasculis conponuntur.

Adeps in cellulas de minimis arteriolis perspirat (*h*).

Cerumen adiposum, inflammabile, amarum, fluidum, oleoque simile, dum recens est, evidenter in glandulis simplicibus percolatur, quæ inter fila cellulosæ telæ per areolas disponuntur, ductuque suo cutem meatum auditorium oblinientem perforant (*i*). Ejusmodi glandulæ, muciferarum totæ similes, membrana fiunt, quæ rotundæ caveæ se circumponit.

Sebum subcutaneum in glandulis quidem nascitur, fluidum oleique simile (*k*): omnium humorum humanorum idem spississimum, lente pastæ naturam induit, atque fccæ lemæ, quoties diutius adservatum exarvit, etiæ etiam hujns sebi alia species alias fluiditatem superant. Butyrosum adprimis est, quod auricularum partem convexam obungit; oleofum, quod in plica inguinis, inque alis reperitur, inque clunibus, scapulis, cervice, & femoribus (*l*). Siccius est, & in crustas densabilis, quod in nympharum convexitate, in glandis virilis corona, in umbilici (*m*), & mammæ areola, in lacrumali caruncula (*n*), in concha auriculæ, in narium aditu paratur. Spississimum etiam est, sed unguenti simile, inque vermiculos amat figurari, quod de poris convexi nasi exprimitur. Neque castoreum, zibethum, moschus ex variis animalibus sumitus, ab unguenti similitudine recedit.

Fontes, qui sebum separant, non ubique sunt iidem. Cum ob brachii violentissimam a lapsu contusionem continuis sex septimanis humerum corpori

(*g*) L. II. p. 286.

(*h*) L. I. p. 35.

(*i*) Conf. Comm. in Praelect. Goerk. T. IV. p. 320. 331.

(*k*) BOERHAAVE de fabric. gland. p. 9.

(*l*) MORGAGN. Advers. I & IV.

(*m*) IDEM Advers. IV. p. 59.

(*n*) Adept. I. T. 4. f. L.

Aliæ glandulæ sebaceæ compositæ, ductus suos excretorios in unum communem canaliculum conjungunt. Exempla inter maiores glandulas compositas nasi (*b*), & faciei reperta sunt, tum in glandulis ejus odoriferi animalis (*d*), quod nuper excitavi, & zibethicæ felis (*e*).

In sinibus sebum palpebrale nascitur, & quidem oblongis, ramosis, in unum intestinulum confluentibus, cæcis folliculis (*f*). In eas glandulas per arterias Ruy schaus suam ceram usit (*g*).

§. XXVI. Peroratio.

Ex his omnibus colligitur, glandularum & organorum secretoriorum magnam varietatem esse, & parum omnino videri, quod diversæ glandularum classes commune habent, cum neque fabrica converiant, neque facie (*h*), neque functione: ut omnino ægre definitionem invenias, que & simplicissimam, & cōglobatam; & conglomeratam glandulam comprehendat. Quare utilius futurum videtur, si diversa his classibus nomina imponerentur: neque id omne glandulæ nomine comprehendendi velle*m* (*i*), quod humorem de sanguine separat, ex quo certe consilio confusio augetur.

Cæterum, per eadem adparet, glandularum veras classes esse; cōglobatas; simplicissimas, & quæ ex iis conponuntur, quo sinus referimus; & glandulas conglomeratas. Denique & viscera inter colâ esse, per quæ humores de sanguine secedunt, & arteriarum fines exhalantes. Harum classium prima, cōglubata, ad lymphatica vala spectat. Altera simplex separat de sanguine mucum, oleum, sebum: tertia conglomerata aquam, gelatinam, lac. Viscera aquam, & lac, & oleum humorem generant. Arteriæ, absque alterius organi auxilio, aquam, mucum, gelatinam, oleum, omnium hæmpe classium humores.

Fff 2

S E C-

(*b*) MORGAGN. Epist. III. n. 4.

(*c*) MALEPIGN. posthum. p. 54. T. 16. f. 10.

(*d*) Mem. de l'Acad. des Scienc. 1731. p. 444. T. 4. tot.

(*e*) DREFLINCOURT apud BLAS anat. anim.

(*f*) ZINN d. fabric. o. ul. T. 7. f. 8.

(*g*) Th. f. anat. X. n. 114.

(*h*) Ex quis HESTERUS glandulæ characterem sumere jubar Compend. Anat. ade-

mogr ph. P. II. & in MAUCHARTA disp. de vera glandula appellata.

(*i*) PEYER parerg. p. 82.

S E C T I O III.

Causæ quæ faciunt, ut in definitæ fabricæ organo suus constanter humor de sanguine separetur.

§. I.

Multa difficultior pars operis exigenda supereſt. Quæ hactenus exposuimus de humorum indole, colorumque fabrica, de iis quidem oculorum conſtat auctoritate. Quando vero declarare oportet, quare per suum quodque organum proprius humor unice separetur, multa certe pars veri in elemen-torum corporis animati ignorata fabrica latet, de quibus aut filere necesse fit, aut conjecturis, non absq[ue] temeritatis metu, aliquanto propius ad rerum naturam accedendum. Ostendendum est adeo, quare, dum sua corpori integritas conſtat, in parotide & ſemper ſaliva, & nunquam aliud humor de ſanguine fecedat; in hepate & bilis unice & ſemper, in rene urina generetur, neque conversis colis, in ſalivali glandula urina, ſaliva in rene, bilis in mamma, mucus in ſebi cryptis, naſcatur.

Auget certe operis difficultatem, ſpemque minuit noſtram, quod inter diuersas classes humorum quæque non unice, in unicæ fabricæ colo, de ſanguine fecernatur. Id ſi foret, id ſolum quærendum eſſet, quomodo ejuscoli fabrica ad indolem ſcreti liquoris ſe habeat. Nunc horum contraria locum habent: nam (k) aquosi ingenii humores & per continua vascula, & per con-globeratam glandulam generantur, oleosi vero generis ſucci omnino per omnia fere colorum genera fecernuntur. Hæc meditato, continuo metus ſubnaſcetur, non in cognita ſensibusque accessa fabrica cauſam diuerſi in ſuo liquore characteris poni, ſed utique multo profoundius, inque organi ſecretorii conditionibus ſenuſum aciei inacceſſis cauſam latere, quare in quo-que organo ille humor, neque aliud ſeparetur. Quare non ignari, quan-tas per tenebras ſit incedendum, conabimur ea prima proponere, de qui-bus aut certa ſenuſum fide conſtat, aut quo breve omnino ex rerum natura peritum filium ſponte ducit. Inde ea addemus, quæ conjectura fatigat ſup-pedita-

(k) p. 411.

peditare, non absque justi metus testimonio. Denique, ne aliorum auctorum placita desiderentur, etiam ea breviter adtingemus, quæ ne probabili quidem conjectura, sed hypothesi unice mera nituntur.

§. II. Conditiones¹ præparantes. I. Sanguinis ad colum delati diversa natura.

Ab iis caulis diversarum secretionum initium faciemus; quæ extra ipsum colum quasi sitæ sunt. Diximus (*1*) in sanguine omnes humorum classes reperiri, quas diversa per cola de sanguine oportet separari. Nunc minime dubium est, quæcumque sit humoris aliquo in organo secretorio percolati natura, facilius ejus humoris separationem iri intellectum, si ad ipsum organum sanguis veniat, qui quam plurimis ejusmodi particulis plenus fuerit, quales per id colum secedere videmus: Adeo certe id verum est, ut in quoconque organi secretorii genere quicunque humor nascatur, dum sanguis eo humore vehementer imprægnatus fuerit, bilis exemplo, quæ omnes per glandulas, viscera omnia, halituosaque vascula (*m*) exit, quando sanguis retenta bile inebriatur, & urinæ, & argenti denique vivi, quod per ipsos cutis (*n*) poros, perque oris exhalantes villos (*o*) manifestissimum erumpit, quando plurimum in sanguine receptum est.

Nunc, in fano homine quidem ita sanguis contemperatur, ne ullus humor tanto cum vito abundet. Verum etiam in sanissimo homine non tamen penitus idem sanguinis ad quamque corporis partem euntis ingenium est, valdeque probabilis conjectura est, quæ fidem sibi faciat apud invitum, ad hepar ejusmodi sanguinem mitti, qui præcipua bilis elementa copiosiora advehat, quam quisque alias, aliud ad viscus delatus sanguis. In hepate enim & oleum de mesenterio, de mesocolo, de omento resorbunt, & subputrida ex intestinis aquila, denique jam propior urinose indoli fecum alvinarum succus copiosissimus advenit (*p*). In bilis vero natura & adeps dominatur, & acrimonia, quæ ad urinofam volatilem salem accedit.

F f f 3

Non

(*1*) p. 368. seqq.

(*m*) Quando totus sanguis unius generis humore plenus est, ea species per omnia colla separatur SAUVAGEZ physiol. p. 181.

(*n*) Ex vulnero veicatorii effluxit London Magazin 1755, suplern.

(*o*) Ut aurum dentibus preheusum dealbent, quæ consistens de metallariis Idrie fama est.

(*p*) Prim. Litt. Physiol. p. 683.

Non perinde in alio quocunque colo sanguis, peculiari jam indele insignis, aque aliorum viscerum sanguine diversus adferri potest. Per arterias enim advenit, quocunque alia colla habent, is autem sanguis a corde veniens commissa de penu sanguinis dimittitur. Est tamen etiam de isto sanguine valde probabilis conjectura, certas ad sedes aliis, quam ad alias, affectionibus imbutum sanguinem advenire. Si in capite humor omnium subtilissimus & mobilissimus generatur, non est absolum, in sanguine per carotides submissis, etiam ejusmodi volatiles, atque aqua, oleo aliquique sanguinis elenctis subtilliores particulas abundare. Cum enim a duabus contrariis potestatibus diverse sanguinis particulae regantur, a pondere, & a motu a corde accepto, quorum illud ad inferiora sanguinem deducit, hoc autem rectissima via ad cerebrum pelit, non dubium videtur, descensuras de arcu aortæ eas particulas (*q*), inque abdomen se conversuras, quæcunque pondere magis valent: ad censuras adeo ad caput, quæcunque levissimæ, mobilissimæ, minori vi deorsum trahuntur. Cum enim ejusmodi particularum motus ex pondere & cordis vi componatur, potest hiberi pro duobus parallelogrammi lateribus, quorum laterum alterum gravitatio est, alterum motus a corde acceptus, diagonalis autem linea medium iter exprimit, qua sanguis ab his duabus viribus simul follicitatus progrederit. Quo minor est gravitatio, eo majori portione motus a corde acceptus superat: quo majus est pondus, eo potentius in arcus aortæ partem inferiorem detrahitur, superata cordis vi. Particulae enim, in medio aere natantes, etiam in sanguine superiora tenebunt, & a cordis communi vi in caput mittentur, a minori vero pondere debilius, quam ullæ aliæ, in aortæ inferiores ramos follicitabuntur. Iude videtur intelligi, quare camphora (*r*), spiritus vini, aut vapor volatilis aquarum Pyromontanarum continuo in capite efficaciam suam expediant (*s*), & stuporem aliquem, aut plenam demum ebrietatem, prius inducant, quam in ulla alia corporis particula mutent quidquam. Huc etiam pertinere putas, quod venena maxime volatilia, & variolosum potissimum miasma, in facie inprimis suam violentiam ostendant, quæ tamen a perpetuo aeris adflatu potius densiore cutem, quam aliæ partes corporis nacula fit. Nescio an hoc non pertineat, quod opium (*t*), aliaque in cerebrum effica-

(*q*) WINTERTONI *de podagra* p. 59.

(*r*) *Princ. Lin. physiolog.* n. 339.

(*s*) *De contexta parte arcus aortæ erumpunt ex particulis, quæ vi centrifuga magis valent* P. MICHELOTTE, MARTINE *de antro fonsil*, p. 58.

(*t*) *Cann tolerata opii innumensam vim, & ad duas drachinas absque periculo devorat* SPENSER *Exp. 23*.

efficacia venena homini , etiam in minima dosi plus noceant , cui cerebrum majus , ampliores pro portione carotides , & caput erectum sit . (t*). Non nimis tamen haec oportet ornasse , cum ex eadem carotide mucus etiam , & adeps , & sebum , & succus ossium nutritius , adeoque viscidii & inertes succi generentur .

§. III. Particulae certae indolis ostiis secretoriis oblate .

Etiam alia consideratio hoc adferri solet . Ex corde utique rectior via (u) per dextram carotidem , deinde per sinistram ad caput dicit , dum & subclavie arteriae , & aorta inferior , cum linea ex ostio aortie producta , aut angulum rectum , aut demum acutum , intercipiant . Nunc & cum mathematicis demonstrationibus convenit , & cum experimento , inter varii ponderis particulas , communi a potentia propulsas , rectam lineam , primamque directionem eas tenere , quæcunque gravissimæ , & præterea rotundæ sunt . atque adeo & momentum plurimum habent , & ad resistentias superandas aptissimæ factæ sunt : minusque adeo & ob superficiem minimam , & ob maximum momentum , ab alia quacunque causa de linea , quam tenent , se dejicere sinunt . Notissimum C A R T E S I I (x) sclopetum est , quo projectæ plumbeæ sphæræ , & ligneæ , & subereæ , ea lege progressæ sunt , ut rectissimam viam plumbeæ tenerent , reliquæ ad latera dispergerentur , quæcunque leviores essent . Id experimentum , ad humanum sanguinem translatum , videtur persuadere , rotunda , eademque innato pondere plurimo feta corpuscula , de corde projecta , ea lege ferri , ut axin aortæ teneant (y) , leviora vero quæque , & quæ maxima cum superficie minimum habent veri corporis , ad latera vergere . Iude non unum corollarium sequitur ; ponderosissima nempe & levissima corpuscula de corde projecta , ob viæ rectitudinem in carotideni utramque , & in dextram potissimum , inque caput adeo venire : uti certe argentum vivum , levissimum , ponderosissimum , rotundissimis factum globulis , in capite , inque

(t*) Addebat III. vir H. B O E R H A A V E , in lotio , etiam abundantis vini spirito hominis , alcohol non reperi , ejusmodi ergo particulas ad caput non ferri E lem , chem T. H. P. 10. c. 93. Conf. Baltazaris Ludovici T R A L L E S elegantiissimum de opio librum p. 210. seqq.

(u) Oktendetur L. X. Sect. I.

(x) De formato fetu p. 213. P A T E N in diff. Ergo variis humoribus separandis varius motus.

(y) Fr. B O I S S I E R diff. des medicaments W I N T E R I N G H A M l. c. p. 49. N E I F E L D de secreto n. 163. seqq.

inque salivalibus glandulis suas vires demonstrat. Neque haec speculatio priori contraria est, hic enim non ob minus pondus, sed ob viæ rectitudinem cerebrum aditur.

Sed aliud latiusque patens corollarium inde fluit: in arteriis nempe ubique, deinde etiam in arteriis secretoriis, globulos rubros manifesto ponderosiores, arteria axin tenere (*z*), atque adeo ad venam continuatam properare, dum leviores, & minus ad motum aptæ particulæ, adiposæ & mucosæ, ad parietes arteria accedunt. Sed in iis parietibus ostiola excretoria sunt. His adeo ex particulae se offerunt (*a*), adque separationem festinant. Facile certe vidi, in meis etiam experimentis, quoties torrentis modo sanguis de inciso vase se præcipitat, globulos rubros centrum tenere, quos nebula pallidior, inque ambitu tota alba ambit (*b*). Sed etiam in anatomicis vasorum repletionibus, quando injectum, cinnabarieque tinctum sebum stagnavit, in centro ponderosissimam cinnabarim, albumque fere & decolor in ambitu sanguis reperio (*b**). Denique crustis, quæ aneurysmata aortæ obducere solent, rubræ & cruentæ medium tenent tubuni, leviores albæ serosæque exteriorem ad parietum viciniam adhærescunt.

Alia etiam exempla sunt, aliom ad certa colla sanguinem duci, quamquidem ad alia separationis organa, quæcunque demuni eorum exemplorum causa sit. In choroidea certe oculi tunica arteriæ sanguineæ spadiceo & castaneo colore sunt, inter uvas vero membranas, & in ciliari anulo omnino decolores: ex iis vero arteriolis, earumve ramulis, aquosum humorem exhalar probabile sit. Aliud exemplum BOERHAAVIUS proponebat; seminalem arteriam (*c*) putabat omnem suum sanguinem todali venæ tradere, donec decolor ipsa, & humore solo plena, qui sanguine tenuior sit, ad interiora testis locumque veniat, quo serum generari oporteat. Iterum in cortice cerebri (*d*) simile artificium locum credit habere: in eo enim non de rubris vasis, sed de cinereis arteriolis, tenuioremque sanguinem

(*z*) L. VI. Sect: I. n. 8.

(*a*) Joſephus del PAPA de hamor. c. 7. p. 100. Job. de GOLTER. de secre. I. n. 25. Joſephus LIUTAUD physiolog. p. 169.

(*b*) Second Mem. sur le mouv. du ſang Exp. 154* 167. 176: 177. 180. 182. 183. & p. 302. 304.

(*b**) Cera diverſorum colorum iniecta separatur Nux dud. aquos. p. 85.

(*c*) Hift. ri Med. n. 262. Praedict T. II. p. 541. T. V. P. I. p. 282. In nuperioribus codicibus de ea peculiari arteriæ seminalis praerogativa cepit dubitare.

(*d*) Idem I. c. n. 274.

guine humorem vehentibus vasculis, nerveus ille subtilissimus succus separatur. Et in universum hoc III. Viti (e), atque VIEUSSENII (f) theorema pertinet, quo humores subtiliores non ex rubro primove arteriae genere parati docent, sed ex aliquo minorum arteriarum ordine, qui aut absque sanguine lympham flavam, aut tenuiorem etiam absque sero vel sanguineum humorem vehat. Ita fiet, ut ad ostiola secretoria neque sanguis se offerat, neque alii crassiores humores atque simplicius, puriusque, exque paucioribus mistum liquidum sit, ex quo destinatus succus separatur. Intelligitur autem facilius, ex paucis particularum ordinibus euna feligi, quem oportet separari, quam ex massa, in qua plurima, diversa, elementa confusa sunt. Simplicissimum enim duorum lominum colum humorum ex duobus ordinibus particularum, conniustum in duos humores separabit, quorum alter purus erit. Verum nolim hic repetere, quæ alias de vasis minoribus monui.

§. I V. Velocitas diversa sanguinis arteriosi.

Etsi in conditionibus ipsius organi secretorii multa de velociori motu aut tardiori sunt dicenda, aliqua tamen non ad coli fabricam pertinent, quæ adeo priora exponemus. Velocitatis communis in corde fons est ex vero vel in ipso corde alia esse potest, atque inde experimento constat secretiones omnes mutari; vel alia & alia in arteria esse potest, quæ ad eolum venit.

Ergo velocitatem in toto animale, inque corde potissimum, augent moti musculi, & exercitatio: nixus & aucta respiratio, ut in parturientibus: potus inflammabili spiritu plenus: stimulantia medicamenta, aromata: vehemens fluxuum: & potissimum febrile irritamentum, cuiuscunque demum naturæ fuerit, quo pulsuum numerus in dato tempore augetur.

Poterit etiam velocitas ad organum quocunque major esse minorve vicissim. Magnam facit cor proximum, qua sede vites sanguinem impellantem nondum diminutæ superflint. Hinc enormes illi de minimis arteriis pectoralibus (g) sanguinis saltus. Hinc in vulneribus plus sanguinis dato tempore ex arteria etiam minori fluet, quam ex majori alia, dum illa proprius ad cor, aut ex grandiori trunco nata sit (h). Hinc vicissim pedum

(e) IDEM L. c. II. 245.

(f) Tr. des liqueurs p. 129.

(g) Second memoir sur le mouv. du sang Exp. 41. 43.

(h) L. VI. p. 156.

pedum frigus , rarior nisi in certis hominibus sudor , senior exanthemati eruptio , tardius incrementum.

Velocior etiam sanguis ad eas partes corporis advenit , quarum arteriae & rectae sunt , & ex directo cordis ostio opponuntur , capitis exemplo (i). Iterum enim ab ipsis arteriis retardatio aberit , quæ oritur a flexione (k) , & ab angulis (l) ramorum cum trunco ejusque axi interceptis.

Velocior iterum ex alia causa motus erit , quoties arteria secretorii organi proxima ab aorta provenit : evitabitur enim ea retardatio , quæ fit a multiplicata divisione , luminibusque ramorum lumen trunci superantibus (m).

Per eadem , aliquanto melius conservabitur velocitas in iis arteriis , quæ de truncis suis sub minoribus angulis prodierint (n). Velocior erit etiam sanguis in magnis arteriis , in minoribus tardior , & quia trunco ampliores sunt , & quia frictio major (o). Viscerum secretoriorum arteriae majores sunt , & in dato tempore plus aquæ transmittent (p).

In arteria cylindrica , qualis carotis est , celeritas melius conservatur , quam in ramosa arteria. Minus denique velocitatis de arteriis firmioribus perit , quarum figura ab impulso sanguine minus distendatur , minus flectatur , hinc minor frictio sit. Hinc arteriae secretoriae densiores (q) , & robustiores. Hinc , inter alias causas , alii in fetu , alii in adulto homine humores per eadem organa percolantur , aliisque in athleticis , alii in mollibus ejusdem ætatis corporibus.

Velocitatis majoris effectus nihil habent obscuri. Et primo , secreti humoris copia in universum augetur , quando sanguinis celeritas magna est. Ad idem enim colum æque magna unda sanguinis , saepius in eodem temporis spatio applicatur. Hinc dormienti (r) , mœrenti , hibernanti animali ,

(i) Conf. p. 164.

(k) p. 187.

(l) Ibid.

(m) p. 173.

(n) p. 183. HAMBERGER physiol. n. 328. de secretione in genere n. 5.

(o) SAUVAGEZ Mem. de Berlin 1751. p. 41. Musculorum majores nervi sunt ; viscerum arteriae majores. Comparata arteriam renis , tantillæ visceris , cum brachii arteria , & vicissim plexu nervorum brachiale , cum plexu renali.

(p) SAUVAGEZ p. 49. & interna vascula minus forte , quam in artibus angusta p. 43.

(q) L. II. p. 73.

(r) FRANC. LAMURE de secrez. p. 41. DE BORDIU reflexions sur le pooh p. 351. Nam aucta in nostro somno transpiratio caloris a vestibus audiopus est , & collectæ circa cutem calidæ atmosphære.

mali, in universum parcæ secretiones. Hinc perspirationis immensa a corporis exercitatione copia.

A velocitate fit, omnibus reliquis iisdem positis, ut in ostium secretorum particulae majores impellantur. Cum enim omnia vascula corporis animati dilatationi obsequantur, sintque flexilia, nunc vero vis minima vasa distendens aucta sit, dilatabuntur utique, eorum vasorum ostia, ab humore cuim majori velocitate innitente, & majoribus particulis patebunt, eademque ipsæ aucto momento suo, ad ostiola coli sui dilatanda vi majori utentur. Subeunt ergo in ostia secretoria ejusmodi particulæ, quæ cum minori celeritate subirent nunquam (s). Ita siphon anatomicus vi modica aquam in minima vascula impellit, sebum demum vi maxima. Ita a corporis exercitatione & febre, pro tenui perspirabili, crassus viscidusque sudor, pro urina straminei coloris & aquosâ, urina rubens, ponderosior, fatidior, terraque copia majori feta, eadem incola transit. Sanguis ipse denique velocitate vehementer aucta per omnia corporis humani vascula penetrat (t).

Hinc velocitas major, multis modis, impuras facit secretiones & humores in ostiola secretoria urget, alienis plenos moleculis. Cum enim angusta oscula majores quasque particulæ excludat, dilatata eadem cum tenetibus glebulis etiam majores transmittunt.

Iterum, celeritas major faciet secretiones humorum fluidiorum (u), neque finet, suis in colis, viscidos humores nasci. Ostensum est (x), motum *progressivum* sanguinis diversa elementa, pondere varia & figura, aliisque affectionibus, adipemque & aquam, & mucum & gelatinam, terram etiam ferrumque, mista conservare. Vires enim adtractrices, dum superest, impedit *progressivus* motus, particulæque a mutuo contactu dividunt, ut minus se trahere possint. Quare non finit viscidas particulæ, adiposâ ita se amplecti, ut uniantur, inque homogeneas massas confluant, ut quidem confluere in secretione necesse est. Ergo a multo motu sanguinis adipis generatio impedietur (y), & muci. Phlegmaticorum est muco abundare.

G g g 2

§. V.

(s) *Clifton WINTRENGHAM* I. c. p. 219. *LAMURE* p. 22.

(t) *I. II.* p. 22. 229.

(u) *WAINEWRIGHT de secret. animi.* *NEIFFEL de secret.* n. 206. Addit *CL. WAINEWRIGHT* sanguinis abundantiam fluidas secretiones facere.

(x) *L. VI* p. 284.

(y) *L. L* p. 32.

S. V. Tardioris in sanguine colum adeunte cause & motus efficacia.

Tarditatem in sanguine secretorum colum adeunte facit arteria a corde remoto (z) loco orta, eademque præterea prælonga (a), & exigua (b), ut in seminali arteria exemplum est. Porro arteria ramosa, in qua repetitæ divisiones lumen ramorum multo majus faciunt, quam est lumen trunci, quam quidem ad secernendum præparationem olim *Guil. Colz* (c) testis exemplo illustravit. Ejusdem generis est arteria, quæ eundo dilatatur (d). Huc porro facit arteria flexuosa (e), & incurvata; nata ad angulum rectum, rectoque majorem (f); mollis præterea (g), quæ a vi cordis extendente valde dilatetur, inque gyros agatur. Ab his omnibus causis frangitur motus progressivus, & prelio lateralis pro eadem portione augetur.

Effectus mechanici retardationis intelliguntur fere ex contraria velocitatibus efficiacia. Secretio primum parca erit, in dato enim tempore pauciores sanguinis unciæ ad idem colum adlicantur. Parca ergo bilis secretio, pro visceris mole, parcissima feminis.

Tarditas excludet particulas crassiores, facietque humores puros, cum crassiores nunc glebulæ ab ostiis minoribus præcludantur. Post urinam crassam, ponderofanam, restituta sanguinis naturæ tarditate, iterum citrina & aquosa urina excernitur. Sanguini mentruò, superato qui eum incitat impetu, mucus uterinus succedit. Puros autem humores vocamus homogeneos. In multis modis a tarditate secretionis adjuvantur.

Homogenitos humores se adtrahere, & opposite indolis particulas repellere notum est. Mistus aquæ adipes, mucusque, sola quiete fecedit, & ad mucum viscidæ particulæ, ad adipem oleolæ (h), ad aquam aqueæ fe

(z) *Kerr de secret. animi*, p. 100.

(a) *Cowper philos. transact. n. 280. Kerr ibid.* In porco, ob flexiones repetitas quinque pedes cum dimidio longa est *Monssoo de telib.* & *fenniae* p. 17.

(b) *Kerr*, ibid.

(c) *Deser. animi*, p. 101.

(d) De ipsius tæta arteria id docent apud *Kerr* l. c. Vigiles & quinques longitudines ampliorum redili *Monssoo de fenniae & telib.* p. 17.

(e) *Vigiliana liquor* (12), parvæ in arteriæ maxime complicita *Wainewright* prof. 16. *Morsus principi* p. 175.

(f) l. VI. p. 184. 184. *Hänsberger* l. c. n. 528. *de secrezione* l. c.

(g) His, ethi sive venas humitate superat, tamen pertinet vena portarum, arteriis teste interior & flexior.

(h) *Kerr* p. 29. &c. *Wainewright* prof. 16.

se congregant. In globulos non viscidus solum adeps, oleumve, sed fluidum argentum vivum, & aqua demum se colligit. Ergo diminuta sanguinis celeritate, causa trangitur, quæ congregationem similium particula rum impedit. Quare, si arteriæ ad secretorium colum tendentis sanguis tarde fuit, colligentur utique in ipso sanguine, deque alienæ indolis particulis se segregabunt, particulæ mucosæ, oleosæ, pingues, reditque ea efficacia ad eam præparationem, quam primo loco diximus; sanguis nempe ad colum destinatum ejusmodi ducitur, in quo plurimæ particulæ ejus humoris similis continentur, qui per id colum debet separari. Dudum senserunt Cl. viri (*i*) hanc tarditatis ad secretionem necessitatem, ut etiam negarent, absque lentiori sanguinis motu, quidquam secerni posse. Eadem est ratio, quare Cl. NEIFELD acutum angulum secretioni contrarium esse scripsit, rectum favere (*k*).

Iternum latus motus auget pressionem lateralem (*l*), particulas ergo secretioni destinatas parietibus ad�icat, in quos secretoriae particule patent. Celeritas contra sanguinem per axin urget luminis. ut perlegat longitudines sui canalis, minusque in parietes mutatur. Hæc potest cauta esse, quare adeps in homine exercitato minus in cellulas congregatur.

Augtur hic tarsatis effectus, & facit, ut vitidi potissimum humores secernantur, cum motu progressivo tracto aut sublato, facilius se amplectantur, inque suis vasis viscidus jam, adque motum ineptius liquidum constituant (*m*). Reguntur enim sola attractione, quando contraria vis progressiva sublata fuit. Ita Cl. NESBIT (*n*) in minimis vasis ossium particulas scruposas reperit, alii glutinosas, & resarciendo callo aptas (*o*); quas in magna arteria nemo vidit.

Sed tædein particulæ, ut minus mobiles, obque visciditatem pigræ, de axi sue arteriæ per validiores alias deturbabuntur (*p*), adque parietes suorum valorum etiam hanc ob causam, repellentur, lentiusque fluent,

G g 3

uti

(*i*) Guil. COZ de secret. p. 101. LANCIS. diss. III. SPOLETUS, ut ex aliis percipio, HALLES bannister p. 125. VILLARD & MACQUER in thes. Ergo ab initio in capillaribus sanguinis velocitate facilitate secretio Paris. 1740. HAMBERGERE de secret. in genere &c.

(*k*) n. 230. 245. SAUVAGE'S physiol. p. 171. &c.

(*l*) JONES de mot. muscular. cont. L. VI. p. 133 &c.

(*m*) p. 31. De secretione bilis hæc SPOLETI: theoria sicut de secret. bilis Venet. 1685.

(*n*) NESBIT human offragony p. 20.

(*o*) WARDE son der multikom.

(*p*) p. 415.

uti omnis per canales , etiam exanimes , secundum latera motus eo len-
tior est (q) , qui per axin pergit.

Porro eo magis viscidæ particulæ per retardationem in vascula secre-
toria secedent , quia ad parietes arteriarum & vasculorum suorum alioquin
adtrahuntur (r). Cum ergo & sponte se ad latera conferant , & a pres-
fione lateralí eo urgeantur , intelligitur , quomodo viscidæ humores adeo
celeriter , & abunde , in quieta & sedentaria vita colligantur. Pinguedi-
nem vasculorum lateribus adhærentem credit se vidisse BAGLIVIUS (s).

Subtiliora etiam aliqua superlunt , quæ ex tarditate sequuntur. Si hu-
mor in arteria ad secretorium colum veniente jam viscidus advenit , & par-
ticulæ glutinosæ se in eo trunco amplexæ addensaverint , si tunc porro ex ea
arteria minores fistule exiverint , secedet per eos ramos quæcunque flui-
dus , iisque oculis aptius est , qui neque adiposa , neque mucosa , neque
gelatinosa admittunt , aequæ in trunco ipso manebit , quidquid est viscidissi-
mi & pigritimi (t).

Adhuc eit hactenus , diversum tamen , quod alii Cl. viri docuerunt.
Ponderosa aiebant axin tenere sui canalis , longius ergo a cordis commu-
ni vi propelli , quod momento majori ferantur , in loco ergo a corde re-
motissimo id omne fecerni , quod est crassissimum. Contra eam utique
theoriam monuit Cl. SHEBBARE (u) & omnia omnium corporum
elementa æque gravia esse , & argenti vivi sublimati solutionem in vaso-
rum systema impulsam , æque acrem , & aequæ adeo ebriam metalli copia ,
ad magnas a fonte motus , parvasque distantias prodire , ponderosiora adeo
a levioribus non segregari. Verum prior affirmatio unice vera est aut
de corpore per inane spatiū delapsa , aut de veris elementis , quæ in
graviori corpore numerosiora sunt : posterius experimentum unice docet ,
metallum accurate a solvente humore solvi , & adeo pertinaciter ipsi ad-
hærere , ut in exiguo spatio non separaretur.

Hæ & aliæ harum similes contemplationes fecerunt , ut p' erique physiologi
diversæ velocitatis rationem haberent , quando diversorum humorum secre-
tiones

(q) BERNOULLI hydrodynam. p. 36.

(r) De g. o. v. l. i. u. b. r. S. e. m. e. r. f. s. i. r. le. m. o. u. v. e. m. e. n. t. d. u. s. a. n. g. p. 340. &c. Viscida
ad latera vasorum adhærent MICHELOTTE I. C. p. 53.

(s) Orr. oph. p. 679.

(t) Caius WINTRINGHAM inquiry p. 120. Conf. Th. MORGAN principes
p. 170.

(u) Prince. of practice p. 312. 316. 317.

tiones explicare adgrediebantur, & inter primos *Guilielmus COXBURNE* (x). Cum diametrorum vasculosorum secretorum consideratione velocitatis rationem *Georgius CHEYNE* (y) conjunxit, & *Bartholomaeus BOSCHETTI* (z), & alii.

§. VI. *Cause diversæ secretionis quæ in ipso colo ponuntur.*

I. Arteriolarum in organo habitus.

Multa naturæ consilia sunt, quibus ad diversorum humorum separationem obtinendam usæ est : & quæ partim ex conjectura adtingimus, partim etiam oculorum testimonio confirmamus. Huc ergo recenseo retia vasorum diversa ; ostiolorum secretorum diversum lumen ; firmitatem ductuum excretorum non ubique eamdem ; irritabilem vim organi secretori magnam debilemve ; brevitatem canalium humorem secretum accipientium, aut vicissim longitudinem ; deinde restringitudinem aut anfractus ; folliculos, in quos natura humorem secretum effundit ; eorum folliculorum potentias moram augentes aut minuentes ; resorptionem venosam ; commissiōnem diversorum humorum. Sed hæc omnia præterea variis modis inter se conjungi & combinari possunt. Neque ideo NATURE dvitias exhauserimus, cum in fabrica intima plurima latere queant, quæ æternum nos sint fugitura.

Initium hujus contemplationis merito fiet ab iis conditionibus, quæ humorum nondum natum regere creduntur. Sequentur, quæ jam separatum humorum determinant. Eo magis vero follicitos nos esse oportet in hac historia, quod clarissimi viri plurimum huic in arteriarum retibus diversitatē tribuerint ipseque, parum favens hypothesibus, RUYSCIUS (a) ab ea sola causa secretionum varietatem crediderit explicari. Videbant alios aliquos arteriolarum in diversis corporis humani particulis fines, cum aliis & aliis secretionibus conjunctos ; neque improbabile videbatur, hoc discrimen in arteriolarum fabrica non absque sapienti NATURE, nihil frustra molitur consilio

(x) *Oecon. anim.*

(y) *Theory* p. 69, *philos. principi. of relig.* p. 297.

(z) *De salivat.* art. 3. ad fin.

(a) In *Prefat.* ad *Tbel.* VI. p. 6. *Tbel. max.* n. 232. *Advers. Anat.* I. n. 4. III. n. 8. In aliis etiam alias patibus corporis humani diversos esse extremos arteriarum fines monstruit *Epijt.* III. p. 28.

confilio esse. Id consilium ita sunt interpretati, ut ab alia retium fabrica; aliud organi munus sequeretur: sive id munus fuerit, humorem aliquem separare, tunc quidem quæque fabricæ arteriosæ quasi species suum peculiarem succum produceret: plane ut plantatum & diversi succi sunt, & earumdem folia alios & alios nervorum incessus ostendunt. Eo magis vero probabilem sententiam se sequi persuadebantur, quod diversas humorum fluentium affectiones se per mathemata confirmasse crederent.

Nempe velocitas major nascitur, si canalis rectus fuerit: minor si inflatus (*b*). Inter ramorum cum suis truncis interceptos angulos discrimen est, atque parvi anguli plus velocitatis (*c*) suo humoris impertinent, magni minus. Velocitatis autem & majoris sua in varianda separatione humoris efficacia est (*d*), & minoris. Verum in variis corporis humani arteriosæ retibus, aut systematibus recti canales dominantur, flexi in aliis; anguli interplerisque acuti, in nonnullis tamen recti. Sequi videbatur, ex ea ipsa diversitate fieri, ut in quibusdam corporis partibus sanguis celerius in vasa secretoria veniret, tardius in alia, indeque ea omnia eventa fluenter, humoresque separati discrimina, quæ a celeritate & a lentore nasci ostendimus. Sed etiam diversam arteriarum magnitudinem in retium valetatem, aliarumque affectionum dispartes naturas, inde vero alias etiam humorum indoles generari autemant.

Ergo, ut eamus per singula, rectæ arteriolæ per choroideam oculi membranant incedunt (*e*). Rectæ etiam sunt, quæ in liene (*f*) Ruy Schlaß a arte innotuerunt; tum que ex pia membrana (*g*) in cerebri corticem se demittunt; rectæ fere quas in pituitario narium velamento Ioseph Vir Cl. ostendit (*h*). Flexa contra, & serpentium similia, vascula sunt in rene (*i*) hamano, in uteri ovilli tunica (*k*) intima, in utero virginum maxime teneriorum (*l*).

Anguli,

(*b*) L. VI. p. 182 seqq.

(*c*) p. 183.

(*d*) I. VII. p. 47. seqq.

(*e*) Icon. Anat. fascic. VII. tab. arter. oculi f. 4.

(*f*) Ruy Sch Epist. T. IV. f. 4. Thes. II. t. 6. f. 5. Thes. VII. T. I. f. 2.

(*g*) Intra Epist. XII. T. 14. f. 13. Thes. VI. prodrum. fig. 6. ALBIN adnotat. anat. L. I. T. II. f. 5.

(*h*) Longi nempe & in universum recta Thes. VII. t. 3. f. 2. eti, non absque manifesto etiam anatomice repletionis effectu, aliquantum flexuosa sunt.

(*i*) Ruy Sch Thes. II. T. 6. f. 7. Thes. III. T. 4. f. 3. Thes. IV. T. I. f. 1. Thes. VI. prodr. f. 2. 4.

(*k*) Thes. II. T. 6. f. 8.

(*l*) Coli. Nuck in adenograph. f. 32.

Anguli, ad quos arteriolæ dividuntur, valde frequenter exigui sunt.
Ad parvos angulos choroideæ membranæ arteriolæ dividuntur (*m*), & ciliarium processuum (*n*), tum pituitariæ etiam (*o*) membranæ vascula.

Acuti anguli dominantur in membranis cere omnibus, hepatis nempe (*m*), vesicular felleæ (*q*), pleuræ (*r*), pericardii (*s*), scroti (*t*), arteriarum (*u*), sub craniū cute (*x*), subque planta pedis (*y*), in pia matre (*z*), omento (*a*), periosteo (*b*) externo, interno, chorio (*c*) [vitulino quidem] (*d*) & corde (*e*).

Ad exiguos angulos se dividunt lienis vascula (*f*), quæ ex eodem trunculo numerosa, & inter se parallela, & cum trunculo progrediuntur. Sed etiam in placenta uteri eo modo se habent (*g*), inque glandulis intestinorum (*h*), quas cum penicillo vieto RUY SCHIUS inventor comparavit.

Aliquanto majores ad angulos dividuntur vascula hepatis (*i*), quæ ex communi trunculo ad stellæ modum in ambitum discedunt, tum in tympani membrana (*k*), cojus arteriola ramosum arboris truncum refert. Per intestinorum etiam membranas (*l*), & potissimum per cellulosa spatia inter musculosam & nerveam membranam, arteriæ crassorum intestinorum ad acu-

tos

- (*m*) *Fascie. Anat. I. c.*
- (*n*) *Zinn ocul. hum. T. 2. f. 3.*
- (*o*) *Ruy Schi. I. c.*
- (*p*) *Tbif. X. T. 3. f. 5.*
- (*q*) *Epifl. IV. T. 4. f. 4. Tbif. IX. T. 4. f. 1.*
- (*r*) *Epifl. II. T. 2. f. 1. 3.*
- (*s*) *Epifl. IV. T. 5. f. 4.*
- (*t*) *Epifl. II. f. 2.*
- (*u*) *Aorta Epifl. III. T. 3. f. 1. 2. 3.*
- (*x*) *Albin adnot. L. I. T. 6.*
- (*y*) *Ruy Schi. Tbif. III. T. 3. f. 2.*
- (*z*) *Epifl. VII. T. 8. f. 2. 3. Albin L. I. T. 2. f. 3.*
- (*a*) *Tbif. II. T. 5. f. 1.*
- (*b*) *Epifl. IV. T. 5. f. 1. 2. 3. Epifl. VIII. T. IX. p. 6. 10. Albin ieron. off. fisi.*
- fig. 162.**
- (*c*) *Albin Adnot. L. III. T. 9. f. 2.*
- (*d*) *Tbif. II. T. 6. f. 8. Tbif. max. T. 2.*
- (*e*) *Epifl. III. T. 3. f. 1. 2. Tbif. IV. T. 3.*
- (*f*) *Epifl. IV. T. 4. f. 4. Tbif. III. T. 6. f. 5. Tbif. VII. T. I. f. 1.*
- (*g*) *Tbif. II. T. 6. f. 1. 4.*
- (*h*) *Epifl. XI. p. 9.*
- (*i*) *T. fl. IX. T. 4. f. 1. 2. 3. BIERWIRTH de fruct. beg. f. 1. VITUS'ENS obf. d'ancet. & de med. prat. p. 139.*
- (*k*) *Epifl. VII. T. 9. f. 9.*
- (*l*) *Albin de ovi intellauer.*

tos angulos dividuntur: idem vero anguli in tenuibus intestinis sensim laxantur majoreisque sunt, tum in ventriculo. Sed & alibi arteriæ reperiuntur (*m*).

Magnos angulos vidi in vasis, quæ inter parallelos truncos arteriosos venososque piscium media intercedunt; maximi demum sunt, ad quos arterie arterios facientes divaricantur per mesenterium (*n*) perque eum circulum, quem arteriole choroideæ (*o*) retro uirae faciunt, atsumque quo nervum opticum (*p*) cingunt, tum in vasculis ex quibus circulus vitelli ruber in ovo nascitur (*q*): & anguli demum ramorum, qui divisis crucibus peripherie figuræ venosæ se addunt (*r*). Rectos vero angulos, quos in vesicula sellis (*s*), inque musculis (*t*), & alibi paullim in membranis Cl. viri descripserunt, ut arteriole a truncis suis rectos ad angulos natæ, ad rectos pariter in vena se inmittant, eos quidem angulos anatomæ non confirmat.

Sed neque ubique in corpore humano retia esse doceri debuit. Viscera quidem vera vix in interiori fabrica retia habent, ramique potius arteriosi recti incedere solent, sibique paralleli, ut in liene, hepate, placenta: neque serpentuli renum ad rete pertinent, quod ne in majoribus quidem ramis reperio, qui utrinque papillæ solent inninere. Inter membranosa vasa absque anastomosis, atque adeo absque reticulata fabrica sunt, quæ cellulas ossium adcent (*u*).

S. VII. *Quantum diversitati finium arteriosorum tribui possit.*

Alibi retium affectionem exposuimus (*x*). Ea in universum diminuunt ramorum ad truncum rationem, faciuntque ut truncus ramis potius major sit (*y*). Hactenus ergo celeritatis decrementa minora faciunt.

Contra

(*m*) Ruyssen Thes. max. T. 3. Advers. anat. III. T. 1. f. 4. 5. 6. 7.

(*n*) In fascic. IV. tab. art. mesent.

(*o*) Fafic. VI. t. 6. f. 5. 6.

(*p*) Ibid. f. 4. i. Zizani L. p. 217.

(*q*) De la format. du poiret T. II. p. 146.

(*r*) Ibid. p. 29.

(*s*) Hales's Utemat. p. 150. 251.

(*t*) Idem ibid. p. 248.

(*u*) Bezzolin offecog. T. I. p. 295. 296. 301.

(*x*) L. VI. p. 280.

(*y*) Ibid. p. 355.

Contra si retia fuerint ejusmodi, ut rami diversorum truncorum, magnos ad angulos nati, magnos pariter ad angulos convenienter: eorum quidem sanguis contrariis icibus collidetur (z). Si omnino sanguis teritur, inque minora abit ramenta, hoc certe loco abibit. Ad tritum enim nihil potest potentius excogitari, si a pressione directa recesseris, quam perfectus e contrario concursus.

Quo minor angulus est, quo duo trunculi coeunt, eo minor fiet consilio; & eo pacatus duo sanguinis flumina in unum torrentem consentient. Plus eniam est in eorum directione, quod convenit, minus omnino quod pugnat.

Verum his omnibus collectis, nondum certe ad verum, adque causam diversae secretionis cominus accessimus. Primo quidem loco satendum est, ipsam rei, uti se habet, historiam, retiumque veram varietatem nondum innotuisse, cum de minimis, ultimisque in primis arteriolis hic queratur, ex quibus vascula novum humorum vehentia prodeant. Quae vero majora retia, ex truncis potius multorum globulorum confluunt, ea non satis sui dissimilia, neque pro diversi humoris, qui quoque loco dignitur, varietate satis a se invicem aliena sunt. Cur perinde pene recta vasa & lienii data sunt, & tenerrimis humoribus oculi? Cur similis nimis corticis cerebri, lienis placentaque uteri, dissimillimi cum utilitatibus & humoribus fabrica est? cum inde humorum omnium tenuissimus nascatur: hic aut nihil, aut pi- grum quid bilis generanda auxilium.

Denique, quod mihi fere omnem spem eripit, venarum est fabrica. Neque enim ego quidem venosa retia laxiora (a) neque eorum angulos rectos reperio, sed frequentissime simillimas, quales arteriarum sunt, omnino divisiones. Arbusculas intestinorum arteriolas simillimas venose arbusculæ comitantur. Anuli mesenterii majores perinde ex venis sibi occurrentibus coalescent, ut ex arteriis (b); in ovo autem omnino ii circuli unice venosi sunt, quibus nihil pulchrius vel cogitari potest (c). Verum a venis secrecio exspectari nequit. Sed etiam ubi nulla secrecio, praeter similiens ubique vaporem obtinet, ut in membranis, diversissima aliis, & aliis locis retia sunt. Quare diverse illæ quidem arteriarum fabricæ ad alias & alias circuitus sanguinei adfectiones, ad retardationes, impedimenta, accelerationes, & auxilia magis pertinere videntur, quam quidem ad

H h h 2

defini-

(z) ill. p. 280.

(a) Hæck. I. c. p. 137. L. II. p. 135.

(b) Tab. a. t. ms. in fasc. IV.

(c) p. 426.

definiendam peculiarem humoris quoque loco geniti naturam. Et si quidquam inde ad secretiones humorum definendas facit, id ad preparatoriam illam trunci arteriosi celeritatem, aut tarditatem, adque copiam aut partem sanguinis retulero, qui secretoria organa subit. Quae omnia enim quasi aliquantum ad secretionem spectant.

S. VIII. II. Diversa diameter vasculi recipientis.

Simplicissimum hoc naturae artificium est, quo obtinuit, ne sanguis in ulla vascula secretoria, in aliqua ne gelatina quidem subiret. Vasculo nempe secretorio, quod a rubra arteria nascitur, suumque humorem accipit, ostiolum minus fecit, quam est diameter globuli rubri. Ita iste quidem excluditur, reliquæ vero moleculæ admittuntur, quæcunque diametrum lumine ostioli secretorii minorem habent. Ita porro facile est intellectu, si multa fuerint particularum in sanguine circumeuntium genera, potuisse naturam levi artificio primam quasi ad secretionem præparationem, hac unica providentia obtinere, ut diversam etiam magnitudinem poris secretoriis admettiretur. Fac ex ordine, molecularum ejusmodi progressionem esse, ut sanguinis maximæ massulæ, adipis secundæ magnitudinis sint, bilis elementa tertiae, lymphæ flavæ glebulæ quartæ, salivæ particulæ quintæ, aquæ exhalabilis quæcunque guttulæ sextæ sint. Fac inde poros secretorios, quorum lumen sit secundæ magnitudinis molecularum diametro æquale, aliosque, qui particularum tertiae, quartæ, quintæ classis diametro pares sint. Ita per genus secundæ classis molecularum capax, excluso sanguine, exhibet adeps, bilis, lympha, saliva, exhalabile fæctorianum: per poros tertii ordinis neque sanguis, neque adeps, ceterum bilis, serum, saliva, halitus: per quartum genus pororum neque sanguis, neque adeps, neque bilis, neque lympha, sed saliva, & perspirabilis vapor; per quintum neque adeps, neque bilis, neque lympha, neque saliva, sed unice fæctoriana aquula separabitur. Solus ergo humor ultimus purus erit, reliqui omnes impuri, & tenuioribus generibus eo numerosioribus committi, quo majoribus particulis constant.

Ex omnibus autem sanguinis excluditur, qui solus fiat corpusculis certa fide conspicuis, atque adeo majoribus, quam reliqui humores, quibus inconspicua sunt. Qui bilem sanguine crassiorem fecerunt (*d*), ii oblii sunt,

nasci

(d) *BRANCUSI* in *bifloria hepatica* edit. I. p. 27. & post reprobationem *LAXATIS* edit. 1715. p. 84.

nasci tenuem (e), de nascente vero unice sermonem esse: & classes duas distinckissimas rerum confuderunt (f), crassum nempe viscidumque. Glutinosa enim natura non a magnitudine molecularum pendet (g), sed a cohaesione vi majori. Exstat Cl. IATROMATHEMATICUS (h), qui moleculas viscidi humoris potius minores faciat. Certe si adtractionis aut cohaesione vis esset, ut superficies, minorum utique molecularum, cum eadem utrinque figura, major erit superficies.

Hypothesin ceterum si cum experimento comparaveris, perinde fere consentire videbitur, ut cum mathematum elementis consentit. Primumque, si cordis vim cum siphone anatomico; sanguinem cum injecta materie cerea comparaveris, certum est ceram, sebumque in maxima vasa sola penetrare, & difficilime subire in minoria, quæ & crassa materies sit, & tenax. Deinde tenue terebinthina oleum in minima quæque oculorum aliarumque partium corporis humani vasa penetrat. Iterum certum est, per mea experimenta, in pulmonis exemplo, gluten de filuro pisce in bronchia decolor transisse, & cæruleas indici veneni particulas in arteriis pulmonalibus deseruisse.

Hæc de humoribus. Oscularum vero vasorum si diversa lumina reperieris, probabile fiet utique, vena maxima esse, quæ globulos rubros admittunt, lata etiam oleosa, & sanguine proxime minoria, qui frequenter per ea ipsa erumpat (i). Ergo in adiposas cellulas, penitus ex theoria, omne fere genus injectæ ab anatomicis materiei subit, sebum fusum, etiam crasso minio tintum, adeps calefactus (k), gluten piscium dissolutum, aqua, argentum vivum, aer. In mucosa vasa, PEVERIQUE (l) glandulas cera transit, crassas vero cinnabaris particulas, nimis oppido magnas, non potest secum transmittere.

Contra exhalantia vascula angusta ostiola habent, ex LEEUWENHOEKIANIS, hactenus nobis sufficiunt experimentis, sed ab iis osculis & cera, & sebum fere arcetur, aqua facile transit. In tenerima vascula vitiæ humoris, lentes crystallinæ, corticis cerebri, aut nihil subit, aut tuuissimus unice, magno cum labore liquor.

H h h 3

Iterum

(e) Monuit LANCISIUS *Galeria di Mineræ* T. VII. p. 98.

(f) Ut Thomas MORGAN qui oleum adipe crassius facit L. c. p. 342.

(g) P. A. MICHELOTTI L. c. p. 35. *Job. de GORTZIA de Secretione* II. n. 63.

(h) LAMURE *de secrèt.* p. 28.

(i) L. I. p. 35.

(k) SCHULZE *Commenc. Lit. Noric.* 1731. *Spec. V.*

(l) RUTSCHE *Epist. anat.* XI. p. 9. *Advers. anat.* II. n. 3.

Iterum a sola angustia luminorum excretorii ductus crassiores particulas excludi, aliquanto probabilius redditur, quod aucta velocitate sanguinis, aucto adeo impetu, quo globuli in ostiola secretoria nituntur, omnino sanguis in ea etiam ostiola viam sibi aperiat, quæ integro in rerum statu solos tenuiores humores transmittunt. Ostendimus enim (*m*) sanguinem, ex solo febris impetu, aut a corporis exercitatione vehementiori, non laesis organis, per ductus excretorios urinæ, sudoris, muci narium, pulmonis vesiculas, pericardii (*n*) aquiam, intestinorum vaporem, aliosque canales aquosos exire. Plane ut in angustum tubum globulus plumbeus subit, si bacillo valide impuleris, non subiturus, nisi ea vis accessisset.

Neque sanguis solus in tenuiora vasa transit, nam etiam crassus oleofusque sudor in vasa perspirabilia viam sibi explicat: in urinam oleum crassius penetrat, merisque in phthisicis adeps, in varios, alienos & teneriores ductus demum lac a suis viis repulsum.

Etiam ulterius paulo clarorum virorum sagacitas progressa est. Nam rationem invenerunt, qua fieri posset, ut ex solo secretorum ductuum diverso ordine puri humores, neque alterius generis particulis misti, de sanguine separarentur. Ergo si scopus fuerit crassissimum aliquem humorem secernere, bilem in exemplo, præstiterit ex arteria secretioni bilis destinata educi ex ordine ramos minoris diametri, quam sunt bilis molecule; fac multos esse, & longa serie, exhibunt adeo de ea arteria particulæ omnes, quæ bilis glebulis minores sunt, si satis fuerit ostiolorum hos humores avehentium, usque dum cum sanguineis globulis, in arteria secretoria aut soli bilis globuli supersint, aut certe paucissimis subtilioribus particulis misceantur (*o*). Hactenus certe exemplum vasculorum capillarium huc referre possis, quæ solos globulos rubros, aut certe ita paucio tenuiori huncore mistos, continent, ut unicus globulus ruber totum ejus vasculi lumen sibi sumat. Contra, si quam tenissimum & limpidissimum liquorem fecerni volueris, para ejusmodi arteriam, ex qua magni canales adipis, bilis, aliorumque crassorum humorum glebulis adaptati longa serie prodeant: avehent ii crassiores humores,

(*m*) L. I. p. 218. &c.

(*n*) SANTORINI *Floria d'nn feto* p. 51.

(*o*) JOS. MORTLAND *of the force of the heart* p. 85. qui & hills & ferrini exemplum adducit, cum in *physiol. transf.* p. 283. *Ress. de secret. anim* p. 229. 230. VERNAYER L. II. p. 238. NEFFERID. *de ferret.* p. 74. Adauis est III. LUDWIG *hypothesis*, qui tenuiores humores per venulas abducit *physiolog.* n. 237.

humores , ut solus cum sanguine in ultima arteria is humor tenuior superfit , quem voles secerni (p).

Secundum id consilium , variatis (q) fistularum de arteria productarum luminibus , poterit utique obtinari , ut ante finem arteriae fere is humor abundet , quem de eo fine secerni volueris : subductis nempe ante eum finem aliis humoribus quibuscumque . Quod quidem machinationis genus etiam ad preparationem secretorii sanguinis (r) haec tenus pertineret , nisi fistulas abducentes in ipsa glandula , aut in viscere necesse esset disponere.

Ut ut hæc se habeant , certe oscularum secretoriorum diameter , glabelis cujusque humoris elementum constituentibus apta , a primis fere mechanicæ teste initis ita placuit , ut in omnium sectarum placita admittetur . Sola ea fere machina usus est Cl. KELL , neque aliud ostiolorum secretoriorum discrimen admisit (s) : ex ea sola totum mysterium separacionis PITCARNIUS explicavit (t) , & J. Maria LANCISIUS (u) , & Petrus Antonius MICHELOTTUS (x) . Ea sola etiam ita usus est Josephus MORLAND (y) , ut tenuem humorē ob ipsam arctitudinem secretorii ostioli secerni doceret , quæ sanguinem repelleret .

Qui velocitate præterea diversa uti voluerunt , figuris pororum , ita tamen omnes ad diametros ostiolorum pariter respexerunt . Cum figura eam speculationem conjanixerunt Cl. viri Guilielmus COLE (z) , J. Alphon-fus BORELLUS (a) , Guilielmus COKBURNE (b) , Philippus VERHEYEN (c) . Cum velocitate , & angulo secretorio luminis rationem composuit (d) Georgius CHEYNE , cum velocitate , densitate , & angulo Clifton WINTRINGHAM (e) . Neque ab ea contemplatione BoERHAAVIUS abstinuit .

§. X.

(p) In ratiis Second mem. sur le mouv. du sang Exp. 110. 128. 134. &c.

(q) Conf. KELL l. c.

(r) p. 416. 417.

(s) l. c.

(t) De circul. sang. per min. n. 15. 16. 17.

(u) In Epist. ad J. B. BIANCHUM quæ in operib. omnibus existat & pro differt. III. numeratur.

(x) l. c. Lex. I. Excludit velocitatem lege II. p. 150.

(y) Philof. Transact. n. 183.

(z) De secrec. anim. p. 82.

(a) De motu anim. L. II. Prop. 140.

(b) Orcon. anim.

(c) Anat. L. II. p. 292.

(d) Phys. princip. of relig. p. 297.

(e) Enquiry p. 178. 184.

§. IX. *Objectiones.*

Non ideo dissimulasse oportet, varia contra hypothesia objici posse, que ab oscularum secretorum diversis luminibus separationem diversorum humorum dedit. Primumque dubitari possit, num omnino diversa particularum magnitudo sit, que diversos humani corporis humores constituantur. De globulis rubris credo constare, forte etiam de lacteis globulis, esse maximas, solasque conspicuas sanguinis glebulas. Sed de adipis certe, lymphæ, muci, salivæ, urinæ, lacrumæ particulis, nullum experimentum producitur, & ne quidem produci potest. Crassiorum humorum elementa sunt qui crassâ faciant, sunt qui tenuia (*f*), adeo incerta res est. Neque hæc diversa magnitudo discrimen characteristicum humorum exhaustire videtur, quod facit, ut sui in omnibus hominibus similes, aliorum humorum dissimiles sint. Idem lactis globuli dum recentes, dulces sunt, diversissimi a seipsis, postquam per circuitum sèpe iteratum acrimoniam induerunt rancidam.

Verum altera, multo severior, objectio superest, quam *Georgius MARTINUS* proposuit (*g*). *Franciscus Boissier* dissolvere conatus est (*h*). Nempe in animalibus grandissimis, qualis elephas est, & minutissimis, ut in muore: deinde in homine adulto, & in eodem puerō, per similia viscera similes humores generantur, bilisque, in exemplo, horum animalium hominumque eadem est, easque dotes habet, quæ bilis characterem in universum ingrediuntur. Nunc porro trunci arteriosi quicunque adulti hominis procul dubio multoties majores sunt iisdem analogis truncis in puerō, & vena portarum hepatica viri quam pueri hepatica vena major est. Eadem in ratione justum est, & primos ramos venæ portarum viri majores esse primis in puerō venæ portarum ramis: idemque discrimen oportet in secundis, & in tertii, & in omnium divisionum ramis recurrere: id enim nisi recurrerit, tunc utique aut viscera pueri æque magna forent, quam quidem adulti hominis viscera, aut pauciores in puerō rami. Quare si omnia vascula hepatis viri majora sunt, quam pueri, majora etiam erunt cella secretoria bilis, & tamen eundem humorē parant. Non ergo a magnitudine diversa pororum secretorum diverlorum humorum separatio.

§. X.

(*f*) *LAMURE* l. c. p.(*g*) *De animal. similiat.* p. 12. seqq.(*h*) *Physiog.* p. 183. 207.

§. X. Respondetur.

Prima quidem objectione haec tenus videtur iniquior esse, quod elementa aquæ non minora faciat, quam terræ saliumque. Nempe humorum corporis humani omnium pars maxima aqua est: differunt autem, quod hæc aqua in aliis pene pura sit, in aliis admixtum habeat salēm, terramque, & eorum quidem elementorum diversas portiones, denique oleum. Nunc aquæ quidem puræ elementa plus quam probabile est minora esse (*i*), quam elementa salis, terræque, quibus & maius pondus insit, & minor in universum penetrabilitas, naturaque consistens, adque motum pigritus oleo possit ambigere, sed etiam oleum ab aqua haec tenus distat, quod fluiditate ei cedat, quod sensus nostros gustus visusque in primis, magis quam aqua emoveat, idemque minus purum sit, & iterum ex aqua fiat, alioque elemento, quod aquæ & lentorem impertit, & opacitatem, & saporem, aliasque dotes ipsas, quibus oleum ab aqua distat, adeoque particulis magis sensibilibus constat.

Quare, quantum quidem de rebus a sensu remotis dici potest, probabile videtur, utique diversas esse glebularum magnitudines, ex quibus humoris nostri componuntur, & subtilissimos videris, qui mera aqua fiunt, crassiores ex ordine eos, quibus plus majorum particularum salis, terræ, olei, ferri, commissa fuerint.

Ad alteram objectionem haec tenus respondere conatur Vir III. *Franciscus Boissier de Sauvages*, vasa secretoria pueri & viri tamen æque grandia esse, et si vilacea, glandulæque, & totæ statuæ impares sunt. In juniori vero homine (aut animale) pauciora ejusdem vascula esse, cum plurima nondum evoluta lateant. Nihil ergo interesse, quin definita in viri puerique viscerebus magnitudo sit, cumque ea similis humoris separatio conjungatur. Neque defunct argumenta, quibus Cel. viri explicationem adjuvet. Nempe vascula minima globulorum rubrorum moduli sunt, eosque transmittunt singulos: ut possit fere tutò colligere, ramorum minimorum in diversis animalibus lumina se habere, ut globulorum rubrorum circuli maximi. Sed rubri globuli, per experimenta hominum (*k*) in microscopicis contemplationibus

(*i*) *BORKHAUSE Elem. chym.* T. I. p. 555.

(*k*) *LEEUWENHOEK Philos. Transact.* n. 223, oper. omni T. II. p. 75, T. III. p. 220.

tionibus exercitatorum, & in magno animale, & in parvo, & in viro, & in puer, ejusdem sunt magnitudinis. Eadem æqualitas etiam in fibris carnis obtinet, quas & in minimis animalium æque magnas, ac quidem in vastissimis belluis, olim ab omni hic præjudicata opinione pusus *Antonius v. LEEUWENHOEK* (*l*) repetito reperit. Supereft, ut, ex probabili valde analogia, & in magnis & in parvis animalibus etiam alia vascula, ipsaque excretoriæ de arteria rubra nascentis canalis ostiola æque magna sint. *l*. Ingeniosa hæc excusatio accuratius meditantis animum non peritus confirmat. Et primo ab evolutione repetita solutio problematis non potest ad animalia minora transferri, quæ adulta & perfecta sint, & quorum viscera nullam porro evolutionem exspectant. Deinde, cum vasa hepatis, & visceris cuiuscunque sanguinea, pauciora quidem in fetu sint, cæterum æque magna, dic num æque densa sint, num in fetu, quam in viro molliora. Æque densa quidem non sunt, cum & totus fetus tener sit, & hepar coagulato sanguini simile ad tactum diffusat, & aorta fetus multo, quam aorta viri debilior reperiatur, & eadem diversitas in omnibus vasis hepatis, primæ, secundæ, aliarumque divisionum recurrat. Pone nunc, sola vascula minima & secretoria fetus æque densa esse, sequetur infinita fere ratione densiora fore, quam sunt ejusdem visceris trunci, tota nempe ratione, qua robur aorte viri, robur aorte fetus superat. Sed ejusmodi densi canales nunquam per mollissimos truncos replerentur. Cum enim & truncis minores sint, & una dilatatione sua immensum magis resistat, impellenti cordi trunci tanto cedent, quam ramuli, facilius, quanto hi densiores sunt, nempe motus cordis ex progressivo, in lateralem convertetur.

Contra pone vascula secretoria in fetu minus densa esse, quam in viro, uti omnino minus densa sunt, & tamen multo majora, tanto nempe, quanto vir fetus major est. Sed fetui cor & majus est, & magis irritabile, & pulsat frequentius (*m*). Huic cordi vasa minimæ æque ampla resistentiam, quam in adulto viro, millies minorem obponunt. Quare, cum vires distendentes potentiores sint, resistentia minor multo, dilatabuntur ea fetus vascula, neque nanebit ea diameter, quæ in viro est, vasque secretoria fetui, quam viro, majora sient, quod est contra hypothesis. Cl. enim vir vascula secretoria fetus negat crescere.

Verum

(*l*) *Epist. physiolog.* p. 6.
(*m*) L. IV. p. 430. 431.

Verum ipsis præterea oculo confirmatur, fetus vasa minima secretoria non posse æque ac in adulto magna esse. Unicus porus excretorius urinæ, nudo certe oculo conspicuus, *in viro* ea est diametrum, ut totus ren minoris embryonis non major sit, quem non possit unico ex poro urinifero compонere, qui præter eum porum certe necessario & arteriam contineat & venam. Fuit tempus, quo vixit fetus, *in pullo* incubato conspicuus, in quo vere ejusmodi ren fuit, neque majus hepatis unico ramo bilarii ductus adulæ avis, quem ultima oculi acie adsequaris. Non ergo in fetu vasa secretoria æque, quam *in viro*, magna sunt.

Iterum, perpetua ea evolutio novorum in grandescente homine canarium secretiorum experimento, & rei ipsi non respondet. Æque perfecta & copiosa est vasorum fetus quasi sceletus, & omnes aortæ rami, eorumque surculi furcotorumque propagines, & omnia vascula minima oculi humani, alteriusve visceris; quæ in numeratis habemus, ea quidem eodem numero & in fetu sunt, & *in viro*, neque unicuni vasculum cum ætate accedit, aliqua vero, si fides est peritissimis dissecotoribus (*n*), utique evanescunt, & pauciora in viri, quam in fetus visceribus vascula adparent. Omnino uti in foliis & teneris, & adultis, cumdem nervorum numerum, parvumque nervorum distantiam, Cel. Stephanus Hales reportat (*o*).

Alio vero modo fieri potest, ut in nonnullis visceribus, ut in utero, plura in muliere, quam in virginula materno utero comprehensa, vascula adparent. Non dubium est, grandescere eadem, dum totum corpus incrementa capit. Pone nunc in fetu vasculum uterinum tota in longitudine sua unicum globulum rubrum recepisse, tunc quidem nudo certe oculo invisibile erit (*p*), & observanti incisori nullum, cui nihil existit, nisi quod videt. Pone nunc a cordis vi impellente idem vasculum pluribus globulis repleri, reddetur conspicuum, & ex *am* nunc emerget, in quo prius latebat. Poterit autem totum vasculum dilatari, ut in rubrae arteriae exemplo, aut si subtiliorem esse placet, poterit pars prior cordis finitima expandi, quæ prima istum dilatati emboli experta sit, ultimumque osculum minutum, unique globulo pervium, & secretioni aptum manere. Æquum enim est creditu, in principium cylindri cor validius nisi, vimque dilatantem expidre majorem, quam quidem in finem.

I I I 2

Deinde

(*n*) Ruyssch *Advers. Anat.* Dec. II. p. 4.

(*o*) Veget. *flavits* f. 44. 45.

(*p*) L. II. p. 115.

Deinde multo res simplicior est, neque tanta egebat perspicacitate. Certum est, utcunque in fetu maturo sistema vasculorum grande fuerit, & pro portione corpusculi grandius, non eo minus tempus fuisse, in quo aorta tota non amplior fuit, quam unius rubri globuli diameter est. Eo tempore nullus in fetu sanguis esse potuit, sed neque fuit. In ea etatula ductus secretorii utique minores, quam in adulto homine fuerunt, cum etiam aorta ne sanguinem quidem transmitteret. Eo ergo tempore per ea vascula excretoria humor magna ratione subtilior transiit, quam per ejusdem nominis in adulto homine vasculum excretorium, neque similis utique humor tunc ex eo viscere prodiit. Nam omnino neque semini in fetu generatur, neque menstruus sanguis, neque bilis (*q*), neque atrum uvae membranae pigmentum (*r*), neque adeps (*s*); sed mucus ubique iners, pellucidus, insipidus, pene aqueus, minori olei, salis terraeque portione fetus. Ipsum ordinem ostendi, quo particulas colorem impertinentes primi in bilem, in oculum, in alias fetus particulas viam sibi aperiunt (*t*). Ita adeo objectio Georgii MARTINE solvitur, ut non verum sit, in fetu similes, quales in vitro, humores separari. Vasa minora sunt, humores tenuiores (*u*).

In minoribus animalibus adultis, si verum est globulos rubres & fibras carneas &que grandes esse, poterunt & ductus excretorii &que grandes esse, ac in vastioribus belluis. Tunc vero necesse est utique, ex paucioribus vasis renem aut hepar, aut alia quaecunque viscera glandulase in minori animalculo conponi, quam quidem in grandiori alio animale ren, hepar, aut ejusdem nominis glandula constat.

§. XL III. Ostiolorum secretoriorum densitates.

Etsi parum hic anatome lucis adfundit, praebet tamen nonnihil, & aliquantum theoria addit. Posita adeo eadem velocitate sanguinis aduentis, eademque particularum, quae ostio excretorio se offerunt, natura, tamen aliis

(*q*) Mucus nempe pro bile. Viredo adparere die 13 & 11. Amaror decimo quarto Mem. sur le poulet p. 160.

(*r*) Incipit adparere die quinto ibid. p. 160.

(*s*) Incipit generari post quartum, certe in meis experimentis mensem, in homine L. I. p. 25.

(*t*) Mem. sur le poulet. T. II. p. 130.

(*u*) Ibid. p. 192. 193.

alius humor separabitur, si alia canalis secretorii in ostiolo suo densitas fuerat. Pone densorem esse, resistet magis impulsis particulis, & majores repudiabit, tum segniores levioresque; admittet aquosas, admittet minores, has quia absque dilatatione subeunt, istas, quia majori momento in canalis secretorii ostiolum nituntur. Contra pone laxum ostiolum secretorum, minus resistet utique impulso humoris, facilius admittit & magnas particulas, & leves mollesque. Densa ergo ostiola secretoria puriores secretiones, sed minus copiosas facient & humores transmittent graves aqueolive: laxa ostia faciunt, secretiones impuras, quod varii generis humores admittant. Hanc contemplationem hactenus Cliftonus WINTINGHAM (x) adgit, & Josephus LIEUTAUD (y), & multo ornatus Franciscus LAMURE (z).

Si anatomen consulueris, & secretionum vitiosas conversiones, non minuetur utique probabilitas hypotheseos. Certum est laxata organa, quae prius densiora fuerant, humores transmittere crassiores. Densus, & acerbus teneræ virginis uterus fomentis laxatus, & vapore, pro muco sanguine stillabit. Laxior idem in multorum liberorum matre, pro eodem tenui muco copiosissimum lacteum albumque humorem fecernet. Sicca vulneris latera tenuem lympham, laxata eadem per calorem, tepidaque fomenta, aut emollientia emplastra crassum pus subpeditant. In exemplo, post amputationem, die quarto, quintove de truncu tenue serum stillat: die 6. 7. 8. solutus, neque coctus adeps: aliquanto serius demum verum, & crassius pus (z*). Posset videri, tenues per densa vasa secretoria humores, crassos per laxa separari.

In corpore humano non minuitur analogia. Renum ductus uriniferi (a) densissima carne sunt: iisdem dum fani sunt, aquæ, ponderosa cum terra intime mistæ, patent. Laxissimi adipis loculi, & per experimenta anatomica, laxæ in eos loculos de arteriis viæ sunt: levis ergo adeps eo secedit, & crassissimus sanguis facile sequitur.

Sed etiam in vasculis excretoriis seminis, uteri, & intestinalibus vil-

(x) A variis arteriis equidem secretorium diversitatibus secretiones varie Enquiry p. 173. 212.

(y) Physiologie p. 166. 167.

(z) Vide n. 37.

(z*) BAGIS U de amputat. p. 405.

(a) Ut suo loco ostendimus.

lis, diversas densitates offendimus: & in arteriis diversorum viscerum artuumque, simile discrimen est (b).

S. XII. IV. Irritabilis vis ducluum excretiorum major minorque.

Etsi neque multi nervi ad glandulas plerasque eunt (c), neque mechanica illa cultelli vel acus irritatio ullum conspicuum motum producit (d), non ideo a glandulis irritabilis natura abest, & fere ubique & excretionem, & ipsam secretionem præcipitat, efficitque, ut glandulæ & multum huniorem excernant (e), & propter morte defectum tenuem, nihilque mutatum.

Aliquando irritatio unice videtur excretionem expedire, cum organum secretorum ne adtingat quidem. Ita in puerpera, lac plerumque tubulis suis coercetur, neque sponte effluit, nisi ultra modum abundaverit; sed omnino in feminis formæ studiosis, commodiorisque vitæ, perpetuo retinetur, inque flavam caseofamque unguenti speciem suis in ductibus abit, quod multos post menses, integrosque post annos ab ultimo puerperio, in mammarum lactiferis ductibus deprehendi. Causam, qua retinet, diximus (f). Si vero stimulus ad papillam accesserit, sive pressio fuerit puerilis labri, sive digito leniter scalpente, aut excutia papillam confricaveris, pallida papilla erigitur, rubet caletque, & una lac crumpit. Ita semen in vtro casto aut diutissime retinetur, aut semper: idemque tamen, si frictio accesserit sensillissimorum in nascentis glandis inferiori parte duorum colliculorum, non absque violentia exilit.

Verum, si accurate, quæ eveniunt, speculator fueris, tamen hos stimulos secretionem ipsam præcipitare, & augere compries. In priori mammæ exemplo, so a frictio in virgine innocentissima (g), in vtro demum (h), nullum unquam lac alioquin datno, sensim repetito stimulo, soli papillæ admoto, tamen lactis generationem auget, & demum tantam ejus copiam suppeditat, quanta ad alendum puerum sufficit. In feminis exemplo, sola mechanica illa glandis irritatio feminis secretionem adeo vehementer accelerat, ut ab ejus jaætura

(b) LIEUTAUD l. c.

(c) p. 377.

(d) Ibid.

(e) De BORDEU p. 317.

(f) Pluræ ducluum lactiferorum

(g) Ibid. p. 442, 443.

(h) Com. Boerb. T. VI. P. II. n. 650. p. 443, 444.

jaclura totum corpus miserrime contabescat (*i*). Ita pollutiones , quas vocant , & testium tumores in gonorrhœa succedunt , & secreto adeo feminis præcipitatur , et si acris ille ichor in urethræ fine paulum super glandem residet (*i**). Ad glandulas irritatas liquores confluere , ut sanguis ad dolentes & inflammatas confluit , nupera conjectura est (*i***).

In aliis secretoriis organis adhuc evidenter irritationis exhibitæ efficiæ est , quæ acri aliquo corpore admoto fit. Omnia autem auctæ in organo secretorio velocitatis phænomena imitantur (*k*) , secretionem nempe celerem , tenuemque , & aquosam , quæ secretioni lente , mucosæ , crassive humoris succedit. In naribus , resorbto pulv're hellebori , aut acri fere quoconque sapidoque corpore , prior mucus emungitur , qui in narium evanulit præt' fuit , atque adeo excretio promovetur , deinde , repetita sternutatione , aqua copiosissime de naribus exturbatur.

Ita in ore , acris cujuscunque fere corporis , sed in primis tamen acrium nonnullarum stirpium , manducatio & excretionem salivæ auget , & omnino etiam secretionem. A foliis absinthii integrifolii , quo'd draconem vocant , communans , & etiam magis a femine *sabadiell.e* , sive ea aconiti species est , sive ex delphinii genere , incredibilis lenta salivæ copia , etiam tunc pergit effluere , quando dudum acrem cum aophelegmatismum de ore rejecimus. Scintilla electrica salivam perinde accelerat (*l*).

Eodem penitus modo acres fuliginis in fumo latentis particulae lacrimalium secretionem ita præcipitant (*m*) , ut ductus resorbentes minime salivæ aquæ absumendæ sufficiant , quæ porro de genis defluit.

Iterum per intestina admissa medicamenta purgantia , glandularum muciferarum , arteriolarumque exhalantium fines , per villos suos patentes , tanta vi sollicitant , ut intensa sape aquæ vis per anum descendat , cuius ne guttula quidem unquam , absque ea violentia , de intestino recto exiisset. Qua vero ratione ea secretio urgeatur , & aliis Cl. viris , & docto nostro olim auditori D. FELICI (*n*) , & mihi non in brutis solum animalibus

(*i*) Lege de his graviter commentante Cl. virum elegantissimumque medicum D. TESSOT *de manufractionis noxie.*

(*i**) MONROE *de semini & testic. p. 64. 65.*

(*i***) ANDREÆ *de tritab. p. 17.*

(*k*) p 418. 419.

(*l*) ZETZELL *confess. electric.*

(*m*) WHYTT *physiolog. effays p. 50. cordis motu nihil mutato.*

(*n*) Addend. ad diap. de motu peristaltico intestinorum in collectionis nostre

bus (o), sed in femina nuper vidisse contigit, cui immensa portio, & incredibilis, recti & laxioris intestini de ano descenderat. Cum enim a Cl. viro Jalapam, a me mitius nitrum, nudo, ruberrimo, & sicco colo intestino inspersum fuisset, undique aquila de innumeris poris rubræ & denudatae villosæ tunicae sudavit, ut totum late commadesceret.

Porro, cum interiore vesicam, continuamque urethram lenissimus mucus modice obliniat, cuius nihil quidquam de glande sani viri destillet unquam, acris quicunque liquor, in sanissimi hominis penem impulsus, copiosum subrubelli, tenuis, calidique humoris effluxum non sine dolore ciet.

Iterum per universam cutem sebum quidem modicum, & tenuis humor perspirabilis se diffundit. Si vero ejusdem cutis cuicunque regioni acres herbas, ut ranunculum palustris apii folio, aut cantharidum tritarum pulverem, aut salem aliquem lixiviosum per aliquot horas imposueris, aut demum ignem, tamquam stimulum omnium potentissimum, minus admovebis, incredibili celeritate enormis vis humoris de cutis vaculis fecernitur, qui epidermidem sibi, ut videtur, non satis patulam, de cute repellit, atque in hemisphaericas bullas cogit elevari.

Quanto vero calerier ea secretio fit, quam sani hominis perspiratio, satis adparet. Si posueris, de tota cute undique ampullas abscedere, quod nonnunquam tristissimo eventu, in magnis ambustionibus factum est: si earum ampullarum altitudinem sex linearum feceris, quæ intra octo minuta horæ ab aqua ebulliente admota efflorescent: si cutis superficiem 15 pedibus æstimaveris; habebis excretionem 10 unciarum aquæ, qualis quidem 24 horis continuata exhalatio ad 75 in hora uncias perveniret, quo tempore in eodem homine non supra tres uncias perspiratur.

Hujus enormis in secretiones potentiae causam sedemque ut exploremus, alia præterea irritationis exempla considerasse oportet, in quibus in toto quidem organo separatorio nihil mutatur, neque ullus stimulus admoveatur, & tamen a mera vi irritationis humoris excretio, & separatio promovetur. Simplicissimum exemplum est salivæ in sano homine ad odorem, vel ad non-men etiam grati serculi, de ductu maxillari profilientis. Aliud in lacrimis est, quarum excretionem aut tristis, aut nimium super oranem spem latus nuntius, perinde præcipitat, ut famosa cepe, acrisve fumus. Sed etiam venereæ idea in fumante frequenter difficilem illam alioquin seminis excretionem

(o) *Second Mem. sur les part. irrit. & sensibl. Exp. 419. 420. 425. 450.*

tionem perficiunt, aucto simul proculdubio modico illo prostatarum humore, qui in fano viro, ut dignitur, ita resorbetur, nunc subito nimia umerate adfusus, conspicuus erumpit (*q*): feminis enim, quod vocatur, major pars ad prostatam pertinet. Porro in timidis mortalibus, inque brutis etiam animalibus, tormento crudeliori subjectis, terror subito perspirabilem hinc morem, de cute repercuttam, ad intestina precipitat, ut feces prodituras diluat. Sed etiam ira bilis (*r*) ad intestina flumen accelerat, sanguinemque (*s*) saepissime per nares urget, ut per muci vasa, aut exhalantis liquoris ostiola erumpat.

Deinde proprius adhuc ad secretionum gubernationem pertinet, mira illa mutatio urinæ, quæ in hominibus hypochondriacis, ad ingratu nuntii adventum, ita enim vidi, subito vesicam stimulat, depositoque colore pallida, & limpida denique aquæ similis effunditur (*t*), durabili etiam viatio, ut in diabeten (*u*) abeat.

Hæc cum viderent Cl. viri, multa inde deduxerunt, quæ ad secretionem regendam spectant. Tonum partium a succo nerveo conservari, ita ad secretionem nervos facere J. Godofredi de BERGER (*x*) opinio fuit. Cl. vero Carolus MALOUIN motum certe liquoris per glandulas, a nervis inhibiri statuit, dum interim cordis impulsio manet (*y*). Ulterius progressus Cl. vir Franciscus QUESNAY (*z*) a diversa sensibilitate vasorum separantium humorum discrimina deduxit. Sed etiam Cl. vir Theophilus de BORDEU tantum nervis tribuit, ut iis ligatis secretiones turbari (*a*): systolen (*a**) autem arteriarum ab iisdem augeri, hinc secretionem, nuper docuerit. David HARTLEY (*b*) motum peristaltico similem in organis secretoriis describit, quo ab irritante causa aucto, plus prodeat humoris. Inde

STAHL-

(*q*) Candor feminis a lacte prostatarum est.

(*r*) PECHLIN obser. 25. L. II.

(*s*) Comment. ad Præl. BOER. T. IV. p. 447.

(*t*) Vix motus muscul. momenta aliqua. p. 15.

(*u*) HOOKE pothum. p. 20. in fallor. Inde dedit, neque a motu sanguinis, neque a celeritate, aut momento ejus, secretionum discrimina perire. Habet etiam K. A. T. ZENSTEIN diabetis sive. quem a nervis vasa venosa confringentibus derivat. Sensibilitas in secretionis vis reperiatur FRANK AMERICK. T. III. p. 418.

(*x*) De natur. humana p. 122.

(*y*) Des corps solid. & fluid. p. 67.

(*z*) Essays sur l'org. anim. T. III. p. 437.

(*a*) Recr. des sur les glandes p. 352.

(*a**) p. 359.

(*b*) Essays on man p. 174.

STAHLIUS, & qui ante *STAHLIUM* animæ etiam vitalium motuum frena tribuerant, ab anima vim secretionis dirigi scripserunt, & nuper (*c*) *Adolphus Fredericus HOFMANNUS* (*d*), animadverfa, ut puto, magna fatelliti nervosi potentia, totam secretionum diversitatem animæ tribuit, quæ sphincterum valvularumve ope secreteoria ostiola regat, eaque modo claudat, ne particulas suis prævisis finibus contrarias admittat, modo ad eas aperiat, quas emitti e re sua putet.

Nimia certe hæc sunt, oportetque memores nos esse, etiam in plantis separationem humorum perfici, deque communi per radicem resorbta penu balsamos, resinas, gummata, coloratum lac separari. In homine euidem, quin nervea potestas multum valeat, vix potest dubitari. In urinæ certe hypochondriacæ exemplo (*e*) vix possis tibi temperare, quin adgnoscas, nervos ostiola urinifera amplexantes stringere, ut exclusis crassioribus, & colore aliquo tinctis particulis, puram aquam solam transmittant.

In plerisque aliis exemplis etiam vix possis te retinere, etiam si anatome nihil hic nos adjuvat, quin in glandulis minimos & inconspicuos musculos admittas, qui ab acri quoconque corpore sollicitati, alterne contracti & laxati folliculos emungant. Idem ipsam per inanitionem ductus aut folliculi, parato spatio, in quod minori cum resistentia novus humor succedat, secretionem etiam ejus succi augere videntur, cuius excretionem præcipitaverunt.

Exempla certe aliqua exstant, in quibus verissime per muscularum irritationem admota acria excretionem urgent, & accelerant: in cavea nempe aliqua præsens vis humoris stimulive musculos, magnos eos & notos, sollicitat, ut molestiæ finem faciant, incommodumque corpus expellant. Ita fæces in recto intestino collectæ agunt; ita semen sani hominis, in seminalibus vesiculis collectum. Utroque enim ex stimulo, pariter convulso acceleratore musculo, anique sphinctere vigilanti fæces, per quietem semen cietur.

§. XIII. V. Ductus excretorii nascentis rellitudo aut anfractus.

Non dubium videtur, quin ductus excretorius rectus, absque angulo ab arteria exorrectus, & absque flexione productus, valvulisque purus & rugis,

(c) PERRAULT du toucher p. 537.

(d) Noe. Hypothes. physiol. p. 13.

(e) Conf. КУКС, НОДЖА, КЛАТЦИМСТЭН 1. с.

rugis, celeriorem primo & uberiorem secretionem faciat, cum obstacula velocitatem frangentia minora sint, quæ continuo considerabimus.

Subtilius aliquanto est, ejusmodi ductum facere humores crudos, nempe ejusmodi, qui cum iisdem adfectionibus immutati exerceantur, cum quibus secreti sunt. Multum enim mora mutat, ut continuo adparebit, hic vero mora nulla injicitur.

Verum brevissimus ductus excretorius facit secretionem facilem, copioam, & crassi humoris. Per brevissimum enim canalem, etiam si paulo angustior fuerit, tamen multo facilis magna particula transibit, quam quidem transit, si idem longus fuerit, & angustia sua continuata repetito itineri ejus particula obliterit.

Denique ductuum excretoriorum, venoso more ex ramis minoribus coalescentium, fabrica humoris universum iter accelerat. Neque enim fieri potest, quin perinde ut in venis (*g*), per truncum angustiorem, quam radices sunt unde confluit, tanto celerius liquor transfigatur, quanto ipse angustior est, si ad frictionem utique auctam, non respexeris.

Hæc si ad anatomes leges expenderis, non valde absonta videbuntur. Recti primo ductus uriniferi (*h*), secretio adeo copiosissima, fluida eadem, etiē postquam in folliculum deposita fuit. Brevissima vascula adipem secernentia, quæ forte unicè pori sunt, hinc velox secretio, & crassi humoris, & crassioris sanguinis facilis eruptio. Demum omnium ductuum excretoriorum, qui venas referunt, exque ramis coalescent, humores omnes aquosi sunt, & tenues, & copiosi, nisi bilem excéperis, quæ tamen & ipsa ab hepate adeo fluida advenit, ut nuper, & ab insigni corporis humani scrutatore (*h**), pro lympha habita fuerit.

Celerius etiam fluet, si vasculum separans amplio, patuloque ostio, nullam resistentiam opponente, suæ in destinatiovis sedem patuerit, ut in pancreatico ductu.

Post contrarias causas eventa contraria expectari possunt. Ergo si ductus excretorius minime recta via ab arteria sua prodierit, sed plicam cum ea interceperit, difficulter humorum recipiet (*i*), tardaque secretio erit.

Si ductus excretorius toto suo itinere angustus est, frictio augebitur, & tarditas humoris (*k*). Si longo itinere ab arteria ad excretorium po-

K k k 2

rum

(*g*) L. VI. p. 324.

(*h*) RUVSCH Tbos. III. T. 4, f. 3. &c.

(*h**) VIEUSSENS in off. d'anus. Et de pratique.

(*i*) L. VI. p. 187.

(*k*) Ibid. p. 185.

rum iter fecerit, tardus quidem motus erit (*l*), a frictione diurna, & consequentur omnes ex mutationes, quæcunque a retardatione expectantur, adtractione particularum similium, & viscidarum potissimum, & resorbitione venosa. Cæterum ductus excretorius difficiliorem se præbebit crassiore cuicunque particula, & secretio purior erit.

Si flexiones in ipso ductu repetentur, tardius (*m*) equidem & longiore demum tempore transibit humor, idemque omnibus causis mutantibus obnoxius erit, & adtractione molecularum augebitur (*m**).

Si plicæ (*n*) in canale fuerint internæ, rugæque, quibus superficies exasperatur, quam transfluens humor contingit, etiam hæc causa frictionem augebit, tarditatem faciet, ejusque effectus.

Si ductus excretorius in latiorem caveam quomodocunque se diffudere, retardabitur in ea cavea effusus succus, tanto potentius, quanto lumen partis dilatata latius erit lumine partis angustioris (*o*).

Si ductus excretorius in fine suo insigniter angustior fuerit, retardabitur utique in ipso ductu humoris fluentum, aut nullum erit, totusque rotinebitur. Exempla sunt in vasculi seminalis ostio ad urethram (*p*) patente, in ductum salivalium, in primis maxillarium ostiis, in sinuum pituitariorum fine ad nares aperto.

Pleraque ista anatomie confirmat, si quidem fabricam ductuum excretoriorum adtingit. Animalibus herbivoris longissima intestina, fæces siccæ; carnivoris brevia, fæces vix motatae, fluidæ. Longissimus omnium ductuum excretoriorum seminalis est, humor lentissimus.

Non aliud eodem seminali ductu angustior est.

Non aliud magis flexus, & crispioribus cincinnis, quam testis ipse, tum epididymis (*q*), & ductus deferens. Tanta inde nascitur retardatio, ut vix ulla vi mobilissimum etiam argentivivi metallum, lentissima pressione, epididymidis plicas relegat, tantumque flexionum est (*r*), ut pressione progressiva destructa, lateralis denique sola supersit, ductumque, satis cætera

(*l*) p. 178. 179.

(*m*) p. 186. 187.

(*m**) In vasis contortis uniuertunt globuli (sanguinei) NEIFFELD n. 168.

(*n*) p. 182.

(*o*) p. 176.

(*p*) *Prim. in physiol.* p. 783.

(*q*) Obs. nostr. in phlegm. transfact. n. 494. conf. BEZELIN l. c. prop. 39.

(*r*) Numerum flexionum initivit Cl. MUSKOO, & ad 1108 in teste, ad 11100 in epididymide estimavit l. c. p. 30. 32.

tera densum, fere semper perrumpat. Sed etiam alii humores viscidi pli-
cas suas passim habent, ut bilis in cystico ductu repetitas illas flexiones (*s*),
quibus cervix vesiculae contorquetur. Lactis etiam tubuli solis plicis (*t*) in
in quas in papilla laxata collabuntur, ita clauduntur, ut longe plerumque,
nihil ex plenissimis mammis effluat, donec irritatio accesserit, & viam rec-
tam aperuerit. Sebacei palpebrarum canales repetito flecentur.

Internarum plicarum exemplum in viis bilis est, quarum totus canalis un-
dique reticulato opere exasperatur (*u*), cysticus vero ductus adeo arte a
cellulosa tela in brevitatem colligitur, ut membranae in tubulum emineant,
quas pro valvulis habeas (*x*), & quae totum pene canalem repleant. In-
testina valvulas habent, humorenique, qui ex ea fluiditate, quae in tenuibus in-
testinis ipsis maxima est, in crassitatem & siccitatem addensatur, quae notissi-
ma est.

Ductus epididymidis latescit, dum in deferentem abit, deferens ipse in
cellulas laxatur (*y*) contortuplicatas, hinc semen etiam absque vesiculis
viscidum. Folliculis proprium locum destinamus.

§. XIV. VI. Receptacula & Folliculi.

Frequentissime hoc mechanismo natura utitur, ut humorem secretum re-
tineat, perficiat, inspisset, ad destinatos usus contemperet, legiuma occa-
sione effundat. Varium receptaculorum genus est, grandius alterum, quod
ad instrumentum secretionis non numeratur, alterum minutius, quo pro-
pius ad secretoria organa pertineat. Inter grandia receptacula sunt intesti-
na pro bile, pro succo intestinali, pro massa cibaria, pro saliva varia: ve-
sicula fellis pro bile, & muco: vesica urinaria pro lotio: cellulæ ductus
deferentis & vesiculae feminales, pro testium spermate: caveæ articulatio-
nū & vaginalrum tendinosarum pro albumine articulari: sinus pituitarii,
ventriculi laryngis pro muco: uteri cavea pro uterino sero; sinus valvulosi
ad orientis vaginæ latera, pro muci propriis fontibus; capsulae renales pro
suo rubro flavescente humore: utcumque etiam oculi cavitas hinc conca-
va cornea, inde convexa lente crystallina intercepta, pro humore aqueo-

K k k 3

Minora

(*s*) *Prim. lus physiol.* n. 688.

(*t*) *Præf. Comm. Boerb.* T. V. P. I. p. 427. *Prim. lus.* n. 850.

(*u*) *Ibid.*

(*x*) *Ibid.* n. 783.

Minora receptacula , pariter suum liquorem recipiunt , & adservant ; donec a causa aliqua peculiari , neque ad vires humores universos in circulum agentes referenda causa , evancentur : Eo folliculi simplices varii generis pertinent , quos ubique Natura viscidis humoribus perficiendis præficit (z) : tum sinus sive folliculi oblongi . Huc etiam possit ductuum secretiorum dilatacionem , cellulæisque referre . In ipsis plantis cryptæ , sive nectaria , viscidum humor colligunt .

Non raro est , eundem humorum plus semel in folliculos & receptacula deponi . Ita narium mucus ex arteriolis in minimas cryptas , ex cryptis in sinus pituitarios effunditur . Maxillares sinus in cadavere , ossibus undique remotis , ut membrana sola superfit , semper muco plenos reperias .

In bilis via & folliculis felleus est , & intestinorum cavitas .

In semine omnium plurima receptacula alterneque ampliores ductus natura conjunxit . Laxius rete est , quod albuginea subjacet , per angusti ductus illi , qui conos vasculiferos efferentes constituant (a) . Iterum his ductibus , qui multi sint , angustior canalis epididymidis , et si singulis laxior est (b) . Laxatur idem in deferentem ductum , qui tamen ad imum testem latior (c) , in itinere ad vescicam urinariam angustior fit . Sed idem in cellulas sub urinaria vesica multo ampliores (d) diducitur , quas angustus canalis sequitur (e) , quo ex cellulæ in vesiculos patent . Ibi semen de novo in amplum receptaculum , idemque mire anfractuosum se diffundit , ut porro , suos ad usus , per angustiorem ductum seminalem (f) in urethram , nihil porro moraturam , exprimatur .

§. XV. Varia follicularum efficacia . Retinere humorum secretum .

Variis modis fit , ut in folliculis humor colligatur & retinetur . Celeritas equaliter omnis , quam a vi impellente cordis depositus humor habuit , in

(z) *Sauvages physiolog.* p. 178. &c.

(a) *P. d. Transf.* n. 494. T. 2. f. 1. e. e.

(b) Testum vascula $\frac{1}{200}$ pollicis æqualia fecit Ci. Alexander Monrooo Alix.

F. cum vas epididymidem constitutus sit $\frac{1}{80}$ ejusdem mensuræ .

(c) *Pbil. Transf.* L c. T. 2. f. 1. inter g & h.

(d) f. 2. g.

(e) *Ibid.* o.

(f) *Ibid.* p.

in folliculo evanesceret (*g*), ut alibi ostensum est, si clausus foret. Cum tamen apertus sit, & ostiolo ad sedem fœ utilitatis pateat, oportuit efficiere, ne continuo, ut in folliculum seponitur, ita per excretorium osculum effundatur.

Huc ergo angustia ostii excretorii facit, quæ aquæ quidem parum, mulci nihil dimitat, nisi pressio accelerit. Id fere commune naturæ præsidium est in folliculis glandulosis, in magnis receptaculis bilis, urinæ, semenis, in sinibus pituitariis, ductibus item excretoriis salivalibus.

Est, ubi anfractus excretorii ductus exitum morantur, ut in ductibus seminiferis, bilariis, lactiferis, & in intestinis, inque pituitariis sinibus; est ubi valvulae iter humori per excretorium canalem difficile reddunt, ut in via bilis. Est ubi sola vis ponderis in uno altero corpore corporis humani situ effluxum humoris retentum moratur, ut in maxillari sinu, quoties caput in idem latus recubuit; & in vesica urinaria, cujus pars posterior repleta infra anterorem descendit. Sed etiam bilis de folliculo suo adscendere cogitur (*h*), ut effluat, & sinuum mucosorum penis vulvæque multi fundo suo deorsum spéctant.

Aliquando dura cellulosa tela, denso quasi niuro circumposito, ductum excretorium comprimit, ut quidem prostata ductus femineros arctat. Aut inter membranas tubi alicujus idem oblique incedit, ut a pressione humoris in magna tubi cavea contenti comprimatur, in ductus biliferi & pancreatici exemplo. Aut intra propriam papillam retrahitur, atque ostiolo connivet, quam papillam vis deorum accessoria extendat, ostiolumque in rectitudinem porrigat, ut in Whartoniano salivæ ductu.

Alibi fibras inter musculosas ductus excretorius prodit, quarum vi coegeratur, nisi contraria causa accesserit. Ita de urethra de vesica prodeuntis ostio vulgo certe creditur, ita intestinum, folliculorum maximum, sphinctere manifesto clauditur.

Verum eti in aliis canalibus excretoriis constringentes ostiola musculos ostendere non licet, non ideo minus idoneo rationis usu demonstrantur adesse. Ita in cute musculosi nihil adparet, neque irritabilis natura experimento anatomico confirmatur (*i*). Notissimum tamen est, cutem a frigore & a terrore ita constringi, ut suppresso sudore, & perspiratione cohíbita, tota in

(*g*) p. 393.

(*b*) *Prim. lin. phys. n. 688.*

(*i*) *Exper. sur les part. irritable.* p. 45.

in tubercula elevetur, quæ cum cute anserina populari sermone comparantur. Eorum tuberculorum non alia origo esse videtur, quam subita ductuum perspirantium constrictio. Ea vero non potest nisi a vi contractili; nempe a fibris inco-aspicuis orta fuisse, quas nervea potentia sollicitaverit, contrahique coegerit. Neque dubium est, si in ejusmodi violentia propria in cute fabrica adfuit, quæ contractionem operaretur, quin eadem etiam fabrica in fano hominis præsto fuerit, quam nulla cum specie veri subito per terrorem ortam fuisse dices. Nunc si sphincterum similes vires adfuerunt, quæ vasorum cutaneorum oscula subito clauerunt, earum natura semper eadem fuit, quæ tota in contractione ponitur. Adfuit ergo ejusmodi machina, quæ, magno ex stimulo excitata, ductus perspirantes totos obturat, modica vero vi eosdem arctat.

Non alia videtur causa esse, quare in glandulis sinibusque amplio, ut videtur, ostiolo patulis, inque urethra, ejusque ad summam vaginam exitu potissimum (*k*) apertis, tamen mucus magna capia congregetur, quem vis venerea, subitave irritatio subito sepe expellat.

§. XVI. In folliculis retentus humor spissatur.

Princeps equidem folicularum, & communis effectus est, viscidiores reddere humorem, quem fluidum receperunt, nisi omnino natura ejus humoris ab omni visciditate aliena est, ut in aquo oculi humore. Ipsa vesica urinaria urinam, non quidem viscidam, minus tamen aquosam magisque & coloratam, & secundam reddit, quam accepit. De bile, semine, muco dubium nullum est. In naribus aquosus omnino & pituita limpida nascitur, eamque naturam conservat, quando in coryza de naribus defluit, aut emungitur; tunc enim singularis acrimonias nares sollicitat, neque sinit muci materiem in naribus eam morari agere, a qua viscorem contrahit. In homine, cuius faciem frigus percussit, quod exemplum omnem morbi suspicionem excludit, tenuis utique & limpida fistula de naribus delabitur. A repetita sternutatione, ejusmodi aqua exturbatur, qualis nempe præsto fuit, postquam prime concusiones paratam muci penum exhauserunt. Sic perinde, qui solet vitreus de aspera arteria mucus excreari, idem a convulsiva tussi, absque morbo etiam

(k) Conf. hist. nostram uteri in *systome I. icon. anatom.*

etiam ex fumi stimulo , aut illapso alieno corpusculo nata , subito excutitur , neque naturam morando mutare potuit , aquula mera est . Saepè videtur , lacte calente contemperata ea violentissima tussi , continuo malum remittere , quando vel paulum niuci cocti ejicitur . Id enim significat , fragilis vi acrimoniae nunc in folliculis suis mucum solitam moram ducere . Ita porro intestina lentissimo muco obducuntur : verum si acris clyster , per rectum intestinum impulsus , sensilem naturam intestini sollicitavit , continuo tenuis aqua ejicitur , qualem etiam a timore , aut ab ira decessisse vidi . Sed etiam de urethra monui (*l*) , flaventem aquulam , non absque dolore educi , si acrem liquorem injeceris . Cerumen ipsum , adeo lentum , fluidum tamen educitur , quando diutius sollicitata aure , demum nuper natum conspicuum prodit . Vidi , neque amarum , neque spissum , dilute flavum , mollesque olei simile prodiisse . Seminis per loca , post nimiam venerem , inque illa gonorrhœa , quæ a viroso eorum organorum ulcere sequitur , imbellis aquæ gutta effunditur . Bilis de hepate lymphæ similis effluit (*m*) : eadem in folliculo felleo ita crassescit , ut fila trahat , postquam in eo receptaculo aliquandiu quievit .

Inspissari adeo humorum folliculis receptum , non dubium videtur . Unde spissescat , facili labore ostenditur . Aliquid calor potest , qui particulas tenues & aquosas omnium humorum , etiam extra animalium corpora , diffat & abigit . Bilis certe particulas penetrabiles de folliculo suo emittit , quæ & exteriore vesiculae membranas , & vicinum amplius intestinum , & peritonæum , late flavo colore tingunt . Tenuorem esse bilis partem necesse est , quæ per membranas folliculi vijam sibi aperuerit , dum reliqua pars bilis retinetur . Sed tenuiori parte abacta , spissescit residuus humor .

Neque nihil potest adtractio particularum similium , quam nullus nunc progressivus motus turbat . Ergo colligentur ad aqueas particulas aquæ , ad oleosas oleosæ , ad mucosas mucosæ . Quæ ergo pingues , aut mucosæ moleculæ , cum aqua mixta , per sanguinem inconspicue oberrabant , tæ nunc per quietem coeunt , inque adiposis cellulæ in verum adipem , in mucosis receptaculis in verum mucum adunantur (*n*) .

§. XVII.

(*l*) p. 440.

(*m*) p. 443.

(*n*) J. de GORTER de Secretione n. 45, 46.

§. XVII. Pars tenuior humoris resorbetur.

Verum plus in humoribus incrassandis omnino potest tenuioris latice resorbio per venulas, quæ de cavea folliculi hauriunt. Nobile hoc, quantum memini, magni Praeceptoris nostri inventum est (o). Nempe, uti in folliculum undique arteriolæ minimæ patent, humoremque suum exhalant, ita vicissim plurimæ venulæ, in idem folliculi cavum productæ, aqueam & volatilem partem depositi humoris resumunt, sanguini reddunt, & reliquum adeo in folliculum humorum spissiorem relinquunt. Non difficilis & in magnis receptaculis, & in minimis, est demonstratio. In magnis quidem princeps exemplum intestinorum est, in quibus de fluida massa ciborum, etiam in febriente homine, qui nihil non fluidum per os admisit, ad finem laxiorum intestinorum, ne guttula per anum amissa, nihil superest, præter durissima, lapidum pene similia scybalia. Causa simplex est, & oculorum testimonium habet. Aqua enim per venam portarum impulsæ, & rebinthinæ oleum, facillime, totis libris, per venas mesentericas in caveam intestinalium depluit.

De semine partem volatilem resorberi plurima ostendunt, & fætor potissimum, qui carnes animalium masculorum undique replet (o*). Is proprius maribus nidor non a particulis seminalis est, quæ per sanguinem oberrant, ut per testes separentur, sed omnino a particulis sit, quæ de semine jam nato resumuntur. Castratum enim animal hoc toto pædore, & una cornubus, in cervino genere caret, cui sola vasa seminalia revincta fuerunt, nihil ergo mutatum est, unde fieret, ne in sanguinis massa de cibis ejusmodi particulae generarentur.

Sed eamdem venarum resorbentium frequentiam suis locis demonstravimus, aut porro confirmabimus, in caveis pleuræ (p), pericardii (q), peritonæi (r), ventriculorum cerebri (s), vesiculæ felleæ, vesicæ urinariae (t)

(o) *Præl. Acad.* T. II. ad n. 219. addito etiam intestinalium exemplo. Sed etiam superi scriptores parcus ejus resorptionis meminerunt. Habet Cl. NIFFELD p. 38. & FURANT *splanchnolog.* T. I. p. 374. sed imprimitur præstantissimus vir *Abrabonus KAUV BOERNIAVE de perspirat. hippocr.* multis locis.

(o*) Fætor veneris tempore apri caro & cervi, & sapore fit nauseoso *HUMAULD des vapores* p. 289. 299.

(p) L. II. p. 152. 153.

(q) L. IV. p. 297.

(r) L. II. p. 152. KAUVW n. 614.

(s) L. II. p. 153. KAUVW n. 614.

(t), humoris aquae (u) oculi. In ea enim receptacula omnia aqua per venas impulsa, undique exfudat, & perinde ipsum dissolutum in frumenti spiritu pisicum gluten.

In minoribus cellulis pari facilitate demonstratur, aquam per venas impulsa exfudare in loculos adipis (x), cavernulas pulmonis (y), folliculos intestinalis solitarios (y*), &, ut uro verbo totam rem comprehendam, tam late inhalatio venosa patet, quam exhalatio arteriosa (z).

Est ubi de ductu iplo pars tenuior per vas lymphatica resorbetur. Eo vasculum de epididymide aberrans pertinet, quod a me inventum junior (a) Monroous confirmavit (b).

S. XVIII. *Hunores in folliculis depurantur.*

Hec maximii momenti maturatio proxime utique ad arcanam artem interpretandam accedit, qua natura ex eodem sanguine humores adeo multis dotibus a se invicem diversos eduxit. Nempe dudum vidimus, vix evitari posse, quin cum crassioribus humoribus tenuiores una secernantur. Aegerrime enim fieri potest, ne per crassius ostiolum etiam tenuiores particule viam inveniant (c).

Neque intra speculationem hæc observatio consistit. Certum est enim adipem, quando primum generatur, aqua mistum, gelatinæque similiorem esse. Bilia primum nata dulcis & aquosa est, tenue semen, quando primum per colla sua in receptacula descendit.

Hanc nunc aqua vitiosam ubertatem resorbentes venulæ emendant, dum quidquid est tenuis laticis, suisque ostiolis idoneum, resumunt; crassiora, ut nimis arcta, respuant; acris sepe a vi stimuli contracta repudiant, ut certe bils a lacteorum vasorum ostioli respici videtur. De adipe adeo, plurima aqua mixto, qualis nuper in cellulosis adiposas fecessit, cum plu-

(t) Idem n. 492 BORRHAUVE Inflit. n. 334.

(u) Comment. ad Prædict. Borrh. L. IV. p. 153.

(x) L. II. p. 151. &c.

(y) Conf. interius prim. lin. phys. n. 272. KAAUW &c.

(y*) Aequo enim feliciter per arterias perque venas repletur.

(z) KAAUW plurimis locis.

(a) In progr. de oīs feminis a. 1745. edito.

(b) In diff. de semine & testibus.

(c) Humores non generantur puri CYPRIANUS in epist. de seu tubario p. 58. 59. Patet tamen cum crassis particulas secerni HAMBERGERUS de secretione in genere p. 58.

rimam aquam venule resumant, in isto quidem exemplo lymphaticæ, prior utique inflammabilis materiæ relinquitur. De bile, dum tenuis pariter latex hauritur, reliqua portio & viscidior fit, & amarior, veriorque bilis. Idem in articulorum humore, & in toto corpore animato locum habet, & humores omnes indolem sibi propriam sinceriorem induunt, postquam superflua, nihil ad characterem faciens, & omnibus communis aqua secessit.

§. XIX. *Commixtio diversorum humorum.*

Sed uti ad perfectionem quorundam humorum pertinet puros esse, uniusque & ejusdem generis particulis unice conponi, aliorum ad humorum naturam contra postulatur, ut ex diversis succis coalescant. Non alia ratione hæc elementorum commixtio commodius obtineri potuit, quam receptaculo, in quod diversa colla excretoria patent, quæ diverse pariter indolis latices advehunt. Ii enim in folliculo retenti, calore fani animalis digesti, eo potentius miscentur, quo adservantur diutius. Ex chemicis enim notissimum est, olea difficillima, tenuesque balsamos, sola digestione intime solvi, & cum vini spiritu potentissime misceri.

Iterum multis modis diversi humoris in eundem folliculum convenire possunt. Simplicius ex theoria sumptum artificium fuerit, si in receptaculum quocunque arteriæ diverse magnitudinis apertis ostiolis patuerint, aut in eundem & arteriosus humor exhalaverit, & pigrior aliis de glandulosis cryptis succus subiverit. Earum enim aliae crassiores humoris percolabunt, teneriores aliæ, quale fere intestina exemplum præbent. In id enim receptaculorum amplissimum & crassus de glandulosis folliculis mucus venit, & tenuior, satis tamen & ipse crassus humor, de majoribus & conspicuis vilorum ostiolis, & tenerrimus denum de inconspicuis, etiam armato oculo inaccessis arteriolarum finibus. Hæc quidem Petri NANNII (d) viri Cl. speculatio fuit.

Alio modo, potest in receptaculo definitæ indolis humor contineri, ad eum vero per exhalantes arteriolas aliis, multo tenuior adfundi, aut per glandulas vicissim, crassior aliis adtemperari. Ita probabile fit, ad HAVERSIANUM albumen in articulorum caveis perspirabilem & aqueum arteriarum sudorem addi. Ita non dubium videtur, quin in bilis folliculo

ad

(d) *Comment. Acad. Bonon. T. I. p. 312.*

ad hepaticam subamaram subpinguem lympham, & mucus in folliculis ejus receptaculi natus commisceatur & aquosus latex, qui de arteriolis exhalat. Ejusmodi pariter tenuis humor in vesiculas seminales per arterolas videntur deponi, mucusque forte, qualem reticulata interior fabrica promittit. Eo etiam PRÆCEPTORIS nostri (*e*) conjectura tendebat, qui ipsos animales spiritus in glandulis quidem conglobatis lymphæ, in ventriculo massæ subigendæ admisceri persuadebatur, et si ea quidem hypothesis demonstrationem non admittit.

Potest demum ad humorem in receptaculo adservatum liquor alibi adfundi, qui per proprios ductus adveniat, ut adeo ex duobus, jam suis diversis in organis secretoriis percolatis, liquoribus tertius contemperetur. Hujus opificii plurima in corpore humano exempla sunt. In chymum, quem ventriculus submittit, natura bilem, alio in viscere natam, & pancreaticum succum adfundit, ut nova inde, fluidiorque miscela nascatur chyli nomine (*f*). Ita ad cisternam chyliferam albus pinguisque chylus, & gelatinosa lympha conveniunt. Ita in ipsa urethra semen ex testibus expeditatum, cum lacte prostatico miscetur, inque nonnullis quadrupedum ad viscidissimum semen (*g*) propriarum glandularum tenuior humor adfunditur. Ita in articulationum, quas vocant, capsulis, cum gelatina HAVARSIANA oleum, de ipso ossis majori tubo penetrabile, convenit.

Per ejusmodi artificia folliculus omnino contrarias priorum affectiones, in humore separato generare poterit, & dilutionem, & fluiditatem majorum. Si enim arteriarum in folliculum exhalantium copia & laxitas maior fuerit, humorque tenuis maxima cum ubertate in folliculum depluerit, dilui utique poterit, & fluidior exire, qui in eo folliculo residet humor. Exemplum in fæcibus alvinis est, quas irritatio aucta, & copiosus humoris arteriosi confluxus, evidenter mollit diluitque.

S. XX. Acrimonia in folliculis nascitur.

Humores humani pene omnes ejus sunt indolis, ut in calore, qualis est corporis humani sani, aliquot diebus conservati (*h*), si præterea clauso

L 11 3

in

(*c*) Præl. Acad. T. II. p. 395. 396. VIRUS & EXS. metriograph. p. 102. nov. system. varior. p. 97. &c.

(*f*) NISIFELD p. 68. 69.

(*g*) MONROO L c. p. 57. In ariete viscidissimum Hist. natur. T. V. p. 27.

(*b*) L. V. p. 84. seqq.

in receptaculo humiditatem suam retinuerint, acrimoniam utique concipient, quæ ad putredinosam corruptionem dicit, & urinosa indoli favet. Sed ejusmodi mutatio non uno loco ad prævilos Naturæ fines pertinet, neque absque ea acrimonia idem humor suis officiis digne defungi possit. Ita in vesicula fellis bilis (*h**), quæ mitis ab hepate advenit, amarissima redditur & acerrima. Ita in seminalibus vesiculis semen de testibus veniens, flavescens idem & tenue, in sature flavum, olenisque liquamen abit. Sed etiam lac stagnando ex dulci amarum redditur, & in muco partium muliebrium acrimonia suboritur (*h***). Atque id ad corporis integritatem spectat, ut in laxioribus intestinis fæx alvina acrior fiat fætidiorque.

§. X X I.

Folliculi humores retinent, ut suis aptisque temporibus unice effundantur.

Cum priori contemplatione hæc ipsa necessaria adfinitate conjungitur. In folliculis nempe & receptaculis humor moratur, & colligitur, ut uno eodemque tempore omnis effundatur, quod quidem tempus vitæ animalis communis adaptatur. Exempla sunt, ubi copia quaeritur humoris utilis, qui absque follicularum præsidio perpetuo defluens, neque ad loca a Natura destinata, neque necessario impetu, neque ea copia perveniret, quæ vite usibus sufficiat. Ita semen quidem necesse fuit in vesiculos, aut in partes vesiculis ductus deferentis cellulas colligere, ut in massulam alicujus & molis & ponderis fieret, quæ a musculo acceleratore momentum itineri agendo æquale recipere posset. Eo enim momento eguit, ut per vaginam, sepe longam, uterumque, in quadrupedibus longissimum, ad ipsa ovaria vis feminis pervenire, indeque, quodcumque est humanitatis elementum, exturbare posset. Huic enim officio nunquam guttula feminis sufficeret, qualis a vasculo epididymidis stillare potest.

Ita probabile est, omnino vesiculam felleam bilis aliquam penum colligere, quæ eo maxime tempore in duodenum copiosior effunderetur, quo digestio servet, bileque plurima opus est (*i*). Sed etiam in valvulis illis laryngis, in folliculis pharyngis, in cryptis, totoque longo intestinuli vermiculati

(*b**) QURSNAT *anim.* T. II. p. 175.

(*b***) FANTON p. 189.

(*i*) *Prim. lin. physiolog.* u. 691, 692.

miculati folliculo, in cellulis extremiti intestini recti, mucus colligitur, qui loquela, deglutitioni, excretioni excrementorum adjuvandæ, sub ea maxime tempora uberior suppetat.

Alia sed ad finis iterum, follicularum utilitas est, fætidos sensibusque ingratos humores aliquos reservare, ne præter voluntatem perpetim defluant, corpusque civili vitæ destinatum inquinent. Ita urina in vesica propria, ita in laxis intestinis fixa alvina, ita in naribus mucus, inque suis vesiculis semen retinetur.

S. XXII. Ut folliculus evacuetur.

Etiam id boni ad servatio humoris facit, ut acrimonia sua, & copia, receptaculum suum potentius irritet, viresque adeo evacuantes follicelit. Ita obtinetur, ut neque ultra aptam naturæ finibus copiam, neque ultra definitum acrimoniae gradum humores nostri reservari, neque vitæ commodis obesse possint, utque demum ad destinata loca quisque humor veniat. Quam insuperabilis enim vis stimuli sit, quo humores, etiam mitiores, excretionem suam follicent, docet necessitas intolerabilis, qua ad sternutationem, tussim, alvi laxationem, mictionem, seminis effusionem cogimur, ut corpus humanum retento humore liberemus. Quibus vero machinamentis hæc excretion obtineatur, ostendere oportet.

Musculus est, qui irritatus contrahitur, musculosam fabricam, plerumque conspicuam, aliquando sensibus nostris subtiliorem, Natura folliculis circumdedit, quæ ab extensione, ab acrimonia, a cupiditate sola & imaginationis vi, irritata humorem de folliculo expellat.

Diversis autem modis musculosæ fibrae folliculo adaptantur. Aliquando in ipsam folliculi fabricam recipiuntur; alias exterius & quasi eininus circumpositæ, aut unum folliculum, aut totum glandularum systema una exinaniantur.

Proprias grandium receptaculorum musculosas fibras paßim oculis percipimus. Quin ventriculus, & intestinum, & vesica urinaria, & uterus a suis musculosis fibris inaniantur, dubium non est; et si enim aliqui Cl. viri dubitarunt, experimentorum tamen fide confirmatur.

In folliculis minoribus omnia minora sunt, neque fibrae musculosæ aut oculis dispalescant, aut experimentis crassioribus, quæ acu fiunt aut scalpello. In iitdem tamen folliculis vim irritablem acrimonia chemica detegit, quæ

quæ in vivo homine admota , eorum humorum excretionem mire accelerat . Cryptas narium errhina medicamenta emulgent , oris glandulas apophlegmatizonta , faecium mucum gargarismi educunt , intestinorum leuita hunores acres pulveres inspersi concitant . Analogiam folliculorum cum ventriculo dudum Cl. viri (k) senserunt , neque in donandis fibris carnis avare se gesserunt . Omnibus glandulis alii motum peristalticum tribuerunt (l) , alii excretoriis arteriis carneas fibras adsignarunt , quibus & stringerentur alterne & laxarentur (m) . Alii non veris solum folliculis , sed pulmoni præterea , hepatis , renibus , testibus , vires suas musculosas donarunt (n) .

Facilius est , in exteriori systematum folliculosorum facie musculosam fabricam detegere , ut quæ grandiora sint . In animalibus equidem glandulae , quæ in avium ventriculo membranaceo (o) , inque castroris (p) ventriculo pulcherrimæ sunt , carneis fibris ambeuntur , quas eximiens olim WEPFERUS pulchre descriptas dedit . Sed etiam unguentum odoratum Zibethici (q) animalis , alteriusque ex africa (r) moschum fundentis , & folliculi castorei (s) : deinde vulgares illi avium (t) , & plerorumque quadrupedum circa anum positi , statidi unguinis facculi , involucra sua musculosa habent . Glandulae mucosæ marsupialis , five didelphidis , cum suis facculis a sphinctere comprimuntur (u) . Cutaneus musculus glandulas colli in castore descriptas exprimit (x) .

Sed neque homo ejusmodi involucra nulla habet . Testium numerosissimi sunt excretori ductus , musculus qui comprimat unicus , nempe cremaster , qui de toto teste semen exprimit , in equo quidem evidens (y) . Ita cryptæ minores adeo numerose , pharyngis , œsophagi , intestinorum , membrana communis carnea , fibrisque anulacibus totum tubum ambeuntibus adeo .

(k) MORGAN L. C. p. 140.

(l) LANCISSEUS diss. III.

(m) BURCHART de secret. p. 39. 40.

(n) BELLEIN dijcors. Anat. I. p. 19.

(o) Eph. Nat. Cir. Dec. I. abn. z. obs. 251.

(p) Ibid.

(q) PERRAULT. Mémoir. pour servir à l'hist. des animaux T. III. P. I. p. 165. MORAND Mem. de l'Acad. des Scienç. 1748. p. 446.

(r) Franciscus Gigot DE LA PETRONLE Mem. de l'Acad. des Scienç. 1731. p. 453. 456

(s) WEPFER 1 c.

(t) BLAAS. Avian. min. p. 27. in cane &c. Hist. natur. T. VII. p. 119. in mele-

(u) COWPER philos. transf. n. 290.

(x) FANTON hist. Anat. p. 52.

(y) MALEPIGNIUS ac. fabrie. gland. conglob.

adeo arcte teguntur, ut nunquam ex fibræ officio suo fungi, majoremque tubum arctare possint, quin ex iis cryptis mucum exprimant.

Iterum alio modo, & amplissimis potissimum receptaculis evacuandis Naturam prospexit. Totum nempe, sed cum systemate vicinorum viscerum, amplissimo musculofo cingulo circumdedit, quo ita universa cavitas, cum aliis partibus receptaculum continens, de quo queritur, arctetur, ut is una folliculus potenter urgeatur, & exprimatur. Ita musculosa illa potentissima prela hinc transversi septi, inde muscularum obliquorum & transversorum abdominis, maxima vi utecum, vesicam urinariam, felleamque vesiculam inaniant. Ita levatorum ani cingulum musculosum feminales vesiculos & prostatam exprimit, ita uulam columnæ duæ muscularæ pharyngis urgent (z). Neque valde diversum artificium est, quo parotidem subiectus masseter agitat, maxillare glandulam biventer, palpebrarum orbicularis musculus lacrimalis glandulam, sublingualem mylo-hyoideus, thyroideam sternothyreoidem, sternohyoidei, aliique.

Video dudum STAHLIUM, & Michalem ALBERTUM (a), & nuper Theophilum de BORDEU (b) e re suæ sedlæ existimasse, ut hanc pressionis mechanicæ vim rejicerent, qua glandulas exprimit. Adeo vero manifestum est, a viribus muscularis maxillas agitantibus salivam elici, ut etiam ligno dentibus subacto copiosa adfluat, a qua certe perfecte mechanica vi omnis cupidus & voluntas abeat. Experimentum leve, ad demonstrandum tamen, quod ostendere oportet, breve & efficax, ipse feci.

Aliud non muscularum pressionis genus est, quo ventriculus cibis plenus, & ab aere distentus, vesiculam sellis urget. Ita omnino sèpissime magna portione ceræ in vasa intestinalia acta, elisa eorum cavea, fæces per alvum exivisse. Ita dilatato aere, inque ab domine se expandente, sub inanitam campanam inclusa animalia fæces egerunt.

§. XXIII. Receptacula cæca.

Non absque exemplo est, omnino nihil de cava glandulosa evacuari, quæ undique cæca sit & clausa. Ita cavae articulationum, adeo & grandes

(z) Non disertante Theophilo de BORDEU, *recherches sur les glandes p. 130;*

(a) In scriptorum phil. opb. medic. collectione, que germanice prodierunt.

(b) 1 c.

des & numerosæ, synoviam suam sibi servant, neque emitunt quoquam: ita cavae tendinum vaginæ, & renales glandulæ, & oculi cameræ, & Graafiana ovula, & cerebri forte ventriculi, & cavae pericardii, pleuræ, pectoris, abdominalisque & amni, & adipis cavernule, & umbilicalis funiculus, aliaque plurima cellulosa teles spatiola suos humores retinent. In iis exemplis secretionem, resorbtione, aut exhalatione compensari æquum est, tantum dem tempe per venas resumî, aut aliunde dissipari, quantum arteriæ deposituerunt. Neque repugnaverim, in horum exemplorum nonnullis, vivo in homine, per ipsas clausi receptaculi membranas, aliquam humoris secreti partem penetrabilis sua vi sibi viam aperit, inque circumiecta quæque se diffundere. Siquidem bilis per poros suarum membranarum exhalat, cur alii humores non possint, et si non perinde colore suo se produnt.

§. XXIV. VII. *Conditiones priores varic combinantur.*

Sequitur, ut de iis in separatione humorum discriminibus dicamus, quæ ex prioribus causis inter se compositis nascuntur.

Ita possunt variae cause conjungi, quæ lentorem faciant. Simplicissima speculatio est, quam primam propono. In omni canale particulae secundi latera lenti moventur: in ea ergo sede adtractione molecularium viscidarum major est. Si præterea tota arteria ramosa, aut serpentina, aut aliâ ob rationem quamcunque ad lentiorem in fagine motum generandum apta fuerit, tunc iterum particulae viscidæ secundum latera arterie magis se trahent. Nam & in axi lente movebantur, & in lateribus de eo parciore motu iterum portio decedit. Ita vehementer utique ad latera arteriæ, & ad oscula canalium inde ortorum, particulae mucidæ, aut adiposæ adhærescent.

Resistentia ramorum, ductuumque excretiorum, celeritatem in ipso trunco minuit, cum ægrius depleatur. Possunt etiæ conditiones adesse, quæ in arteria velocitatem frangunt, & etiæ adcedere, quæ tarditatem in ductu excretorio generant. Ita jam in ipso sanguine particulae mucosæ, adiposæ, gelatinosæ, incipient se adstrahere, & potentius in ductu excretorio, ejusque folliculis & anfractibus se trahent, quæ vicinæ, paucisque fluidis particulis separate eo advenerint. Ita in feminis masculini arteria lensor incipit, & augetur in plicata epididymidis anfractibus. Sequitur, ut quam viscidissimum fiat.

Poterit

Poterit etiam combinari trunci in exemplo , complicatio & angulus, sub quo ramus de trunko prodit, celeritati contrarius, aut plica¹, quam si ductus cum trunko interceperit. Dupli in ratione inde lento secreti humoris crescat. Cum enim in arteria tardus jam motus sit, deque, paucō, iterum angulus non savens diuidium motus abstulerit, parum utique celeritatis supererit. Et uti ponderis vis in celeri sanguinis motu ægre percipitur, eademque jam tardiorum venosi sanguinis motum potenter mutat, ita etiam angulorum, plicarumque duclis excretorii cum arteria interceptorum vim, in tardiorum jani sanguinem morandum potentius operati æquum est.

Porro in trunko arterie tardior motus, cum retis vasorum minimorum iterum celeritatem frangente natura , cumque ductus excretorii plicis, & cum folliculis intermediis, & cum multa resorbitione, & cum admissione humoris etiam viscidioris, aut omnibus , aut aliquibus combinari potest.

Et facile adaptabit meditanti , conditiones , quas in arteria secretoria trunko , inque ejus ramis , in pororum secretoriorum diversa densitate , reætitudine , plicis , longitudine , folliculis , exhalatione , resorbitione , irritabilitate , & que alia exposuimus , sere in infinitum alias & alias secretiones fieri posse. Ex decem diversis conditionibus 1023 humorum genera combinari posse , alias ostendi (c).

§. XXV. *Priora in compendium reducuntur.*

Quæ longo fatis sermone exposuimus , alia ab experimento repetita , ex theoria alia , ea nunc in breve compendium contrahemus , ut quid nobis magis probabile videatur , uno intuitu comprehendi possit. Quæ , remotiona a demonstratione , mera in speculatione nituntur , hic omittere malumus , facile aliis magis animosis scriptoribus gloria cessuri , quam a pleniori re difficillimæ functionis interpretatione sperant.

Ergo in sanguine utique ostendimus , particulas esse aut omnino ejus naturæ , quæ in humore jam secreto dominatur , aut certe ad eam indolem proras. Est in sanguine aqua , & liquor coagulabilis , & non matus quidem mucus , sed mucosus tamen viscor , est adeps (d) imperfectior. Ea corpuscula omnia , & mucosa , & gelatinosa , & pinguis , aqua puriori procul dubio pigror , de sanguine separari æquum est , tum quod ciliola

M m m 2

tabris

(c) *Comm. in Tractat. Eserib. T. II. p. 457.*

(d) p. 107.

tribus globulis minora sint, per quæ a sanguine necesse sit secedere, quodcumque eo humore tenuius est (*e*), tum quod sponte, quæ viscida sint, & ad sui canalis parietem accendant, & a globulis axin tenentibus eo deplanauntur (*f*), quibus & soliditate cedunt, & ad motum aptitudine: denique quod in minimis arteriolis, retardato jam sanguinis motu, particulæ mucosæ, gelatinosæ, oleosæ se adtrahere incipient, adque sui similes se colligere, ad mucosas mucosæ, ad gelatinosas albuminosæ, pingues ad oleofas (*g*). Sed quo magis cum sui similibus coeunt, eo ad motum ineptiores sunt, eo magis ad parietes canalium, ostiolaque inde nata adhaerescunt, exemplo lymphæ, quæ de naribus, aut pulmone, aut urethra post mucum exit, a majori aliqua irritatione sollicitata. Flavo enim tunc colore subeunt lymphæ se prodit.

Porro ex his tribus viscidiorum humorum generibus adipose quidem subeunt ostiola maxima, & una brevissimos canales: parvoque motu a reliqua vi cordis incitatae, ideo ea ostiola subeunt, quia omnium post sanguineos illices (*h*), maxima sunt, solaque ejusmodi pigris & crassis particulis patent. Inde in cellulas per poros simplices (*i*), ut videtur, minus deponuntur, cum longiorum canalium (*k*) aut angustiorum resistentia major sit, neque a lentissimo succo superari possit. In cellulas recepti stagnant eadem (*l*), propiusque se comprehendunt, nullo nanc interposito humore defensæ. In iis receptaculis aqua, & lymphæ cum adipem mixta, liberatur adeps, per resorbentes (*m*) venulas minores, quam quæ adipem quietum recipient; ita purior demum colligitur.

Coagulabilis humor secedit in oscula, aliquanto minora, quam adipis pori sunt, adeoque sanguineis ostiolis etiam majori ratione angustiora (*n*): secedet etiam in adipis patentiores vias (*n**). Cum lymphæ & aqua transibit, sed eadem aut per minima, albuminosarum particularum diametro angu-

(*e*) p. 418. 429.

(*f*) p. 422. 423.

(*g*) p. 420.

(*h*) p. 429.

(*i*) p. 443.

(*k*) ibid.

(*l*) p. 393.

(*m*) p. 450.

(*n*) Cum in adipos loculos lymphæ non ita vicillim in lymphatica adeps integris animalis rebus transeat.

(*n**) L. II. p. 167.

angustiora , foramina exit (o), aut per villos inhalantes resorbetur (p) , donec secluso adipe , aqua resorbta , in propriis nunc vasculis is solus humor dominetur , qui albuminis affectiones habet. Idem cum fluidior muco sit , & una ponderosior (q) , per longiores (r) ductus excretorios viam inveniet , qua neque adeps permeare queat , & ne mucus quidem. De adipe idem per resorptionem separatur.

Muci viae angustiores esse videntur , quam vel olei vel lymphæ , quam tum denum admittant , quando major velocitas accessit. Eadem breves fere semper sunt , & villus mucifer in folliculum non longo itinere patet. Credibile est , mucui ex arteria vel flexa , vel longe capillati , & a magnis truncis arteriosis remotius nata , progigni. Si absque folliculo mucosus humor nascitur , tunc & ex arteriolis minoribus , & longioribus (s) , & cincinnatis (t) mucum generari opinabile fuerit , ut ipsam per moram particule viscidiores vi attractili coire possint. In folliculo denum , aut in prælongo ductu excretorio , lento , qui in recente pituita parvus fuit , per resorptionem (u) aquæ & particularum (x) adtractione perficitur.

Humores aquosi transiunt per oscula tenuiora (y) , quæ neque mucosas particulas recipere apta sint , neque coagulabiles , neque pingues , quamdiu sua organo integritas constat. Eadem alias de rubra arteria secedunt , aut de arteriola minori , quæ rubro sanguine se liberavit (z) : aut denum de prioribus humorum generibus resorbetur. Aquoso humori destinatas fistulas præterea rectas esse videtur (a) , & sub iis angulis (b) iisque conditionibus & nasci , & produci , quæ celeritati conservandæ aptissimæ , & ab omni mora quam alienissimæ sint.

His quatuor humorum generibus subductis , solus in arteria rubra sanguis fere supereft , quem minora ostiola ob crassitiem repudiarunt : & qui idem solidior , tuendo axi conservandæ celeritati , minimarum arteriolatum , ad alios humores conniventium densitati superandæ aptissimas moleculas

M M M 3

nactus

- (o) p. 428.
- (p) p. 450.
- (q) p. 362.
- (r) p. 443.
- (s) Ut in semine p. 420.
- (t) ibid.
- (u) p. 450.
- (x) p. 410.
- (y) p. 428.
- (z) p. 420.
- (a) p. 424.
- (b) ibid.

nactus est. Non penitus tamen aut aqua sanguinem iis in arteriolarum finibus tota deserit, aut minorum humorum genus. Diametrum sui vasculi totam tenere globulum (*c*), per experimenta nostra constitut, inconspicuum vero humorum una transire ex intercepto globulorum filo adparet, quorum motus absque conjugentium minime quidem visibilium (*d*) particularum ordine non posset intelligi.

§. XXVI. *Exempla in humoribus viscidis, bile, semine.*

Exempla lætitiam aliquam serio sermoni adspergere solent, siisque facillora esse, qui abstractas de singulis objectis & generales ideas minus vivide percipiunt. Ergo ad bilis, viscidi & una inflammabilis humoris, generationem hæ nobis quidem note conditiones consentiunt. 1. Sanguis advenit ad viscum, oleosum, acrem humorum suppeditandum idoneus (*e*), plenus nempe oleo, vapore abdominali, intestinorum putrido habitu, ut lienis ignoratam hactenus utilitatem prætermittamus. 2. Is sanguis per viscum secretioni destinatum huit quam lentissime, per canalem a corde remotissimum, ab arteriis ipsis tota serie capillarum in variis visceribus & membranis vasculorum separatum, per venam demum, arteris tamen minus firmam, per ramos maximos, numerosissimos, suo trunco in maxima ratione maiores. 3. Ductus excretorius parvus (*f*), si cum trunco sanguineo secernente comparveris, intus undique rugis & reticulo frictionem augente asper, 4. ducit secretum humorum in folliculum, unico ostio præditum, impedito, angusto, adscendente, in fundo suo cæcum, in quo bilis quiescere, & reforctionis, caloris, incipientis etiam putredinis vires experiri potest, & a muco etiam vesiculae proprio novam visciditatem mutuatur. 5. Ex eo folliculo bilis vi potente muscolosa, certo tamen tempore (*g*) uberioris exprimitur per ductum valvulis pene clausum, angustum, reticulatum, perque fibrarum muscularum intestini vaide mobilis & irritabilis hiatum, per duarum denique (*h*) tunicarum ejus intestini sibi instratarum intervallum, ut omnino causarum satis adsit, quæ biliarum ductum conprimant, claudant que

(*c*) p. 181. 186.

(*d*) p. 225.

(*e*) p. 413.

(*f*) Multo minor pro hepatis portione, quam pro renis portione ureter.

(*g*) p. 457.

(*h*) *Præm. lym. physiol.* n. 686.

que, quoties intestinum vel intus ab aere expanditur, tunicamque suam interiorem ad exteriorum adprinit, vel vicissim fibræ carneæ irritabili vi motæ idem intestinum arcant. Ita obtineri videtur, ut in hepatæ separetur humor acris, amarus, inflammabili materie prægnans, latus, parcusque, qui certis demum temporibus in duodenum intestinum majori cum abundantia effundatur. Minime recuso, alias conditiones superesse, quæ nos lateant, has tamen, quas proposui, ita se habere crediderim, ut alius, neque bilis similis humor nasciturus esset, si earum conditionum unicam sustulisset.

Iterum semen etiam ad certos humores pertinet, haecenus diversum, quod materie inflammabili destitutum, mucosæ tribui propius sit. Ergo semen 1. secernitur ex parva (*i*), prælonga (*k*), tortuosa (*l*), inferne potius latiori arteria: certe in nonnullis animalibus. 2. Secernitur de sanguine per arteriolarum ramos adeo minitos (*m*), ut nulla arte, liquor ullus, haecenus ex arteriæ trunco in ductus feminis excretorios urgeri potuerit. 3. Deponitur in testis vascula innumerabilia, supra fidem longa, in crisiſſimis cincionos flexa. 4. Inde fluit semen in rete vasculoſum, laxius, quod non difficulter repleas. 5. Hinc denuo in conos illos vasculoſos (*n*) multo subtiliores, iterum in frequentissimos gyros intortos, indeque in simile longissimum vasculum, quod sola sui repetitione epididymide confituit. 6. Ex ductu eo angustissimo redit in latiore canalem ductus deferrantis, iterum arctatum, & secundo lateſcentem in cellulis, vesicæ urinariæ ſubiectis. 7. Ex iis per angustum ductum in amplas cavernofas contortas vesiculos feminales. Tunc 8. post multam moram, nunquam sponte sua, sed musculeſa demum irritabili vi expellitur, quando ſepe totis mensibus in suis vesiculis stagnavit, transiisque per angusta oſtiola ad urethram patula. 9. In ipso exitu mifectur cum albo prostatæ liquore, ut copia augeatur, & forte etiam fluidius reddatur, certe in nonnullis animalibus. Haec ſi repetieris, invenies moram in arteria, in ductu excretorio, in folliculis, reſortionem (*o*) de cellulis, de ipsa epididymide (*p*): peculiarem fotum ſuper intestina, putrefacente materie plena; receptaculum perfecte clauſum, niſi stimulus

(*i*) p. 420.

(*k*) ibid.

(*l*) ibid.

(*m*) L. II. p. 29.

(*n*) Haec cum ſeqq. vide p. 444. 446.

(*o*) p. 450.

(*p*) p. 451.

mulus veneris accesserit. Omnia ergo consentiant, ut parum viscidi humoris fiat, qui præterea putredinosi nonnihil a suo fotu habeat, & forte, ob primam angustiam arteriolarum separantium subtilissimis particulis abundet.

Nunc si duos istos diversos suis dotibus humores cum suis colis secreto-riis comparaveris, poterit utique probabile videri, multa communia esse ob fabrica similitudinem, discrimen esse in bilis copioso oleo, atque putrido de intestinis resorbo vapore, qui conjuncti humores, stagnando amarefcant. In semine olei minis, plus viscoris est, uti plus est machinarum retardantium, plus tamen subtilium molecularum, ob primos excretorios poros angustiores.

In genere albuminoso tanta est simplicitas, ut sola arctatione ostiolorum sanguini patentium pro sanguine lympha transeat, ut in exemplo lochiorum, vulnerum (*r*), aut vicissim sola dilatatio pororum albumini destinatorum sanguinem admittat, aut in anatomicis experimentis adipem, in exemplo vaporis saepe rubi pectoris, pericardii (*s*), ventriculorum cerebri, inque ipsis vasis lymphaticis adeo saepe rubrum humorem vehentibus.

S. XXVII. Exemplum in humore aquo.

Si vicissim renum secretionem contemplatus fueris, aqueive humoris oculi, repieres, in rene quidem arteriam maximam, hinc secretionem copiosam celeremque. 2. Ramos quidem arteriae cincinnatos, ut aliquantum sanguinis velocitatem diminuant, & aliquas forte particulas excludant, quæ in ipsis cincinnis retardatae venis resumantur, quæ renibus amplissimæ sunt & laxissimæ. 3. Ex iis arteriis rectissimi ductus excretorii continuantur, unde velox iterum & fluida secretio. 4. Sed ii. ductus densi sunt, singulare inter omnes excretorios canales exemplo, qua quidem arte humores forte leves excluduntur, & adiposi: indeque forte fit, ut aucta demum celeritate sanguinis, hinc vi, quæ particulas in excretorios ductus impellit, adeps in lotii vias transeat. 5. Urina in rene secreta in receptaculum deponitur, in quo retenta acrior fit, & fætidior, & demum 6. op-

(*r*) Ex dente cariofo post hemorrhagiam maximam serum limpidum falsumque sic cessit HELWIG obs. 27. Post maximas haematurias jacturas sanguis albus effluxit M. T. A. M. enchyrtm. p. 36. In pulmonis vulnera primo sanguis exsit, secundum serum, de numeris quoque utror. HARDER op. 52.

(*s*) L. IV. p. 283.

6. opportuno tempore , cum necessaria ad munditiem celeritate , expellitur.

Hæc ego vel omnino certa fide evicta esse , vel a probabili ratiocinio addi persuaderor , neque diffiteor , multa alia in recondita organorum secretoriorum fabrica latere posse . Si quis tamen arcanam secretionis naturam (s) esse maluerit , si in cujusvis particulae corporis animati propriam & reconditam vim necessariam crediderit , nou valde ego repugnabo , ut unice ex prioritibus repeatam , in plantis tamen cum vasis omnibus cylindricis (u) , omnibus mera celullofa tela fartis , absque corde & anima , de purissima aqua , pariter mucum , gelatinam , oleum , particulas demum odoratas subtilissimas , suis in definitis organis separari (x) , ut in sola petala odoratae particulae , in corticem , bullasve epidermidis balsamus terebinthinæ similiis , in fructum dulces particulae exeat.

§ XXVIII. Hypotheses. I. Fermenta.

Unicus labor supereft , eas recensere hypotheses quibus Clari viri , tanquam ad citiis alis , propius ad lucem veri accedere conati sunt.

Primus ergo J. Baptista v. HELMONT , cum ad physiologie declarationem experimenta chemica transferret , fermentorum exemplo inter multa alia abusus est . Nempe acidæ pastæ meraciores , corporibus nondum acidis admistæ , sed ad acidam tamen indolem vergentibus , in iis corporibus sive similem acidam naturam generant . Continuo simile cuique visceri fermentum tribuit vir acris , quod nostris admistum humoribus eos in suam sibi propriam naturam convertat . Ergo , ut propria Cl. viri verba immutata repeatam , fermentum (y) ita definivit , ut omnis transmutationis causa , idque sit , quod ex aqua , communi omnium corporum elemento , propria sibi semina rerum facit (z) , in propagationem speciei Deinde fermentum aliud vitale esse , quod adspiret in viventem animam . Alterum saltem continere initium generationis rei in rem (a) . Esse vero tot in notis fermenta , quot digestiones sunt (b) . Inflari fermenti odores

a 72-

(s) Job. de GORTER Exercit. V.

(u) LUDWIG Inst. regu. veget. p. 169. 184. 196.

(x) p. 442.

(y) In quo fermenti impregnat mafsam semine n. 1.

(z) Cujusq; imita natural. n. 25.

(a) Ibid. n. 8.

(b) Sextuplex digestio alimenti bambuill n. 2. 6.

a vasibus continentibus (*c*). Dividi per ea corpora in minima, sive in atomos (*d*). Esse in ventriculo suum acidum (*e*) proprium, specificum, vitale fermentum: esse in hepate fermentum fellis (*f*), quod acorem stomachi in salem salsum convertat. Sed in intestinis fermentum stercorum succedere (*g*), alterumque ejusdem nominis, sed lotii naturam induturum fermentum in rene habitare (*h*): aliud in hepate hæmatopoieticum residence (*i*), & in corde sanguinem arteriale a proprio fermento in vitalem spiritum mutari (*k*). Ultimas culinas membrorum sequi (*l*), quæ in singulis membris singula sanguinem in alimentum partium mutant. Hæc, obsoleta quidem, paulo fusiis ideo persecutus sum, quod in primis magnus olim PRACEPTOR noster voces Helmontianas passim repetere soleat, easque aut excusare, aut refutare.

Non valde dissimilia propria fermenta sunt, quæ Thomas WILLIS (*m*) in corde, ventriculo, teste, liene, hepate adsignat, qui idem omnia in corpore animato per fermentationes geri scripsit, qua voce etiam effervescentiam intelligit.

Porro Guilielmus COLE, minime cæterum contempnendus auctor, in glandulis scripsit fermenta nasci (*n*), quæ se per omnia diffundant (*o*), & peculiares de sanguine particulas separant (*p*). Id autem fermentum succum nervolum esse (*q*), & ob eam rationem magnos in glandulis nervos reperiri (*r*), inque paralysi secretiones injuriam pati (*s*). Ab eo porro succo sanguinis quidem moleculas in ostiola propelli, in ea subitura, quæ fibi magnitudine respondeant (*t*) & figura. Adparet virum Cl. fermenti nomine

- (*c*) *Imago fermenti* n. 12.
- (*d*) n. 23.
- (*e*) n. 24. *Sextuplex digestio* n. 14.
- (*f*) *Sextuplex digestio* n. 27.
- (*g*) n. 81.
- (*b*) *Latex humor, neglect.* n. 10. &c.
- (*i*) n. 38.
- (*k*) n. 62.
- (*l*) n. 67.
- (*m*) *De fermentatione* c. 5.
- (*d*) *De secret. anim.* c. 10. p. 145.
- (*o*) p. 130.
- (*p*) p. 145.
- (*q*) c. XL p. 147.
- (*r*) p. 158.
- (*s*) p. 212.
- (*t*) C. 12. [p. 185, 186, conf. c. 7, p. 81, 82]

nomine non chemice usum esse, neque sensum receptum ei quidem voci tribuisse.

Ali quanto accuratius eadem voce utitur *Johannes PASCAL* (u). Dicit idem, dari in corpore humano fermenta volatilia, circulantia, acida, ex cerebro orta: & alia fixa, quae cum alcali in substantiam corporis humani abirent. Sed illa volatilia, quae ipsis sunt spiritus, cum sanguine in corde effervescere, eademque in ventriculo pro fermento esse, cum semine feminino alcalino in compendium partium corporis humani abiit, & quae alia, eum fere in sensum scripta reliquit.

Denique *Laurentius BELLINUS* (x) fermentum sibi dari postulavit, quod sanguinem chylumque solvat, & solutum ad organa secretoria mittat. Idem tamen peculiaria fermenta refutavit, priorque causas utiliter exposuit, ob quas chemica haeresis stare nequeat. Si enim in viscere fermentum ponas habitare, quod ejus visceris sanguinem in suam naturam convertat, hujus fermenti originem ostendere oportet. Pone in sanguine paratum praeflo fuisse, non intelligetur, quare singuli in singulis partibus corporis humani humores de communi sanguinis massa separantur. Si mavis a sanguine in viscere demum fermentum generari: redibit quaestio, ad quam respondeas. Nam humorum mutationes a fermento fieri dixisti; nunc sanguinem in dato viscere in fermentum mutatum fuisse admittis, superest ut ostendas aliud fermentum, quod sanguinem in fermenti naturam convertere: eodemque modo fermentorum fermenta perpetuo requirentur, neque ejus necessitas finis invenietur (x*).

Si malis fermentum cum homine in quoque viscere connatum inesse, quae fere *HELMONTII* & *PASCALII* opinio fuit, major iterum nascetur difficultas. Fermenti enim copia, quae ab embryonis rene capi potuit, nunc sufficere debet, quotidie in urinam mutandis integris libris sanguinis: & adeo pertinacis esse efficacie, ut ea fermenti copia, grano certe fabuli minor, in homine quinquagenario ad 22, 000, 000 libras sanguinis misceri potuerit, neque adeo enormi copia alieni humoris aut superari, aut dilui, aut destrui. Si enim renibus undecimam partem totius de corde emissi sanguinis tribueris, & duabus arteriis renalibus tantum sanguinis recipi admiseris, quantum alterutra subclavia avertit, aut carotidum altera, aut

Non 2

ilia-

(u) *Nouvelles découvertes sur les ferment.*

(x) *Propos. XXXVI.*

(x*) *Propos. XXXIX.*

aut iliacarum una, aut hypogastrica demum vel coeliaca, vel mesenterica, accipiet certe ren, in singulo pulsu, quatuor sanguinis scrupulos, in hora adeo scrupulos 19200 five libras quinquaginta, in die libras 1200, in 50 annis libras 21 900, 000.

Nunc ex omnium fermentorum exemplo constat, numquam vires ejusmodi corporis absque suis finibus esse, sed utique certam fermenti ad eam massam proportionem requiri, quam mutandam suscipit. Deinde non omnes sales fermenti modo se habere, inque suam naturam admista corpora convertere; quæ quidem vis fere regno vegetabili propria sit: omniesque qualitates humorum, qui de sanguine fecidunt, ejusmodi esse, quæ per nullam fermentationis speciem adquiri possint, cum ex omnibus, unico in exemplo, olea destruant, aut cum aqua certe penitus per intima conniveant. Neque ullus acor in rerum natura exstat, ullumne salis genus, quod subito de sanguinis parte urinam aut conficere possit, aut ea celeritate separare, qua in homine fecedit. Omnia enim fermenta, ut alia corpora in suam naturam mutant, & tempore egent, & acre, & amplis vasis, & tardissimo motu, aut plena quiete (y). Hæc aliquanto fusius repetii, quod alia, eaque celeberrima hypothesis fere iisdem, quibus fermenta, vitiis obnoxia sit, & per easdem causas evertatur.

§. XXIX. Pororum figura.

Celebris ille hypothesis auctor Renatus DESCARTES per aptas suis finibus corporum figuras (z) universa fere naturæ opera explicare tentavit. Ide etiam humorum in animato corpore separationem a figuris pororum secretiorum ad particularum secernendarum figuras aptis exponere suscepit. In universum adeo organa secretoria cum cribris comparavit, quorum foramina diversarum figurarum essent. Deinde etiam in sanguine diversas particularum figuras fixit. Ita facile vides, cujusque figure particularis in sanguine circumfluentes, quam primum per consuetum humorum circuitum ad sua colla appellunt, de sanguine secessuras: triangulares particularæ per triangulares poros elabentur; quadrangulares per poros tetragonios; rotundæ per teretes tubulos; & ita porro aliæ particularum figuræ alios invenient poros, per quos ob adfinitatem propriæ figuræ exeat. Accuratæ

(y) BORELLUS de mot. anim. L. II. Prop. 136. 137. &c.
(z) Ut magneticas figuræ, & primi clementi &c.

curatas vero secretiones fieri addebat IDEM (*a*), cum quisque porus suæ unice figuræ moleculas admittat, reliquas omnes, quæ alterius figuræ sint, respuat & expellat.

Amant utique mortales ejusmodi hypotheses recipere, quæ facili sua simplicitate & problemata plene solvere videantur, & absque mentis labore apprehendantur. Magno ergo plausu cibrorum hypotheses receptorunt viri clarissimi (*b*), pororumque figuræ cum magnitudine coniunxerunt, inter quos aliqua primi ordinis (*c*) nomina reperiuntur.

Sæpius monui, infelicitibus exemplis expertus, raro eam esse hominum felicitatem, ut vera sint, quæ facile & sponte quasi mente offerunt: uti rarissime recte divinaturum puerum æquum est, qui causas compostissimæ machinx, & cujusque particulae prævisos fines explicare susciperet. Nempe non longo ab inventa hypothesis tempore, vitia novæ hypothesis tanta innotuerunt, ut eadem fere facilitate de medicinæ legibus rejecta fuerit, qua recepta fuerat. Primus, nisi quidem fallor, *Franciscus GLISSON* (*d*), vir aliquin non mediocris ingenii, observavit, omnes in humano corpore meatus teretes esse, & omnia oscula circularem sectionem habere, recte quidem, quamdiu de arteriolis, etiam armato oculo consideratis, sermo est. Id ipsum primum argumentum fuit, quo Clarissimi viri (*e*) cribra, poris variæ figuratis pertusa, a secretionum explicatione removerunt.

Poterat hactenus pro *CARTESIO* adferri, & venas triangulares certa fide in humano corpore reperiiri, & non penitus impossibile videri; secretorum organum cellulosum dari posse, exque laminam intervallis cibri genus componi, cujus foramina variae, & cujusque fere figuræ sint, quam requiras. Deinde in sanguine & globuli sunt, & salis marini cubi, aliæque aliarum figurarum particulae, certe per imaginationis solertes vites excogitari possunt, quæ cum sanguine circumveant. Alia ergo ratione ad hypothesis cibrorum evertendam *PITCAIRIUS* usus est (*f*). Cujuscunque

N n n 3

nempe

(*a*) *De homine* p. 15, *de formato fetu* III. n. 25.

(*b*) *Theodorus CRAANEN de homine* p. 274. additis iconibus, quibus hypothesis declarat. *Philippus VERHEYEN Anat.* L. II. p. 292. *Dominicus GUILLEMIXUS de sanguine. Matthæus GEORGII de homine* propos. 40. *Guilielmus COCKBURGHUS in seconon. animal. & vapor Hyacinthus VOGLI in fluidi nervi digestio* p. 18. 19.

(*c*) *J. Alphonsii BOEELLUS de motu animal.* L. II. Prop. 138. 140.

(*d*) *De ventricul. Usq; intell.* c. 23. p. 449. edit. Belg.

(*e*) *Archibaldrus PITCAIRN de motu sanguinis per minima* n. 16. *Jacobus KREIL de secret. anim. I.* 61. *Hermannus BOERHAAVE Inglit. sci Med.* n. 155. *Job. GOETHE L. c. n. 38.*

(*f*) *L. c. n. 11;*

nempe figuræ poros feceris, ostendit, admittere utique omnes particulas alienissimæ, & cujuscunque iterum figuræ, dummodo earum maxima diameter minor sit minima diametro pororum (g). Quare per *CARTESIANUM* ubique cribrum non solez poris ejus adaptatæ similisque figuræ moleculæ transibunt, sed tenuiores utique omnes, & omnium adeo figuratum particula per omnia ex æquo cribra meabunt.

Iterum particulas alterius, quam sphærica quidem, figuræ esse oportet, cum ali quin diverse pororum figuræ utilitate careant. Sint ergo alterius figuræ: tunc iterum particula poro æquals erit: eo vero in casu non transibit, neque de sanguine per adeo aptum sibi porum separabitur, licet figura congruat & magnitudo. Cum enim particula non sit sphærica, habebit majorem aliquam diametrum, & perinde porus, cujus eadem figura sit, & ipse majorem aliquam diametrum habebit. Quoties una major diameter particulae majori diametro pori respondet & congruit, toties transibit utique, & de sanguine separabitur. Verum is casus unicus est inter innumerabiles alios, in quibus major diameter particulae extra majorem pori diametrum cadit, atque adeo in minorem quamcumque pori diametrum incidit, atque adeo a poro angustiore repulsa refutatur, neque de sanguine scedit. Eruntque, ut vere omnino, *PITCARNIUS* (h) monuit, vires exclusionis infinitesimales numerosiores, quam unicus admissionis casus est.

Ad hanc *PITCARNII* demonstrationem respondit haecenius *Petrus Antonius MICHELOTUS* (i), non ille quidem serius cribri, pororumque advocatus, famæ ramen *BORELLI* & *GUILIELMINI* studiosus. Putat vir Cl. in illis diametri maximi particulae a diametro maximo pori aberrationibus inpingere quidem particulam in parietem pori, neque expedite subire: ceterum posse ab iis, quæ insequuntur, particulis in rectam viam dirigi, dum rotatorum ab iis particulis motum sequitur, usque duri denique diametri sibi respondeant, & ipsa per canalem excipientem viam sibi aperiat.

Verum canalis secretorius poterit conicus esse, & certe conicus est in exemplo arterie decoloris, quales in uvea membrana a rubris arteriis nascuntur. Eo vero in calu vitiosa particula longiori diametro preeuntis impulso

(g) *MICHELOTUS* l.c. Lex. II.

(h) l. c. n. 12.

(i) *Ibid.* p. 244.

impulsio in progressu adeo non corrigetur, ut omnino malum augeatur eundo, & tanto minores admissionis vires fient, tantoque major illusionis in parietem metus, quanto profundius in canalem particula poro non congruens processit. Sed etiam rotatio illa particularum sanguinarum omnino absque demonstratione, & prater experimenti fidem (*k*) admittitur.

S. XXX. Colorum hypothesis.

Valde adfinis ea prioris est, *cola enim a cribris haec tenus differunt*, quod cribra firma & sicca corpuscula discernant, *cola contra fluidos humores separent*. Deinde hypothesis, quam propono, non quidem poros definita figuræ poscit, sed coli poros definito humore plenos, eodem, qui per totam animalis vitam per quodque colum de sanguine seceruntur: ut bilis vascula secretoria bile a prima hominis origine plena sint, feminis *cola semine*. Ad eum nunc humorem homogeneas de sanguine particulas adtrahi creditur, aque eodem alienæ indolis humores repelliri. Solent viri Cl. exemplo coli aqua pleni uti, quod oleum respuit, aut viciissimi coli oleo ebrii, a quo aqua transitura prohibetur. Hæc opinio priorem simplicitatem vincit etiam, & maximis quidem & numeroſissimis viris (*l*) placuit, interque eos Godefrido (*m*) Guilielmo LEIBNITZ, & inter anatomicos Jacobo (*n*) Benigno WINSLOWO, ut turbam omittam sequicum (*o*).

Sed neque valde a Cl. viris alii dissentunt, qui singulo humoris suam majorem ad solidum determinata densitatis attractionem tribuunt, qua sit, ut per ejusmodi tubulum facilius transeat. Hæc quidem hypothesis Isaaci NEWTON (*p*) suffragium ostentat, deinde Johannis de GORTER, (*q*)

(*k*) p. 285.

(*l*) Inter primos *Bernardo COWHOR* in tentamine epistolico post evangelium medici adjecto.

(*m*) Apud P. A. MICHELOTTUM.

(*n*) *Mémoire de l'Acad. des Sciences* 1717.

(*o*) *Nicolaus HARTSOEKER* *frise des conjectures physiques* P. Sylvano REGIS corr. de philosophie p. 556. J. Godesfreo de BERGER de natur. hum. p. 127. J. Claud. A'riaco HELVETIO *acon. animal.* p. 162. *Eclaircissement* p. 68. Josepho LIEUTAUD viro Cl. physiologie p. 222. *essays d'anatomie* p. 693. CL VERDIER abrégé d'anat. T. II. p. 183. *Anatomic Devidier de humorib.* p. 23. Jacobo PARSONS of genera &c. p. 172. 173. CL BARBAUT *Splanchnologie* p. 18. J. Baptiste MAZINGO medic. mechan. L. I. n. 11. p. 21. C. G. KRATZENSTEIN de diabete n. 28. Jacobo SCHUBERARAE *principi. of practice* T. I. p. 322.

(*p*) *Optiks* L. III. *Query* 31. p. 367.

(q) viri illustris, aliorumque per sua merita clarorum hominum (r).

Ut cunque aliqua in eorum virorum sententiis diversitas supererit, in eodem convenire videntur, esse in quoque corporis animalis secretorio organo definitæ indolis quasi magnetem aliquem, qui certas particulas, neque alias, in id organum adtrahat, sive nunc is magnes in fluido organum imbuente sedem habuerit, quod ab omni tempore, animalisque primordiis ea in sede habitaverit, sive in solidis ejus tubulis.

§ XXXI. *Humoris analogi adtraffio rejicitur.*

Verum ut acceptissima ejusmodi hypotheseos simplicitas est, ita tamen minime cum fabrica rerum consentit. Et humorem primum, quo quæque particula corporis animalis ab omni retro tempore ebria fuerit, & qui perget in animale adulto per idem secretorium colum manare, utique admittere non sinunt, quæ contraria habemus experimenta rerum. Si vero ostendimus nullum ejusmodi perpetuum humorem dari, prior quidem hypotheseos pars eversa erit.

Ergo humores fetus alii sunt ab adulti hominis humoribus, quibus idem nomen impertimus. quod per idem organum percolentur. Omnia in nascente embryone blanda sunt, mollia, albuminosa, insipida, decolorata. Bilis cystica (s) in pullo incubato, & perinde in quadrupedum, ipsiusque hominis fetu, neque flava, neque viridis, neque acris, neque amara est, ejusque locum, ipsa in vesicula, pellucida in pullo quidem lympha, in humano fetu (r) rubrum viscum tenet, fila trahens & insipidum. Iterum, nam meretur Cl. virorum auctoritas, ut curiosius in eorum argumenta inquiramus, adipis loco in tenero fetu gâtina est (u). Ren, blandissimam, mucosam, absque odore aut sapore aquulam percolat. In utero virguncularum, partu nondum editarum, lœteus & albissimus succus est, quem adulta virgo magis mucosum, & pallidum habet. In uæc facie posteriori, & choroidæ (x) membranæ, pallidus etiam humor est, atremque pigmentum præcedit. Glandulas bronchiales serosum lac imbuit, in ejus locu in adulto homine nigritimus

(q) I. c. I. n. 17.

(r) KINNEIKS of nerves p. 11. NERFELD p. 144.

(s) Memoir sur la form. du poulet T. II. p. 192..

(t) VESICLE DU BOEUF CHYLE n. 254.

(u) I. p. 25.

(x) Mem. sur la form. du poulet L c.

nigerrimus pariter ex cæruleo humor succedit. In pericardio, pleura, peritonæo, fetus rubra aqua abundat, quæ homini adulto & sano pellucet. In testibus embryonis sexus virilis aquula insipida, inodora, paulum mucosa, absque animalculis, parcissima percolatur, cui flavum viscidissimum, odore penetrantissimo fragrans in adulto animale, vivis bestiolis plenus semen succedit. Perinde etiam in plantis junioribus, ut in vite, per omnia vascula aqua limpida transit: in iisdem adultioribus austerus & acerbus succus, in maturo vero racemo dulcissimus percolatur. In frumentis aqua primo est, deinde mucus, quæ maturo in tritico lac erit, deinde farina, inflammabili elemento pleno. De plantis diximus (α^*), ut tamen *Edmundi MARIOTTE* observatio addi mereatur, in primordiis nempe planarum multum lixiviosi salis esse, acoris parum, in adultis multum acidæ naturæ (α^{**}).

Ergo id primum ostendimus, neque in hepate, neque in oculo, neque in utero, neque in rene, neque in cellulosa tela, neque ullo fere in colo fetus & embryonis ejusmodi succum fuisse, qui similis etiam in adulto animale idem per colon separetur, & sequaces, suique similes, particulas de sanguinis communi flumine adtrahat.

Non ergo necesse est multis inquirere, nō adeo fidelis colorum custodia sit, veraque in primis fide narretur, per oleosa cola olea, per aquosam solam transfire. Nam et si sunt, qui adfirment (y) non desunt tamen, qui contraria eventa viderunt, chartamque oleo ebriam aquam transmittere (z) testantur, maxime si calor accesserit (a).

S. XXXII. Neque in tubolorum firma substantia certarum particularum amor residet.

Multo certo etiam minus admitti potest, in firmae vasorum fabricæ vi adtrahili causam latere, quare hic, neque alias humor in suis definitis organis generetur, quæ eadem omnes alterius indolis particulas rejiciant. Nullum enim in corpore humano colum est, quod eundem perpetuo, neque aliud

(α^*) p. 362.

(α^{**}) *De la vegetal*. p. 162.

(y) LOESCHER *Specim. anthropolog. experim.* p. 32.

(z) EL. CAMERARIUS in *tentaminibz* p. 144. *Fab. VERHEYEN* L. II. p. 157. *GEELHAUSEN de secreto. anim.* n. 27.

(a) *HELVETIUS de glandular. stridula* p. 65.

Haller *Physiolog.* Tom. II.

alium humorē percolet, ut ex ea quidem hypothēsi oportet. Omittimus de fetu dicere, cuius alii a cognominibus in vitro humorib⁹ humorē sint: in adulto enim homine eadem est, levissimis a causis, in iisdem colis, ad transmittendos humorē inconstantia. Exempla excitavimus, oportet autem hic summa rerum capita unice colligere. Uterus sanissimæ virginis viginti duobus tribus in mense diebus mucosum quid & tenuē generat, reliquis septem vel octo, purum putumque sanguinem. Vascula cutanea hominis quieti subtilem aquulam exhalant: eadem, si vel calidæ potus, vel modica omnino corporis exercitatio accesserit, aut acrius mentis studium, oleum, cum multo sale, præter aquam exsudant. Redde quietem, aut subitum terrorem aut frigus in cute, continuo aquam meram reddent, aut omnino nihil percolabunt. In urinæ generatione eadem est inconstantiæ. Ren sani hominis, dimidia fere ab aquoso potu hora tenuem aquam excolorem vesica submitit. Adde aliam horam, jam flava & acrior: nega potum, corpus exerce hominis, iterum post paucissimas horas flammæ, ponderosa, oleo & sale gravis, per idem organum urina decedet. Redde potum, quietem, jam pallida denuo & innocentior redibit. Lactea vascula mammarum aquam, absque sensu fere virginis, percolant, quæ ubi nota est, ita in sanguinem redit, ut pellucidissimi ductus, cum fatis grandes sint, omnino oculis se subducant. Adde nunc in ipsa mamma, nihil mutata, papillæ irritationem, jami copia liquoris oleo plenissimi, caseo quoque viscore, per ea, nunc suo colore flavescente oculis facilime percipienda vascula exhibet. Sebaceæ glandulae alias lac generant, alias sebum (*b*). In adipis cellulas alternis sape vicibus aqua, gelatina, adeps deponitur (*c*). Soli animi affectus, per cutem, adeo tenui humoris destinatam, sanguinem exprimunt. Plerumque in his exemplis nulla causa est, quæ densitatem vasculorum percolantium mutaverit. Ipsum vulnus cuiuscunque partis corporis humani sanguinem primo ex discillis vasculis plorat, deinde tenuem, serosum laticem, denique pus oleosum & viscidissimum (*d*). Ergo per eamdem particulam corporis aliis & aliis humor de sanguine fecedit.

Ita viciissim, idem humor, suas per dotes definitus, per diversissima organa percolatur. Repetitionibus abstinebimus, indicabimus titulos. Lac per glandulas femoris effusum legimus (*e*), bilem istericam de cute sudasse,

(*b*) ESCREVENBACH mat. p. 317.

(*c*) L. I. Sect. IV.

(*d*) Conf. p. 373.

(*e*) ibid.

sudasse, perque renes descendisse : lotium (*g*) per alienissimas ventriculi, cerebri, oris vias fluxisse, sanguinem per itinera sudoris (*h*), lacrumarum, muci narium, muci uterini, lactis, semenis, urethræ, adipis subivisse, & quæ alia exempla fusius suis locis enarravimus.

Adparet adeo, nullum adeo necessarium cujusque humoris ad suum organum vinculum esse, quin & idem humor aliis locis nasci, & idem organum alios humores generare possit; neque adeo certos humores, cum certis vasculorum densitatibus, infolubili aliquo nexus conjungi: sed omnino & omne organum alios humores generare, & omnem humorem per alia & alia colla transire, quamprimum sanguinis velocitas, temperies, nervorum vis aucta aut diminuta, aliaque ex causis a nobis recensitis, accessit; & in quoconque organo alium a legitimo humorē, & quemcunque humorē in alio organo generari posse.

Sed eo etiam minus his densitatibus discriminibus tribuimus, quod in animalibus vastissimis, & minutissimis, in trochili hepate & elephanti, in balenæ mammis & muris, simili bilis, simile semen generetur, cum tamen, per experimenta etiam mea, constet, incredibili ratione densitates vasorum in magnis animalibus densitatem eorumdem vasorum in minoribus superare. Arteria equi, ex seminalibus, nam in equo adnotatio nata est, minima, pene capillaris, durior est, densiorque, quam cuniculi aorta. Quare, cum necesse sit ~~densis~~ trunculis densos ramulos respondere, cumque obvia ipsa experimenta demonstrent, membranas & viscera, & ipsas glandulas majoribus animalibus duriores, & densiores esse, adparet, non opertere ab ea diversa densitate summas discriminis in percolandis humoribus causas repeti.

§. XXXIII. Keiliana adtractionis.

Jacobus KEIL adtractionis vocem cum auctoribus proximo loco excitatis communem habet, mentem tamen aliam. In ipsis nempe particulis sanguinem componentibus duorum generum adtractrices vires ponit, aliam nempe vini, qua ad totam humorum massam retinentur, aliam, qua particulae ejusdem generis inter se ipsas cohaerent (*i*). Quoties illa quidem vis superior est, tunc quidem omnes in communi masse sanguinæ

O o o 2

massa

(*g*) p. 170.

(*h*) I. II. p. 115.

(*i*) *De secret. anim.* Prop. 7. 8. p. 65. 74. &c. *BRANCUSI* *biflor.* p. 42. *PATER* in disp. excit. & hactenus *CHEZELDENS* p. 141. &c.

massa remanent. Si vero vis ea vicerit, qua inter se mutuo eæ particulae cohærent, tum vero similes inter se particulae confluent, & in peculiarem liquorem unitæ de sanguine se expedient. Hæc vero vis, qua se particulae similes trahunt, in quiete supereft, dum interim ea vis debilitatur, qua ad totam massam adtrahuntur. Eæ ergo particulae omnium primæ & proxime cor ipsum coibunt, quarum vires adtractrices maximæ sunt (*k*) : ultimæ urientur, & in locis a corde remotissimis, quæ & minori vi se adtrahunt, & quæ exēdem minus solidæ sunt. Præterea tamen etiam figuræ (*l*) vires adtractiles mutare possunt, easque aut augent aut minuant, eaque fluida prima coeunt, seque de sanguine evolvunt, quorum particulae sphæricæ sunt, & solidissimæ, tarde vero, quæ pluribus in punctis sui similes contingunt, ut planæ particulae (*m*).

Facile hic vel leviter perpendenti adparet, viciniam ipsam cordis parum ad secretionum dicrimina facere, cum in ipso corde humor omnium lentissimus, neupe adeps, magna copia generetur, contra vero in partibus corporis a corde valde remotis tenuissimi humores nascantur, ut perspirabilis vapor & spiritus nerveus. Deinde dari plurimas secretiones, quæ ad diversissimas a corde distantias æqua facilitate perficiuntur, ut humorum a quo sorum.

S. XXXIV. Adhæsio ad solidas particulas eisdem densitatis.

Multo ornatius nuper alia hypothesis proposita est, quæ haec tenus cum NEWTONIANA couenit, quod per adhæsionem, aut adtractionem ad contigua corpuscula, pro varia solidarum partium densitate potentiorem, functionem secretionis interpretetur. Eam eo æquius & magis sollicita cura me expendere oportet, quod mei olim acris adversarii *Georgii Ehrhardi HAMBERGERI* sit, & quod clarissimorum virorum, quos plurimi faciam, plausum obtinuerit (*n*). Dudum eam theoriani apud aliquos viri olim illi discipulos (*o*) expositam reperias, deinde in dissertatione, quæ Academæ Burdigæ-

(*k*) p. 84.

(*l*) p. 101.

(*m*) p. 85.

(*n*) Francisci BOISSIER in physiolg. mechan. elementis, inque tract. de la maniere dont le medicaments affectent certaines parties du corps humain. Deinde Ernestus Antonius NICOLAE & alii,

(*o*) I. Henr. GEELHAUSEN de differenti fluidorum in corpore humano secretione Argentor. 1730. J. Daniel KUHATSCHKE de secretione in genere Witteberg 1746.

Burdigalenis (*p*) præmium obtinuit, inque magno opere physiologico.

Ex physicis primo legem repetere oportet, quam IDEM ill. olim noster amulus fanxit, fluida nempe quæque corpora ad solida ea adhærescere, quæ iis fluidis ponderosiora sint (*q*), ad ea vero minime, quæ minus in eodem volumine ponderis habent. Deinde vires adhesionis augeri ex majori æqualitate (*r*) ponderum specificorum fluidi corporis solidique: & tanto magis fluidum quocunque ad quocunque aliquanto se ipso gravius solidum corpus adhærescere, quo minor diversitas in utriusque pondere specifico fuerit (*s*). Contra vero minus valide cohædere, quo majus inter pondus specificum utrinque discrimen fuerit, ut omnino denique nulla cohæsio reliqua sit (*t*), quando maxima inter pondera specifica diversitas est.

Nunc id ipsum est principium (*u*) omnis illius discriminis, quod inter humores quoque in corporis parte secretos intercedit. Omnia quidem totius corporis animalis viscera omnibus humoribus graviora esse ponit Vir Cl. (*x*): verum dari omnino, quorum pondera specifica certis cum humoribus proxime convenient; ergo eos humores in iis visceribus ad vasa secretoria adtrahi, adeoque per eos ipsos tubulos secerni, quorum interna pondera internis ejus humoris particularum ponderibus proxima sunt (*y*). Puros denique humores generari, quod humores graviores ad solida leviora omnino non adhærent (*z*), leviora autem adeo debiliter ad solida multo ponderosiora adtrahantur, ut a sanguinis fluento facile separtentur, & de ostiolis avellantur (*z**)

Hæc nunc, urgebat vir. ill., & cum generalibus naturæ legibus consentire, & cum peculiari corporis animati fabrica. Adhærere nempe humores corporis humani utique ad suos parietes, & per ea viscera separati, quorum pondera specifica suis ponderibus proxima sint.

Id ut ostendat Idem, præmittit in eadem ratione pondera specifica viscerum esse, in qua ea pondera sunt, quæ viscera siccata (*a*) diffatis hu-

O O O 3 moribus

(*p*) *Diff. sur le méchanisme des sécrétions*. Burdigal. 1746.

(*q*) *ELEM. PHYSIC.* n. 163. *SAUVAGES elem. physiolog.* p. 175. 177.

(*r*) *HAMBURGER physiol.* p. 179.

(*s*) *HAMBURGER ibid. SAUVAGES ibid.*

(*t*) *HAMBURGER physiol.* p. 203.

(*u*) IDEM *ibid.* p. 172.

(*x*) p. 204.

(*y*) *Diff. cit. n. 24.*

(*z*) *Ibid. & n. 52.*

(*z**) *Ibid. KUNSTENKE n. 42.*

(*a*) *Diff. de secret.* n. 29.

moribus conservant. Solida enim nunc pura esse, cum soli humores diffentur. Quæ vero densitas totius visceris sit, eam etiam singularum fibrarum eius visceris densitatem esse (*b*).

Nunc in vacca (*c*) de corticis cerebri decies mille partibus amitti siccando partes 8508 : de cortice cerebelli partes 8450 : de glandulis mesentericis, salivallibus & pancreate 7991. 7950. 7390. & 6971. de rene 7850, de hepate 7102. In cane (*d*) amittere in exsiccatione testes quidem partes 8400, cerebri corticem 8096, renes 7910, hepar 7696, glandulas maxillares 7640. Adeoque, per priora, pondus specificum in cortice cerebri, in priori exemplo esse 1492, in glandulis mesentericis 2049, in parotidibus 2056, in renibus 2174, in glandulis maxillaribus 2660, in hepate 2898 (*e*). Ergo maxime ponderosum inter viscera hepar esse, deinde ex ordine, renem, glandulas salivales, cerebrum (*f*).

Nunc in eodem omnino ordine esse pondera humorum quoque loco secretorum, pondus nempe bilis in vacca esse 395 (*g*), pondus urinae 397. Salivam aliquantum urina leviorum esse, in ratione 394 $\frac{1}{2}$ ad 399 $\frac{1}{2}$, & si urina in vacca gravior videtur, id vitium in porco & vitulo corrigi, cum in iis animalibus bilis urina ponderosior sit.

Iterum alias CL viros (*h*) aliis in numeris pondera specifica humorum corporis humani definitissime. Ita a CL SILBERLINGO lac inventum esse 277 partium, serum vel lympham partium 274, bilem partium 272, urinam partium 271, salivam 267 (*h**), spiritus vero levissimos esse sive nullius ponderis (*i*). Nunc cum pondus hepatis sit 1083 partium, cutis pondus partium 1067, renum 1050, glandularum maxillarium 1043, carotidis 1034, sublingualium 1007 (*k*), manifesto constare, pondera organorum secretoriorum specifica eademi in ratione esse, in qua pondera humorum sunt.

Omitto,

(*b*) Diff. cit. n. 44.

(*c*) Physiolog. p. 188. diff. cit. in tabula.

(*d*) Physiolog. p. 190. diff. cit. in ead. tabula.

(*e*) In vipera cum totum pondus sit 96 gran. humidi tantum fuerunt grana 4 $\frac{1}{2}$
Mem. de l'Acad. des Sciences 1732. p. 26.

(*f*) Diff. cit. n. 37.

(*g*) Physiolog. p. 190. diff. cit. p. 25.

(*b*) SILBERLINGO l. siepe cit. p. 15. excepta saliva, cum aqua sit 161 partium.

(*h**) SAUVAGES diff. sur les medic. p. 28.

(*i*) HAMBERGER Elem physiol. p. 174.

(*k*) SAUVAGES l. c. p. 27. 28. 29. cum aqua sit partium 1000.

Omitto, quæ vir Cl. de compositione directionis (*l*) particularum ex cordis viribus & adhæsionis, & de angulis vasorum (*m*) cum truncis habet, quæ fere omnibus hypothesibus communia sint, propriæque viri sententiae nihil addant, demantve.

§. XXXV. *Quare admitti nequeat.*

Et primo quidem eas omnes adhæsionis majoris ad solidâ corpora densiora leges olim accurriora physica experimenta refutarunt (*n*), quibus evincitur, utique ad leviora solidâ etiam fluida gravissima adhædere, ut ad vitrum chartamque argentum vivum, ad eandem chartam oleum vitrioli (*o*), ad varia etiam levissima corpora minii balsamum, aliaque gravissima pigmenta, ut flanum ex admisto plumbo gravius ad levius flanum, electrum ex auro cum argento misto compositum ad argentum, aurum ad spiritum vitrioli. Porro alioquin ex metallorum exemplo facile constat, graviores humores leviora firma corpora solvere, ut idem quidem vitriosi oleum partes animales devorat (*p*): neque tamen etiam in hisce solutionibus ullam legem Hambergerianæ similem obtinere. Nam gravior nitri spiritus levius argentum colliquat, levior aqua regia gravius aurum dissolvit (*q*). Nulla ergo cum specie veri dici potest, corpora fluida ad levius solidum corpus non adhædere, & perinde experimento repugnat, adhædere fluida solidis eo pertinacius, quo ea solidâ ponderosiora sint: neque denum similitudo ponderum in fluidis atque solidis quidquam ad faciliorem solutionem aut fortiorein cohæsionem facit.

Nunc si ex leges non firmæ sunt, quibus vir olim acrioris ingenii, quam timidi, suam hypothesin totam superstruxit, possemus quidem fusioris distinctionis compendium facere. Dandum tamen & hoc dignitati viri, ut per singula eamus.

Viscerum specifica pondera eo modo non recte definiuntur, quo vir Cl. definire sulcepit. Ponit enim rem minime certam, abacta per exsiccationem aqua, veram

(*l*) Diff. cit. n. 15. 37. 47.

(*m*) Ibid. n. 5. 10. 11. &c.

(*n*) P. v. MUSSCREN BROCK Institut. physicar. p. 267. 258. Franciscus LAMURE de secretionum in corpore humano in mechanismo p. 18. Cl. enim viri opus est, et si aliud non men pre se fert.

(*o*) Vir Ill. Car. Aug. a BERGEN position p. 19.

(*p*) Ref. ad SAUVAGE'S physiol. p. 180.

(*q*) Cel. HUNDERT MARK de vera mercurii virtute p. 13.

veram elementorum viscerum, quæ superfunt, gravitatem detegi. Nam in visceribus quidem post exsiccationem adeps, adeo evidenter superest, adque fibras vasculaque adhæret, ut vim veri omnino ipse vir Cl. senserit. Fatur enim, minus accurate per exsiccationem pondus specificum definiri, & ea ipsa proprietatum experimentorum refutatione pro re sua utitur (r). Cum enim post exsiccationem plus materie de glandulis salivalibus, quam de hepatæ superfit, quo ipso analogia in ordine ponderum viscerum humorumque infirmatur, respondet IDEM, oleosi & sebosi aliquid iis glandulis adhærcere (s), quod pondus augat: & ea adnotatione adeo libere utitur, ut etiam medullam encephali, propter adipis copiam, plus ponderis retinere ajat, quam oportuerat. Id vero facile quisque perspicit, in Hambergeriana exsiccatione quamque corporis partem eo plus de priori pondere conservaturam, quo plus habet adipis, qui per exsiccationem non disperat, eamque pinguitudinis portionem potius per aquæ exhalationem inventri, quam quidem verum vasculorum viscus componentium specificum pondus, & omnino ideo renes, & salivales glandulas plus videri de suo pondere retinuisse, quam alia viscera, quia plus habent adipis.

Verum, quando paulo propius pondera specifica humorum, cum specificis organorum fecerentium ponderibus comparamus, tunc quidem magis atque magis dispalefcit, nullam perpetuam utriusque ponderis proportionem efficit. Recipimus ea humorum pondera, quæ illi. Vir ipse proponit, ut bilis ponderissima, tunc urina, inde aqua, demum saliva sibi succedant, et si possemus de saliva clari viri experimento alia opponere, quæ salivam lotio ponderosiorem faciunt (t). Adde nunc huic seriei in supremo loco semen, quod ab illi. viro (u) omnium humorum humanorum ponderosissimum habetur, & utique in urina fundum petit: adde imo serici fini adipem, utique aqua & saliva leviorum, demumque succum nerveum, ex illi. HAMBERGERI proprio testimonio levissimum, fiet ejusmodi humorum series, quæ a gravissimo incipit, semen, bilis, urina, aqua, saliva, adeps, spiritus.

Repete nunc ho-um humorum cola, ex ipsis Cel. HAMBERGERI experimentis, erunt ea in hoc ordine. Gravissima est glandula maxillaris, quæ salivam

(r) *Physiolog.* p. 185, 186.

(s) Dill. cit. p. 24 n. 37.

(t) LAMURE l. c.

(u) Duplo sanguine ponderosius BUFFON *hist. natur.* T. II. p. 71. Semen in aqua subsidere debet SYLVIVUS *de gener hum.* In ariete adeo denium est, ut in acre coeat, & solo calore colliquescat IDEM T. V. p. 21.

salivam generat (*x*), deinde hepar, ren, cortex cerebri, testis (*y*). Vide, quam parum hæc series cum priori conveniat. Semen gravissimum paratur in organo omnium levissimorum. Bilis, quæ salivam pondere insigniter superet (*z*), generatur in viscere leviori, quam quidem salivæ colæ sunt. Spiritus omnium levissimi, in ponderoso organo percolantur; certo enim experimen-to comperi, & corticem cerebri in aqua promptissime subcidere, & me-dulla, iterum ex propriis HAMBERGERI experimentis, gravissima est (*a*). Oportebat autem ex hypothesi viri Celeb. spiritus, quorum pondus pene nullum sit (*b*) a cortice cerebri infinita pene ratione graviori repudiari (*c*). Atque adeo vides, levissimos liquores in ponderosissimis organis, gravissimos in levissimis generari. Ipsum argentum vivum, omnibus solidis partibus adeo magna ratione ponderosius, tamen & ipsum vascula subit, & levis ponderis impulsu, & in illos adeo leviores tubulos altissime pe-netrat & percolatur, per ipsa tenera vaporis cutaneo patentia vascula (*d*), per humoris aquei oculi fistulas.

Possent etiam hic adferri, quæ de vi adhaesiva humorum nostrorum certa-fide tenemus. Ea enim alia omnino in ratione est, quam specificum pon-dus. Cum enim pondera reperiret ejusmodi vir Clar. saliva 85, bilis 76, aqua 74, urina 72, cohaesiones fuerunt in hoc ordine, saliva 30, bilis 30, urina 10, aqua 10. Immensa ergo ratione urinæ vis adhaesiva minor est, quam quidem pondus, cum triplo minus, quam bilis cohaerat (*e*), & tantum exigua portione, atque $\frac{1}{3}$ minus gravis sit. In alterius Iatromathematici experimentis multo major virium adhaerentium a ponderibus diversitas est. Urina nempe, aliquanto quam aqua levior, adhesionem habet quadruplam, saliva octuplam, parem bilis, sebum, quod aqua levius sit, triplam, pix adeo levius 256 majorem (*e**). Sed in hypothesi III. HAM-BERGERI maxime de adhaesione ad vasa capillaria queritur, neque de gravi-tate quæstio est, nisi quoad cohaesione determinat.

Demum contra III. viri opinionem ea omnia faciunt, quæ contra vim specificam

(*x*) HAMBERGER physiolog. p. 190.

(*y*) Testis est ad hepar uti 1600 ad 2104. IDEM ibid.

(*z*) Al. can. sc. habet uti 272 ad 261. SELBERG L. c.

(*a*) Habet se ad hepar uti 3106 ad 2304. HAMBERGER L. c.

(*b*) HAMBERGER, SAUVAGE Elem. Physiolog. p. 175.

(*c*) p. 479.

(*d*) In vesicatorii aqua mercurius Lond. mag. 1755. sup. pl. 12 dudum citatus.

(*e*) LAMURE L. c. fin.

(*e**) In translat. p. 41.

specificam viscerum ad parandos unice definitos humores efficacem, jam produximus (*f*). Nam & mucus modo gravior aqua, modo levior (*g*) in eodem organo percolatur: & in easdem cellulas, lympha, & aqua, & adeps, vel jubente anatomico exit, vel ab ipsa naturæ potestate (*h*), aliisque & alii humores in eodem separantur, cum nulla specie veri dici possit, ejus coli gravitatem specificam mutatam esse.

Iterum, idem omnino humor, aut simillimus, eadem v. c. saliva, per diversi ponderis organa percolatur, glandulas nempe parotides, maxillares, pancreas, quarum glandularum pondera specifica sunt, ut 2050, 2660, 3029, enormi nempe discrimine diversa (*k*). Contra per organa parum diversi ponderis humores diversissimæ gravitatis exeunt (*l*), ut in exemplo, spiritus & saliva, quorum organa se habent, uti 1900 & 2050, adeo vicina, ut in tota serie, quam vir Ill. proponit, nullum propius pondus intercedat.

Denuo adhæsiones illæ, quæ in quietis humoribus locum habere dicuntur, non ideo perinde valent in humanis humoribus, qui celeri torrente per sua vasa feruntur, & quorum tanta est velocitas, ut vis adhæsionis cum eo comparata fere evanescat. Quare ipse vir Ill. vehementer urit, secretiones eo unice in loco fieri posse, in quo sanguis, quam lentissimo motu ferretur (*m*). Verum si tardæ aliquæ secretiones sunt, dantur certe & velociæ, quæ eam retardationem non suunt veram esse. Urinæ 200 unciae unica in hora per unum renem percolantur, qui aquas medicatas bibunt. Lacruma ab adfectu tristi evidentissimis, & celeriter sibi succedentibus guttulis per genas stillat. Vaporem perspirabilem de ore, deque tota cute videmus, rapidis nebulis exhalare. Deinde non eas esse humorum nostrorum retardationes, quæ viribus coherentibus locum facere possint, rapideque etiam per minima sanguinem fluere, & ego ostendi (*n*). & Clar. HAMBERGERI summus amicus, *Franciscus BOISSIER* (*o*).

Hæc

(*f*) n. 30. 31. 32.

(*g*) SENACI c. T. II. p. 105.

(*h*) p. 372. &c.

(*i*) LAMURE p. 18.

(*k*) HAMBERGER physiolg. p. 188.

(*l*) Si glandulam parotidem cum medallia oblongata comparaveris Ibidem ibid.

(*m*) DILL. cit. n. 19. &c.

(*n*) p. 195.

(*o*) p. 194.

Hæc omnia ipsum Ill. hypotheseos auctorem sensisse adeo manifestum est, ut ad varias excusationes vir alioquin minime sui diffidens descenderit. Adipeni, in exemplo, adfirmavit, parum omnino ab aquæ pondere differre (*p*): candem esse viscerum densitatem & vasorum negavit, quando aqua in cellulas adiposas penetrat (*q*); denique subtile discrimen inter pondus specificum visceris, & pondus specificum membranæ internæ vasorum in eo viscere secretiorum ponit *Ideæ*, ut omnino ad membranarum internarum eorum vasorum pondus specificum (*r*) consurgere posset, quoties visceris totius pondus suis finibus minus responderet. Cautus enim intelligebat vir acris, nullo experimento posse de pondere specifico eorum parietum constare, neque adeo se de eo asylo dejici.

Quare de hac tota hypothesi tamdiu æquum erit ampliasse, donec ve- rioribus experimentis, & vis cohesionis cum ponderum specificorum pro- portione concilietur, & postera vasorum secretorum firmius constituentur,

§. XXXVI. *An a densitate comparata.*

Iatromathematicus *Franciscus Lamure* aliam nuper viam ingressus est, ut arcana secretionum revelaret. Posuit primo loco, tubulos nostros secretorios in omnibus colis adeo arctos esse, ut humorum particulas non transmittant, nisi vi aliqua superaddita adigantur (*s*). Ad arctiorem enim diametrum perpetuo, dum vita supereft, vasa nostra nitit (*t*), siquidem arteria in cadavere duplo, quam in vivo animale arctior sit. Ita contractorum ductuum membranas internas in plicas collabi (*u*), quæ & ipsum ca- nalem vehementer arctant, & noncuplo omnino reddant angustiorem.

Nunc cæ angustiæ non possunt superari, nisi vires humoris cujusque ex velocitate & densitate natæ, tante fuerint, ut resistentiam ductuum excretoriorum superare valeant (*x*). Ductus ergo excretorios quasi clausos futuros, ad omnes particulas, quarum momentum minus sit, quam vis

P p p 2 refi-

(*p*) *Physiolog.* p. 197. cum magis utique differat, quam illi inter se humoros humani.

(*q*) p. 199. In cadavere penetrat. In cadavere omnia sua pondera; omnes sua densitates, Vir Ill. dimeritus cil.

(*r*) *Physiolog.* p. 180. 198. Diff. cit. n. 26.

(*s*) Diff. cit. n. 26. p. 31.

(*t*) p. 32.

(*u*) p. 33.

(*x*) *Ibid.*

resistens canalis secretorii. Et, quoties committi humores ad idem columni veniunt, admissum iri eos, quorum momentum distendendo conniventi lumini canalis secretorii sufficit (*y*), dum eæ particulæ repudiantur, quorum momentum minus est.

Deinde cum sentiat, fortiores humores, tamen per debiliora organa non percolari, neque urinam, quæ sit ut *z*, transfire in vias salivæ, cuius tamen momentum minus sit, & se habeat ut *x* (*z*), ad nervos se recipit (*a*), qui in glandulis numerosiores eorum colorum vim contractriam augeant. In hepate vero, cum salivam, urinam, aliosque humores aquosos, ex hypothesi, bilis colla oportaret subire, excusationem profert, sanguinem, ex quo bilis paratur, aquosus particulis non abundare (*b*).

Nunc quidem eam ductuum excretiorum enormem angustiam experimentum non confirmat. Viscerum vasa minima potius laxiora esse, quam in musculis aliisque partibus corporis nihil fecerintibus, alii Cl. viri, & in primis auctoris amici (*c*) sumperunt. Arterias viscerum alias vir Cl. internam membranam laxiorem, molliorem, rugosam, fere friabilem, cellulosam vero telam laxiorem esse, absque hypothesi docuit (*d*). Patuli dantur utique inter excretorios canales, in quos aer, utcunque levior minimique momenti capax, expeditissime transeat, ut in tenis exemplo, inque cellulis adiposis. Nervorum in glandulis majorem numerum anatomie rejicit (*e*). In hepatico sanguine aquam desiderari repugnat naturæ sanguinis venæ portarum, qui non unice de suis arteriis, sed præterea uberem de intestinis reforbit aquam continet, & aliorum organorum sanguine potius fluidior sit, minusque ad coagulationem inclinet (*f*).

(*y*) p. 34.

(*z*) ibid.

(*a*) p. 35.

(*b*) p. 38.

(*c*) SAUVAGE'S Mem. de l'Acad. de Berlin 1755. p. 49.

(*d*) Conf. interim L. I. p. 37. L. II. p. 99.

(*e*) Conf. p. 377.

(*f*) Conf. p. 34. & adda quæ suo loco adferemus ex MEKELLI, FASLEI & aliorum Cl. virorum, experimentis.

I N D E X
T O M I S E C U N D I .
ELEMENTORUM PHYSIOLOGIÆ
LIB. V. S A N G U I S .

S E C T I O . I.

*SANGUIS IN UNIVERSUM
CONSIDERATUS.*

- 1. Quantum sanguinis in vasis humani corporis continetur pag. 1
- Calculus sumitus a sanguine de vase emisso 1. 2
- 2. Non justus est, quia magna pars sanguinis in vase residet 2. 3
- 3. Calculus sumitus a magnis jacturis sanguinis 3. 4
- Quanta hic varietas sit 3. 6
- 4. Sanguis arteriosus a venoso param differt, aut nihil quidquam 6. 7
- Neque differe credit HARVEIUS 7
- Qui aliter ex hypothesos necessitate considerunt 8
- Sanguinemque arteriosum tenuiorem dicunt 9
- aut vicissim densiorem 9. 10
- 5. Veri discriminis vix quidquam subsistit, neque arteriosus sanguis a venoso colore differt 10. 11
- neque pondere 11. 12
- 6. Num aliquod in sanguine diversarum arteriarum discrimen sit 12. 13
- 7. Sanguis vivi hominis rubet 13. 14
- viciose paler 14
- Chylus in sanguine nonnuquam conspicitur 14. 15
- Sanguis niger 15
- 8. Sanguis sponte coit 16
- etiam in animalibus frigidis 17
- magis in hominibus corpus vehementer exercentibus 18

| | |
|------------------------------------|--------|
| & in febribus aliisque morbis | 18. 19 |
| 9. Etiam in vivo homine & animali | 19. 20 |
| 10. Polypus non verus | 21. 22 |
| 11. Polypi veri | 22. 23 |
| Eorum fabrica | 23. 24 |
| Signa vero polypi a dilatato corde | 24 |
| a symptomatibus | 25 |
| Polypi causa | 25 |
| Qui primum polypum descriperint | 26 |

S E C T I O . II.

ELEMENTA SANGUINIS

- 1. Calor pag. 27
- Quibus animalibus sanguis calet. 28. 29. 30
- Quibus minus vere dictus sit frigere 29
- Quibus vere frigescat 29
- 2. Ali sanguis calorem atmosphaerae constanter superet 30. seqq.
- Calor atmosphaerae aetivae medius 31
- Calor major 31
- Summi sextus exempla gradusque 32. 33
- Quem ultimum homines tolerant 34
- 3. Calor sanguinis non semper major est calore aeris, quem respiram 35. 35. 37.
- Qui sit calor sanguinis mediocris 35
- & summus 36
- 4. Sanguinis diverse partes 37. seqq.
- Haltus 37. 38
- levior est reliquo sanguine 38
- 5. Pars rubra sanguinis sive crux 38. seqq.
- serum pondere superat 38. 39
- tum aquam 40
- Pondus ejus ad aquam comparatum 40

P p p 3

6. Sponte

6. Sponte cruentis scissile quasi hepar cogitur pag. 41
etiam ipse absque fero cruentus 42. 43
cuni calore firmius 43
& a febre 43. 44
7. Idem sibi permisus dissolvitur 44
etiam in vivo homine 45
aut debili 45
aut in febribus nati moris 45. 46
8. Cruoris & feri in sanguine portio 47. 48.
Varie a variis definitur 48
quia serius aut maturius ad experimentum acceperunt 48
aut ob diversum humorum indolem ---
Sericea copia cum atate minuitur 49
9. Globuli cruentis 50
In frigidis potissimum animalibus compiciui ---
a LEEUWENHOEKIO detecti 51
a LEEUWENHOEKIO in primis descripti ---
10. Non sunt neque olei leves nullae 51
aut corpuscula rotunda ab attractione nata 52
Sed vera constantia sanguinis elementa ---
neque in aliis humoribus continentur ---
11. Figura. Num in frigidis plana 53
Non videtur 53. 54
Crassi enim sunt, nulla diametro parva 54
12. Magnitudo. Num in omne animale eadem 54. 55
Num in aliis alia 55
Quenam diameter cum pollice comparata 55
Variae Cl. virorum mensurae 55. 56
Videtur per exigua esse 56
13. Color. Num ob acervi crassitatem rubent 56
Proprius inest rubor 57
14. Copia varia est & in robustis major 57
Non parva in animalibus frigidis 58
15. Num figuram mutent. Qui admittunt 58. 59
Dubium videtur 59
16. Acre elasticus repleri dictum est 60
Sed non finit pondus, color, natura frigore minime densibilis ---
nec expansibilis ad calorern 61
17. Num globuli rubri ex minoribus spheralis constent ---
LEEUVENHOEKII experimenta 61
18. Globuli subris minores etiam aliis auctoribus vidi 62. 63
Globuli subris minores etiam aliis auctoribus vidi 63. 64
- Systema de crescentium globulorum BOERHAAVIE pag. 64. 65
19. Objectiones TABORI, LANCISI, BRENDELII 65
SENACI 66
20. Globuli majores, qui diffilierunt, fuerunt sunquam globuli rubri minores nisi 66. 67
Neque sanguis in lympham colliquescit 67
neque in de crescentium globulorum theoriis firmum quid esse videtur. 68
21. Fibrae in sanguine veteribus dicitur 68
nuperisque 69. 70
Experimenta quibus confirmantur. 70
22. Contraria argumenta BOERELLI 70
Non possunt admitti 71
23. Sapor sanguinis falsus 72
Sodium microscopio in sanguine visorium historiam 72. 73
non duplex liquet 73
24. Ut sanguis a salibus mediis admittit nubetur 73
An a nitro cogatur, an diluat 74
STAHLIUS cogi scribit 74
HOFMANNUS i solvi 74
Hec sententia vero propior videtur 74
Ruborem sanguinis auget 74
Tunc sal maius 74
& tartarus solubilis, & sal epsonensis 75
Non valde diluit idem 75
25. Acidi sales quid in sanguine mutant 75
Vegetabiles potius diluant 76
Fossilis potius cogunt 76. 77
In primis stillatitii inde natu liquores 77. 78
26. Sales lixiviosi dicuntur sanguinis fluiditatem augere 79
& ruborem intendere 79. 80
Alia tamen experimenta potius cogi ostendunt 80
& denigrari 81
etiam mea 81. 82
27. Spiritus inflammabiles sanguinem cogunt 82
tum olea stillatitia 83
28. Sanguis in vivo homine non alcaleficit. ---
ad cam tamen indolem accedit 84
29. Sanguis putreficit, aut a muciculorum motu
& a corporis exercitatione 84. 85 •
aut a febre 85
aliisque caufis 86
& a calido aere ---
vi mercurii 87
in scorbuto aliquaque morbis 87. 88
atque acerrimus fit 88
tum

- tum humor cancerosus —
 30. Phænomena putredinis 85. 89
 Aerem latenter expedit 89
 Sales lixiviosi putredinem adjuvant 90
 Acidi & medi sales eam morantur 90. 91
 31. Animalia aliqua vehementer acres 91
 & lixiviosos omnia humores habent 91. 92
 32. Omnitudo acer in animalium humoribus
 latet 92. 93. 94
 & per experimenta confirmatur 93. 94
 33. Animalia plerique fætent 95
 34. Analyti igneæ non uniuersum debet tribui
 95. 96
 neque vera corporum elementa repre-
 sentat 96
 Exarum resolutionium utilitas in morborum
 curatione 97
 35. Elementa in quæ sanguis igne resolvitur 97
 Aqua sanguinis 97
 Eius ad reliquias crux partes ratio 98. 99.
 apud varios scriptores varia ibid.
 per morbos mutabilis 100. 101.
 36. Spiritus sanguinis 101. 102
 Eius ad reliqua elementa portio 102. 103
 in morbis alia & alia 104
 37. Sal volatilis siccus 105
 eius in sanguine portio 105
 quomodo a morbis inutetur —
 38. Oleum sanguinis 107
 Siccus inflammatur 108
 portio, quam in sanguine habet 109
 & quemam in morbis sit 109. 110
 Oleum animale Dippelii 110
 39. Carb. sanguinis 111
 Portio ejus ad reliquum crux 112
 40. Sal sanguinis in igne fixus —
 Pars ejus lixiviosa est 112. 113.
 Pars mariti similes 113. 114.
 Eius portio 114
 41. Acer in sanguine latens 115
 Impugnatur 115. 116. 117.
 Confirmatur per experimenta 117
 42. Terra sanguinis 117. 118.
 Eius portio 118
 In sanguine subiude conspicua 118. 119.
 43. Terra ferrea sanguinis
 Varix experimentis confirmatur
 44. Aer sanguinis 122
 sive trigemina tertiam partem constituit —
 45. An spiritus inflammabilis in nostris humoribus sit 122
- pondus inter aquam & sanguinem 122. 123.
 2. Para seri gelatinosa pag. 124
 Sponte non adeo cogitur emissum —
 Sed in calore 148 grad. 125. 126.
 Cogitur etiam in vivo animale 125. 126.
 Inde para polyporum 126
 & cruenta inflammatoria —
 De ejus origine aliqua 127. 128.
 Coagula seri firma sunt 129.
 Ab igne in gummi siccatur —
 5. Lymphæ vavorum valvulosorum ejusdem
 nature est —
 tum aqua hydrorica, hydatidum ichor, &
 alii morbos humores 130
 & jus carnium 113
 quod ex frigidis etiam animalibus obti-
 netur —
 4. Serum in tempore dissolvitur, tum humo-
 res ejus similes 131
 & in febre —
 minus urinosum est 133
 5. pars mucilaginosa seri sanguinis 133. 134
 Admissus adeps, fabulum, acer 134
 6. Quid in lymphæ admitti fides mutant
 134. 139.
 Ab acidis liquoribus cogitur 135
 etiam a lixiviosis salibus 136
 & a filialitio spiritu 136. 137.
 7. Seri ad ignem analysis 137. 138. 139.
 ut a sanguine differat 139. 140.

S E C T I O N . IV.

ELEMENTORUM SANGUINIS
PROPORTIO ET UTILITAS.

1. Temperamenta in universum 146
2. Sanguineum sive globulorum rubrorum a-
 bundantia 142.
 Plethora vera —
3. Temperamentum acre & urinosum 142. 143.
4. Temperamentum aquosum & debile 143.
5. Comparantur illa cum veterum tempera-
 mentis 144. 145.
 Quatuor elementa GALENT 145
 & superorum 145. 146.
6. Cur admitti nequeant 146
 Atra bilis nulla est in fano hominis 146
7. Fumarium partium præcipua est in tem-
 perantibus efficientis dignitas 147
 Sanguinis taconstantia 148
8. Globulorum rubrorum utilitas 149. 149.
 Vasa melius distendunt 149
 aperient 149

S E C T I O N . III.

SERUM SANGUINIS.

1. Sapor seri falsus 122

| | | | |
|--|-----|---------------------------------------|-----|
| & in his vaſis inueniuntur | | sanguis dilutus | 354 |
| Male laudatur ſanguis tenuior | 151 | 11. Aqua facilius vaſa perfuit | ... |
| 9. Sphaerica figura refleſtientia minuit | 152 | humores varios generat | 355 |
| Ferri utilitas. Ad densitatem | 152 | aeris utilitas | ... |
| ad colorem | 152 | & caloris | ... |
| Olei utilitas ad calorem | 152 | 12. Globuli ex adipe lactis nascuntur | 356 |
| ad gluten conſtituentium | 152 | ſerum ex gelatina animali | ... |
| & humores varios | 153 | & mucilagine vegetabili | ... |
| 10. Seri utilitas. Ex eo partes firmae gene- | 153 | Sal ex acido fale plantarum | ... |
| rautur | 153 | Ferrina ex plantis eſt | 357 |
| & elementa uniuertur | 153 | | 357 |

L I B . V I .

ARTERIARUM ET VENARUM OFFICIA.

S E C T I O . I.

MOTUS SANGUINIS PER AR-
TERIARUM AXIN.

| | | | |
|---|----------|--|-----------|
| 1. M Ultia hic obscura & manca | 158 | 11. Neque a pondere partium corporis ani- | |
| 2. Sinus aortæ maximus | 159 | malis, que arteriis incumbunt | ... |
| 3. Aortæ magnus arcus | 160 | 12. Neque a vi contractili arterie | 372 |
| in rutiſ animalibus aliter se habet | 161 | Vis balneorum | ... |
| hominis proprius | ... | 13. Aliquid decadit a mutata arteriarum fi- | |
| eius varietaes | 162 | gura | 173 |
| Quinam primi veram fabricam statue- | ... | 14. Plus facit dilatatum lumen ramorum | 173 |
| runt | ... | Inventor hujus retardatiois <i>Giglianus</i> | |
| 4. Rami magnæ arterie principi | 163 | <i>Colles</i> | 174 |
| 5. Sanguinis motus secundum axin | 164 | 15. Allatio <i>Kittiana</i> | |
| 6. Ejus velocitas media | 164. 165 | avis, a Cl. <i>Borssier</i> proposita | ... |
| Emenationes <i>cranci</i> <i>Borssier</i> | 165 | Nondum certa proponi potest | ... |
| 7. Motus secundum axin celerior | 166 | Quia ratio luminum ramorum ad lumen | |
| 8. Particularum graviorum impetus major | 167 | trunci incoultans eſt | 175 |
| & longus promovetur | 168 | & ignorator | 175 |
| 9. Retardatio motus progressivi | ... | 15. Sed tamen necesse eſt, ab eo majori lu- | |
| Eius cauſe varix | 169 | mīne ramorum sanguinem retardari | 176 |
| Caufa non veræ | ... | Ut per experimenta confirmatur, facta | |
| 10. Pondus incumbentis atmosphæra | ... | in tubis duris | 177 |
| utique gravitat in corpus animalis | ... | in aneurysmatibus | ... |
| Inde dilatatur, quæcumque pars ab eo pou- | ... | in arteriis vivi animalis | ... |
| dere libera eſt | 170. | mensura decrementi ignoratur | 178 |
| Inde liquor quicunque in viscus irruit | ... | 16. Friccio varia | |
| quod in vacuo ſpatio eſt | ... | I. Quia a vaſis longitudine nascitur | ... |
| Sed omnino inde ſanguinis circulari motui | ... | vehementer ea celeritatem diminuit | ... |
| whil. decadit. | 171. | per experimenta | 178. 179. |
| | | II. Quia a tubis angustioribus | 179 |
| | | Per experimenta | 180 |
| | | III. Fo major f:qi , quo ſanguis cele- | |
| | | ris movetur | ... |
| | | IV. Friccio , quo nascitur a mutata fi- | |
| | | gura tubi. | 181. |
| | | aque gracia | ... |

BIBLIOT.

- internis arteriarum rugis —— 182
 20. & a figura conica convergente —— 183
 21. ab angulis rectis aut aliquoquin majoribus 183
 & obtusis —— 184
 Confirmatur haec retardatio 184
 22. Similia fere in corpore animali locum
 habent 185
 & longitudine vasorum de celeritate demit ——
 & anguitia 186
 23. & plicae 186. 187.
 24. & anguli magni, obtusique 187. 188.
 & major celeritas ——
 25. tum frictio sanguinis in ramis 189
 26. torrentes sanguinis in anastomosibus op-
 positi 189. 190.
 27. Sanguinis viscosus & cohæsus 190. 191. 192.
 Concurrit contra negatuos 191.
 28 Ergo sanguis utique retardatur in arteriis
 vivi animalis 192
 Qui primi retardari invenerint 192
 & nuperi ——
 29. Mensura retardationis Cl. Stephanii H-
 A-E-S 193
Francisci Boissier & aliorum 194
 30. Experimenta quid doceant 195
 nou tanta est retardatio —— 196
 & celeritas major quam poscit calculus ——
 31. Oportet ergo retardationem minuiri 197
 In minimis truncis lumen non est minus
 ramorum lumine 197. 198.
 aliqua frictionem minuunt 198
 32. Unde nova sanguini velocitas accedit 199
 Non a minori vasorum minorum dia-
 metro 199. 200.
 Neque a columna sanguinis in minimis
 longiori 200
 33. Neque a vi ponderis, quæ sanguinem tam-
 quam per bicursum tubum cogit ad cor
 redire 200
 Id pondus equidem passim sanguinem ad
 loci inferiora derivat 201
 & venosum cruentem regit ——
 In arteriosum parum potest ——
 Nulla est via bicursum tubi 202
 34. Num a nerve vi arterioso sanguini nova
 addatur celeritas 202
 Argumentum ab animi affectibus ——
 ab inflammatione ——
 Modus, quo sanguis a nerve vi inci-
 tetur 203
 Plurimæ art. riz laqueo nerveo compre-
 35. benduntur 204
 Vis etiæ, arterias ab ejusmodi laqueis com-
 primi possit ——
Haller Physiolog. Tom. II.
- indeque motus sanguinis & incitari &
 inhiberi 204, 205
 36. Sed ea parum firma sunt 205
 Nervi enim constringi nequeunt ——
 Pulvis non argutus a nervis irritatis
 neque a dolore ——
 aut a convulsione ——
 neque minitur a paralyse ——
 In placenta abique nervis sanguis circu-
 nit 206
 & in arteriis ossicis ——
 inque animalibus capite destitutis ——
 Non repugnat arterias magis irritabilis
 reddi ——
 tum cor ——
 Sed experimenta eo non pervenient ——
 37. Veræ causa accelerati motus sanguinis ——
 Contractio arterie ——
 In multis arteriis e. causa potestatem ha-
 bet 207
 Objectio sanguinem arteriis contractis ad
 cor repellit ——
 Respondet, non repellit, quia sanguis di-
 versas arterie sedes non simul, verum ex
 ordine follicula 208
 atque adeo sedes queque remotior suum
 sanguinem ad ultima determinat ——
 Ea succelit non percipitur 209
 Mensura contractionis, quæ dilatationis ——
 Non potest definiiri ——
 38. Nulla adaptare contractio in arteriis ani-
 malium frigidorum plerisque 210
 & animalium calidorum multis arteriis 211
 39. Eius contractionis causa 212
 In clavate queritur ——
 & in fibris arterie musculosis 213
 vi que nervea ——
 Purus est vis irritabilis ——
 Resistentia arteriarum ad vires cordis ra-
 tio 214
 40. Vis derivationis 214, 215
 Videtur ab elatere per universas arterias di-
 stributo nasci 215
 non multum ad motum sanguinis confort
 216
 41. Vis muscularum ——
 utique motum sanguinis faciat 217
 in arteriis tamen minus 218
 42. Phenomena motus progressivi turbati &
 laquentis 218
 Lentius sanguis movetur ——
 turbatur 219
 retrocedit ——
 oscillat ——
 Q. q. q. quies-

| | | | |
|--|----------|--|---------------|
| quieticit | 220 | comprimuntur vascula arteriarum | 237 |
| arteria inanitatem | — | 9. Arteriae lumen dilatatur | 238 |
| 43. Causae motus sanguinis a morte superfluitatis | 221 | Dubitatur de ea dilatatione | — |
| Via derivationis | — | Eius mensura sumtu difficultis | 239 |
| ponderis | — | Quomodo a parva unda sanguinis dilatatur | — |
| frigoris | 221, 222 | Sententia <i>Josse WEITBRONT</i> | — |
| Actractionis | — | <i>Josephi BRUNN</i> | 240 |
| evoluti aeris | 223 | Videtur explicari posse a successione istudum | — |
| inde Vampyri | — | sanguinis in diversa arteriae partes | — |
| De vita minima | — | Cur ea successio non percipiatur | 241, 242 |
| S E C T I O I I . | | | |
| <i>PRESSIO SANGUINIS LATENS KALIS.</i> | 224 | 10. Pulsus significatio | 242 |
| 1. Non est illa communis pressio a fluiditate nata | — | An a facultate pulsifica arterie | 242, 243 |
| 2. Arteriae semper plene sunt, tum in systole sua, tum in diastole | 224, 225 | 11. A quibus medicis pulsus plaustrum observati sint | 243 |
| Cur nonnunquam aut inanis adpareat aut imperfecte plene | 225 | Nuperi de pulsibus scriptores | 244 |
| Potest humor pelucidus repleto, quod vacuum videtur. | 226 | 12. Quibus in arteriis pulsus percipiatur | 244 |
| Potest vasculum se contrahere ad lumen minus | — | Ejus aberrations | 244, 245 |
| 3. Sanguinis unda super a corde expulsa celeriter est unda antecedente | 227 | 13. Pulsus celer & frequens | 245, 246, 247 |
| cumque supervenit | 228 | Hactenus distinguui possum | 247 |
| Id fieri demonstratur | 228 | In morbis tamen ratio separantur | 248 |
| Mentura discriminit celeritatis in utraque | 228, 229 | 14. Causa pulsus celeris, aut frequentis | 248 |
| Inculta est | 229 | Cor magis irritabile | 249 |
| 4. Ex ea causa sequitur pressio lateralis | — | in animalibus minoris molis | — |
| sanguinis | 229 | Abundantia stimuli, qui cor irritat | — |
| arterie exproprio in longitudinem | 230 | cor magnum | 249, 250 |
| etiam si cylindrica fuerit | — | hinc iu frigidi animalibus pulsus rarus | 250 |
| & pressio perpendicularis ad latera | 231 | Motus muscularis | — |
| ab ea aneurysmata aortae | — | Calor | — |
| & offex squamæ | — | cibus | 251 |
| & arterie disruptiones | 232 | obstaculum cordis evacuationi objectum | — |
| 6. Confirmatur hec pressio. Ex tarditate unde antecedentis | 232 | An ab anime consilio augatur | — |
| 7. Mensura hujus pressionis. Per observatos morbos | 233 | Debilis | 252 |
| per theoriam, ex saltu majori sanguinis dum cor micat. | 234 | Irritatio nervosa | — |
| ex copia sanguinis in quoque pulsu in veniam transeuntis. | 235 | Electricus torrens | — |
| Augetur eadem, quando circulus sanguinis moram patitur | — | Stimulus ab acridonia varia, in morbis | — |
| 8. Ejus pressionis effectus | 236 | a. cibis | — |
| Membrana arteriarum densantur | — | Cibus magnus & celer signum velocis circuitus sanguinius | 253, 254 |
| | | 15. Causa pulsus rari & tardi | 254 |
| | | Cor minus irritabile | — |
| | | minor copia sanguinis ad cor remitti frigus | — |
| | | circutus undique facilis & expeditus | — |
| | | Hinc sano homini pulsus rarus | — |
| | | non credibile est rarum esse in febribus | 255 |
| | | Rarus, a pulmone obstruто & respiratione difficulti pulsus | — |
| | | ex debilitate majori | 257 |
| | | tunc periculo plenissimum | — |
| | | Ante | — |

| | | | |
|--|---------------|--|------------|
| Ante mortem | 257, 258. | Utilitas in ducento sanguine infra sedem arterie impedita | 278 |
| Hic homines pro mortuis habeuntur | 258 | Alia in sanguine directio ad aliam & alias sedem determinatur. | 279 |
| Exempla pulsus deficientis | —seqq. | Coutrarii torrentes minuant celeritatem | 280 |
| 16. Pulsuum varietates pro estate varia | 259 | | |
| Primus numerum initiv KEPPLERUS | — | | |
| Pulsus hominis nascens | 260 | | |
| infantis | —261 | 4. Retia similia faciunt | — |
| pueri | 261 | & tritum particularum fangiinis | — |
| hominis adulti | 262 | 5. In vasculis minimiis nascitur globulorum mensura | 281 |
| Scnis | — | 6. Quae ex retardatione sequuntur | — |
| A temperamento varietates | — | Coagulation fangiinis | 282 |
| a sexu | 263 | 7. Dotes que ex istis sequuntur | 282. seqq. |
| a statuta | — | Fluiditas | —seqq. |
| 17. Matutini temporis | — | Sanguiis motu privatus cogitur | 283 |
| Sub noctem | 263, 264. | quomodo a motu fluiditas conservetur | 284 |
| Hec febricula natura: | | An motus intestinus in sanguine sit | 285 |
| In somno | | Non videtur | — |
| A cibo | | 8. Calor | 286 |
| A motu musculorum & corporis exercitatione | | Est a sanguine | — |
| 18. Pulsuum diversitates a cœli varietate, æstivo calore | 265, | hinc absque pulsu frigus | 287 |
| frigore hibernali | — | An si aliquis in corde innatus calor | 287. |
| a febribus | 265, 266 | An ab aliqua temptatione sit | 288 |
| Numeri pulsuum in febre levi, gravique | 265, 267 | Qui ita scriperint | 288, 289 |
| Pulsus in utroque latere inæqualis | 267 | etiam nuptime | 290 |
| 19. Pulsus alii. Magnus | 268 | Contra hanc hypothesis. Cor non calidius | |
| Pleins | — | 9. reliquo animalium corpore | 290, 291 |
| parvus | 269 | Sanguis non effervescit | 291 |
| Durus | — | Oleum a fale lixivioso in sanguine neque solvitur | |
| Æqualis & inæqualis | 270 | Neque calorem concipit | — |
| dicrotus. | — | neque putredio calorem generat | 292 |
| ecturnizans | — | neque urinofus sal in homine datur | 292 |
| Incindus | 271 | neque putreficit sanguis, qui moram non agat | — |
| Pulsus Cl. de Borda. | — | 20. Num sanguis a motu progressivo calefaciat | 293 |
| | | A tritu calor | — |
| | | Tritu calefcunt humores sanguini similes | 293, 294 |
| | | A motu solo animalia incalefcunt | 294 |
| | | etiam in summo aeris frigore | 295 |
| | | Motu sanguinis increbescere calor augetur | — |
| 1. Frictio sanguinis ad sua vasa | 272, 273 | Densitas globulorum ad calorem facit | — |
| globulorum inter se invicem | 274 | & ferrum | 297 |
| Motus vertiginosus in arteriæ diastro | 274 | & vasorum densitas | — |
| In systole | 275 | corticisque major vis | — |
| formatio globulorum | — | Calor diminuto motu cordis una diminuitur | 298 |
| 2. Ut eadem in rami se habeant | — | Pulsu subito tollitur calor | 299 |
| cur rami non rumpantur | 276 | Piscis non calet ob cor minus. & paucitatem sanguinis | 300 |
| 3. Anisito mole | — | Q q q. a sanguine | — |
| Earum usus in evitanda & corrigenda obstrunctione | 276, 277, 278 | | |

S E C T I O III

EFFECTUS MOTUS SANGUINIS PER ARTERIAS

1. Frictio sanguinis ad sua vasa 272, 273
globulorum inter se invicem 274
- Motus vertiginosus in arteriæ diastro 274
- In systole 275
formatio globulorum —
2. Ut eadem in rami se habeant
cur rami non rumpantur 276
3. Anisito mole —
- Earum usus in evitanda & corrigenda obstrunctione 276, 277, 278

- A sanguinis copia minori calor frangitur
 Pag. 301
21. Objectiones. Frictio in sanguine calorem non facit 302
Pices cum celerrimo motu calorem non generant 303
Caloris gradus non sunt in ratione pulsuum numeri —
Aucto motu sanguinis, non perinde augetur calor 304
Pulsus augentur absque caloris augmentatione 305
22. Hypothesis Roberti Douglass —
23. Quid de utraque sententia statui possit —
Non ab electrica materie calor 306
neque a frictione sanguinis contra frigidum aerem 305, 307
Respondetur ad rationes dictas n. 11. 307, 308
24. Motus sanguinis facit, ne putrefacat 309
25. & tamen disponit ad degenerationem utinam 309, 310
26. Globulos facit 310. *seqq.*
27. An etiam colorem rubrum.
 Rubor non est a figura sphærica 311
neque a densitate 312
neque a vicinia globulorum —
neque a pulmone —
neque ab aereo nitro —
Nitrum in aero nullum est 313
A laxiori globulorum congerie rubor 314
Non a lixivo sole 315
neque ab albore qui per serum pellucet —
28. Forte a sero sanguinis 316, 317.
29. Densitas, alia est a viscidity 317.
Densitas totius masse —
Densitas globulorum 317. 318
densitas utraque conjuncta 318
Num in pulmone densitas masse nascatur —
- Fit a globulorum numero 319
Globi ut densentur 319, 320
& serum —
30. Elementorum in sanguine separatio 321
31. viscidity 322

SECTIO IV.

- SANGUINIS PER VENAS REDUCIS MOTUS PROGRESSIVUS. 321
1. Motus idem 322, 322
2. Ut se habeat in venulis unius globuli capacibus 322
Non valde lentes est 322, 322
3. Ut in venis globulorum numerosiorum —
4. Quibus a causis acceleretur. 324
Causæ non veræ —
A motu cordis non acceleratur —
Neque multum potest vis venarum contractilis. —
Aut aliud valeat resistentia sublata 325
5. Plus potest figura venarum conica, & sanguinis in angustius lumen congeffio 325, 326
6. Adjuvant agentes musculi. 326
tum quod venas inter se positas compri-
maunt 327
tum quod cor remissio sanguine flimulent
tum quod respirationem accelerent 328
7. Derivationis vis 329
Accelerat sanguinis venosi iter 329
Sanguinem convocat ad partes non refi-
cientes 330
Minutus venefectio globulos rubros —
8. Causæ motum venosum mutanties 331
Respiratio circuitum ut adjuvat,
Sed eadem refluxum facit venosi sanguini-
nis 332
Lis inde orta auctori. —
9. Ab exspiratione & sanguis in venas re-
stitit de pectore, venæque intumescunt
& cerebrum turget 333
Ab inspiratione horum sunt contraria *ibid.*
10. Causæ phænomenorum 334
Prima, quod inspiratio iter ad pulmonem
& cor dextrum expedit —
Altera, quod expiratio thoracem expri-
mit 335
Aliqua de nixu 336
de diaphragmate stringente venam cavam
11. Refluxus in venam cavam ex contracta au-
ricularia —
12. Effectus anastomosium 337
Adjuvant motum sanguinis magis quam in
arteriis —
cum

- cum maiores sint
Faciunt ut sanguis per venas ad locum li-
berioriem fluere possit 338
Faciunt tamen torrentes contrarios 339
23. Friccio in venis minor est 339
Non tamen ideo quod conice divergant
id enim non verum est 340
24. Pondus vehementer mutat sanguinis ve-
nosi motum 340
25. Mensura celeritatis qua sanguis per ve-
nas redit 342
Varia proponitur] 342, 343
Est in ratione luminum venarum & arteriarum
344
26. Quanto tempore totus sanguis circumruit
majorem absolvat 345
Opiniones variae 345, 346
Difficultates aliquae 346, 347
Quid probabile videatur 347, 348
27. Motus sanguinis venosi perturbatus 348
Relapsus 349
Obliteratio venosa 349
28. Motus sanguinis venosi qui post mortem
superest 350

S E C T I O V.

P R E S S I O S A N G U I N I S V E N O S I

L A T E R A L I S.

1. Argumenta quibus rejicitur 350, 351.
2. Confirmatur ex similitudine arteriarum
ex vi derivatiostis
& pressione adeo venosa 352.
Car venae pulsū delittuantur 352, seqq.
variz hypotheses 353
A diminuto excessu unde posterioris fu-
per priorem 354, 355
4. Vitiosus venarum pulsus 355
Ejus causa. 355

S E C T I O VI.

E F F E C T U S M O T U S S A N G U I-
N I S P E R V E N A S 357, seq.

1. Effectus analogi eorum qui a motu arte-
rioso sunt 357
2. Effectus diversi
Mistio humorum 357, 358.

L I B E R V I L

S E C R E T I O H U M O R U M.

S E C T I O L

H U M O R E S Q U I A S A N G U I N E

S E P A R A N T U R.

1. Difficultas hujus operis 359
2. Classes humorum a sanguine separa-
torum quatuor 360
3. Clavis prima. Humores aquaci
Enumerantur 361
Utique puri non sunt 361
4. Humores mucosi
Eorum indoles 362
Experimenta cum variis salibus
& alcohole 362
& igne admoto 363

Q u a p a r t e r e p e r i a n t u r

- | | |
|--|-----------|
| U t i l i t a s | 354 |
| 5. Humores gelatinosi | 354 |
| Eorum indoles | 355 |
| Enumeratio | 355 |
| Liquor articulorum | 355, 356 |
| 6. Humores oleosi | 356 |
| Enumerantur | 356, 357, |
| 7. Humores composti & miscellanei | 357, 358, |
| 8. Humores varii pene perfecti in sanguine | 358 |
| reperiuntur | 358 |
| 9. In quoctaque colo quicunque liquor po- | 359 |
| teat separari | 359 |
| Perspiratio ad alvum, urinam, nares, | |
| Salivam, convertitur | 360 |
| exhalatio intellectialis migrat ad cutem | 370 |
| & urina in aliena cola exit | 370, 371. |

Q q q 3

I N D E X .

- muci loco aqua & lympha percolatur 372
 Lymphæ in aliena vase aberrat —
 & oleum 372. 378.
 & lac 373
 Etiam injecti liquores per vase sui diffimili
 lia excernuntur 373. 374.
- S E C T I O N I L**
- FABRICA. COLORUM S. ORGANORUM SECRETORIORUM** 374 seqq.
1. A quo humoris cola 374.
 Per vascula arteriis continuata — 374
 2. Per glandulas 375
 Glandulae conglomeratae —
 Earum fabrica. Acini 376
 tela cellulosa
 arteriæ 376. 377.
 nervi, in glandulis non magni 377.
 3. Ductus excretorii descriptio 378
 4. Num ultima fabrica acinorum cava sit 379
 5. Cavam esse MALLIGHIUS docuit —
 ex comparatione cum visceribus, que acini
 quis pariter conseruat 379. 380.
 etiam veris acinis, non crassioribus lobulis
 380. 381.
 II acini in nonnullis exemplis cavi sunt 381.
 6. Comparantur etiam cum glandulis, que ex
 simplicibus componuntur 381.
 manifesto cavis 381.
 7. Acinos cavos esse persuadet, quod per
 morbos augeantur 382
 & difundantur aut humore visceri cuique
 proprio 382
 aut alio viciose
 aut aqua, hydatidum exemplo 383. 384
 Inde constare creditur acinos viscerum ca-
 vos esse
 Sententia M ALPIGNII undique recipi-
 tur —
 8. Ruyshii sententia, glandulas ex vasculis
 componi 385
 Argumenta causæ. Vasorum repletio 386
 Transitus sebi ex arteria in ductum excre-
 torium —
 9. Objectio. Non tota viscera replentur, &
 multa materia non vasculosa superest 387
 Refutatur, eam materiem certe cavis
 folliculis non fieri —
 10. Aliæ argumenta. Exemplum acinorum
 tellis 388
 & fructuum hordeorum. —
11. Respondetur ad argumenta ex morbis re-
 petita 389
 Similes rotundi tumores nascentur ubique
 in cellulosa tela —
 12. tum hydatides 390
 Aliæ hydatides vasorum varices esse vi-
 dentur 391
 Opiniones aliæ de hydatidum origine 392
 13. Aliæ pro RUYSENII causa argumenta.
 393
 Secretionis imitatio per liquores in arte-
 rias injectos —
 Lentor nimius, qui ex fabrica glandulosa
 oritur 394
 & spissitudo ex lentore nata —
 14. Causa Ruyshianæ superat —
 Ea sententia exponitur 395
 Recipitur undique — 396
 15. Antonii FERENCIÆ vascula alba 397
 Jacobi Benigni WINSLOW villi exhalan-
 tes 397
 VESSEUXIE ordines ductuum excre-
 toriorum 398
 16. Muci cola. I. Exhalat ex arteriis —
 17. II. Glandula simplex
 in lingue basi 399
 18. Glandula membranacea 400
 Ductus excretorius
 varietates —
 19. Glandulae ex simplicibus compotæ, con-
 gregatae 401
 20. Sinus mucosi simplices 402
 21. Organa que liquores gelatinosos fecer-
 nunt 402
 Arterie exhalantes 403. 404.
 22. III. Glandula conglomeratae, in articulis
 posite. 404. 405. 406.
 23. Ex sigillatum recententur 406. 407. 408
 24. Aliæ congenites, simplices glandulae 408
 25. Vix quibus humores oleosi de sanguine
 separantur —
 Exhalant aliqui —
 Alii per folliculos generantur 409.
 Glandularum sebacearum catalogus 409.
 410
 simplices 410
 Aliæ absque conspicuo ducto —
 Aliæ cum ductu excretorio —
 Aliæ composite 411
 Aliæ de sinuum genere —
 26. Peroratio Colligitur in quibus organis
 quodque humoris genus nascatur —

S E C.

SECTIO III.

*CAUSE QUÆ FACIUNT, UT
IN DEFINITÆ FABRICÆ
ORGANO SUUS SEMPER
DE SANGUINE HUMOR
SEPARETUR.*

412

1. **R**ei difficultas 412
Non cui libet humorum classi sua glandulaum tribus respondet ——
2. Conditions que ad secretionem preparant 413
Sanguinis ad aliquæ colæ ejusmodi advenit, qui peculiariter simili sit humoris, qualis in eo colo generatur ——
Exemplum in hepate ——
Aliud in capite. Eo tendunt particule volatiles 414
3. Particulæ definitæ indolis copiosius se ad nonnulla cœla offerunt 415
exemplo particularum levium, rotundatum, gravium ——
Leviores particulæ ad ambitum arterie separatrix feruntur 416
aut arteria jani separata particulas adserit ——
4. Velocitas sanguinis in aliis & allis partibus alia esse potest 417
quibus de caulis 418
Effectus velocitatis majoris 418. 419
Copia secreti humoris major 419
Particularum majorum separatio *ibid.*
secretiones impure 420
fluidorum humorum 420
5. Tardioris in sanguine arterioso moti humoris causa 421
Effectus, humores puri 421. 422
visci 422
duplicatus effectus tarditatis 422, 423
6. Qui velocitatem consideraverint 423
Cause diversorum humorum separandorum, que sunt in ipso colo *ibid.*
Habitus arteriolarum ejus organi 424
Arteriole rectæ *ibid.*
Flexæ 425, 426
Anguli ad quos rami secedunt 426
7. Quantum huic retium discrimini possit tribui 427.

- Non videtur esse causa quare alii & alii humores separantur *ibid.*
8. Diversa diameter vasculi, quod ab arteria succum separatum recipit. 429
Vasorum series *ibid.*
in hac cum experimentis conveniat 429
Diversus ordo quo vascula secessentia nascentur 430, 431
Qui hac consideratione usi sint 431
9. Contra hanc theoriam objections 432
a vasibus majoribus adulti animalis, & minoribus in animale juniori *ibid.*
10. Ad eas objections ut respondeatur 433
Humor, nostræ alii alii ponderosiores sunt *ibid.*
Francisci Boissier conjectura de evolutione vasorum separatariorum *ibid.*
Cur eam non licet admittere 434
Evolutio vasorum in adulto homine non probabilis est 435
Facilius difficultas solvit 436
11. III. Diversa densitas ostioli separatorii non repugnat ab anatomie 437
12. IV. Alia & alia vis irritabilis in organo secretorio 438
Per experientia confirmatur 438. 439. 440
etiam a stimulus, qui oltio excretorio quo adplicantur. 440. 441
Hypotheses ad nervennam vim explanandam excogitate 441
Animæ vis secretionum gubernatrix 441.
442
cur admitti nequeat 442
13. V. Ductus excretoriæ semper in principio suo potest rectius esse 442. 443
brevisque 443
qua inde sequantur 443
Potest flexus esse variis modis 444
longusque 445
Eius fabricæ effecta 444, 445
14. VI. Polliculus, & receptaculum 445
Exempla receptaculorum 446
15. Receptacula retainent separatum humorum 447
sphincteres quibus clauduntur. Manifesti inconficiuntur 447. 448
16. In folliculis humor spissatur 449
17. Reforatio particularum tenuiorum in folliculis ostenditur fieri 450. 451
18. Quare humores in folliculis deparentur aquæ nimia copia abacta particulæ augentur, que cujusque humoris characterem constitutum 451
19. In

19. In folliculis etiam diversi humores com-
misercentur & nascuntur ex miscela novi
252, 453
20. Humores in folliculis morantes actinom-
niū m. uris tam concipiunt. 453, 454
21. Folliculi retinent humores, ut possint ex-
cessu majori copia & tempore legitimo
454, 455
22. Quibus a potentissimis folliculi iuxta manutur
455
- Follicelli minores a fibrīs inconspicuis
455, 456
- 1 Majores a fibrīs muscolosis circumpositis
456
- Cingula muscolosa toti latē corporis ca-
vez circumposita 457
- utique pressio mechanica ea receptacula
inanit *ibid.*
23. Receptacula varia 458
- Quonodo evacuantur 458
24. VII. Conditiones jam recensē varie com-
binari possunt *ibid.*
- Ut eadem visciditatis causa in truncō &
ramis *ibid.*
- aut diversæ causæ lentoſis 459
25. Quæ expoſuimus in compendium redu-
cuntur 456
- Humorum elementa, quæ sunt in sanguine
456
- Humores viscidii trium generum *ibid.*
- Ad ipsas in crassissima polli sanguinem ollia
exit *ibid.*
- in minora aliquanto lympha 461
- iterum in aquiliora nucus *ibid.*
- & denuo in arcta aqua 462
- aliqua tamen aquæ portio cum sanguine
manet *ibid.*
26. Ut diverse causæ visciditatis combinan-
tur in bile in semine. 453, 454
27. Ut ad aquosum humoris generationem con-
ditiones consentiant 364
- In reue *ibid.*
28. Hypotheses variae 465, *seqq.*
- Fermenta HELMONTIÆ 466
- Zelona WILLESI 465
- Gallehni COLE *ibid.*
- Johannis PASCAS 457
- Lauſe, cur admitti nequeant 463
19. Figure pororum ad certas particulas tran-
mittendas aptæ 468
- Cause quare non possit recipere 469
- Argumenta Archibaldi PITCAIRN 459, 470
30. Cola, sive humorum ad primigenios hu-
mores, in quoque organo secretorio refi-
duentes attractio. 471
- aut ad certe densitatis tubulos 471, 472
31. Non verum est, in eodem organo se-
cretorio a primis vitæ principiis eundem
humorem separari 472, 473
- ne in plantis quidem 473
32. A definita densitate vasa certi humoris
num trahantur 473, 474
- Id repugnat experimentis 474
- Nam per quodque fere colum quisi quam
liquor transit *ibid.*
- & in animalibus, quorum vas a diversissi-
ma sunt densitate, tamen simillimi hu-
mores pecoolantur 475
33. Adtractio particularum similium a KERI-
ZIO proposta. 475, 476
34. Adhesio ad partes vasorum exercen-
tium solidas, major, ut earum pon-
ditus specificum propius est specifico
humoris ponderi 476, *seqq.*
- Hæc hypothesis ex HAMBURGERO pro-
ponitur 477, 478
35. Animadversiones 479, *seqq.*
- Non recte definitur pondus viscerum spe-
cificum 479, 480
- Neque pondera viscerum a CL. VIRO de-
finita sunt in ratione ponderum humo-
rum 480, 481
- Et humores diversi ponderis per idem or-
ganum pecoolantur 481
- Et adhesio in humoribus motis parum po-
test 482, 483
- Auctor ipse sensit hypothesos iniuriantem
483
36. Hypothesis Francisci LAMURE 483
- Ad eam animadversiones 484



ERRA-



